



0. K.




DANIELIS
SENNERTI.
D. ET MEDICINÆ
IN ACADEMIA
VVITTEBERGENSI
Professoris publici,

PRACTICÆ MEDICINÆ

Liber Secundus.

*Olim in Germania, iam secundo in Gallia Typis excusus multisque
quibus scatebat erroribus repurgatus.*



PARISIIS;

M. DC. XXXII.





Illustrissimo, ac Celcissimo Principi, ac Domino,

**D. GEORGIO,
LANDGRAVIO
HASSIÆ, COMITI
CARTIMELIBOCI, DECIÆ,
Zygenhaynæ, & Niddæ, &c.**

DOM. MEO CLEMENTISSIMO,

Salutem & Felicitatem perpetuam.P.



OR vita principium & caloris innati fontem esse, idemque primum vivere, postremumque mori, & reliquas corporis partes ex eo vitam haurire, nec actiones suas obire, nisi vitali calore & spiritu per arterias ab eo transmissio perfundantur, in scholis Philosophorum & Medicorum notissimum est. Nam, ut Hippocrates, lib. de corde, eleganter scribit, αἵται πῦραι φύσος ἀνθρώπου, καὶ οἱ ποταμοὶ ἐν ταῦτα ἀνὰ τὸ σῶμα, τοιοῦτον ἀρδεύεται τὸ σῶμα, ὅτοι δὲ καὶ ζῶνι πέφυκεν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἀναπνεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων. Hi sunt naturæ humanæ fontes, hincque

EPISTOLA

flumina excurrunt, quibus corporis nostri tabernaculum irrigatur. Atque hæc vitam homini conferunt, & si exsiccata fuerint, homo perit. *Et Galen. 6. de usu part. cap. 7.* ἡ καρδία τῆς ἐμφύτου θερμασίας, καὶ ἡ διοικοῦσα τὸ ζῶον, οἷον ἐστὶν αὕτης ἐστὶ καὶ πηγὴ. Cor caloris natiui, quo animal regitur, quasi fons quidam & focus est. Nimirum quod Sol est in maiore mundo, id cor est in minore. *Ut enim Sol lumine suo vniuersum mūdum illustrat atq; exhibet, & calore suo omnia vivificat, ac fouet: ita Cor calore suo & vitali spiritu totum corpus viuum & vegetum reddit, idq; fouet, conseruat, spiritusq; vitales, tanquā radii quidam ætherei & viuifici, à corde in vniuersum corpus dimanant.* *Et, ut Arist. 3. de par. anim. c. 7. scribit: Cor est οἷον ἐστὶν αὕτης ἢ καίεται τῷ φύσει τὸ ζῶον, quasi focus, quo nature foemites & primordia ignis natiui continentur. Ac propterea etiam ut, eodem in loco, Aristot. scriptum reliquit, locum suum ὡς περ ἀκρόπολιν τῷ σώματος, veluti arcem corporis occupat.* Conditor enim rerum sapientissimus ipsi in thorace, media corporis regione, qui maxima ex parte offensus est, locum dedit, atque antè sternum; à tergo spinam dorsī quasi munimenti loco constituit, quibus ex latere utroque costas securitatis gratia adiunxit. Imò in dorso omoplatas seu scapulas, quas Celsus scopula aperta nominat, quasi scuta cordis, apposuit. Intus verò cor totum pulmonibus cinxit, quibus non solum tanquam puluino incumbit, (vnde etiam Auicennas pulmones cordis culcitram vocauit) sed qui etiam respirationis organa sunt, quo calidum quod in corde est, conseruatur. Atque si hæc omnes corporis partes saluæ sunt: æconomia etiam corporis rectè administratur, & sicut in regno, cuius Princeps, cum iis, qui à secretis ipsi sunt consiliis & primariis administrationibus, valet & floret, omnia rectè atque ordine sunt & administrantur.

DEDICATORIA.

ita etiam, dum Cor in sua regione bene sese habet, calorem viuisicum in omnia mēbra diffundit, eaque fouet, τὸ γὰρ πᾶν
 ἔα καὶ ἀμύπει χαρίτων ἔαρ, omnia florent, & fulget ver Gratiarum, ut est in antiquo Aripbronis Sicyonii hymno; nisi pars aliqua priuato vitio teneatur: quod ipsum tamen facilius toleratur, si Cor hilaritatis auram aspiret. Contra verò sicut, dum Rex egrotat & de salute periclitatur, omnes subditi in mœrorem & squalorem coniciuntur: ita etiam, Corde malè affecto, totius corporis salus simul in discrimen coniecitur; id quod non solum in lipothymia & syncope, sed & in respiratione lesa accidit, atque ubi illa caloris in corde ventilatio necessaria cessat, aëre, quem spiritui ducimus denegato, homo in presentissimum vitæ discrimen coniecitur, ut in iis, qui angina laborant, vel quibus aëre aliqua in orificium asperg arterie illapsa spiritus intercluditur, aut qui laqueo strangulantur, vel aqua aut carbonum fumo suffocantur, manifestum est.

Cum ergo libro primo Practicæ, quem anno superiore edidi, Capitis præter naturā affectiones cōplexus sim, secundo hoc libro morbos ac symptomata Cordis, & reliquarū thoracis partiū, quæ gratiā cordis inprimis factæ sunt, cōplecti libet.

Ut verò illustrissimo nomini tuo, Princeps Celsissime, hoc quicquid est operis inscriberem, causas, ut opinor, non leues habui. Primum enim satis superq; notus est illustriss. Celsus. T. erga bonas literas amor, & earum cultores incredibilis beneuolentia, quam cum alia manifesta faciunt, tum id, quod, insigni & Principe digna benignitate ac liberalitate Academicæ Marpurgensem bonarum literarum virtutis & pietatis officinam illustrē alit, fouet ac tuetur. Eum ergo, illustr. T. Celsitudinis in bonas literas affectum etiam hanc qualicumque Dedicatione posteris notum facere & commendare volui. Deinde quia scripta mea omnia iure quodam illustrissimæ Domni Saxonice, utpote in electorali

EPIST. DEDICATORIA.

Saxonica Academia nata, debentur, cum ea verò illustrissima Domui Hassiaca à multis annis fœderis sanctione contracta necessitudo, & Illustriss. T. Celsit. inprimis arcta intercedit cognatio & affinitas: hoc opus iure Illustriss. T. Celsitud. deberi existimo.

Accipe ergo, PRINCEPS ILLVSTRISIME, hoc quicquid est operis Medici, vultu beneuolo & fronte serena, atque eo affectu, quo aliàs bonarum literarum cultores, & qui quocunque modo ad Illustrissimam Domum Saxonicam spectant, complecti soles, & m. is conatibus faue. Deus ter. Opt. Max. Illustriss. T. Cels. Saluam, incolumem, & omni ex parte beatam, felicemque prestat, ac teneatur. VVitebergæ, Cal. Augusti, Anno Christi M. DC. XXI X.

Illustriss. Tuæ Celsitud.

Subiectissimus

DANIEL SENNERTVS, D. Sereniss.
Elect. Saxon. Medicus, &
Facultatis Medicæ ibid. Pro-
fessor ac Senior.



INDEX CAPITVM
LIBRI SECVNDI
PARTIS PRIMAE,

*De Oris ac Fancium, & partium in his contentarum
ægritudinibus.*

Cap. I.	De labiorum tumoribus.	Pag. 3.
ii.	De labiorum fissuris.	4.
iii.	De labiorum vlceribus.	6.
iv.	De labiis vulneratis, leporinis, & curtis.	8.
v.	De tremore & perversione labiorum, sanguinis fluxu ex iis, & labiis liuidis.	9.
vi.	De oris apertione læsa.	10.
vii.	De oscitatione.	11.
viii.	De oris distortionem.	12.
ix.	De pyralismo seu crebra sputatione, & salivæ defectu.	16.
x.	De dentium morbis.	21.
xi.	De dentium dolore.	29.
xii.	De dentium stupore & algore.	47.
xiii.	De dentium stridore.	48.
xiv.	De dentibus nigris malè coloratis & sordidis, ut & de sanguinis è dentibus fluxu.	49.
xv.	De dente aureo pueri Silesij.	51.
xvi.	De gingivarum affectionibus.	52.
xvii.	De morbis & symptomatibus maxillarum.	57.
xviii.	De oris vitiis & primò de eius inflammationibus & vl- ceribus.	60.
xix.	De fœtore oris.	68.
xx.	De gurgulionis laxatione.	70.
xxi.	De gurgulionis inflammatione & exulceratione.	73.
xxii.	De tonsillarum inflammatione & vlceribus.	77.
xxiii.	De iis, quæ in guttur vel gulâ inciderunt, eximendis.	82.
xxiv.	De angina.	85.
xxv.	De strumis in collo, & bronchocele ac hydropse gut- turis.	114.

LIBRI SECVNDI

PARTIS SECVNDAE,

De asperæ arteriæ, pulmonis, mediastini, diaphragmatis, & thoracis præter naturam affectionibus.

Cap. I.	De asperæ arteriæ morbis.	Pag. 125.
ii.	De Pulmonis intemperie.	130.
iii.	De pulmonis inflammatione, siue peripneumonia.	134.
iv.	De valorum pulmonis & primò de asperarum arteriarum angustia.	146.
v.	De læuium pulmonis arteriarum angustia.	153.
vi.	De apertione valorum pulmonis.	156.
vii.	De gradine, calculo & vermibus in pulmone genitis.	165.
viii.	De tuberculis pulmonis.	167.
ix.	De hydrope & hydatidibus pulmonis.	173.
x.	De pulmonum cum latere coalitu.	ibid.
xi.	De pulmonis vulneribus.	172.
xii.	De vlceribus pulmonum & phthisi.	175.
xiii.	De mediastini inflammatione.	192.
xiv.	De diaphragmatis tumoribus, & primò de inflammatione.	193.
xv.	De vulneribus diaphragmatis.	195.
xvi.	De pleuritide, seu inflammatione pleuræ, & musculorum thoracis.	196.
xvii.	De thoracis vulneribus.	238.
xviii.	De fistulis thoracis.	242.
xix.	De empyemate.	243.
xx.	De hydrope pectoris.	251.
xxi.	De vertebrarum dorsii luxatione & gibbositate.	254.
xxii.	De fractura foemineæ & vulneribus spinalis medullæ.	255.
xxiii.	De tabe dorsali.	ibid.
xxiv.	De vermibus dorsii.	258.
xxv.	De luxatione & fractura costarum.	260.
xxvi.	De mucronatæ cartilaginis prolapsu.	262.

LIBRI SECVNDI

PARTIS TERTIAE,

*De symptomatibus, quæ pulmonibus & thoraci
accidunt.*

Cap. I.	D E respiratione læsa in genere.	Pag. 27.
ii.	De asthma & orthopnœa.	275.
iii.	De suffocatione seu strangulatione.	295.
iv.	De vitiiis vocis & sermonis.	292.
v.	De tussi.	305.
vi.	De dolore pectoris.	318.
vii.	De sputo sanguinis.	320.

LIBRI SECVNDI




PARTIS QVARTAE,

*De Morbis ac symptomatibus
cordis.*

Cap. I.	D E morbis pericardij.	Pag. 329.
ii.	De cordis intemperiebus.	331.
iii.	De reliquis cordis morbis.	337.
iv.	De cordis palpitatione.	338.
v.	De virium imbecillitate.	348.
vi.	De lipothymia & syncope.	352.



INDEX QVÆSTIONVM:

- i.  N salua conglutinationem vulnerum labio-
rum remoretur? Pag. 8.
- ii.  An tortura oris & spasmus cynicus diffe-
rant? 12.
-  An spasmus cynicus sit morbus vel symptoma? 16.
- Ad cera dentibus cariosis commodè indatur? 22.
- v. An cauteria tutò in dentibus cariosis adhibenda?
ibid.
- vi. An dens lupi gestatus in dentitione puerorum aliquid
præstet? 47.
- vii. An in tonsillarum inflammatione repellentia solùm in-
tus applicanda? 79.
- viii. An angina à cibis & medicamentis peculiari vi agenti-
bus induci possit? 88.
- ix. An cacochymia primam occasionem præbeat angina?
98.
- x. An in angina rectè à Chymicis vomitoria & antimo-
nialia exhibeantur? 99.
- xi. An pilulæ in angina exhibendæ commodè dissoluan-
tur? ibid.
- xii. Quâ formâ repellentia in angina exhibenda? 100.
- xiii. An omnis angina sit ab inflammatione? 111.
- xiv. An humor anginam excitans à cerebro & capite de-
fluere possit? 112.
- xv. An vera angina sit, quæ ab usu fungorum & similibus
venenatis rebus oriri dicitur? 112.
- xvi. An nidus hirundinis aliquem in angina curanda usum
habeat? 113.

xvii.	An laryngotomia tuta & utilis sit?	114.
xviii.	An bronchocele & struma in gutture sit idem morbus?	114.
xix.	An strumæ & serophulæ differant?	116.
xx.	An strumæ à Mercurio seu aquis ex montibus metallorum feracibus scaturientibus & Mercurium in se continentibus oriantur?	117.
xxi.	An vlcera alperæ arteriæ sint sanabilia?	130.
xxii.	An in peripneumonia hæmorrhagia narium utilis sit?	145.
xxiii.	An dulciæ in peripneumonia conueniant.	ibid.
xxiv.	Quænam sit causa hydropis, quæ læuium arteriarum obstructione laborantibus superuenire solet?	155.
xxv.	Medicamenta grumos sanguinis in thorace dissoluentia quo tempore sint exhibenda?	161.
xxvi.	Qualis ær in apertione vasorum pulmonis ab ære frigido conueniat?	165.
xxvii.	An vlcera pulmonis sint sanabilia?	190.
xxviii.	An in phthili cochleæ utiles sint?	191.
xxix.	Quæ pars afficiatur in pleuritide?	197.
xxx.	An bilis, pituita vel melancholia sola pleuritidem generet?	198.
xxxi.	Quales febres sint pleuriticorum?	199.
xxxii.	Quæ vena in pleuritide & quo in latere aperienda?	209.
xxxiii.	An in pleuritide ex vna vena aperta simul reuulsio & deriuatio fieri possit?	211.
xxxiv.	Mulieribus mensium suppressione laborantibus, quænam vena sit secanda in pleuritide?	212.
xxxv.	Quando secanda sit vena in pleuritide?	213.
xxxvi.	Quantum sanguinis sit mittendum?	ibid.
xxxvii.	An in omni pleuritide detur inflammatio pleuræ?	221.
xxxviii.	An in pleuritide sola pleura, an verò simul pulmo inflammetur?	222.
xxxix.	Per quas vias materia in pleuritide ad asperam arteriam perueniat, & inde tussi eiiciatur?	224.
xl.	Quæ vena in pleuritidis initio aperienda sit?	226.
xli.	Per quas vias è thorace materia ad aluum & vesicam peruenire, & hinc euacuari possit?	235.

- xlii. Qualisnam sit febris, quæ empyemati coniungitur? 249.
 xliii. Quo in loco sectio thoracis in empyicis instituenda sit? 250.
 xlii. An humor asthmatis causa hæreat etiam quandoque extra bronchia pulmonum? 290.
 xlv. An asthma frequentius à catarrho, an vero ab humore crudo è venis in pulmones effuso excutitur? 291.
 xlii. An asthma semper sit sine febre? 292.
 xlvii. An purgantia in paroxylmo asthmatico conueniant? 292.
 xlviii. An vis calli decrepiti asthmaticis conueniat? 293.
 xlix. An arsenicum summis in asthmaticis tutius recte admisceatur? 293.
 l. An virtus attenuans simulque tenuis asthmaticis conueniat? 294.
 li. An tussis sit solum ab angustia tracheæ arteriæ? 316.
 lii. An aliquid in pulmonem ex ore delabatur? 317.
 liii. An in sputo cruento sanguis semper è brachio, an vero etiam è talo & cruribus, præcipue in foeminis mittendus sit? 328.
 liv. An lunatica passio dicta puerorum & infantium ex vermicibus in pericardio ortis accidat? 330.



LIBER SECVNDVS.

PARS PRIMA.

DE

ORIS AC FAUCIVM

ET PARTIVM IN IIS

contentarum ægritudinibus.

Prooemium.

INTER Cranium & pectus, os, fauces, & collum interiacent. Os, Græcis *Στόμα*, dicitur tota illa cavitas, inter labia & buccas, ac initium gulæ, & aspera arteriæ contenta. Et proinde ad os pertinent Labia, Lingua, Dentes, Gingivæ, Maxilla, Columella, Tonsillæ, Fauces, quæ sunt illa oris extrema pars, vnde gula, & aspera arteria incipiunt. Itaque postquam morbos, & Symptomata, quæ capiunt, & cerebro, ac sensuum externorum organis accidunt, explicauimus, antequam ad ægritudines Pectoris accederemus, ordo postulare videtur, ut de harum partium vitijs agamus.

Dicendum ergo de Labiorum tumoribus, fissuris, &

vlceribus, de labijs malè conformatis, & curtis, de osci-
 tatione, de Labiorum tremore, de eorumdem conuulsione,
 seu spasmo Cynico, de Ptyalismo; de lingua asperitate,
 magnitudine nimia, inflammatione, & tumore, de Lingue
 fissuris, vulneribus, combustione, de Ranula sub Lingua,
 de lingua motu lasso; de Dentium corrosione & carie, va-
 cillatione, ordine, & numero vitiato; de dolore Dentium,
 de stupore, de colore eorumdem vitiato; De Gingivarum
 inflammatione, excrescentia, cruentatione, putredine, car-
 nis diminutione, vlceribus; de Maxillarum vitijs; de
 Oris vlceribus; de Oris fatore; de Columella laxitate;
 de inflammatione eiusdem; de vlceribus Columellæ; de
 absorptione & erosione eiusdem; de Tonsillarum tumori-
 bus & inflammatione; de earumdem vlceribus; de ijs que fau-
 cibus, & gutturi præter naturam inharcent, extrahendis;
 de Angina & colli vitijs.



CAPVT PRIMVM

DE LABIORVM

tumoribus.

Labiorū
vsus.



LABIORVM vsus multiplex est. Primò enim os claudunt, vt per nares solum, nisi aliud necessitas postulet, fiat respiratio, ac ne, si illud perpetuò, vbi semel propter cibum, vel potum sumendum, vel respirationem aperire necesse est, hians ac dilatatum maneret, omnis generis corpuscula, muscas, paleas, puluerem admittat, atque etiam dētes & gingiuꝝ frigore, ventisque lædantur. Præterea ad formandum sermonem sunt vtilia, præcipuè ad efferendas litteras labiales, ita dictas, quod ad earum prolationem labia maxime sunt necessaria. Seruiunt etiam ad porus faciliorem assumptionem, neque sine iis porus commodè assumi posset. Vtilia quoque sunt ad cibum in ore continendum iis, qui molaribus dentibus destituti, incisoriis tantum masticare coguntur. Faciunt etiam labia, ad saluam ex ore eiciendam, vt & in ore detinendam, ne illa continuò ex ore proflueret, & insignem turpitudinem pareret. Vtilia sunt, & ad sonos variandos tubicinibus: infan-

tibus item ad sugendum. Tandem per se ad ornatum multum faciunt. Monstrosus enim omnino esset homo, si detuncatis labiis rictum irati canis ostenderet. Contrà homo si labia lenia, rubicunda, magnitudine moderata, vs debito modo claudentia obtineat, insignis inde gratia, & ornamentum ipsi conciliatur.

Atque hæc omnia præstant labia, si naturalem suam conformationem habeant: præstare verò non possunt, si eam amittant, & vicia aliqua contrahant, de quibus iam dicendum.

Et quidem primò de Labiorum tumoribus, & magnitudine aucta dicemus. Nam prima nonnumquam labia nimis crassa, & magna sunt. Et quidem in quibusdam labrum superius est magnum, & crassum, & duplo sæpè maius, vnde non tantum deformitas oritur, verum etiam vox, & sermo aliquantum vitiatur, aërisque efflatio quodamtenus impeditur. Quibusdam verò labium inferius est nimis crassum, & quasi pendulum. Verum hæc vicia cum naturalia sint, corrigi non possunt.

Labiorū
Tumor.
Natiuus.

A venenis.

Deinde interdum labia præter naturam intumescunt, quod fit ab apium, vesparum, muscarum venenatarum ictibus. Et tum decocto althææ cum aceto, vel lacte fouenda, aut succus plantaginis imponendus, vel etiam ratione veneni theriaca illinenda. Interdum etiam intumescunt post hausta venena, & tum cura ad venenum dirigenda. Refert etiam Guilhel. Fabric. *cent. 4. obser.* 136. cuidam Doctori, cum fungos manibus tractasset, & iis illotis postea labia attigisset, ea supra modum intumuisse, sed aqua Stapediana, quæ in tract. nostro de febribus, *capite de Peste*, descripta exstat, apposta conualluisse. Ex quo patet in simili casu, & alia alexipharmaca adhiberi posse.

Labiorum inflammatio.

Tertio, interdum etiam inflammantur ex iisdem causis, à quibus alia partes, ex contusione, & humorum affluxu. Et curatio etiam ut in aliis partibus instituenda. Talia tamen medicamenta usurpanda, quæ in oris inflammatione adhiberi possunt.

Labiorum tumor durus.

Quarto, vidi etiam tumorem durum, ad modum steatomatis in labio inferiore cuiusdam nobilis, qui cum discuti, nec ad suppurationem duci posset, sectione feliciter curatus est.

Labiorum cancer.

Quinto; quandoque & Cancer labia occupat. Qui quas causas habeat, & quomodo curetur, è doctrina de Cancro in genere petendum.

Labiorum tumor ex lue venerea.

Sexto, iuvenem quendam, qui ex Lue Venerea labia ulcerata, inflata, subnigra, tumida carcinomatibus instat, habuit, Forestus *lib. 14. obs. 2.* curavit vniuersalibus ad morbum venereum, & hoc decocto,

panno eo imbuto labiis apposito.

℞. Ligni Guaiaci P. ij. Bulliant in *aq. solani*, deinde colentur. Add. *aluminis*, *℥. j.* iterumque semel ebulliant, & colentur.

Labiorum tumores aridi.

Septimo, interdum etiam tumores aridi labia occupant. Ita in Oeniadis Phœnici, & Andreæ fratribus mala altera intumuit, & labium, quod ex anteriore parte malæ, & oculo respondet, neque quicquam intro spectanti comparebat, neque foris vllam puris significationem edebat, sed arida putredine intumescens marcescebat, & mortuus est. Eadem quoque alteri contigerunt. Mortuus autem est, & hic die septimo, neque epotum medicamentum quicquam profuit. Phœnici verò putredo in circulum excitata est, & vlcus ante mortem magna ex parte repurgatum fuit. Sed & hic mortuus, cum diu vitam traxisset. Hippocrates *5. Epid. sect. 4. in codice Foesii*.

Tumores autem isti vbi exulcerantur, ad caput de viceribus pertinent.

CAPVT II.

De Labiorum fissuris.

CVT I S. carni in labris connexa Fissura labiorum. Est tanta tenuitate, tanta subtilitate, ac ténerritate, ut nisi labiis laceratis, cutem ab iis separare non possimus. Ac proinde labia cum sint tam tenera, mollia, ac subtilia, facili à causis externis, ventis, frigore, vt & vniuersis humoribus, & vaporibus viciantur, finduntur, & scinduntur, vnde interdum etiam sanguinem fundant. Et quidem non

nullis fissuris finditur labium inferius in medio, ubi duæ musculorum extremitates desinunt. Græci hoc vitium *εὐχέαι*, Latini fissuras, & scissuras labiorum nominant. Partis enim affectus nomen commodè additur. Aliàs enim vocabulum hoc commune est, & non tantùm labiis competit, sed & cuti, ano, utero. Estque morbus in soluta continuitate Labiorum.

*Causæ.**Causa.*

Causa proxima est siccitas nimia, atque istalecissura labiorum est continuitas eorum soluta à nimia siccitate & tensione.

Siccitatem autem hanc inducunt vel causæ externæ, frigus videlicet & calor, & præcipue ventorum, imprimisque Boreæ flatus; venena item, ut cantharides, ephemerum colchicum, ut habet Nicander. Pertinet huc, & lac calidum, quod infantes sugunt. Vel internæ, vapores calidi & sicci, salii & acres per oesophagum, vel asperam arteriam ex partibus inferioribus ascendentes, vel humores à capite ad labia destilantes. Vapores autem illi nunc ex Ventriculo, nunc ex intestinis, nunc ex pulmonibus, nunc ex hepate, & venis, nunc ex corde ascendunt, imò & ex utero: & solet ista ex vaporibus labiorum, præcipue inferioris, fissura feminis salacioribus ob vitii siccitatem esse familiaris. Ut enim Lingua valde resiccantur ex atra flegme & utero, ut habet Hippocrates, 6. *lib. S. li. 5. 1. 14.* ita, & labia ob eandem causam propter communem tunicam. Tandem etiam infantibus labia interdum funduntur, ob mammaum, quas sugunt, duritiam.

Differentiæ.

Scissuræ labiorum differunt nunc ratione quantitatis, & aliæ sunt maiores, aliæ minores, aliæ plures numero, aliæ pauciores: nunc ratione subiecti, quod aliæ solum vnum, aliæ utrumque labium occupant.

Differentiæ

Signa Diagnostica.

Affectus ipse per se oculis patet. Causæ verò signis cognoscendæ. Si externæ illæ sunt, id ex ægri relatione cognoscitur: quæ si absterint, causarum internarum id indicium est.

signa.

Et quidem si à vapore fissuræ accendant, sine pruritu, (neque enim vapores ita inhaerent, ut humores) sine ardore, sine multa duritie sunt, neque adeò frequentes, neque profundæ. Quæ verò ex humoribus calidis est fissura, cum pruritu est, & profundior. Et si humor à Capite ad labia fluat, id etiam sensibus manifestum est.

Prognostica.

1. Labiorum fissuræ non plarè negligendæ. Nam & turpitudinem quandam pariunt, & si diu durent, in vlcera ciustosa, callosa, & difficulter curabilia degenerant.
2. Rhagades à natiuitate contractæ non curantur: reliquæ non ita difficulter; nisi ad cancerosam materiam degenerent.

Prognostica.

Indicationes.

Siccitas nimia corrigenda est humectantibus, & labiorum soluta vnienda. Causæ verò, à quibus ea pendunt, tollendæ. Causæ igitur externæ, si adhuc adsint, adiuuendæ. Si vitiosi humores adsint, euacuandi. Si vapores causa sint, illi quoque tollendi, & hepati, utero, vel cuam toti corpori, unde illi proueniunt, succurrendum.

Indicationes.

Curatio.

Curatio
fissuræ à
frigore.

Si ergò à frigore externo sit fissura, solo vnguento Pomato albo labia inungere sufficit: vel paretur tale linimentum:

℞. Pingued. gallin. ʒ. ij. Cera alba, ʒ. ij. Abluantur sæpè aqua rosarum. F. Linimentum. Vtile est & oleum ceræ, ac thutis.

Auicennas pinguedines, adipēs, ac medullas cum oleo rosaceo, & cera miscet, & adhibet. Sint tamen pinguedines recentes. Si enim sint vetustæ, ac rancidæ, atque acridinem acquisuerint, potius nocent, quàm prosunt. Idem pelliculas ouorum, & arundinum applicat.

à causa
calida.

Si à causa calida & sicca sint fissuræ, lintea tenera succo semperuiui, & solani madida imponantur. Vel *℞. amyli, sacch. penid. Canariensis. Conf. ros. an. ʒ. β. Misc. Vtilis est etiam macilago gummi cerasorum, cum aq. ros. extracta.*

Si verò fissuræ altius penetrent, adeps anserinus, & caponis, aut medulla erurum bubulorum cum semperuiuo, & terebinthinâ adhibeatur.

Vel *℞. mucilag. sem. cydon. Ol. mastich. an. ʒ. j. adipis gallinæ, medulla pedum vituli, an. ʒ. β. vini albi subdulcis parum. Cum cera fiat vnguentum, vel ceratum molle. Vel ʒ. Puluer. anth. rosar. q. v. Cum mucilag. tragacanth. F. linimentum, Vel ʒ. Sacch. Penid. mucilag. tragacanth. aqua rosar. extracta. q. f. Misc. Potest & aliquid amyli addi. Vel ʒ. Terebinth. biniyri sine sale. an. q. v. Pulueris macis parum. Misc. Vel ʒ. Ol. macie destillat. ʒ. j. pulu. nuc. mosch. ʒ. β. Mell. rosar. ʒ. β. Misc.*

Vulvis est & traga catha, aquâ

rosar. dissoluta, amyloque mista, & illita: vel cum cera virginea, melle, & oleo communi fiat vnguentum. Vel *℞. Ol. rosar. ʒ. β. amygd. dulc. ʒ. ij. biniyri sine sale, in aqua ros. loti ʒ. iij. terebinth. ʒ. ij. pingued. capon. ʒ. j. β. mellis ʒ. iij. succini ʒ. j. cerniss. ʒ. ij. cera alba. q. f. F. Vnguentum.*

In omni causa vtile est labium introuertere, & linguâ humectare, maximè si mastiche, & alia idonea medicamenta prius masticata fuerint.

De seminis hyoscyami fumo. vide caput sequens in fine, vt & Aëtium. *tecrab. 2. ferm. 4. cap. 18.*

CAPVT III.

De Labiorum Vlcerebus.

Nonnunquam & vlcera labia ^{Vlcera} occupant crustosa, sæpè etiam ^{labiorum.} manantia, quæ ortum habent ab humoribus, siue tales sint naturâ suâ, quales sunt biliosi, & serosi, siue ex adustione, & putredine, vel acris humoris admistione, quomodo, & humores pituitosi, & melancholici, & sanguis acres fieri possunt.

Atque talia vlcera sæpè per modum crileos in febris tertianis, & acutis, & malignis contingunt, & febris solutionem indicant. Sæpè etiam absque crisi ab humoribus vitiosis ex reliquo corpore eò protrusis ortum habet. Sæpè quoque in morbo Gallico proueniunt. Ita & in peste nonnullis labia exulcerantur. ^{Causæ.} *3. Epid. sect. 3. Causa etiam esse potest contitio, & confusio musculi labij. Pertinent huc & venena, vt arsenicum, & similia vrentia, quæ etiam labia exulcerant.*

de Labiorum vlceribus.

7

Signa Diagnostica.

Signa.

Et quidem talia vlcera oculis obuia sunt: Causæ verò signis inuestigandæ. Si per crism accidunt, febris adest. Si à morbo Gallico, is etiam suis signis se prodit. Si & febris, & morbi Gallici signa absunt, è latente in corpore cacochymia proueniunt.

Prognostica.

Prognostica.

1. Vlcera labiorum, quæ in febris accidunt, plerumque bonum signum sunt, & febris vel perfectam solutionem, vel imminutionem significat, & per se facile sanantur, si scilicet cum signis coctionis appareant. Hippocrat. 6. Epid. sect. 4. r. 41. Alioquin si cum viribus debilibus, & alijs malis signis os & labra exulcerentur, lethale, vt in Hermo- ptolemy vxore, 7. epid. sect. 15.

2. Difficiliora curatu sunt, & peiora, quæ à morbo Gallico proueniunt.

Curatio.

Curatio.

Quæ in febribus sunt vlcera labiorum, facile per se sanantur, quæ à lue venerea ortum habent, quomodo curanda sunt, è curatione morbi Gallici patet, & talium vlcerum curatorum exemplum habetur apud Forestum l. 14. obseru. 2. Si sine febre, & morbo gallico talia vlcera oriantur, vniuersalibus præmissis tale adhibeatur vnguentum.

℞. Lithargyri, rament. plumbi, hysscyami albi, an. q. s. ol. rosæ. cera, an. q. s. Misce in mortario plumbeo. Fiat Linimentum. Vel ℞. Vnguenti resasi Mesue, 3. j. Linimenti ex litharg. 3. s. M. Vel ℞. Rosæ. vmbæ. massic. an. 3. j. plumbi ossis 3. s. F. Puluis. Addere resini, terebinth. mellis, an. q. s. Fiat Linimentum.

Applicatur autem medicamenta

commodissimè somni tempore. Ita enim rectius retinentur.

Ioh. Baptista Porta semina hyoscyami prunis iniicit, & fumum per infundibulum papyraceum excipere iubet. Illicò enim euanescente tumorem scribit, & glutinari fissuras numquam amplius redituras.

Dietæ.

Vitet æger cibos salso, aeres, aromata, sermonem multum.

Cancer.

Pertinet huc & cancer labiorum, cuius generatio, & curatio è generali de Cancro doctrina patet. Paræus tamen, lib. 6. cap. 19. peculiarem curandi rationem tradit. Cancrum suis vtrimque sursum, ac deorsum labijs acui filum ducente transigere iubet, vt fili beneficio cancrum tanquam in manu sinistra regere, & tenere liceat, & totum manu dextra, volfellis vnico ictu amputare possis; ita tamen, vt labri ipsius interior quædam, quæ dentes contingit, restet substantia (modò non ad intima vsque cancer radices agat) quæ regeneranda mox carni, & implenda caritati, pro fundamento & basi esse queat. Hinc sanguine sufficiens effusio, vulneris oræ, dextra, & sinistra, interna, & externa parts, scarificatu profundiore erunt nouacula pertundenda, vt cum mox futura ex acui filum ducente, rostris leporinis propria in vnum nodo ducere vulneris oras ipsas, & margines. voluerimus, ipsam labii carnem magis sequacem, & trahenti acui, filoque obsequentiorem habeamus. Reliquum curationis eodem planè modo prosequendum, quo in rostris leporinis.

CAP. IV.

De Labijs vulneratis, Leporinis, & curtis.

Vulnera
labiorum.

Vulnera labiorum ob sermonem, & locutionem, qua partes vulneratæ coniunctæ dirimuntur, & saluam (de quâ postea in questione) quâ humectantur, tardius curantur.

Labia si vulnerentur absque carnis amissione, suenda, si opus, vel aliâs, & diligenter coniungenda sunt, ut deformitas omnis vitetur, & medicamenta glutinantia extrâ imponenda. Ab interna verò parte mel rosaceum, & syrupus de rosâ succis sæpe illinendus.

Si autem carnis aliquid amissum sit, digerendo, detergendo, carne replendo, & tandem consolidando, ut aliarum partium vulnera, labiorum vulnera curantur.

QVÆSTIO.

An salina
conglu-
tinatione
vulnere
labiorum
remoretur.

An salina conglutinationem vulnerum labiorum remoretur?

Plerique Practici id statuunt. Nicol. Glandorpius verò, in *speculo Chirurg. obs.* 17. id saltem concedit in homine malè temperato, vel lue Gallica affecto, vel aliquo morbo salio laborante: in sano verò id negat, in quo potius abstergat & mundificet vulnus salina.

Cui etiam libenter assentimur, cùm videamus scabiem, serpigines, & similia mala ieiun hominis salia sanari, & proinde eam abstergendi, & mundificandi vim habere. Hoc tamen cauendum, ne nimium viscus salia humectetur. Quæ enim glutinari debent, non humida, sed sicca esse debent,

Si autem labia ob vitiosam conformationem non cohererent, labia Leporina, nonnullis rostra leporina, German, *Häsebart* nominantur, habentque causam plerumque imaginationem matris, quæ vel leporinem, vel alium hoc malo laborantem adspexit. Aliam tamen etiam huius rei causam refert Olaus Magnus, dum *lib. 12. cap. 12.* scribit, vnam infelicitatem plerumque mulieres Aquilonares veterum gerendo incurrere, ut vel elu, vel aliu super caput leporis facto, parient infantulos otis leporini, inter os & nares diuisa labra perpetuò retinentes, nisi statim à principio alluant particulam pectoris tenerrimi pulli adhuc sanguinolenti. Verùm ex opinione vulgi hoc scriptum puto.

Præcipua verò curandi ratio à chirurgia pendet. Perficitur autem illa 1. diffistorum, & hiantium labiorum excoriatione. 2. Labiorum iam excoriorum coniunctione, & sutura, quæ ubi facta sunt, reliqua naturæ, ut in aliis vulneribus, committenda: ita tamen ut aliâ fieri solet, ut vnguentis, & emplastris ad vulnera conglutinanda idoneis naturæ succurratur.

Labia curta.

Curta verò labia, qua ratione curanda sint, in *Inq. lib. 5. p. 1. s. 2. cap. 14.* dictum, quibus tamen ut quædam addamus: Duplex curandi curta labia ratio est; vna fucata, altera vera. Fucatam descripsit loh. Thom. Minadous, *de humani corporis turpitudinibus, lib. 3. cap. 40.* is dum Damasci in Syria esset, Mercatorem quendam pannorum sericorum vidit, qui labrum superius factitium habebat, quod dum domi esset, vel

Labia curta
curandi
ratio
duplex.

edere,

edere, vel bibere vellet, deponere, & domi cum turpitudine ista viuere solebat, foris autem labrum factitium adaptabat hoc modo. Foramina ille carni sub naso reliquæ obduta iam dura cicatrice sibi parari curauerat, qualia nonnulli in auribus ad annulos gestandos fieri curant, quibus crebris vinculis portionem larum ad labri deficientis magnitudinem, & figuram conformatam adaptabat, cui ex humanæ barbæ pilis, mystacem gummi tragacanthæ agglutinauerat.

Veram autem curandi curta labia rationem Galenus, *lib. 14. M. M. cap. 16. & 17.* tradit, & post eum Paulus Aegineta, *lib. 6. c. 26.* Cornelius Celsus, *lib. 7. cap. 9.* Diligentius tamen eam recentiores, & imprimis Caspar Taliacotius, in *fibello de curatorum Chirurgia*, tradiderunt. Veteres equidem non aliunde propaginem in curta inferendam petebant, sed à proximis curti partibus cute excisa & carne aucta. At Taliacotius non solum à vicinis, sed & remotis partibus propaginem petit, qui, *allegato loco.* videatur.

CAPVT V.

De Tremore, & Perversione Labiorum, sanguinis fluxu exiis, & labijs luidis.

PRÆter enumeratos iam morbos, etiam quædam symptomata labijs & ori accidunt; labijs quidem tremor, & perversio, color eorum mutatus, & sanguinis exiis fluxus; ori verò apertio læsa, torcra, & Ptyalismus, seu crebra spu-

tatio; de quibus iam dicemus.

Et primò quidem tremunt interdum labia: quod accidit in ira, & metu, interdum etiam ex neruorum debilitatione, sicut Francisco Viario Veneto, labium semper dum loqueretur, tremuisse scribit Alexandr. Benedictus, *lib. 1. cap. 18.* Tremunt & in nausea labium inferius, vel ex humore mordaci, vel ex oris stomachi nimia agitatione ob consensum, qui huius partibus per communionem membranarum intercedit.

Itaque cum labium inferius tremat, nisi ab ira, vel metu sit, vomitum plerumque præfagit, teste Galeno, *3. de Crisibus, cap. 13.*

Interdum etiam in cerebri aliqua magnâ affectione labiorum tremor accidit. Ibi tenuior victus prodest, hic quæ cerebro, & occipiti aliâ sin neruorum affectibus adhibentur, conferunt.

Tremunt interdum etiam labia in summo frigore cum dentium stridore. Item à vermibus, ut scni illi, *9. epid.* cui furiosum quiddam latens inerat.

Videtur interdum etiam motus quidam quasi conuulsivus adesse, ut in Cydis filio, *7. epid. sect. 7.* de quo Hippocrates, sine conatu arò semperfecta loquebatur, & os solutum, & maxillas, ac labia semper in motu erant quasi qui loqui cuperet.

Pertinent huc & labiorum perversio, de qua Hippocrates, *4. aph. 49.* In febribus non intermittentibus si labium, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus perversiatur, si non videat, si non audiat, debilis iam existente corpore, quicquid horum acciderit, mors in propinquo est. Idem aphorismus habetur, *1. Pregnost. 12.*

Labiorū tremor.

Labiorū perversio.

Causa.

Causa proxima huius symptomatis est affectio nervorum tertius conjugationis. Fit verò ista cerebro grauius affecto, & propterea malum hoc in febribus continuis, & ubi ex peculiari organorum vicio accidit, viribusque iam debilibus, lethale signum est. Si verò virtus valida existat, eadem symptomata interdum sine periculo apparent, in criticis scilicet perturbationibus, per *mutacionem* materię ad caput: Vnde & 2. *Coac.* habetur labium contractum, alui biliosę eruptionem significare.

Fluxus sanguinis è labijs.

Interdum & sanguis è labijs effluit, quod in scorbuticis quandoque evenit, cum humores acres, serosi, & salii labia erodunt, & naturam ad excretionem stimulant. Idem interdum in fissuris labiorum accidit.

Labia liuida.

Tandem etiam labiorum color mutatur, & liuida pierumque fiunt, quod accidit in elephantiāsi, morbo Gallico, qui color, curato illo morbo, cessat. Interdum etiam in febribus continuis fiunt labia liuida: quod signum lethale est, 2. *Coac.* & caloris nativii extinctionem significat.

CAPVT VI.

De Oris apertione læsa.

Oris apertio læsa.

Aque hi sunt morbi & symptomata, quę labijs solis accidunt. Sunt verò & alia quędam vitia, quę iis quidem etiam contingunt, non tamen solis, sed simul affectis vicinis partibus, imprimis musculis maxillarum, & faciei. Quęlia sunt oris apertio, vel ablata, vel immutata, oscitatio, oris tortura, pyralismus: quę propterea etiam subiungemus.

Causa.

Et primum quidem oris clausuram

seu apertionem denegatam quod atinet, aperire homines os nequeunt ob distentionem ceruicis ex vulnere nervorum, quia maxilla veluti ossa rigescunt. Hippocrates, *lib. de diebus indicatoriis*. Ita Phœnici apud Hippocratem, *lib. 4. epid.* posteriorum colli vertebrarum contentio aderat, ac circum dentes durities, quos distentus diducere conabatur. de eodem, 7. *epid.* inquit: Quod si caput commouere, aut dentes aperire conaretur, non poterat, utpote admodum distentus.

2. Quando oris cardo, in quo gena veritur, obrigescit, atque os strictius conuiet, quò minus in rictu queat expandi, squalido terrenoque humore iniuncturam illam, & huius vincula altius imbibito. Id quod scorbuticis interdum accidit, *vi de scorbutis, cap. 5.* dictum.

3. Propter maxillam inferiorem adnatam capiti. Id quod rarius est, quod tamen Columbus, *cap. 15. de re anat.* refert, dum scribit, in summi Pōtificis penu esse caput Gigantis, in quo maxilla inferior capiti adeò adnata, & coniuncta est, ut omni motu prorsus careat, atque in viuentē eo carere non potuerit.

4. Propter tumores cuius iuncturę maxillarum: id quod sæpe in inflammationibus maxillę, & consillarum accidit, ob quas os diduci non potest. Signa causarum, ut & curatio pater ex signis, & curatione morborum modò enumeratorum, ob quos os aperiri non potest.

Signa & curatio.

Contrà interdū os nimium hiat. Id quod sæpe fit in febribus ardentibus, ob vapores calidissimos ex inferioribus ascendentes. Idem fit ob luxationem maxillę inferioris, de qua postea dicetur. In lethargo

Oris hiatu.

etiam oblata memoriam os claudere ægri obliuiscuntur. Si nares etiam obstructæ sunt, os apertum ægri seruant, quò copiosiores aërem attrahant. Idem fit in tumoribus faucium internis & angina. Nonnulli & ex mala consuetudine os hians perpetuò seruant.

Affectus autem iste per se patet. Causæ verò è signis, quæ è suis locis petenda, cognoscuntur.

Prognostica.

Prognostica etiam inde petenda. In febris autem acutis faucium sine tumore dolores, & pusilli, & stragulantes, & cum os hiat, nec promptè adduci, & claudi potest, mentis amotionem portendi oportet. 2. *Prorrhæ.* 11.

Curatio.

Curatio pendet à causarum, à quibus hoc vitium prouenit, remotione.

CAPVT VII.

De Oscitatione.

Oscitatio.

Peculiaris verò oris præter naturam apertionis species est oscitatio, Gellius, *lib. 4. cap. 20.* oscedo. Est autem oscitatio vehemens oris diductio ab habituosis vaporibus in spatijs musculorum maxillæ inferioris, & buccarum collectis, vel infra ascendētibz, & copiâ potiùs, quàm acrimoniâ naturam ad excretionem stimulantibus, operantibus simul, & concurrētibz musculis thoracis, unde pandiculationes sæpissime comites. Hinc & Hippocr. *de Præf. Med.* scribit, si pransi fuerint, quibus prandere non conducit, illi continuo graues totòque corpore, & mēte legnes euadunt, cū oscitatione, somnolētia, multaque siti. Cum autem per istam vehementem diductionem auris meatus nonnihil com-

primatur, vt aërem non satis admittat, hinc oscitantes minùs distinctè audiunt: quamuis forsan, & propter neruorum compressionē id fieri possit. Videtur tamē adhuc alius esse oscitationis modus, cum nimirum aperto, admodumque diducto ore aër primò affatim hauritur, rursumque efflatur cum sono quodam, de quo Hippocr. *in lib. de flatibus*, scribit, quod oscitationes febres prædicant, cum magnâ copiâ coaceruatus aër fuerit, confertimque ad superiora rumpens, tanquam machinatione aliqua os diducit, quò hâc ei facilis exitus pateat. Accidit interdum etiâ oscitatio ab imaginatione, si quis alios oscitantes videat. Faciliùs tamen id accidit pigris, & quibus vapores aliqui in musculis illis hærent, quam alijs. Oscitatio etiam crebra est in lethargo, ita vt os claudere ægri obliuiscantur.

Signa Diagnostica.

Affectus ipse per se patet, & causæ signa. cuius quoque faciliè innotescunt.

Prognostica.

1. Oscitatio si citra occasionem sic frequentior, præfigit morbos, & febrium incipientiū præludium est. Citra verò morbos pigritiæ signum est, vel ex imaginatione proficiscitur. Unde puniebatur olim, si quis in iudicio clarè niniūm, & sonorè oscitaret, tanquam illud indicium vagi animi foret, & allucinantis ac fluxæ, atque apertæ securitatis. Gellius, *lib. 4. Noct. Attic. cap. ult.*
2. Ex nimia oscitatione maxilla inferior luxari potest.
3. Oscitatio in nixu lethale est, sicut sternutasse à coitu abortiuum. Gellius, *lib. 4. Noct. Attic. c. 16.*

Curatio.

Itaque cum oscitatio nihil noceat, Curatio.

nisi forsan ex iunxia oris diductione luxatio maxillæ accidat, sed potius iuuat, ipsa per se nullam curationem requirit, sed potius vt morbo, quem præfagit, occurratur, admonet. Quia tamen ex nimia oscitatione, & oris diductione maxilla inferior luxari potest, reprimenda est nimia oris diductio, quæ aliàs etiam inciuisilis habetur. Idque fit, si vinum cum pari portione aquæ exhibeatur, quod materiam importunè euaporantem discutit, modo corpus sit purum, & sine febre, vt est apud Hippocr. 5. aph. 56. & 3. epid. sect. 7. Assiduam etiam oscitationum longam spirationem medelam esse scribit Hippocr. 6. Epid. sect. 2. aph. 9. Auicennas etiam inasticationem a cori commendat.

CAPVT VIII.

De Oris Distortione.

Oris distortionio.

Cynicus spasmus Græcis à distortionis figura, quæ rictum iratorum canum exprimit, appellationem habet Cello, lib. 4. cap. 2. Oris distortio, vulgò Tortura oris dicitur, & quidem rectius. Neque enim semper à spasmò est ista oris distortio. Interdum & risus Sardonicus nominatur, ab herba Sardoæ, quæ est species Ranunculi in Sardinia proueniens, & Apium visus dicitur, quæ vesicetibus ora similiter rictu ducit, vt ridentium facie intereant.

Causa.

Causas istius affectionis Aëtius in Parilysin musculorum *paralyticarum* siue mandibularum refert, & Galenus, 4. de loc. affect. ca. 2. à Paralyti nervorum, & musculorum faciei hoc malum existere affirmat. In 3. de loc. affect. cap. 6. etiam conuul-

sionis meminit, dum labra sæpe numero conuelli scribit, item oculos, frontis cutem, totas mandibulas, & linguæ radicem, quod in Tortura oris etiam accidere solet.

Itaque Spasmus Cynicus, vel potius oris Tortura, est deprauata oris & faciei figura, orta, vel à conuulsione, vel à resolutione musculorum faciei, vnde in obliquum distorquetur os, nasus, vel oculus, & in summa dimidia plerumque faciei pars afficitur in hoc malo, vel dextra, vel sinistra, aliquibus verò omnibus sui partibus. Etsi verò aliquando tota facies distorta appareat, dicitur tamen oris distortio, quoniam manifestius deprauata illa figuræ in ea faciei parte deprahenditur, quæ labiorum ambitu est circumscripta. Si tamè accuratè rem æstimare velimus, distinguendum esse videtur inter oris torturam, & spasmum Cynicum. Hinc Plateus oris torturam appellat, quando oris parte deorsum tendente, vel sursum tractâ os obliquum, & intortum, vt in plorantibus apparere solet, redditur, siue id fiat ex paralyti, siue conuulsione. Quod si verò in vtroque latere labia cum buccis simul contrahantur, tum os transversum diductum veluti in ridentibus hominibus, vel in canibus, cum irati ringuntur, & hiant, conspici, idque spasmum Cynicum vocari scribit. Petrus Salius Diuersus, in Annotationibus in Alimarus cap. 15. inter Torturam oris, & spasmum Cynicum etiam differentiâ facit, Torturamque oris generalius accipit statuit pro omni figuræ oris deprauatione, eamque à duplici causa prouenire, quarum altera est Paralysis, altera conuul-

sio, Spasmodum verò Cynicum, ut ipsa vox, si propriè sumatur, indicat, solum ex convulsione fieri statuit.

Verum si has duas sententias coniungamus, differentia inter torturam oris, & Spasmodum Cynicum rectè constitui potest. Tortura oris est vel à paralyfi, vel à convulsione. Convulsio vel vnum tantum latus occupat, vel vtrumque. Si vnum tantum, convulsio oris simpliciter, vel etiam nomine generis Tortura oris appellatur; si vtrumque propriè Spasmus Cynicus dicitur. Hec enim convulsio exactè iraticanis rictum exprimit: non verò quouis convulsio oris rictum iratorum canum exprimit. Vnde etiam vocatur rictus Sardonius. At ridentes non vnum tantum latus diducunt, sed vtrumque. Quæ verò à paralyfi provenit oris Tortura; Spasmus Cynicus appellari non potest, cum Paralysis non possit esse convulsio.

Vfus tamen obtinuit, ut vocabulum spasmum non semper hic propriè accipitur, sed sæpè oris Tortura, & spasmus Cynicus confundantur.

Quia verò musculi faciei, qui maxillas inferiores, pinnas narium, & labia, ac buccas movent, nervos maxima ex parte à tertia coniugatione cerebri accipiant; musculosa verò latitudo illa, siue *μυῖς αὐτῆς*, cuius Galenus, 4. de loc. aff. c. 2. in fine, mentionem facit, quodque mandibulas, & narium pinnas, & buccam vtramque movet non à tertia coniugatione cerebri, sed à primis cervicis vertebra nervos accipiat, & nonnullos etiam à quinta coniugatione cerebri: fons huius mali præcipuè querendus est, vel in nervis à tertia coniugatione, vel in

musculosa illa latitudine.

Causæ verò remotæ Torturæ oris eadem sunt, quæ Paralyticos, & convulsiones, cum ab alterutra hæc affectio oriri possit.

Auicennæ tamen frequentius fit à convulsione. Quando igitur Tortura oris à convulsione existit, musculi faciei versus sua principia contractis, tunc pars sana ad læsam siue convulsam trahitur, & latus, in quo distortio cernitur, locus affectus est, & musculi dextræ partis convulsi versus sua principia trahuntur, ac sinistræ partis musculi sanos ad se trahunt, affectioque dextram ipsam partem occupat.

In Tortura verò oris ex Paralyfi, pars faciei distorta, est sana; quoniam musculi sani actione sua fungentes trahunt resolutas partes ad se.

Quod tamen, lib. 1. part. 2. c. 28. monuimus, Paralyfin & convulsionem interdum iungi, ut per vices, & alternatim affligant, ita ut pars modò conuellatur, modò resolvaatur: id etiam hic quandoque accidere potest. Cuius generis affectus videtur fuisse, quem describit Anton. Benivenius, de abditis morbor. causis, & curat. cap. 101. Cum enim imperitis quidam Medicis euidam mulierculæ è gena dextra tuberculum furunculo, simile scalpello abscidisset, non habita ratione nervorum, ac venularum, illico subsecuta est inflammatio & dolor, quo mulier in *μυῖς αὐτῆς* incidit, quo temerario motu pervertebatur os, & facies, modò in dexteriores, modò in sinisteriores partem. Cum enim facies modò in dextram, modò in sinistram partem distorteretur, videtur fuisse mixtus affectus ex

Torturæ
oris cau-
sæ remo-
tæ.

Paralysis
& convul-
sio iungun-
tur interdum.

paralyfi, & conuulfione, vt fcilicet alternatim os modò conuelleretur, modò resolveretur.

Resolu-
tio ner-
uorum.

Resolutio neruorum:& inde secuta oris peruersio videatur apud Hippocrat. 2. Epid. sect. 2. propè finem.

Maxillæ
fractura.
Oris tor-
turæ
causa.

Præter Paralyfin tamen, & conuulfionem alia adhuc videtur dari causa oris torturæ, cuius mentio fit ab Hippocrate, lib. de artenulis, malè fcilicet curata maxillæ fractura. Si rectè quidem, inquit, coaptata fuerit, & vt debet quienerit maxilla, breui conualefcet, ac dentes integri manebunt. Sin fecus longior equidem tempore curatio accidit, cæque distorta, & dentes leduntur, ac iniuncti existunt.

Signa Diagnostica.

Signa.

Tortura oris visui patet, quando os ægri ad alterum latus distorquetur, vt labiorum concinnus contactus, aut aliarum partium in facie consensus pereat. Præterea oculus alterritè claudi nequit. Ac denique æger exsufflare, vel exspuere iussus, ex altero tantùm oris latere id præstare potest, & sponte etiam saliuæ oris profluit. Noanquam fit tortura oris non apparentibus in facie signis, neque ipsius, neque Paralyfis. Atque tunc ægrum iubebis ridere, aut pronunciare O, literam. Hic animaduertetur, alteram oris partem liberè moueri non posse.

Quod ad causarum signa attinet, si malum hoc à conuulfione existit, pars affecta dura, & tensa trahit sanam, & plerumque dolor partis adest. Si verò hoc malum à resolutione oriatur, pars affecta laxa, & molli trahitur ad sanam, & sensus in parte affecta obuius est, & palpebra oculi inferior ea parte decedit.

Traditur, & hoc signum ex conuulfione malum esse, si pars distor-

ta ad naturalem situm, & figuram restituitur per extensionem manibus factam; ex resolutione verò, si per retractionem.

In Paralyfi etiam facies est extensa sine rugis, & inclinatio faciei continua est ad inferiora; in conuulfione rugosa est cutis in parte vna, & extensio eius in parte altera. Paucitas spaci & saliuæ est, præcesseruntque, vel adsunt causæ conuulsionis.

Ceterùm si causa Torturæ oris hæreat in musculo faciei, vitiosa figura solùm partem faciei, quæ ab illo musculo regitur occupabit.

Sin in neruo, & quidem secundùm eius principium, ita vt cerebrum altero latere sit affectum, dimidium etiam cùm faciei, tum totius corporis simul afficietur.

Si secundum progressum, & noxa sit in tertio pari neruorum cerebri, vitiosa figura occupabit dimidium faciei secundùm omnes partes.

Vbi fcilicet ramus aliquis maior afficitur. Aliàs enim tortura tantùm aliquas partes occupat. Si etiam tertia coniugatio afficiatur, magis laborat oculus: quia tertia coniugatio aliqua sui parte cum motoris neruis oculorum per eadem foramina prominet.

Si qui in quinto pari, leuis erit noxa buccarum: quæ denique insignis erit, si in primis ceruicis vertebis, illarumque neruis: causa mali sedem habebit, & minus tum laborabit oculus, nisi simul musculus temporalis affectus sit, in quem quinta coniugatio ramulum mittit. Tunc etenim per consensum laborat simul oculus, quia iuxta Columbum; in quibusdam etiam secunda coniugatio, quæ oculos mouet, còramu-

lum quendam mittit, vnde consensus musculi temporalis & oculi minimè laborat oculus, si nervi cervicis afficiantur.

Prognostica.

Prognostica.

1. Tortura oris superueniens spasmodum aut Paralyfin reliqui corporis, Apoplexiâ vel Epilepsiam portendit.

2. Si Tortura oris fortis aduenit per spasmodum præcipuè, inter quatuor dies interficit, materia in cerebrum translata Valescus de Taranta tamè vidit morientem die duodecimo.

3. Tortura oris, quæ ultra sex menses producit, aut nunquam, aut difficulter curatur, teste Auicenna.

4. Quæ per Spasmodum fit Tortura oris in febribus ardentibus, perniciofa phrenitide & morbis aliis acutis, lethalis est, teste Rhase.

5. In febre nō intermittēte, si labiū aut supercilia, aut oculus, aut nasus perueratur, imbecillo iam corpore, in propinquo mors est, 4. apb. 47.

6. Oris peruerfiones, quæ nulli corporis parti consentiunt, celeriter aut sua sponte, aut ex necessitate sedantur. Hippocrates, lib. 2. prædict.

Curatio.

Curatio.

Sicut Tortura oris aut à Spasmo est, aut à Paralyfi: ita etiam curationem requirit diuersam. Ab vtra enim dispositione malum ortum habeat, ante omnia videndum est. Quod si ergo sanguinis copia adsit, vena secetur primū cubiti, si sanguis in toto abundet, postea & quæ sub lingua Aut cucurbitulæ cum scarificatione primis vertebrais, vel quod tutius est, scapulis affigantur. Nā sæpius appositæ cervici tremores corporis afferūt, teste Auicenna, 2. Canon. sen 4. cap. 21. de ventosis.

Auicennas, Paulus Aëtius, ligaturam probant, quā tanquam capistilo

facies ad figuram naturalem reducatur; quod in tortura oris ex Paralyfi locum habet.

Alij tamen etiam vtuntur ligaturis in conuulsione, ita vt primò tendatur cutis frontis ad inferiora, deinde ligetur cum fasciâ; donec tortura cessauerit omnino.

Probantur & frictions extremorum ad diuertendum, factæ manu sicca, vel intincta in aqua lauendulæ. In inueterato hoc malo, si alia non profunt, Auicennas cauterium applicat supra venam, quæ ponè aurem est lateris affecti; quod & in ceruice fieri potest.

Non tamen vbi conuulsio est in nervis cervicis. Ita enim augetur malum. Nisi fortè applicetur inter primam & secundam vertebra. Nervi enim, qui in faciem distribuuntur, à tertia, quarta & quinta vertebra originem habent.

Alij Sinapismo, & Phœnigmo, vel Dropace contenti sunt.

Medicamenta quod attinet, Auicennas vetat pergere ad fortia purgantia, vel digerentia ante quartum, vel septimum diem, propter cruditatem materiæ, nisi metus sit ab imminente Epilepsia, vel Apoplexia.

Post vniuersalem euacuationem profunt 1. Errhina, 2. Arophlogmaticis & Gargarismi, & si sint masticatoria, masticatio magis fiat in parte affecta. A principio autem & ante Errhina, Gargarismis Auicenna non vitur, ne materia partis affectæ in faciem trahatur.

Idem crebro masticare iubet calanum aromaticum, nucem moschatam, & pyrethrum. Et de nucem moschatam in ore tenēda Rhases quoque præcipit. Alij & castoreum sub lingua tenere iubent; quæ omnia vim

habent materiam resoluedi. Nux moschita etiam nervos, & cerebrum roborandi: ideo etiam nux mosch. cum spec. diaphiris exhiberi potest.

Vel fiat Gargarismus ex ruta, laudenda, salvia, primula veris, & locus affectus iungatur vnguento Martiato. Fiant inunctiones partis affectæ cum oleo lumbricor. de castoreo, terebinth. & aliis, quæ paralyti, & spasmo conveniunt.

Vapores etiam de fomentis convenientibus in faciem recipiantur. Vel etiam capitis inunctiones, lotiones caput exlicantes fiant in tortura oris ex Paralyti. Ex. gr.

℞. Lixivium de cineribus viridis, in eo bulliant stæcas Arabica, salina, sol. latr., rusa, salvia, &c. Vel applicetur hoc cataplasma Bertrucij. ℞. Radic. raphanis contusas, & addito oleo laurino, rutaceo, de lateribus, & modico aceti, ac surfuris s. q. F. Cataplasma.

Auicennas ex Indorum Medicorum sententia commendat carnes animalium siluestrium, ut leporis, vulpis, cerui, hirci silvestris, asini silvestris, quas elixatas parti affectæ & capiti applicat.

Possunt & interna medicamenta, quæ ad Paralytin, & convulsionem descripta sunt, supra libro primo, exhiberi, inter quas sunt aquæ duæ à Langio, lib. 3. epist. 1. pag. 364. 865. descriptæ.

Dietæ.

Dietæ sit qualis in paralyti, & spasmo. Auicennas, & Rhases ægrum iubent poni in loco obscuro, ne humores lucis præsentia agitati & fusi, ad nervos concurrant: Et deformitatem oris ab alijs tegant. Auicennas etiam vult ægrum assu-

duè intueri in speculum ex chalybe factum, ut animadversa oris deformitate faciem totis viribus in pristinam naturalem figuram perducere nitatur. Valescus de Taranta tibiam inflare iubet.

QVÆSTIO.

An spasmus Cynicus sit morbus, vel symptoma?

Morbum esse negat Ant. Donat. ab Alcomari, de medend. hum. corp. Cynicus mal. cap. 15. Est enim ad eam sequatur morbus, figura scilicet vitata: tamen ipsum spasmum non esse morbum, sed symptoma facultatis motricis læsæ, ad quam sequatur morbus figuræ.

Verum potius de nomine, quam de re lis est. Spasmus enim Cynicus si concideratur ut altera tortura oris differentia seu species, omnino morbus, vitata scilicet figura: si vero consideratur ut causa huius morbi, & motus vitatus, seu convulsio, symptoma est.

Spasmus
en sit
morbus,
vel sym-
ptoma.

CAPVT IX.

De Ptyalismo, seu crebra spuatione, & salivæ defectu.

Ptyalismus, & ~~Autismus~~ Hippocrati & Celeno, est immoderata, & frequens salivæ exputio. Est enim inter excrementa corporis nostri etiam id, quod Græci *saliva*, & *saliva*, & *saliva*, & *saliva* etiam nominant, Latini salivam, & spiritum: Vnde *saliva* Hippocrati dicuntur, 1. Epid. qui multam salivam ore effundunt.

Distingunt nonnulli inter *saliva*, & *saliva*, seu salivam & spiritum, & *saliva*, seu salivam appellant saltē id oris

Differen-
tia salivæ
& spiritus.

id oris excrementum, quod sine tussi, & excreatione reicitur. Sputum verò quod cum excreatione ex thorace plerumque reicitur, seu vt Ety-mologicum Græcum habet; *σπύγιον* est, quod *σπύγιον*, exspuitur: *σπύγιον* verò, quod *ἀνμάττω* fluit, vt ita affectio, de qua agimus, potius saluatio, quàm crebra sputatio dicenda esset. Verùm quia saliuæ propriè dictæ sæpè sputum ita in specie etiam dictum permiscetur id, quod ore reicitur, ab auctoribus, & sputi & saliuæ nomine appellatur: Vnde etiam Auctores, voces has non semper distinguunt.

Quid autem salua sit, notissimum est, quomodo autem generetur, & qui eius sit vñus, explicandum est. Saluum equidem excrementum esse, & ex ore tanquam inutile reici, extra dubium est, & quidem aquea ista humiditas, qua lingua irroratur, & mandentibus præsto est, natura sua *ἀνμα* est, neque sapore, neque colore, neque visciditate excedit, quantitate etiam moderata est.

Ceterùm cum omne excrementum coctionem aliquam præsupponat, materiam quidem huic excremento suppeditat partim coctio prima, quæ fit in ventriculo, partim tertia, quæ fit in cerebro: elaboratur verò in glandulis linguæ vtrinque assistentibus, quas tonsillas vocant: vnde Galenus, in *comm. in 1. ptolemæi*, ad *inveniens* nominat. Vbi substantiæ modum, ac naturam suam, & nomen etiam accipit, consentientibus tamen, & contrarietibus etiam linguæ, & partium in ore calore. Et si verò ex ore, & alia excrementa pituitosa reiciuntur, & sæpè saluæ permiscantur: tamen salua propriè tantum illud est, quod in tonsillis

gignitur. Quod verò à thorace elicitur, *σπύγιον*, seu sputum est, sicut quod à cerebro defluit, *μύξα* & *βίρρα*, seu mucus appellatur.

Quamquam verò salua excrementum est: natura tamen id etiam ad certos vñus destinavit. Primò enim ad cibi in ore masticationem, & ad primæ coctionis præparationem utilis est, quæ commodè non perficeretur, si os salua destitueretur, sicuti in febribus sæpè apparet, cum os siccum est, neque cibis salua conspergitur. Imò in ipso ventriculo coctio difficilior fieret, si absque salua esset, si is panem & reliquos cibos aridos ab ore acciperet. Deinde locutio per se non posset, si lingua ac labra salua non conspergerentur, quod quilibet, si lingua & labia salua destituuntur, experitur. Tertio etiam ad gustatum conducit salua, & saporum quasi vehiculum est, & si lingua salua destituatur, nullum vel obscurum admodum saporem percipit.

Verùm hæc omnia præstat salua, si naturalem qualitatem, saporem, colorem, quantitatem obtineat. Sæpè verò à naturali constitutione deflectit, & pro insipida fit salua, vel amara, vel dulcis, vel acida; color pro albo croceus, pro aquea & crassa & spumosa, & tandè pro moderata in copia, copiosa vt opus sit, hoc excrementum cōtinuò ore reici, quod Græcis *σπύγιον*, Latinis, crebra sputatio, vel saluatio appellatur. Est videlicet Ptyalismus crebra & involuntaria sine tussi & streau expulsiō à nimia saliuæ copiâ proveniens.

Et si enim etiam ex mala consuetudine quasi nonnulli hanc expulsiōnem familiarem sibi reddant, dura

interloquendum & perorandum toties, quoties sententiam absoluerunt, exspunt: & ex medicamentorum sputum provocantium usu, etiam hoc provenire possit: tamen de ea hic non est sermo, sed de prænaturali, cum obiectum præternaturam, seu salivæ copiosior ad expuendum inuitat.

Causa.

Causa.

Fit autem salivæ, seu sputum copiosius, dum pituitosus humor à capite ad os & fauces defluens salivæ se commiscet, eamque auget, atque tunc pyralismi, & catarrhi eadem generatio & causa est, & solet Ptyalismus, vt catarrhus, nonnunquam Epidemius esse, id quod An. 1565. accidisse refert Forestus, *libr. 14. observ. 13.*

Eadem de causa cum columellæ luxatione plerumque sputatio multa coniuncta est. Accidit eadem etiam in inflammatione & ulceribus oris.

Deinde dum ex ventriculo humidiore & pituita abundante ea sursum in os exsudat & exurgit, sputoque se miscet, quod manè, seu ieiunio ventriculo accidere solet, idque sæpè post morbos chronicos accidit, ventriculo debilitato & non rectè conoquente. Neque tamen semper primariò è ventriculo aquosilla pituita in os confluit, sed nonnunquam ex intestinis, vt in vermicibus accidit, nonnunquam ex liene, vnde lienosi & scorbutici sputatores & salivatores sunt, de qua re, in *Tr. de scorbut. cap. 5. No. 38.* dictum.

In pectoris quoque & pulmonis affectibus excrementa illic congesta si in os propellantur, sputum augege solent. Tandem etiam ex hydrargyri inunctione molesta & continuè

sputi ex ore reiectio & salivatio excitari potest. Interdum etiam infantibus salivatio ob humores vitiosos in utero cumulosos familiaris est. De quo Hollerius, *com. ad. aph. 29. sect. 3.* Nostis, inquit, pueris raro accidunt aphthæ, quia Gallicarum matrum & nutricum frigidus est lac & humidius: sed aphtharum loco pustulas habent & vlcera serpentina per totam faciem, per caput, post aures, & multam præterea salivationem.

Signa Diagnostica.

Malum per se notum est, & qui hoc laborant, coguntur sine tussi, & excreatione ob salivam copiosius ad labia affluentem expuere, Quænam verò copiosæ salivæ causa sit, ex morbis qui præcesserunt, vel præsentes sunt, cognoscitur.

Post cibum si copiosa salivæ excernatur, indicat ventriculorum malè affici, vel ob propriam illius imbecillitatem, vel ob ciborum qualitatem, aut quantitatem. Indicat enim cibum corrumpi. Atque hæc salivæ expuitio à Galeno, *4. de loco affect. cap. 10.* de Diocle inter affectionis Hypochondriacæ symptomata recensetur. De sputatione, quæ etiam scorbuticis familiaris est, videatur tract. de scorbutico, *cap. 5. num. 38.*

Prognostica.

1. Malum, prout morbus, à quo salivæ copiosa provenit, se habet, nunc gravius, nunc leuius est, & facilius, vel difficilius curatur.

2. Ptyalismus interdum à magnis morbis præteruat, imò magnos morbos tollit, & acuta febre laborantes tandem Ptyalismo, & copiosa salivæ reiectione sanatos fuisse

Signa.

Prognostica.

se obseruatum est, cuius rei historiam habet Forestus, lib. 14. obseruat. 24.

Curatio.

Curatio.

Esti Ptyalismus à saliuæ copia proveniat, & proinde ipsa absumenda, & quæ resiccare, & partes illas saluam suppeditantes, tonsillas putæ, roborare possunt, exhibenda sint: tamen cum causæ sint plures, à quibus copiosa saliuæ provenit, ut scopo huic rectius satisfacere possimus, istæ prius tollendæ sunt.

Itaque si à catarrho à capite labente, & saliuam augente est Ptyalismus, curatio ad catarrhum dirigenda. Si à ventriculi vitio suppeditatur, tùm generatio pituitæ ventriculi impedienda, genitæque expurganda, & ventriculus exsiccandus; quam ad rem imprimis aloë, & hiera picra, & aloëticorum medicamentorum usus facit. Vtile est & thus ac mastice, cum vino sumpta, & sinapi cibus admixta. Item diagalanga, diatrion pipereon. Vtilis etiam est vomitus. Æger famem tolleret.

Si Lienis vitio proveniat saliuæ copiosior, illi succurrendum. Eodem modo & pulmonum affectus, si saliuam augeant, curandi. Si ab hydrargyri intusione proveniat Ptyalismus, illi succurrendum, ut de curatione luis Venereæ dicitur: Et exemplum talis Ptyalismi curati habet Forestus, lib. 14. obseruat. 24.

Quibus pro varietate causarum expeditis, & præmissis, tandem & ad os madidum exsiccandum, & tonsillas roborandas veniendum: decocta nimirum paranda ex fol. myrti, plantaginis, rosæ rubris, salvia, nucibus cupressi, balaustris, acacia, hypocistide, mastiche, li-

gno aloës, alumine: quæ decocta in ore solum sunt detinenda, non verò gargarismi modò usurpanda, ne plus pituitæ ad os attrahatur. Potest & spongiæ particula in ore detineri, quæ copiosorem saliuam imbibat. Si tamen critica sit euacuatio, fluxus ille impediendus non est.

Salivæ defectus.

Salivæ defectus.

Causa est materiæ defectus. Deficit autem materia, quia vel non generatur, vel generata absumitur. Non generatur ob siccitatem cerebri, ventriculi, linguæ & tonsillarum. Generata absumitur in febribus ardentibus, ut Pherecidæ, 7. Epid. oris inflammationibus, vigiliis, nimis exercitiis, siti, longis sermonibus, à cibis calidis, & exsiccantibus, fumis metallicis, & similibus.

Signa Diægnostica. hic affectus non requirit, sed per se patet. Signa etiam causarum è præcedentibus, & præsentibus, & iis, quæ de linguæ siccitate, lib. 1. part. 3. sect. 5. cap. 1. dicta sunt, manifesta sunt.

Signa

Prognostica, etiam inde petenda, & desumenda sunt.

Prognostica.

Curatio, ut rectè fiat, causæ à quibus pendent tollendæ sunt, & exsiccationi humedantibus resistendum. Quod sit remediis, quæ ibidem habentur.

Curatio.

Lingua ipsa etiam ore continetur, verum quæ de eius morbis & symptomatibus dici possunt, supra, lib. 1. part. 3. sect. 5. proposita sunt.

Lingua vitia.

De Dentium affectibus.

CAPVT X.

De Dentium morbis.

Dentes soli ex ossibus quadam sui parte extraximus, seu alveolos suos prominent, ut masticationi ciborum, quod ipsorum, munus est, inserviant. Secundario verò sermoni & pronuntiationi verborum suam operam præstant. Ideò & in masticatione atteruntur, attriti verò incrementum denud accipiunt, & cum toti exciderint in infantia, nonnunquam & aliis ætatibus, septenariis potissimum annorum, novigignuntur, ita ut quibusdam septuagesimo, octuagesimo anno dentes renatos fuisse competum sit. Præses enim est usque ad mortem in maxillis vis *dentis*, seu formatrix dentium, quæ ipsos producere potest ex idonea materia, peculiaribus in maxilla finibus recepta, quæ in ossicam quandam duritiem excrescit. In ipsis etiam dentibus parte internâ semper aliquid humidæ mollietiei inest, qua nutriuntur, & fluxionibus opportuni fiunt. Eius rei exemplum occurrit nuper Reichenbachij, in Silesia. Scripsit enim ad me Dn. D. Georgius Tirschardus vivere ibi honestam matronam fere septuagenariam, viduam, quæ ante quadragenium, postquam scilicet climactericum magnum 63, annum superasset, omnibus dentibus ab ortu primo amissis, cepit dolere caput & gingivas tam atrociter, ut moritua putaretur, & præ doloris immenitate insaniam metueret, consueque,

donec elapsis aliquot diebus dentes, perinde ut in ætate infantili fieri consuevit, primores protruderet, ac tum dolores mitigari, meliùque habere & viuere cœperit. Numerati autem sunt 20. Verùm iam olim etiam talia accidisse, patet ex Aristotele, de *hystor. animal. lib. 2. c. 4.* Plin. *lib. 11. cap. 17.* Cardano, *de rer. variet. lib. 8. cap. 43.* Alexandro Benedicto, *de curandis morbis. lib. 6. cap. 1.*

Dentes verò considerantur quatenus vel gignuntur, vel geniti sunt. Et si dentes in ipso utero materno formentur, ut in dissectionibus abortuum sæpe observatum: tamen sapientissimus rerum Creator extra alveolos eos statim eminere noluit, ne papilla matris is læderetur, sed gingivis obducti latent usque ad quintum vel sextum mensem, vel etiam ultra, ac tùm in infantibus cum dolore plerumque erumpunt: dum geniti sunt, variis morbis & symptomatibus affici possunt.

Morbos dentium quod attinet, Primò magnitudo perit, siue à violentia externa, siue à defectu alimentei, dum corroduuntur & perforantur: Deinde interdum longiores, quàm par est, fiunt. Sæpe mobiles fiunt, & vacillant; interdum exadunt & deficiunt. Contrà sæpe plures numero sunt, quàm par est. Nonnunquam situs & ordo eorum non rectè se habet: Interdum topis obducuntur, de quibus iam ordine dicemus.

De Dentium Corrosione & Carie.

Primò sæpe dentes corripuntur & corroduuntur ab acerbis humoribus ad ipsos defluëtibus: à quibus etiam plerumq; dolor excitatur; unde post frequentè dentium dolorem tandem eorum corrosio & caries sequitur, ita ut frangatur & frustillata exci-

Dentium
corrosio
& caries.

dant. Faciunt tamen etiam ad dentium corrosionem, aut certè eam augent cibi, vt Hippocrates, *lib. de Affectionib.* docet, præsertim si dentes iam antea caui sint, vt cibi in iis retineantur. Imprimis hoc præstant dulcia, & præcipuè saccharum, vnde qui saccharum sæpè gustant, plerumque corruptos dentes habent. Corruptum etiam dentes nimium calida assumpta. Vnde vulgatus vermiculus:

Pulses feruentes faciunt corrumpere dentes.

Frigida contra idem præstant, & præsertim post nimis calida paruo intervallo assumpta. Vnde qui circa aquas gelidas habitant: corruptos dentes habent.

Dentes etiam lzdunt fuci mulierum ex hydragyro, vnderard mulieres, quæ facis eiusmodi vtuntur, albos dentes habent.

Fistulæ etiam nonnunquam in dentibus oriuntur, è quibus humor corruptus, & sanies sensim exstillat. Et quidem hæc sanies nonnunquam in os cum fuctore defluit, cuius rei exempla duo habet Forestus, *lib. 14. obs. 2.* Nonnunquam verò per dentium radices, & maxillæ illa foramina, per quæ vasa in eas subeunt sensim extra effluit, & tubercula in mala vel mento excitat, quæ nullo modo curantur, nisi dens extrahatur. Et si enim, vt aliquoties obseruavi, rumpatur illud tuberculum, & pus collectum effluat, & tuberculum inde subfideat, & probè curatum videatur: tamen post aliquod temporis intervallum, ea sâne è dente cariolo ad eundem locum affluente, aliud tuberculum excitatur, iterumque rumpitur & pus effundit: idque toties accidit, donec dens ca-

riolosus extractus sit. Eo enim exempto tuberculum sponte evanescit.

Interdum etiam vlcus semper manet apertum, & continuè saniem stillat, nequitque claudi: donec dens cariolosus extrahatur. Exstillat autem ista sanies, vt dictum, non per eorundem maxillam, sed per foramina, quæ sunt in exteriori superficie maxillæ parte anteriore, per quæ vasa ad mûculos, labium, & cutim eò loci deferuntur. Observationes hæc de re vide apud Anton. Beniuen. *de abd. morb. & sanat. caus. cap. 22.* Guil. Fabric. *cent. 3. obs. 23. & 33.* Tandem nonnunquam vermes in dentibus generantur, qui ipsos erodunt.

Curatio.

Illud quidem, quod corrosum & carie absumptum est, in dentibus resarciri, & reponi non potest: ne verò malum longius serpat, infuens humor omni studio exsiccandus est, ac dum paucus est iste humor, topica sufficiunt: sin multus, capitis etiam prius ratio habeatur & totius.

Postea humiditas putrida absumatur, & ne ab ea amplius dentes corrumpantur, detur opera: quod præstat decoctum Radic. cappar. pentaphylli, cyperi, tithymali, fol. saluæ, menthæ, rorismar sem. nigell. baccar. lauri in vino vel aceto. Aut Gallia moschata vel sola, vel cum cypero & mastiche mixta, in cauum dentis indatur ad prohibendam putrefactionem. Aëtius sulphur viuum lycio exceptum intrudit in cavitatem dentis, aut semen nigellæ torrefactum, & aceto acri affuso tritum.

Vel sequenti decocto os sæpius collatur.

℞. Cort. rad. cappar. ʒ. vj. rad.

peuced. 3. iij. *pyrethri*, 3. ij. *zing.* 3. j. *Sem.* N. *g.l.* 3. j. *B. mir. rub.* 6. fl. *ros. rub.* P. ij. *Dec. in aceti. vini.* q. s. ad tert. *Col.* 2. 3. ix. *Admisc. Syr. de ros.* *fr.* 3. j. M.

Mizaldus commendat aquam rad. pyr. cum vino destillatam, qua os collui iubet. Nonnulli dentes erosos & cariosos camphorâ replent; alij radice peucedani, zingiberis & pyrethri. Alij easdem radices in aceto macerant, deinde coquunt & exsiccant, & eodem modo adhibent. Marcellus cauos dentes sanat imponendo iis cinerem musceridæ, quo ossa cariota restitui perhibet. Sunt qui sequentem aquam stillatitiam parant, qua dentem erosum sæpius fricant:

℞. *Alumin. sacch.* lb. 5. *Sal. ammoniac. gemma.* an. lb. j. Puluerisata indantur retortæ lutatæ, & 2. a. destillantur.

Arceat quoque corrosionem & cariem dentium sequens limentum.

℞. *Paulu. myrrh.* 3. ij. *Gummi iuniperi* 3. j. *alumin.* 3. 5. cum mellis q. s. f. linimentum, quo quotidie dentes putres & erosi fricentur. Vel ℞. *Radix. filic. quinquæ fol. oxylapath.* an. 3. j. Coqu. in aceto vel vino austero ad tertiz partis consumptionem,

Colaturâ os, qua parte dens cariosus est, colluatur; postea hoc puluere, quem Galenus, 5. de comp. med. sec. loc. describit, dens impleatur, qui eius putrefactionem prohibet.

℞. *Melant.* 3. j. *niri* 3. 5.

Simul torresiant, & in aceto acerrimo extinguantur, terantur, & cauernæ dentis imponantur. Rondeletius aquam fortem in cautita-

tem dentis immittit: quod tamen vix tutum puto: cum ab ea & vicinæ partes, & nervus dentis infectus facile lædi possit.

Fricentur etiam dentes iis, quæ postea de dentium denigratione proponuntur.

Et ne dentes carioli amplius corrumpantur, vtile est, post cibum eos à cibis in iis retentis mundare; deinde os vino colluere, & denti mastichen, thus, cyperum imponere.

Nonnulli ceram induunt. Sed monet de ea Rondeletius, ne sola dentibus indatur: cum habeat vim emolliendi, nervos præsertim. Ideoque suadet, si ea uti velimus, ut admiscamus alumen, vel aliud quod siccet, & adstringit, vel ceram viridem, quæ vehementer siccet ob æruginem. Cauteria etiam admittit Hollerius, in Perioste 5. in librum de compo. medicament. sec. loca. Verum vix eorum tutus est usus propter exquisitum nervorum, sensum metuendumque; ne partes aliz & cerebri ipsa in consensum trahatur. Granum etiam thuris vel myrrhæ denti inferere vtile est,

Sylva huiusmodi medicamento-rum reperitur apud Galenum, 5. de Compo. medicament. sec. loc. Aëtium, 3. 2. serm. 4. capite 33. Paulum Æginetam Trallianum.

Si factor dentium simul adsit, aliquid de mircha, aut de folio Indo, aut radic. ireos medicamentis miscetur. Vt ℞. *Myrrh. massic. corall. rubr. rosismarini, ireos,* an. 3. j. *Cera* q. s. pro incorporatione. Fiat Massa, de qua aliquid in dentem cauum immittatur. Vel ℞. *Pulu.*

maſſich. ʒ. ʒ. *corrallior. rubr.* ʒ. j. *myrrb. rubr.* ʒ. ʒ. F. Pulvis, quo cavitates dentium repleatur. Vel ʒ. *Flor. roſar. rubr.* M. j. *maſſich.* ʒ. ij. *radic. ier.* ʒ. j. *igni cupreſſ.* ʒ. ʒ. Fiat decoctio in ſufficiente vini quantitate. Colatur ʒ. lb. j. *Oxymel. ſyſt.* ʒ. iij. Miſc. & decocto dentes eluantur; deinde repleatur cavitates maſtiche cum cera miſta. Dentes etiam mundat & à putredine præſervat Sp. Vitrioli.

Si vermicibus dentes erodantur, necare illos ſcribunt exceptum per infundibulum fumum de ſem. hyoſciami. Faſſiſſima tamen hoc putat Hollerius, lib. 5. *Periſch. in lib. Galen. de camp. medic. ſec. loca*, ſcribitque aliquid vermiculorum ſemper de accenſo illo fumo erumpere, omni tempore in aëre etiam, quando ad dentes corruptos non pertingit. Alij fumum ex fructu Halicacabi cū cera mixto, & ferro candenti iniecto ore excipere iubent; Alij fumum adhibent de trochiſcis ex ſemine hyoſciami albi, ſucco cepæ vel porri & nitro cum ſeuo hircino formati, aut fiat collutio oris ex decocto radicum chelidon. Crato commendat decoctum radicum ſtraxini vel vriticæ. Succus item foliorum centaſrij minoris & perſicæ arboris, aloë, myrrha, C. C. & alia, quæ contra vermes vſurpantur, vtilia ſunt. Quidam os ſpiritu vini colluere iubent. Si dens maxima ex parte carioſus ſit, & dolorem pariat, aut fiſtula inde facta ſit, vel tuberculum, aut vlcus in maxilla, de quo antea dictum, extrahendo ſolum dente cautio adhibeatur, & non extrahatur, niſi vacillet, vt ſine v. extrahi poſſit; aut ſi nervi ſubiecti,

ne inflammatio & inde periculum imminet, Eraſiſtratus, qui dentes temerè non extrahendos putavit, eius rei teſtimonium hoc adduxit, quod in templo Apollinis *Oſtomyæis*, ſeu forceps dentarius plumbeus ſuſpenderetur, quo innuebatur, non eſſe extrahendos dentes, niſi vacillarent, vt plumbeo forcepe & ſine vlla vi extrahi poſſint. Si enim magna vi extrahuntur dentes, ſæpe maiores dolores, & ſanguinis fluxus ſequi ſolet, vel maxilla pars auulſa ſimul extrahi, aut alia pericula excitari poſſunt. Ita memini hic pueri incautè dentem extractum, & proculdubio in extrahendo nervum læſum fuiſſe, vnde poſtea fungus enatus fuit, qui totum os replevit, ac quamvis abſcinderetur, breuiſſimo tamen temporis ſpatio iterum ſuccrevit; maiuſque ſemper incrementum ſumpſit, ac ægrotandem mortem attulit.

Vt autem dentes ſine violentia euelli poſſint, quædam medicamenta adhibenda, quæ paſſim in Medicorum libris occurrunt. Vt, Ranarum viridium in arboribus degentium pinguedo & pulvis, ſi dentibus affricetur; tithymali ſuccus denti inditus, aut ſi ex eo & ſale ammoniaci globuli formentur & cavitati dentis indantur, gummi hederæ impoſitum, radix cucumeris agreſtis per triduum in aceto macerata, ſemen hyoſciami, & radix eiufdem aſſata radici dentis calida applicata. Alij hoc commen-

ʒ. *Prina canis, iburis, dentis canis*, an. q. ſ. Pulverifcentur ſubtiliſſimè & cum vīna permulſcantur,

& imponantur denti eximendo. Tabernæ Montanus hoc laudat.

26. Cummi ammoniacum dissolutum & cum sem. hyssici. Misce. F. vnguentum.

Monet tamen de hisce medicamentis Valescus de Taranta. 1. ut vicini dentes benè muniantur, ne & ipsi à medicamento tangantur. 2. ut os apertum seruetur, & salua effluere permittatur. 3. ne quid deglutiatur.

Ne etiam dentes carioli sub forcipe frangantur, ante extractionem tenui filamento replendus est dens cariosus.

Valescus de Taranta, cap. 72. non facile admittit dentium extractionem; primò propter masticationem, secundò quia dente vno euulso sequatur fluxio ad alterum, & sic cunctinò dentes extrahendos esse, donec tandem homo ad solas offas & pulmenta redigatur. Verùm etsi hoc suo modo concedi possit in dolore dentium à fluxione, & vbi per vasa pluribus dentibus communia materia affluit: tamen in dentibus corruptis, & præcipuè vbi sanies ex iis exesis emanans in maxilla tubercula vel vlcus excitans, nulla alia curandi ratio est, quàm si dens extrahatur. Neque tum metus est, ne vicinus dens corruptatur, cum talis corrosio non sit à fluxione recenti, sed quæ iam diu sæpè præterit.

De Dentium immutatione.

Dentium
immutatio.

Non solum dentes immutuantur, dum intus corroduntur, sed etiam cum breviores fiunt. Fit autem hoc. 1. ob externas iniurias, casum scilicet, percussionem vbi pars aliqua dentis perditur. 2. Vbi nonnunquam in dentium putredine ij non solum intus excavantur, sed etiam pars aliqua decidit. In adultis vix curabile

malum est. In pueris quibus adhuc spes est dentes rursus renasci posse, sanationis spes est.

De Dentium elongatione.

Dentes nonnunquam etiam iusto longiores & prominentiores fiunt, præcipuè anteriores. Id quod accidit. 1. iis vacillantibus, vel eorum radicibus laxatis, vel ex percussione aut casu, acque externa violentiâ, ut in attentatâ, sed non perfectâ dentis extractione. Deinde etiam extra laxitatem & mobilitatem, quando nimirum augentur & longiores fiunt. Id quod plerumque fit, si dens oppositus deest, teste Columbo, lib. 1. capite 10.

Dentium
elongatio.

Si à laxitate & vacillatione dentium fiat eorum elongatio, dentes iterum firmandi sunt, ut postea dicetur; aut si hoc non iuvet, limâ atterendi; quod etiam faciendum, si ex lætore molto longiores sint. De qua re vide Actium, tetrabl. 2. ferm. 4. cap. 3.

De Dentium mobilitate & vacillatione.

Sæpè etiam accidit, ut dentes vacillent: & imprimis incisoriij mobiles fiunt; quia vnâ saltem radice nuntur.

Dentium
vacillatio
& mobilitas.

Vacillatio dentium fit vel à causa externa & evidente, vel interna.

Causa Externa est ictus vel casus. A Causa Interna sunt defectus alimenti, ut interna.

In senibus, interdum etiam conualescentibus; vnde alveoli dentium ampliores redduntur: nimia humiditas laxans radices dentium, præsertim si peculiaris aliqua prauitas accedat, id quod in scorbuto, & in lue venerea ab inunctione hydrargyri accidit: Diminutio gingivarum ab erodente succo prauo, quod & in lue venerea læpe vsu venit. Mobiles etiam fiunt dentes erosâ eorû radice.

Siergo

A causa
repleta.

Si ergo à casu aut percussione dentes mobiles sint redditi, astringentibus & firmantibus vtendum. Vt ℞. Rad. pentaphyll. bistort. an. ʒ. j. cyperi ʒ. ij. flor. rosar. rubr. M. ʒ. fumach. ʒ. ʒ. Coqu. in aqua ferratâ. Collat. adde Alum. ʒ. ij. F. oris collutio. Vel ℞. Coral. rubr. C. C. vñi prapar. rad. bistort. pentaphyll. mastich. rad. cyperi, an. ʒ. j. F. Pulvis, qui dentibus affricetur, vel cum Syrupo de rosâ siccis in liuimenti formam redigatur & dentibus illinatur.

℞. Succinastur. aquar. express. ʒ. iij. syr. ex rosâ, siccis ʒ. j. ʒ. Coqu. l. a. ad spissitud. Add. rad. symphiti ʒ. j. nuc. mosch. express. C. C. vñi pulu. prap. vel sang. dracon. an. ʒ. j. alum. vñi ʒ. ʒ. F. l. a. Linimentum.

Si verò malum sit à defectu alimenti, dentium equidem tenuitati & exsiccationi nullum remediū adhiberi potest. Dentium tamen relaxationi opitulatur astringentia medicamenta, & quæ gingiuas roborant.

Si à nimia humiditate, exsiccantibus & astringentibus opus est. Vbi tamen seligenda ea, quæ dentes non denigrant, & quæ odorem gratum conciliant. Ea enim, quæ dentes denigrant, omittenda, vt cortices granatorum, balauitior, gallæ, vitriolum & calctis.

Fiat nimirum decoctum ex rad. filicis maris, pentaphyll. bistort. lappathi, tormentillæ, cappar. fol. myrti, lentisei, melspil. flor. rosar. rubrar. cupulis glandium in aqua vel vino austero, quibus si alumen, vel decocto, ol. Vitriol. vel Sulphur. guttæ aliquot addantur, efficacius decoctum redditur. Ad humiditatem simul educendam radix pyce-

thri addi potest, & ob odorem suauem rosinarum, saluia, cinamomum.

Pulvere etiam dantes in eundem usum affricentur, quales postea de gingiuis laxis proponentur. Vt ℞. Aluminis, masticeb. an. ʒ. ʒ. coral. rubr. C. C. vñi, eboris, sanguinis draconis, boli armeni, salis communis testis, an. ʒ. ij. thuris, balauitior. an. ʒ. j. radic. ireos, bistorta, rad. capressi, an. ʒ. iij. piperis, picebri, an. ʒ. j. testarum sepiæ, pumicis, an. ʒ. j. ʒ. F. Pulvis. Vel ℞. Corallior. vtriusque an. ʒ. ij. mastiches, tragacanthi, gummi arabici, an. ʒ. j. F. Pulvis.

Vel ℞. Farinæ bordei ʒ. cxx. solior. parietariæ viridis q. s. Contunde folia in mortario & cum farina Misce, vt fiat massa, quæ vtatur in olla igne patente hor. 14. Massam exime & adde mastich. ʒ. ij. rad. ireos ʒ. j. spiciæ Indicæ, solij, an. ʒ. ʒ. ʒ. F. Pulvis. Vel ℞. Off. dactylor. olivinarum combustar. oculor. cancri vñor. an. ʒ. ij. sang. dracon. alum. vñi, an. ʒ. j. F. Pulvis. Vel ℞. Flor. rosar. rubr. fumach. granor. myrr. eupat. glandium, an. ʒ. j. ʒ. cort. rad. mari ʒ. ij. cort. rad. cappar. ʒ. j. ʒ. radic. ireos, thuris, an. ʒ. j. Coquant in vino astringenti pro collutione oris. Vel ℞. Ros. rubr. M. j. C. C. vñi ʒ. j. serpentariæ ʒ. j. radic. tormentill. ʒ. ij. alum. vñi ʒ. ʒ. nuc. moschat. ʒ. ij. cortic. cass. lignæ ʒ. j. Coqu. in lb. j. ʒ. ag. Plantag. Vel ℞. Herb. anriscula muris, serpentariæ, tormentillæ. an. q. v. Coqu. in aqua ferratâ ad consumptionem tertie partis pro oris collutione. Vel ℞. Rad. pentaphyll. bistortæ, an. ʒ. ʒ. flor. ros. rubr. cupular. glandium ʒ. ij. speng. ma-

vin. z. j. Caque in aqua communis chalybeat. & rosar. part. æqual. ad tertias & colentur. Vel ℥. Fol. myrsillor. sorbor. an. M. β. fl. balauſt. sarcocoll. alumnis. an. ʒ. j. acet. scilicet. ʒ. ij. aque Plantag. ʒ. v. Bulliant ad tertias & colentur. Colaturæ admisce. syr. myri. ʒ. j. β. Misc. Efficax est & hoc.

℥. Gland. ʒ. j. alumin. vſti ʒ. j. acarie. ʒ. β. flor. rosar. rub. M. β. Coqu. in vini rubri lb. ij. ad tertiam partis consumptionem: decocto os læpe collatur. Vtilis quoque est sequens aqua destillata.

℥. Fol. salua, rorismarini, an. M. iiij. mentha, chamapith. an. M. ij. schananthi, M. j. cori. citri ʒ. j. ligni aloës, cyperi rot. an. ʒ. ij. Concilis affunde aq. fl. prunell. perichlymeni, rosar. an. q. l. vini cidonior. lb. β. Stent per triduum in infus. deinde destillentur in M. B. In fino adde, moscbi ʒ. β. Possunt & tali linimento dentes mobiles fricari.

℥. Diomori ʒ. β. dianue. ʒ. ij. alum. vſti ʒ. β. Mſce. Vel ℥. Pulv. gummi iunip. ʒ. β. alum. crudi ʒ. j. origani ʒ. β. mellis ʒ. vj. Cum aceto scillitico. Mſce. Aqua pro firmandis dentibus, quæ & in dolore dentium vsurpari potest.

℥. Herb. salu. vrtic. rorismarin. tormentill. rad. nuc. iugland. bene lotar. & comſ. an. M. iiij. flor. salu. rorismar. rosar. rubr. fol. prunell. plantag. summit. rubs, marrub. an. M. ij. sem. myrsill. lb. j. Hypocist. ʒ. iiij. coriand. præp. cori. citri, an. ʒ. ij. cinamomi ʒ. iiij. nuc. cupress. num. x. boli armeni, mastich. an. ʒ. ij. Incisa & contusa infund. in f. q. vini nigri austeri, stent per triduum in macerat. Postea exprimantur fortiter. Expressum indatur cucurb. vitrex. Destillentur

lento igne. In destillato ebulliant vase bene cooperto, Aluminis ʒ. ij. Percolentur. Seruentur vsui. Alia.

℥. Rad. tormentil. serpens. an. ʒ. ij. plantag. ʒ. j. prunell. cori. nuc. iugland. ana. ʒ. j. β. ligni guaiac. comſ. ʒ. iiij. sem. coriandri. præp. ʒ. β. portulac. ʒ. vj. myrsill. ʒ. ij. fol. myrsill. M. j. herb. plantag. marrub. vrtic. min. prunell. an. M. j. β. rorismar. salu. min. an. M. ij. flor. rosar. rubr. M. j. β. santalirub. cori. citri, cass. lign. an. ʒ. β. nuc. cupress. nuc. moscb. an. ʒ. iiij. pinear. rcc. num. iiij. boli armeni, mastich. an. ʒ. ij. cinamomi, myrrha, an. ʒ. j. β. rasur. C. C. ʒ. j. β. Præparata l. a. mſce. & superfund. vini rubri antiq. lb. xij. Stent per aliquot dies, postea per cucurb. vitr. destillentur.

Si ab imminutis & erosis gingiuis sit dentium mobilitas, illæ instaurantur, ut suo loco dicetur. Ut ℥. Alumin. scissil. vſti, flor. rosar. rubr. smach. an. ʒ. j. β. ligni aloës, radic. cyperi. an. ʒ. j. F. Pulvis, qui gingiuas roborat, & astringit. Vel ℥. Corall. rubr. præpar. ʒ. j. β. mastich. radic. cyperi. an. ʒ. β. aristoloch. rotund. cass. lign. an. ʒ. iii. F. Pulvis.

In lue venerea materia putrida & maligna prius abstergatur oxymel. scillit. in quo maceratum sit guaiacū cum succo plantaginis, vel ol. Sulph. aut Viriol. postea aspergatur pulvis ex adstringentibus: tandem post detersionem dentes frequenter abluantur decocto ligni guaiaci parato cum vino, mastiche, plantagine.

Si à Scorbuto sit dentium mobilitas, cura ad scorbutum dirigatur, & adhibeantur ea, quæ postea de gingiuis laxis & corruptis proponuntur.

Ab imminutione gingivarum.

Ementitur structuram firmā dentium alligatio cum filo aureo: Quia verò interdum hanc alligationem sequitur inflammatio, illa cautè instituenda.

Quibus dentes mobiles sunt, non multum loquātur, nec dentes digitis vel lingua moueant, nec aërem frigidum admittant, nec res duras mastificent, sed iuscula sumant, oua sorbilia, vel alios cibos, in quibus forti masticatione non opus est.

De Dentium casu Communere discente.

Dentium casus,

Dentes etiam sæpenumero deficiunt: quod accidit, cum vel violenter excutuntur, vel spontè excidunt, quod malum dentium casus appellatur, id quod frequenter in infantibus accidit, & sæpè in iis dentes à nouis, qui emergunt, extruduntur, sed sine damno aliquo, cum paulè, sicut renascantur. Molarium tamè appendix non decedit frequenter: quia ita cum dentibus committitur acq̃ue coheret, vt ipsorum pars ossea videatur, nec facilè demi possit, Columbus, *lib. 1. cap. 10.* Molares proximos caninis nunquàm decidere vult Plinius; caninos elapsos nunquam renasci. *lib. 1. cap. 37.* Negat tamen hoc Fallopius in *librum Galeni de ossibus*, qui maxillares dentes à se in puero euulsos renatos vidit. Atque omnes maxillares dentes excidunt & renascantur, præter genuinos, qui si exciderunt, nunquam regenerantur. Adultis verò quando id euenit, raro renascuntur; aliquando tamen id accidisse obseruatum est, vt historix à Schenckio, *lib. 1. obseru. 48.* allegatæ testantur.

Causa.

Et ferè causas easdem habet hoc

malum, quas vacillatio & mobilitas dentium, de qua antea diximus, sed grauiores. Quia enim dentes alueolis suis affiguntur, atque alueoli dentibus aptitudine respondent, præterea gingivarum carni dentes adhaerescunt: Si alueoli dentibus non respondeant, sed ampliores fiant, aut gingivarum carni non firmiter adhaerescant, mobiles primò fiunt, & deinde planè excidunt, siue id fiat ob inopiam alimenti, ob quam & alueoli & dentes ipsi exsiccantur, siue ob humiditatem nimiam radices dentium laxantem, siue ob humorum prauitatem, quod in Scorbuto & Lue venera & vlceribus exedentibus, cuius rei exemplum est in puero apud Hippocratem, *4. epid. sect. vli.* & inunctione cum hydrargyro euenit, siue ob gingivarum carnem imminutam & absumptam.

Signa Diagnostica.

Signa causarum quod attinet (vitiū enim ipsum per se patet) ex alimenti inopia vix vnquam alicui dentes excidunt, præterquàm senibus, & dentium casus ex hac causa senectuti proprius & familiaris est. Si ex alimento vitioso & humoribus prauis id accadat, ex viuendi ratione, morbis, qui præcesserunt, ex destillationibus acerbis, dentium dolore cognoscuntur.

Si ex humiditate nimia, os saliuā abundat, gingivæ sunt humidæ; Lues venerea, Scorbuto & vlcera etiam suis signis cognoscitur.

Prognostica.

Malum hoc non contemnendum est. Nam quia dentes masticationi inserviunt, si dentes desint, masticatio non rectè perficitur; atque ita etiam coctio in ventriculo non rectè

fit. De inde & turpitudinem aliquam pariunt, quæ in loquentibus, videtur in oscitâtibz apparere; imò sæpe inde sermo vitatur.

2. Dentium ab alimenti inopia vacillatio curari nequit, id quod senibus accidit. Quæ verò affectio flegmonæ similis est, ex alimenti redundantia, ea iuvenes magis corripit. Galenus 5. de comp. medic. sect. loca. cap. 8.

3. Dentes in infantibus siue sponte siue ob violentiam aliquam excidunt, modò radices remaneant, sponte renascuntur. Quamobrem cauendum, ne cum pueris dentes casu atque aliquo ictu effringuntur, quæ reliqua est portio eruatur, sed accuratissimè radix ipsa, quoad eius fieri potest, seruari debet. In ea enim, velut in femine quodam, ipsius dentis regenerandi spes residet, eaque radicitus euulsa dentes non amplius, vel rarissimè renascuntur. Columbus, lib. 1. c. 10. In adultis verò etsi hoc aliquando accidat: tamen plerumque ubi radices seu appendices exacte coaluerint, si ita cum radice excident, non regenerantur.

Curatio.

Curatio.

Quæ dentium mobilitas ex humiditate nimia, vel humoribus prauis accidit, eodem modo curatur, vt dentium vacillatio & mobilitas; cum easdem causas habeant. Dentes verò, qui ex alimenti defectu exciderunt, etsi reparari nequeunt: tamen quia deformitas aliqua inde oritur, præsertim in anteriore oris parte, vel qui exciderunt, modò non sint carioli, dentes arte fabricati ex ebore, & in amillorum locum arte inserti, deficientium numerum supplere possunt. Cautè tamen hoc præstandum, ne ex

compressione gingivarum, vel nervorum inde inflammatio gignatur, quod interdum accidisse observatum est. Observatum etiam est, quosdam loco dentium multorum vnum os continuum habuisse, vt historix à Schenckio, lib. 1. obs. annotatz testantur.

De Dentium numero, & situ vitiato.

Præterea numerus dentium præter naturam augetur, & plures, quàm secundum naturam, dentes reperiuntur. Quosdã enim dentium loco vnicum os habuisse refert Plin., lib. 7. c. 16. Plutarchus, in Pyrrho, & alij, quos citat Schenckius, lib. 3. obseru. de dentibus.

Dentium
situs, &
numerus
vitiatus.

Ita observatum est, quosdam duplicem, vel triplicem, ordinem dentium habuisse, quod incommodi aliquid, vel deformitatis ferè non habet, si situm saltem: ordinarium observent. Cuius rei historias collegit Schenckius, lib. 1. obs. 413.

Interdum etiam dentium numerus imminuitur, & pauciores quidam, quàm vulgò homines solent, dentes habent, vt Valescus Taranta de seipso testatur.

Nonnunquam verò dentes, sine numerum iustum obseruent, siue eum excedant, siue rectum non obseruant, sed extra ordinem prominent, & ita quidem, vt interdum labia diducant, deformitatemque pariant, ac in masticatione impedimento sint. Et imprimis dentes incisores non rarò duplices sunt.

Quibusdam etiam dentes in palato eructi sunt, cuius rei historia habetur apud Scheck. lib. 1. obseru. 415.

Verùm cum ista mala omnia à conformatione vitiosa dependant, emendari arte non possunt,

De connexione Dentium

Dentium
connexio.

Non verò tantum in numero & situ, sed etiam in connexione sunt dentium vitia. Connexio præter naturam dentium fit, vel ob eorum inter se, vel cum maxilla.

Inter se connexi dentes interdum sibi coherent, sicut in Persia illo, de quo Herodotus, lib. 9. Post pugnam enim ad Plateas, in qua multi Persæ ceciderunt, cum cadauera comportarentur, inuenta est maxilla habens quidem distinctos dentes, verum ex vino ossæ. Cuius rei hostiæ plures videantur apud Schenckii lib. 1. obser.

Connexio autem cum maxilla est, quando dentes maxillæ non inserti tantum, sed planè adnati sunt, & coherent, ita ut euelli non possint, nisi maxillæ ossis frustū simul auellatur, quod obseruauit Columbus lib. 15.

De sordibus ac tophis dentibus.
accretis.Dentium
sordes.

Tandem etiam dentibus sordes & lapides seu topi, quos Græci *τοφί*, appellant, annascuntur, atque obstruuntur est, in quibusdam ita incrementum sumphisse, & dentes ista lapidea materia ita obductos fuisse, ut nulla dentium distinctio amplius appareret, sed vnius tantum ossis speciem præ se ferrent.

Generantur autem isti topi ex lentis, & viscidis cibis, præcipuè caseo dentibus adhærente, & in iis, ut reliqui lapides in corpore, in hanc duritiem coagulatis. Topi illi iam geniti scalpis vel alius instrumentis è ferro aut potius argento paratis à dentibus separandi sunt. Ne autem iterum generentur, dentes post cibum diligenter mundandi sunt, idque faciendum non ferro, &

acie cultri, cum dentes inde ladan-
tur, sed denticulæ palpi ligneis vel ossæ
firmo, ac flexili, ideoque in hunc
vsum commodum lignum lent. cup.
iunip. & huius generis alia; spinæ
item piscium aliquæ: item ossicula,
& tendines ossi gallinarum. Postea
os abluatur, vel aqua, vel vino, &
dentes à sordibus diligenter abstergantur,
id quod fit commodissimè
denticulæ, & pulueribus ad dentes
mundandos idoneis, qui postea de
nigredine dentium curanda proponuntur.

CAPVT XI.

De Dentium dolore.

ATque hi sunt morbi, qui dentibus accidere solent. Symptomata dentium alia in actione læsa consistunt, ut quando dolore, stupore, vel algore afficiuntur, alia in qualitate mutata, dum stridorem exciunt, & dura nigrescunt, & sordido lentore obducuntur, de quibus iam dicendum.

Dentium
dolor.

Et primò *de dolore maxillæ*: Quæ appellatio à parte affecta, & à symptomate sumpta est, ut docet Galenus, 2. *met. mor. 27*. Dolent autem dentes, & quidem maxime molares (incisores, verò raro numquam) etsi ossa sint, quia sensu non planè destituti, ut alia ossa. Nam vt Galenus, 16. *de usu. p. c. 2*. docet, dentes mollium cerebri nervorum participes sunt, quod extrinsecus occurrentibus calidis, frigidis, duris, aliisque nudi sunt expositi. Nervulus autem ille ad radicem dentis implantatur membranulæ cavitate dentis intus succingens: & quod

dem ex tertia & sexta nervorum propagine, nervi qui dentibus implantantur originem habent.

Galenus tamen, *de comp. med. s. l.* etiam corpus dentis sentit ac dolet, ex affectione scilicet phlegmonis simili substantiam dentis, ubi dolorem ex hac causa ortum discernit, à dolore inflammati nervi, qui radices dentis substratus est, & à dolore inflammatarum gingivarum, quæ omnia suo experimento Galenus *ibid.* confirmat.

Causa.

Causa. Causa proxima doloris cum sit solutio continui in parte sentiente, etiâ hic dentium dolor excitabitur, quatenus & ipsi nervum participant, huiusque membranae dentibus inseruntur. Solutionem autem continui hic parit, vel intemperies, vel humor, ut vulgò docetur.

Verum vix sola intemperies dolorem dicit, nisi forsitan alior sit, de quo postea, sed semper humor coniungitur: & intemperies illa, si quæ adeit, humore inest.

Humor autem is est, vel stigidus & pituitosus, vel calidus, vel serosus, salis & acris, id quod frequentissimè accidit: & qui dolores dentium à vapore à multis fieri docentur, eos potius ab humore seroso provenire verisimile est. Interdum etiam illa materia in dentibus putret, & corrumpitur, unde vermes geniti doloris in dentibus causa sunt.

Confluit autem illa materia, vel in membranas maxillarum & alveolorum dentium, vel ad nervulum in radice dentis & membranam huius internam nerveam, vel in ipsum corpus dentis à capite. Et quidem in superiorem maxillam per angulum oculi maiorem, in inferio-

rem per venas temporum. Et principium huius fluxionis plerumque est à capite, nonnunquam tamen & ex inferiore corpore materia affluit, ex hepate, liene, utero. Cum enim vitiosi aliqui humores, præcipuè serosi, in parte aliqua geniti in venis cumulantur, natura iis sese liberare cupiens, eos cum ad alias partes, tum ad dentes protrudit: præcipuè si sint debiles. Id quod maxime accidit, cum dentes sunt erosi.

Externæ causæ, quæ seu humores commouent, seu ut facilius recipiantur, faciunt: sunt ictus & casus, usus ciborum nimis frigidorum aut calidorum, maxime si mutuo in se consequantur. Acridum item, acerbiorum ac dulcium frequens usus: contactus creber, qui sit ferro.

Signa Diagnostica.

Signa. Primò ut certi sumus, an dolor sit in dente, vel gingiva, autè omnia inspicienda est gingiva, utrum inflammata sit, tumida, corrosio seu putrefactio in ea appareat. Si nihil horum cernatur, causa doloris erit in dente ipso, vel eius nervo. In dente quidem, si dolor non ita profundus est, & secundum latitudinem dentis extendatur, mutatio etiam quædam doloris in dente animadvertantur. Et fortassis dens tum cariosus est à verme intus obsessus: ubi etiam dolor interpolatus est ad motum ipsius vermis. In nervulo vero si dolor sit, profundior, & vehementior est, qui dente exempto non nihil levatur, quòd ob viam patetactam materia iam melius diffatur dolor etiam secundum gingivas se extendit in latitudine, & ad aurem pertingit.

Signa causarum sic discernuntur. Humor, qui doloris causa est, suis

signis se prodit, ex doloris specie, ex sapore & habitu corporis. Sanguis cognoscitur, ex dolore pulsate, sapore subduli: pituita dolore distendente, sapore alio aut insipido: bilis dolore punctorio, sapore amaro: humor melancholicus, dolore profundo, & sapore acido: à sero dolor non est ita fixus, sed sæpè mutatur. Ac generatim à calido humore dolor est acerbior, à frigido remissior. Habent hic & locum signa, quæ suprà, lib. 1. de *Interperie Capitis* cum materia sunt expofita.

Prognostica.

Prognostica

1. Dolor dentium maximis tormentis annumerati potest, teste Celso, lib. 6. cap. 9. Et ut Galenus scribit, 1. de *comp. med. sec. loc. cap.* 1. nonnullis tantus fuit, ut mortem sibi impatienti consueverint. Ita dolor dentium periculosior videtur esse, quàm dolor capitis, symptomatis scilicet ipsius ratione, non causarum: cum causa dolorem capitis producat propriam sit cerebro, & proinde grauius symptomata, ut cæcitatem, apoplexiam, & similia afferre possit.

2. Dolor dentium pro causarum & loci affecti diuersitate facilius aut difficilius curatur. Ex sanguinis affluxu citius tollitur. Quamquam si inflammationem pariat, multum seuiat.

3. Atrociorém dolorem excitat humor tenuis, acris, salus & serosus, sed citius desinit, ob materiz illius mutationes subitas. Mitior dolor est à frigido, & pituitoso humore et si diuturnior.

4. Si affectus fuerit in gingiuis, dolor non remouebitur dentis euulsione: si in nervo, dolor exempto

dente interdum cessat, tum materia antea conclusa exitum iam habet, tensioque remittit, aliquando remanet, quando materia nimis crassa, & lenta nervo adhæret. Aui-cenn. *1. 1. cap. 7. tract. 3. cap. 5.*

5. In vehementi dentis dolore, si nullo prius affectionis vestigio in gingiuis apparente, tumor iam in eisdem aut in malis oboritur, bonum est. Significatur enim materia ab interna dētis cavitare ad externa verti ac deriuari siue naturæ robore, siue virtute medicamenti.

6. Dentium dolor cum eorundem stridore, & febre ardente lethalis est quod si iis accidit, quibus antea dentes stridere non consueverunt commotionem mentis, maniam, epilepsiam aut conuulsionem portendit. Cum enim stridor fiat ob conuulsos temporum musculos, argumento est, cerebrum affectum esse, cui si delirium coniungatur, mali consummati est indicium, atque inde mors sequitur, ut Galenus, *ibidem in comm. docet.*

7. Quibus in dentium dolore de supercilio tenuia discedunt, his à pipere probè affricato posttridie crassiora discedunt, si stupefaciens prius adhibitum dolorem non sedauit, sed potius auxit, ut Aegippii exemplo docet Hippocrates, 6. *Epid. sect. 6.* Piper enim in pactum à narcotico succum soluit, vnde dissipato eo mitigatio doloris sequitur.

8. Dolore dentium cessante interdum aures pus colligunt. Sic Athenæo puero sinistra parte dens inferior, dextra superior doluit. Huius auris dextra pus collegit, cum non amplius doleat. Hippocrates, 4. *Epid. sect. vii.*

vel succus plantaginis, semperuini, vel decoctum de rosis, lactuca, plantagin. acetos. falic.

℞. Flor. ros. rub. fol. malu. minor. aa M. j. Coq. in vino austero ad tertias. Colat. *℞. ℥. viij.* Quibus admisce *el. sulphuris acidi* *℞. croci* *℞. j.* M. Vel *℞. Fol. quercus, plantag.* an. M. i. *hedera arbor.* M. *℞. Rad. tormentil.* *℥. ii. vrtice.* *℥. iii.* Coq. in vini Rhenani q. s. ad tertias, & colentur.

Rulandus aqua solani cum oleo vitrioli mixta vitur.

Vbi verò gingivæ simul sunt affectæ, acetum, monente Aëtio tanquam hostilis gladius vitandum est, ob mordacitatem, quâ gingivas erodit. Alioquin in dolore dentium, citra gingivarum inflammationem, siue corpus ipsum dantis doleat, siue nervulus eidem substratus, Galenus in aceto medicamēta præparare iuber, tam repellentia, quàm discutientia. *℞. decomp. med. sec. loc. c. g.*

Etsi enim acetum per se dentibus nocet: tamen repellentibus rectè admiscetur: quoniam penetrando illorum vim auget: discutientibus etiam, quia præterquam quod penetrationem adiuvat: ipsum quoque incisoria vi suâ nonnihil ad discutendum conducit.

Vel *℞. Sem. Papav. albi. hyoscyami* an. *℥. ii.* *Rad. alib. a.* *℥. ℞. Flo. chama. rosar. rubr.* an. *℞. i.* Coq. in aquæ, & aceti s. q. ad consumptionem tertie partis.

Vel radices oxylapath. Coq. in vino austero, & decoctum in ore detineatur.

Vel radices oxylapath. aceto macerate denti dolenti & cavernoso indantur. Felicax est & medicamentum decoctum radic. prunorum syl-

vestium ablato cortice exteriore. Vel *℞. Limatura ligni guaiaci* *℥. ii.* *cortic. interior. Virid. quercus, Radic. Prunell.* an. *℥. ii.* Coq. ad remanentiam lb. i.

Extra inungatur maxilla vnguento Alabastrino. Monet tamen Languis, vt vnguentum Alabastrinum in materia calida misceatur cum frigidis, sicut in frigida cum calidis.

Vel *℞. Pomor. dulc.* *℥. ii.* Adde *sulfuris* *℥. iii.* *croci* *℞. i.* *olei rosar.* *℥. i.* M. Fiat cataplasma extra loco dolenti apponendum. Vel *℞. Medulla pomor. assat.* *℥. ii.* *℞. stercor. gallin.* *℥. i.* *℞. Ol. ros. omph.* *℥. vi.* M. exactè & fiat cataplasma.

In materia frigida Auicennas alumen vstum aceto extinctum cum salis parti portione misceat, eoque dentes fricat, & postea cum vino abluit. Resolvit simul vinum, in quo hyssopus & thymus coctus est. Utilis est & collutio ex decocto origani, serpilli, sem. staphidis agriæ, rad. pyrethri, acori, ligni sancti, & similibus. Vel *℞. Origani M. i. hyssopi M. ℞. Cort. aurantior.* *℥. ℞.* Coqu. lb. i. ad consumpt. tertie partis, & colentur. Vel *℞. Fol. Beronice, salu. maioran, rosmar.* ana M. *℞. Flo. stachad. arab. P. ii. sem. nigella, Rad. Pyrethri,* an. *℥. ii.* Coq. in vino albo & aceto pari portione pro collutione oris. Vel *℞. Origan. rosmar. salu.* ana M. *℞. rosar. rubr. P. i.* *Rad. pyrethri.* *℥. iii.* Coq. in lb. ii. aquæ. ad dimidium, Colaturæ adde *aceto rosar.* q. s. ad gratiam aciditatem. Vel *℞. Limatur. ligni guaiaci* *℥. i.* *Cort. inter Virid. lign. querc. Rad. pyrethri, filicis,* an. *℥. ℞.* Coq. in aquæ puræ lb. i. s. ad *℥. i.* remanentiam. Vel *℞. Rad. pyrethri* *℥. ii.* *infuse parilla* *℥. iii.* *rasura ligni guaiaci* *℥. ℞.*

pini ʒ. iiii. *fl. ros. rubr. serpilli, origani,*
an. P. i. *gran. iunip.* ʒ. β. *sem. carui*
 ʒ. iiii. Incisa contusa coq. in *aq. &*
vini Rhenani ʒ. xij. Ad tertias, Co-
 lentur. Colaturæ ʒ. ʒ. vj. In qui-
 bus dissolue *camph. g. v.* Vtile etiam
 est decoctum gummi iuniperi cum
 vino paratum.

ʒ. *Gummi iuniperi* ʒ. β. *vini Rhe-*
nani ʒ. viij. Coqu. & Colentur. Co-
 latura calida in ore detineatur.

Alij *Camphoræ* ʒ. β. in spiritus
vini ʒ. ij. dissoluant, & eodem
 modo vtuntur. Iuuat & sequens
 gargarismus.

ʒ. *Rad. vritic. ardent.* M. j. La-
 uetur ter in aqua; postea ex vino;
 terantur optimè in mortario cum
Rad. pyreth. zingib. an. ʒ. j. Bulliant
 in *vini alb. opt.* lb. iij. ad tertias
 pro gargarismo, qui sapius adhi-
 beatur. Commendatur etiam sequens
 liquor odontalgicus.

ʒ. *Cortic. ligni guaiaci* lb. ij. *ma-*
stich. ʒ. j. *vini hie distillati* lb. ij.

Digerantur in Sole per mensem
 bene agitando, donec rubescant,
 postea colentur & clarificentur. Hu-
 ius essentia ʒ. vj. vel vij. in ore de-
 tineantur.

Tedarum quoque & Pinearum
 decoctū prodest pro collutione oris.

Ipsi etiam denti dolenti appli-
 centur *Rad. oxylapath. aceto mace-*
rate, vt antea dictum; Vel spon-
 gia madida decocto *staphydis agriæ,*
mirrhæ cortic. radic. cappar. Vel
 ʒ. *Rad. helenij, oxylapath. pyrethr.*
filicis, aluminis rissi partes æquales.
 Contunduntur in puluerem & cum
 melle. Fiant pillulæ dentibus impo-
 nendæ. Vel ʒ. *Rad. pyreth. ʒ. j.*
serpentar. filicis, oxylapath. alumin.
rissi an. ʒ. β. *mellis* q. s. Fiant pillu-
 læ dentibus imponendæ. Trochisci

de *Pyrethro.*

ʒ. *Rad. pyrethri* ʒ. j. *bisfort. hya-*
sciami, ana ʒ. β. *alumin. tragacanth.*
ana. ʒ. ij. *aceti vini acerr. q. s. F. la-*
trochisci.

Aut olei destillati *cariophyllor.*
 gutta vna vel altera cum gossypio
 denti imponantur, cuius ʒ. β. aliq.
camphoræ g. admisceri possunt. Idē
 præstant olea destillatæ *spicæ, thymi,*
nuc. mosch. cinam. ligni iuniperi,
ligni guaiaci, & similia.

Suffitus etiam per tubulos conue-
 nientes ore excipi possunt ex *radic.*
bayon. pyrethri, cortic. radic. cap-
par. myrrha, thure in aceto & vino
 coctis.

Hodie fumum *Nicotianæ* ore ex-
 cipere vulgatum est.

Vsu sæpe à me compertum, &
 efficax in dolore dentium à quacun-
 que ferè causa est remedium hæc
 oris collutio.

ʒ. *Rad. Filicis, pēaphyll.* ana ʒ. iiii.
bisfort. ʒ. ii. *Fol. ruta, salu. betonic.*
Flor. rosar. rubrar. an. M. β. Coqu.
 in vini rubri & astringentis & aquæ
 communis, an. q. s. ad consumptio-
 nē tertie partis, pro collutione oris.
 Extra applicetur hoc cataplasma.

ʒ. *Rad. Maluæ* N. xij. Coqu.
 ad mollitiem. Adde *farina fenugraci.*
Sem. lini, Pulv. anethi Fl. chamemeli,
ana ʒ. j. *farina bordei* ʒ. iijj. Incor-
 porentur omnia simul & in fine ad-
 datur *ol. chamemel. vel aneth.* F. ca-
 taplasma.

Si ob doloris vehementiam ali-
 quod periculum metuendum sit,
 narcotica vsurpentur.

E. G. Fiat oris collutio cum de-
 cocto rad. & fol. hyosciami, vt &
 sem. eiusdem, ac sem. lactuæ &
 papau. cum aceto parato, cum ʒ. β.
opij. Vel fiat collutio oris ex aceto,

in quo opij grana aliquot sint dissoluta. Possunt & opij ḡ.ii. cum æquali parte croci vel castor. bombace excepta in dentis cauernulam induci, si erosus sit: sin minus, opium & crocus in pauxillo lactis vel aq. papau. aut hyosciami dilui, & dentis dolentis radix eo fricari potest. Vel ℥. Fl. Chamem. anebis, ana P.i. Cort. rad. mandrag. ʒ. i. Sem. hyoscy. papau. ana ḡ.ii. Coqui in aq. solani, plaurag. rosar. an ʒ. iii. Coleuntur. Colaturæ admisce, aceti rosar. ʒ. i. laudani opiaris ḡ. iii. M. Vel indatur denti pilula de laudano opiato, vel pilula de cynogl. Vel ℥. Laudani opiaris ḡ. iii. Sp. vitr. gut. i. M. F. Pilul. & dentibus vna indatur. Vel Theriaca recens aut Michridatium vel philonium romanum, aut socirella parua in dispensatorio Angastano descripta, denti illinatur. Vel ℥. Stryac. calamis. piper. albi, Cost. opij, Sem. hyoscyam. an. ʒ. ʒ. F. Cum vino. F. Pilulæ dentibus indendæ, vel indatur pilula vna de seqq.

Sem. apij, hyoscyami, ana ḡ. iii. opij ḡ. iii. Cum syr. de papau. hiant pilulæ iii. vel v. Vel ℥. Philon. Roman. ʒ. i. spir. ligni guaiaci ʒ. i. M. Vel ℥. Rad. pyrethri, Sem. apij, an. ḡ. ii. hyoscyami, opij, an. ḡ. i. Cum syr. papau. hiant pilulæ N. v.

Aut admoveatur cum gossypio oleum hyoscyami. Vel aliquid de sequenti mixtura cum bombace denti dolenti applicetur.

℥. Philon. Rom. ʒ. i. opij ḡ. vi. ol. viridol. ḡ. v. M.

Balsamum ad dolorem dentium.

℥. Opj Thebæic. Spec. diamb. an. ʒ. i. campb. ḡ. iii. ol. nuc. mosch. expr. ʒ. ii. Caryoph. gut. vii. vel q. s. F. balsamum.

Decoctum Langii.

℥. Opj Thebæici ʒ. ii. succi hyoscyami ʒ. iv. cortic. mandragoræ ʒ. v. fl. chamamel. ʒ. i. ʒ. pyrethri ʒ. v. croci integr. ʒ. i. Infunde in vini sibi. i. aq. rosar. ʒ. iv. & aceti opij ʒ. vii.

Bulliant in vase duplici ad tertiam partis consumptionem, & cum panino intincto dentibus colatura applicetur.

Cautio tamen in narcoticorum exhibitione adhibenda: refert. n. Alexand. Benedict. de cur. morb. l. 6. c. 13. Iacobum Iustinianum, patrium Venerum, in dentis dolore oleo opiato imposito, Patavii sopore perpetuo extinctum fuisse.

Dolore sopito post opiatorum usum os illico abluitur decocto saluæ, rorismarini, maioranæ, hyssopi, vt noxa ab opio impressa, tollantur.

A proprietate etiam valere dicuntur sequentia: Suffusus ex canis mortui dente, aut vltus ille in fornace cum posca misceatur & imponatur; Senesca serpentis in aceto cocta, aut vltæ eadem & trita, atque cum melle vel oleo ad mellis spissitudinem subacta, imposita. Dictamni quoque radix, & radix chelidoni, præfectum si vermes sint in dentibus.

Plinius plantaginis radicem in aceto coquere iubet. Decoctum etiâ foliorum lappæ maioris cum sale in aceto commendatur. De Pastinacæ etiam marinx radio scribit Plinius, lib. 32. cap. 7. si eo gingivæ scarificentur, dolorem dentium sedare.

A recentioribus etiam, consentiente experientia, pluriimum commendatur oleum ligni Heraclei per retortam destillatum, si gutta vna cum gossypio denti imponatur.

Nonnulla tamen horum ad manifestas qualitates reduci possunt, cum vel repellant, vel discutiant, vel dolorem sedent.

Si his nihil proficitur, dens corrosus extrahatur. Præparatur autem ad extractionem ve supra etiam dictum imponendo in foramen lactithymali, vel solum, vel cum pulvere radic. mori aut cappar. mixtam. Aut, quo Galenus vitur, rad. pyrethri 40. diebus in aceto macerata ac trita denti imponantur.

De pastinacæ etiam marintæ radio scribit Plinius, si tritus cum helboro albo illinatur, dentes sine vexatione extrahi.

Facile quoque cadit dens, si cum aqua ex sale armoniaco destillata tangatur,

Dixit.

Dixit.

Dixit pro causam diversitate variet, & medicamenti respondeat. Imprimis tamen danda opera, ut dentes à corruptione præsententur. Ideoque ratio imprimis ventriculi & capitis habeatur, ne capula & cruditate infestentur. Lactis item & dulcium, ut sicurum, mellis, sacchari usus frequentior cauendus. Raphanus quoque & masticatione & evaporatione nocet, sicut & porrum, quod à proprietate dentibus nocere auctor est Avicennas. Vitentur quoque acerba valde & acida: præterea solida & dura inimica sunt dentibus, ac stupefacientia, ac gelida, sicut & cæteris ossibus. Actum quoque vehementer calida præcipue si frigida mox subsequantur. A cibo dentes diligenter mundentur, & iuxta est, & ut dentes semper à cibo sale fricentur, & os vino eluatur.

Quod ad remedia præservantia,

commendatur sal theriacale, Galen. in lib. de theriac. ad Pisonem, c. 8. teste. A dolore dentium etiam præservant collutiones oris ex iis quæ astringunt; imprimis si medius cortex fructus berberis aqua maceretur, & aqua mane os colluatur. Laudentur etiam dentes his singulis mensibus vino, in quo tithymali radix cocta sit, eodem Galeno docente, 1. de Euporist. cap. 10. & 2. cap. 16. Quibus locis plurima huius generis medicamenta reperiuntur. Prodest etiam pro collutione oris aqua saluicæ, vel vinum decoctionis origani, & mentastri. Dentifricia etiam adhibeantur frequenter, de quibus postea, cap. 13. dicitur.

De Doloze Puerorum Dentientium.

Et si, ut supra dictum, infantes iam duri in lucem eduntur, dentibus præditi sint: tamen gingivis tumuntur, & postea denum erumpunt. Infantes autem, cum dentes erumpunt, sæpe maximus dolor affligit. Et si enim, & alia symptomata dentitioni infantium coniungantur: tamen de iis omnibus agere huius loci non est, sed dicendum de eo, de morbis infantium, ubi de dentitione in genere agendum erit.

Adest autem dolor maximus, cum canini erumpunt, unde etiam vulgatum est; Parentibus non esse gaudendum de liberis, donec hi dentes eruperint.

Cum vero dolor ille ferè à densitate & duritie gingivarum existat, hæ rarefaciendæ & emolliendæ sunt. Oblinantur itaque lacte canino aut cerebro leporino, quod nonnulli crudum assument mellique permiscunt. Sed Galenus, in 11. de simp. med. fac. & Avicennas cocto vituntur, toto scilicet capite elixo.

Dolor infantium dentitionis.

Valent & cerebella pullorum & animum. Aut gingiuarum pinguedine gallina aut anatis recent. inungantur, aut butyro recenti non salito, eoque vel solo, vel cum melle, vel cum decocto lactuce permisto.

Commendatur etiam succus & canceris viuis contusis cum aqua flor. cyani extractus, si eo gingiuarum abluantur.

Si dolor vehementior sit, Aua-cennas succum solani cum oleo rosarum calefacit & illinit. Alij malagmate vtuntur ex semine lini & althææ, & aliqua pinguedine, vel si febris adlit, ex semine lactuce. Vel *℞. Sacchari & butyri s. sale, succi alibæ, an. ʒ. j. vitell. oui dimid.*

M. Ambrosius Parvus, *lib. 23. cap. 67.* suadet, vt, si infantes ob gingiuarum duriciem de vita periclitentur, scalpello gingiuarum aperiantur, atque eius rei periculum cum felici successu in aliquot suis liberis se fecisse scribit.

Nonnulli & quædam periapta commendant. Aëtius radic. colocynthis sylvestris laudat, si canali argenteo includatur, & collo pueri appendatur. Alij dentem viperæ maleulæ appensum, iaspidem item viridem & dentem lupi dextrum, de quo Plinius, *lib. 11. cap. 37.* Dens dexter caninus lupi in magnis habetur operibus. Quæri tamen hic posset, an dens lupi id quod præstat, gestatus præstet, an verò potius, quod dum eum infantes sugunt, & gingiuis admovent, eas hoc modo rarefaciat.

CAPVT XII.

De Dentium stupore & algore.

Stupor dentium, Græcis *ἀπυσία* Dentium Stupor.

Est molestia & dolor quidam dentibus accedens ab acidis & acerbis præcipuè rebus, qui sensu rectius percipitur, quàm verbis describitur. Id malum ita occupat dentes exteriores, vt non solum mandantes ex eo intoleranter doleant: verum etiam ipsimet dentes digitis suis attingere præ dolore vix sustineant. Quapropter non satis commodè stupor affectus ille appellatur, qui est abolitio sensus: sed potius ad dolorem pertinet, vnde rectè Capiuaccius, *l. Pract. Medic. cap. 53.* hæmodiam dolorem dentibus proprium esse asserit.

Causa est sapor acidus, temperiem dentium immutans. Id quod accidit à cibis quibuscumque huiusmodi sapore præditis. Idem euenit ab humoribus acidis & atra bile vomitu reiectis; id quod multis affectione hypochondriaci laborantibus accidisse memini, qui tam acida vomitu reiecerunt, vt dentibus stupidius ita inde euaserint, vt per integrum diem vix aliquid comedere potuerint. Quod quandoque etiam præstant vapores acidi è ventriculo ad dentes elati. De quo etiam Hipocrates, *lib. 2. de morbis sub morbo nigro.* Aliquando & ipsis dentibus huiusmodi materia alieno sapore infecta innascitur, vel ad eos confluit.

Contingit etiam, vt ab imaginatione stupor eiusmodi inducatur, quæ

do alium res acerbas masticantem videmus, aut strepitum limarum, vel similitum rerum audimus. Nam imaginatio occulto modo mouet humores in corpore, atque eos præcipiè, qui cum re, quam imaginamur, analogiam aliquam habent.

Curatio.

Fracturios tamen, & probabiliter, *desymph.* & *anticipath.* cap. 14. ad auditus organum affectum causam refert, dum scribit: *Similiter & si acutus valde sit sonus stridulus, applicatio vim patitur, quasi in angusto fassa, tum & membrana auditus quasi ita offenditur, unde contrahitur reperiendè, ac cum ea simul & neruuli quidam usque ad radicem dentium, in quem locum subito incidens nouus acerrorem quandam circa dentes facit.*

Medetur huic affectioni portulaca masticata, cuius succus lentore suo dentibus adhærens affinitate quadam, humiditatem acidam & acerbam è dentibus extrahit, vt disputat Aristoteles, 1. *problem.* 38. Et si hoc alij ad proprietatem substantiæ referunt, quæ & in apostematibus lienis portulaca proflit, & affricione verrucas tollat. Rhases & amygdalas amaras atque ceram masticatam commendat, quæ temperatâ sua qualitate, ac vinctuositate illam quasi congelationem remittunt. Salem item affricare iubet, qui materiam liquefaciendo acorem è dentibus extrudit. Alij panem calentem, vt è furno extrahitur, masticandum exhibent, aut radices vel succum glycyrrhæ aut pineas, auel-lanas, iuglandes. Alij caseum recentem commanum, & calidum oui vitellum commendant. Aginetâ omphacinum inunctum, vt & gmyream vetulram in æneo vase co-

ctam ad mellis crassitudinem inunctam laudat. Confert & frequens oris colluctio cum vino calido.

Colluctio quoque oris commoda est ex aqua salinâ calente, vel decocto radic. aristolochiæ & baccar. lauri.

Cognatum stupori malum est, cuius Rhases meminit, cap. 44. quando dentes frigidi tactu imprimis offendentur, quod malum Auicennæ est Eber denium; ac dentes tum ita afficiuntur, vt neque frigidum neque calidum, neque durum quid tollerent.

Causa est debilitas dentium ex intemperie siue frigida siue calida, & eorundem debilitas, seu vt alijs placeat, nimia sensibilitas cum raritate texturæ. Plerumque verò ab intemperie est frigida. Ideo Rhases oleum exalefactum ore tenere iubet, & vitelli oui assatum calidum masticare, aut calentem panem. Auicennas Hierâ simpl. aut Theriacas dentes fricat, vel masticentur lauri baccæ, aristoloch. anethum. In calida materia Auicennas fricat dentes cum oleo rosacæ tepesfacto, cui camphora & santali sint admixti: aut mucilaginem sem. psyllij, vel sem. portulacæ masticare iubet.

CAPVT XIII.

De Dentium stridore.

Dentes naturâ etsi moueantur, Dentium stridor. dum voci formandæ & masticationi inseruiunt: tamen motus ille fit sine sono. Interdum verò p. n. sonitus accidit, qui stridor dentium appellatur.

Causa cius est imbecillitas musculi, Causa.

locum maxillæ à frigore, aut potius rigor quidam in ea accidens à frigore; vermes etiam per consensum cerebro affecto, vaporum multitudo, vt in paralyſmorum principiis.

Pronostica.

Prognostica.

1. Stridor dentium, minatur apoplexiam vel epilepsiam, Valeſcus de Taranta.

2. In febribus dentibus stridere, quibus à puero minimè est consuetum, insaniam & mortem significat. Quod si iam deliranti id accidat, admodum id exitiale est. Hippocrates *incoar.* Potest tamen delirium cum dentium stridore dupliciter coniungi. Aut enim præcessit stridor, & secutum est delirium, vel contra. Si præcessit stridor, maniam, & mortem prædicere potest Medicus; quia cerebrum simul afficitur. Si verò antecedit delirium, & sequatur stridor, non semper exitiale malum denotat, quia provenire potest à facultate imbecilla, non semper cerebro affecto.

3. Stridorem dentium etiam inter conceptionis signa refert Hippocrates, de *superſatatione*.

Curatio.

Curatio ad ipsum stridorem dirigenda non est, sed ad causas.

CAPVT XIV.

De Dentibus nigris, malè coloratis & sordidis, & sanguinis è dentibus fluxu.

Dentes sordidi

Dentes natura sua albi sunt, quæ res vt naturalem dentium constitutionem indicat, ita ad decorem & pulchritudinem hominis etiam facit.

Qui color si mutetur, quod sæpè accidit, dum dentes à naturali suocandore ad flauum, lividum, nigrum colorem deflectunt, vitium in qualitate mutata oritur, quod sæpè in dentium corruptionem, & graviora vitia degenerat.

Accidit autem ista dentium fœditas ab humoribus vitiosis in superficie illorum hærentibus, à vaporibus sursum exhalantibus, à frequenti dulcium esu, à masticatione fructuum nigrorum, vt myrtillorum, mororum, à cibis in vasis cupreis aut æneis asseruatis, ab inuentione argenti viui in luc venerea, vel ab eadem in fucis & pigmentis faciei adhibitis, vnde feminæ, quæ ad faciem pingendam fucis ex Mercurio vtuntur, plerumque dentes malè coloratos habent. Interdum tamen etiam ab humoribus vitiosis & alimento prauo dentibus sese insinuante color eorum mutatur.

Ad dentium autem sordes tollendas & colorem vitiosum emendandum, vſitatuſſima sunt Dentifricia, parata ex iis, quæ sordes abſtergere possunt; vt ossibus sepius *pumic.* præcipuè si igniatur & vino albo bis extingatur, ac tertia vice ignitus spontè refrigerari sinatur, & puluerifetur; *Cornu cerui, corail. margarit. ocul. cancri, lapid. spongiæ, alabaſt. corbl. testis combustis, radic. aristol. testis onorum, mandibul. lucij, filicibus combustis, arena abla, maſſiche, sale, gummi ſuniper, tartaro, alumine.* Quibus ad suauem anhelitum conciliandum addi potest, *Cornu mamonum, lignum alecs. Radic. reos, roſinarius, flor. lanendula xijārum, moſchus.*

Vt *℞. Alabaſt. pumic. an. ʒ. ii. ſoſ. li. ʒ. i. F. puluis. Vel ʒ℞. Off. ʒ. p. ʒ.*

3. ij. test. onor. 3. i. β. rad. ireos coral-
lior albor. an. 3. i. alum. roch. 3. β.
massib. rosar. rubr. an. 3. v. mosch.
3. i. Silic. alb. combust. vel aren. al-
biss. subtiliss. ad pondus omnium. F.
pulis. Vel 3. Mandib. lucij. c. c.
visti prap. cor. prap. an. 3. β. aluminis
visti, radic. ireos. an. 3. ii. sal. gem-
mei. 3. i. F. puluis. Vel 3. Oss. se-
pie. corall. albor. margarit. prapar. an.
3. i. c. c. vsti 3. i. β. pulu. rad. ireos.
gummi juniperi an. 3. β. aristol. rot.
3. i. lig. aloes. 3. β. mosib. 3. ii. F.
puluis. Vel 3. c. c. vsti prapar. cor.
alb. an. 3. β. margarit. prapar. 3. i.
massib. ireos. an. 3. i. mosch. 3. iv.
F. puluis.

3. Corall. albor. rubr. an. 3. ii. la-
pid. spong. oss. sepie. an. 3. i. c. c. vsti
prapar. rasur. eboris, an. 3. ii. ma-
ssib. 3. iii. gummi juniperi 3. i. β. sal.
torrefact. 3. ii. mosi. 3. β. F. puluis.
Vel 3. Pulu. crystalli 3. ii. corall.
rubr. scobise. c. albiss. & subtiliss. an.
3. i. F. puluis. Vel 3. Pulu. ossis se-
pie. lapid. silicis vsti, pumicis vsti,
an. 3. i. β. calaminar. 3. β. rad. ire-
os. 3. β. F. puluis.

Anth. Boëtius puluerem osteo-
collæ commendat. Potest & pulue-
ribus saccharum, mel, vel oximel
admisceri, & mixtura Eleotuarij in-
star parari, qua dentes fricentur.

Vel 3. Pulu. Corall. rubr. lap. cry-
stalli, an. 3. i. oss. sepie. lap. calami-
nar. myrriba. an. 3. i. alum. vsti, sa-
listosti, c. c. vsti, lap. pumicis, an. 3.
β. rad. ireos, calami odor. nuc. mosch.
an. 3. β. pavis albis soffi, 3. iii. oxy-
mel. scillis q. s. M.

Hac mixtura dentes alternatim
fricentur, postea lauentur oxycrato,
vel aq. gluminoia cum aq. comunu-
ri vel rosarum.

Alij solo melle rosato cum oleo

vel spiritu vitrioli mixto vtuntur
h. m.

3. Mellis rosati col. 3. i. spir. vi-
triol. 3. β. M.

Secreti loco nonnulli commen-
dant carbonēs & cineres stipium
rosimarini: quibus neoterici præ-
ferunt, & pro certissimo experimen-
to habent cinerem nicotianæ.

Cardanus aq. & succum limonum
ac citri commendat.

Vel 3. Summr. myrtibi, lentisci,
oleastri, saluie, rosimarini, an. M. i.
corall. rubr. eboris, dent. equorum,
an. 3. iv.

In fictili vase simul vrantur, ad-
dendo salis communis, p. j. donec
omnia dealbata sint, & reducuntur
in puluerē, cui adde: Caryophyll. cin-
namomi, rosimarini, an. 3. iij. mos-
chi 3. j. F. puluis. qui etiam excipi
potest oxymel. scillitico, vel muc-
lagine gummi tragacanthi, aut Ara-
bici, & inde styli formari.

Loco puluerum etiam styli ad dē-
tes mundandos fieri possunt.

3. Corall. rubr. prapar. pumic. prap.
an. 3. j. β. gallie mosch. 3. j. sanguin.
drac. caryophyll. cinnamomi, ma-
ssib. an. 3. j. mosch. ambr. an. 3. ii.
Cum tragacanthi in aqua Rosar. dis-
sol. F. Styli. Vel 3. Lapid. pumic.
3. β. corall. rub. alb. c. c. prapar. an.
3. β. sanguin. drac. 3. ij. gummi Ara-
bici in aqua rosar. dissoluit. & albumin.
onor. q. s. F. Styli.

In summa ne dentes malè colora-
ti euadant, & corrumpantur, den-
tes à sordibus & cibis mundandi,
verum non acumine cultri, cum
dentes inde lædantur, sed dentiscal-
pis ligneis, vel ex ossē firmo ac fle-
xilli paratis, è spiritus piscium aliquo-
rum, ossiculis, & tendinibus ossicis
gallinarum, item ligno lentisci,
myrtibi

myrthi, lauri, iuniperi, cupressi, Os verò post cibum colluatur aqua salsa imprimis, vel vino. Commendatur ad dentes mundandos & hæc aqua:

℞. Sac. hâr. lb. β. sal. ʒ. iij. alum. roch. ʒ. j. β. Destillantur per alembicum. In aqua intingatur gossipium, & eo dentes fricentur: Vel *℞. Salis ammoniaci, gemmei, an. ʒ. j. alum. ʒ. j. β. ag. ros. q. s.* Destillantur. Laudatur & sequens aqua.

℞. Sacchari lb. ij. alum. roch. lb. j. vini albi generosi, lb. j. β. Destillantur f. a.

Destillato liquore dentes sæpius fricentur & mundificentur. Chymici oleum sulphuris commendant, ut & aquam fortem cum aqua communi temperatam, cum penicillo denti oppositam. In ea nonnulli folia saluæ macerant, eisque dentes fricant, qui postea ut glabri tursus fiant, melle rosato & sanguine draconis intingendi, osque eluendum, Sic enim statim dealbantur.

De sanguinis e dentibus fluxu.

Nec prætereundum hæc loco, quod Balduinus Ronsseus, lib. de hominis primordiis & hystericiis affectionibus refert. Nos, inquit, quod supra communem hominum fidem est; Furnis municipio Flandria mulierem nouimus, cui sorte fortuna, cum elisas esset dens molaris, soliti aliqui menses suppresserentur natura nocuum illum, seculentumque sanguinem propellente, singulis mensibus ex elisi dentis vulnuscule sanguineus quidam gurgis, proportionem purgationis respondens, efflueret. Scribit etiam Hollerius, com. 2. in sect. 2. l. 2. aph. 18. Concar. prædictum, se vidisse e loculo dentis longo tempore sanguinem profluxisse, qui nullis remediis cessit, ægramque tandem sustulit.

CAPVT XV.

De Dente aureo Pueri Silesij

H Oc loco ubi de colore dentium mutato agitur, non videtur omittenda questio, de aureo dente pueri Silesij. Anno enim Christi 1593. circa F. pascatos rumor innotuit, pnerum quendam annorum septem, Christophorum Mullern, in pago *Wewilsdorf* in Silesia, cum ipsi dentes excidissent, vltimi molaris loco dentem aureum succreuisse; cuius rei historiam post anno Christi 1595. descripsit, & publicè edidit D. Iacobus Horstius, Medicinæ Professor in academia Helmstadiana, qui ipsum partim pro naturali, partim pro prodigioso habent, & solati loco Christianis à Turca tum afflictis exhibuum esse statuit. Eodem anno 1595. eiusdem auræ dentis historiam edidit Martinus Rulandus, cui sese opposuit Ioh. Ingolsteterus anno 1597. contra quem suum iudicium eodem anno defendit Martinus Rulandus. De eodem aureo dente scribit etiam Andr. Libavius, part. 2. Singular. Dissertat. 7. qui disputationes illas, in partem vtramque habitas, recenset; quas ut huc afferam, opera pretium esse, non puto. Non entis enim nullæ sunt affectiones, & dens ille aureus hullus fuit, sed focus merus, qui Vratislaviæ demum detectus fuit. Eius rei historiam ad me perseripit Dn. D. Michael Doringius, sicut illam ex Dn. Danielis Burecij Physici quondam Vratislaviensis relatione accepit, quæ talis est. Puer ille cum Vratislaviæ deductus fuisset, & omnes nouitate

Dens aureus pueri Silesij.

Sanguinis fluxus e dentibus.

istius miraculosæ (vt putabatur) cognoscendæ ac visendæ desiderio tenerentur, factum est, vt in Doctorum virorum conuentum ac concionem cui inter alios plures C. L. D. *Christophorus Rumbaumius* p. m. etiam interfuit, vocaretur. Acciti & admissi dentem sedulo contemplati sunt, qui splendore aurum Rhenanum representauit. Adfuit simul aurifaber. Is ulla frictione lapidis Lydij dentem examinauit. Linea affictione inducta existimabatur reuera esse aurum Rhenanum. Aurifaber igitur, rei veritatem penitus exploraturus, ipsi illeui pigmentum aureum, & ecce linea illa absumpta disparuit. Protinus ergo de fraude suspicio concipitur. D. verò *Rumbaumius*, vt erat, dentem non integrum sed foraminulo pertusum conspiciatur. Sparula igitur ferrea adnota numquid lamina aliqua orichalcea solum denti esset inducta explorat. Rem ita se habere certissimè inuenit, & reliquis spectatoribus ostendit. Lamina enim illa per sparulam mouebatur, nihilque erat aliud, quàm medietas (& forsitan inautata) globuli, quales crumenis & marsupijs olim à feminis in Silesia gestari solitis appendi consueverunt. Detraxisset prorsus à dente laminam istam. D. *Rumbaumius*, ni deceptor restitisset, & se cum puero subduxisset. Fraudis enim hæc detectio pessimè habuit pueri istius circumductorem, vt pote qui nummos corrodendi occasionem sibi ereptam esse videbat: atque ita cum aureo isto dente euauit ac disparuit. Quæ historia omnes Naturæ scrutatores moneo monere debet, ne causas rei, & *re diu*, prius querant, quàm

re en, sit manifestam, & de re ipsa planè constet. In qua re tamen non raro peccatur, dum de non Entis affectionibus & causis sæpe acriter & magno conatu disputatur.

CAPVT XVI.

De Gingiuarum affectionibus.

Gingiuarum etiam affectiones p. n. varix sunt, nimirum luxuries ipsarum, dum præter naturam augentur, vt deinde propemodum integant: deinde flacciditas, dum caro earum mollis euadit, & faciliè sanguinem fundit; quod vitium scorbutico familiare est: contra eorundem corrosio & abscessio: Inflammatio ad radicem dentis, quæ *impulsi*, Celso *impulsi*, (nisi mendam in textu est) abscessus *impulsi*, sequens, qui si malè curetur, caruncula innascitur, ad intimos præcipuè molares, quæ *impulsi*, dicitur, & aliquando cum adruelo buccarum muleulo coalescit. Nonnunquam abscessus in vlcera, cancerum & fistulas, degenerat; interdum & gangræna gingiuas corripit, de quibus iam dicemus.

De gingiuis excrecentibus, laxis, flaccidis, sanguinem fundentibus.

Gingiuarum caro ita sæpe luxuriat & incrementum sumit, vt dentes, præsertim molares obtegit, quod vitium *exadapata*, gingiuarum luxuries, excrecentia, & denique lupercarnatio nominatur.

Gingiuarum affectiones.

Gingiuarum excrecentes & laxæ.

Plerumque illa caro laxa foetida & flaccida & cruorem, si paulatim attingatur, de se fundit, & graueolet; id quod scorbuticis familiare est.

Atque accidit hoc vitium à sanguine seroso, vitioso, corrupto, copiosius ad gingivas confluyente; ad quam rem imprimis facit caro gingivarum sua natura laxa, quæ humores affluentes facile suscipit.

Vt enim in vulneribus, vbi caro cutem non tegitur, facile luxuriat: ita etiam gingivarum caro, quæ cute crassa non tegitur, facile luxuriat.

Si luxuries ista carnis sit lenis, & sine putredine facile reprimendum & astringentium vsu compescitur, vt collutione oris cum aqua aluminosa, cum decocto balauft. gallar. fol. pruni, cortic. mori, & asperione puluer. ex balauft. radic. bistortæ, corall. rubr. & pauco alumine,

Si verò gingivæ putridæ sint, & grauem odorem spirent, fortiora requiruntur.

Commendatur hæc peculiariter Aquilegia, & vnguentum ex Aquilegia paratum in hoc malo utile est. Imprimis verò efficax esse sequens linimentum, multo vsu compertum est.

℞. Pulv. fol. aquileg. saluæ, menth. crisp. nuc. mosch. an. ʒ. ʒ. ʒ.

Nonnulli etiam rutæ, & myrrhæ tantundem addunt, aluminis vss. ʒ. j. mellis puriss. ʒ. iv. vel q. l. Mellis nigri despumetur. Despumato & calenti pulueres inspergantur. F. linimentum, quo gingivæ inungantur. Vel ℞. mellis opt. ʒ. ij. aceti vini ʒ. i. fl. aris ʒ. j. alum. ʒ. j. Bulliant, donec rubescant, adde, pulv. saluæ, nuc. mosch. an. ʒ. ʒ. C. C.

prop. ʒ. ʒ. F. linimentum.

Præstantissimum quoque hic est decoctum suminitatum rubi Idæi: Utile est, etiam gingivas etuentes, & defluxione tentatas sapienter attingere, sale vss. Idem præstat pulvis coralij rubri crudi, vt & antheræ rosarum, nec non collutiones ex vitriolo, alumine, myrrhæ, mastiche, & aceto scillitico paratæ.

Utiles est & oris collutio cum aqua saluæ, plantag. prunell. & nasturt. aquat. ℞. Radic. tormen-tille, corr. rad. prunor. sylvestr. hyperici, saluæ acutæ, an. manipulum. j.

Incisa coq. in vini lb. ii. ad consumptionem tertiæ partis. Colaturâ os colluatur.

Efficax est & hæc aqua, & in omnibus vlceribus fordiosis gingivarum, tonsillarum, palati faucium, narium, & oræ vtilis.

℞. Mellis rosati, ʒ. ij. sulfuris vini, aluminis crudi, an. ʒ. j. alb. Grac. cimar. sabin. an. ʒ. ʒ. ʒ. spong. sambuc. ʒ. j. Fol. hyperic. rosarum, plantag. rutæ, saluæ, pulg. an. manipulum. ʒ.

Coq. in vini & aquæ lb. ij. ad consumptionem quartæ partis. Sub finem adde argemisi aris ʒ. j. stent donec sponte refrigerint, postea colentur.

In colatura penicillum lana vel gossipio inuolutum intingatur, & locus affectus tangatur, vel gossipium aut stupa loco affecto imponatur.

Actius sumit alumin. vss. i. thuris, myrrhæ, an. p. æ. quæ cum melle miscet & illunt, & postea os vino colluere iubet.

Eiusdem est quod efficaciter carnem corruptam gingivarum absumit, & putredinem sistit.

℞. Chalcitid. cruda 3. iij. cadmia 3. j.

Cadmia in aceto ad æstium Solem aliquot diebus conteritur, deinde adiecitur chalcitis, & similiter cum ea teritur affuso sæpè aceto. Postea ambobus exsiccatis, tritis, & cribratis vtere siccis, sed cum cautione, ne quid ex pharmaco in os deglutiaur.

Vd ʒ. Alumin. fessil. flor. rosar. rubr. an. 3. j. sal. fossil. 3. ij. Croci 3. ʒ. Vtere sicco aut cum melle cocto.

Mel etiam rosatum, si vnciæ vni ol. vitrioli guttæ ij. addantur, vlceribus gingivarum, & oris vtile est.

Vel ʒ. Nuc. mosch. N. j. alumin. crud. 3. ʒ. alb. Græc. suc. rat. millefol. cborisfol. an. 3. ij. mellis 3. Misc.

Vtilissimum est, si ante & post cibum os colluatur aqua è qua sal excoquitur.

De fluxu sanguinis è gingivis.

Interdum non solum laxæ fiunt gingiæ, sed etiam sanguis ex iis fluit. De quo Hippocrates, in *Coacis lib. 2. comm. 1. sect. 2. apbor. 14. sec. distinet.*

Hollerij. Tà àn ʒan aʒualia iai aniaij vʒp i kãpia. Sanguis de gingivis, ab alno liquida letbale. Significat enim virtutis debilitatem in hepate & venoso genere & in ipso sanguine vitium, vbi scilicetis est acris & ʒxpõit: qualis in scorbuticis colligitur. Si ergo is per gingiæ effluit, & alius symptomatice solvatur, malum signum est.

Cui malo si curatio adhibenda sit, medicamenta, quæ ad gingiæ laxas conveniunt, viurpanda. Interdum tamen eiusmodi fluxus criticus est, & non itaum sistendus. Itaque Do-

donzum, *obs. 14.* Latoro ethymatis laboranti sanguis è gingivis erupit, quo represso ad vrinariæ meatus delatus, ac cruenta vrina subsecuta est, quæ cum reprimentibus talis esse desiisset, iterum ad gingiæ se contulit, nec fluxus cessavit, donec æger sanitati restitutus est.

Ita refert Amatus Lusitanus, *cent. 5. curat. 5.* quibusdam hominibus sanguinem è gingivis effluxisse, qui, si fluxus non solito responderet modo in capitis dolorem inciderint, vt eum revocare necesse habuerint. Et Iulius Alexandrinus, in *annot. ad cap. 11. lib. 2. method. med. Galeni*, scribit, socru suæ per intervalla quædam sanguinem è gingivæ fluxisse, quasi venula aliqua inibi ex anæstosia aperta.

De Gingivis carne denudatis, seu carnis gingivarum consumptione.

Vt gingivarum caro aliquando luxuriat ita contra nonnunquam imminuitur & absumitur, vt dentes nudi conspiciantur & laxentur, ac vacillant: quod accidit ex humore pravo & acri ad gingiæ confluente, easque erodente.

Danda igitur opera est, vt caro regeneretur.

Ergo *℞. Thuris, massib. sarcocol. sanguin. dracon. an. 3. j. F. Pulvis*, qui gingivis aspergatur. Aui-cennas tumit, *thuris, massib. aristolochiasæ und. sang. dracon. farin. orob. rad. ireos, an. 3. j.* Pulverisata cum melle & aceto scilicet. subigit, & eo gingiæ fricat.

Possunt tali etiam linimento iungi.

℞. syr. myribini, mellis ros. col. ana 3. ʒ. ʒ. diamori, diannæ. an. 3. 2. puln. mandibul. lucy. pisc. rad. bistort. nuc. moschat. an. ʒ. j. Misc. Vel ʒ. Mel.

Gingiæ carne denudatæ.

Fluxus sanguinis è gingivis.

res. col. 3. j. pulu. mastib. mirb. thuris,
nuc. mosch. an. 3. j. Misc. Vel 2℥.
rad. Cypess 3. ij. arist. rotund. sarco-
coll. an. 3. j. rad. ircos. terre sigilla-
ta, rasura C. C. an. 3. 6. myribi, flor.
rosar. rubrar. an. P. j. santal. albor.
rubr. an. 3. j. 6. alumin. vssi. balauft.
an. 3. ij. F. Puluis, de quo aliquid
in qua sol. quercus bulliant, & deco-
cto os colluatur.

2℥. Cancros viuos N. vj. Radic.
lappa maioris 3. j. Contundantur in
mortario ad pulvis consistentiam.
Diluantur cum aq. flor. cyam 3. xvj.
Exprimantur per pannum linteum,
lauentur eo dentes & gingiæ.

De Gingivarum inflammatione, seu pa-
rulis, epulide, ulcere,
cancro, fistula.

Præterea etiam gingiæ quando-
que inflammatione cum dolore cor-
ripiuntur, apostema patiuntur, quæ
in vlcera interdum cancrum, fistu-
las, gangrænam desinunt. Inflam-
matione, quæ Græcis *ερυσίλη* dici-
tur, gingiæ corripuntur à sanguine
tenui, siue puro, siue cum aliis hu-
moribus mixto, quidè capitis vasis in
eisdem defluit. Familiaria etiam sunt
vlcera gingivarum scorbuticis, de
quibus in tractatu de scorbutico di-
ctum.

Signa diagnostica.

Malum ipsum per se visui patet.
Et quidem, si materia sit calidior
& acrior, gingiæ magis rubent &
calent, doloreque & punctio vehe-
mentiùs affligit. Si verò sanguis sit
frigidior, rubor, calor & dolor est
remissior.

Prognostica.

Prognos-
tica

1. Inflammationes hæ, nisi sta-
tim reprimantur, in apostemata
abunt, quæ nunc citius, nunc rar-
ius rempuntur pro tumore ma-

gnitudine & humoris natura.

2. Non contemniendum est hoc
malum, cum nisi maturis præsti-
diis ipsi succurratur, in apostema
& vlcera diuturna nonnunquam &
in fistulam abeat. Sæpe & in can-
crum incurabilem, vbi materia me-
lancholica sicca, & adusta fue-
rit, quandoque & in gangrænam
abit.

3. Si gingivarum inflammatio in
gangrænam mutetur, insanabile ple-
rumque malum est, vt aliquot
exemplis demonstrat Guillelmus
Fabricius, cent. 1. obs. 30.

4. Ætate in aurium inflama-
tionibus quinto die eruptiones sunt:
est etiam vbi longius perdurant: sic
& quæ circa gingiuas & nares sup-
purationes contingunt. Hippocra-
tes. 6. epid. sect. 6. r. 24.

Curatio.

Vniuersalia quod attinet, eadem Curatio:
methodo curanda hæc inflammatio,
quæ aliæ inflammationes. Vena ni-
mirum aperiatur in brachio. Ita Me-
lisandro apud Hippocratem, 7. epid.
sect. vltima, cum magno gingiæ
dolore corripere, & valde in-
tumesceret, vena in brachio secta
est. Potest & postea vena sub lin-
gua aperiri; & cucurbitulæ collo
admoeri. Nec Topica multum
discrepant; nisi quod gingiæ, cum
carne sint præditæ molli ac rari,
fortia medicamenta non tolerant.
Ideoque dum nondum putrescunt
nec corrosæ sunt, conueniunt me-
dicamenta, quæ asperitatis & mor-
daciditatis sunt expertia. Nam acria
insigniter nocent, & proinde in
gingiæ dolore ab aceto abstinend-
um. Et primum quidem phleg-
mones generatio impedienda est.

& reprimenda institutis oris collutionibus & gargatimsis ex decocto fol. quercus, nucum cupressi, balauftior. ros. rubr. aqua plantaginis, prunellæ, saniculæ, portulacæ, veronicæ, fragor. fol. quercus, cum succo vel rohub mororum in eis dissoluto, vel rohub nucum, ribes, berbertum fragorum, syrupo granato cum violarum, rosarum siccatum, myrrino, oxylaccaro simpl. melle tofato. B. g.

℞. Aq. plantag. prunella, an. 3. iiij. rosar. rubr. 3. j. b. diamori 3. vj. mellis rosati col. 3. iiij. salis nitri præp. 3. b. Misce. Vel ʒ. Aq. semperuini, plantag. centimod. min. an. 3. ij. b. mellis rosati 3. i. nitri præp. 3. b. M. Vel parietur tale decoctum.

℞. Herb. prunell. plantag. an. m. j. fol. ros. rubr. P. iiij. balauftior. 3. b. rad. glycyrrh. 3. j. cerasor. exsiccat. 3. ii. Concila & contusa coq. in aq. hord. simpl. pro 3. ix. In quibus dissolue rohub. fragor. 3. vj. syr. violac. 3. iiij. nitri. præp. 3. j. b. M.

Galenus, 5. de comp. med. sec. loc. c. 9. scribit gingiuis ex inflammatione dolentibus optimum remedium esse ol. lentiscin. temperatè calefactum in ore retentum, idque recens. Nam oleum quò vetustius, eò calidius. Habet illud oleum vim moderatè reprimendi & discutiendi. Aëtius prisciana gingiuis colluere iubet. In causa frigida aliquod de retoluentibus calidis admisceatur, vt de alum. vsto vel sale. Aut decoctum fiat ex sem. lini, fol. agrimon. cum exiguo alumine, pro collutione oris. Vel parietur tale decoctum.

℞. Hord. saccri m. i. fl. maly. arbor. P. iiij. rosar. rubr. P. ij. rad. gly-

cirrh. 3. iiij. uinbar. N. vij. caricar. ping. N. iii. Coq. in s. q. aq. fluuiatilis ad tertias. Colentur, colatura ʒ. ʒ. viii. In quibus dissolue oxymel. simpl. mell. rosati colat. an. 3. i. diamori 3. b. sap. prunella 3. i. M. pro gargarismo. Alumen etiam vstum & tritum parotidas comprimit, teste Aëtio.

Si apostema ad maturationem tendat, gingiuarum butyro inungantur, Deinde apostema aperiatur decocto caricarum lini, fenugraci, & similia. Vel carice per medium discissæ imponantur. Si abscessus sponte non aperiatur, scalpello aperiri potest. Apertus abscessus hydromelite collutionis & gargarismi instar adhibito, mundetur. Tandem vlcus exsicceetur & claudatur.

Interdum verò apostema in vlcus definit, & quidem nunc vlcus simplex est sine corrosione & putrefactione, nunc verò corrodendo serpente incipit, vt non tantum & vnde gingiuarum fiat: quod accidit cum humores falsi, actes aut praua affluunt. Curantes autem talia vlcera, si sint simplicia, exsiccantibus & adstringentibus medicamentis, collutione scilicet oris cum decocto agrimonix, rosar. balauftiorum, cupul. gland. aceto scilicet alum. myrrh. Vt.

℞. Agrimon. m. i. balauft. rosar. rad. aristoloch. rotund. an. 3. ii. Coquantur in vino Colat.

℞. lb. a. acer. scillur. 3. ii. M. Vel ʒ. Rad. aristoloch. rotund. balauft. ros. rubr. an. 3. b. myrrh. alumina. an. 3. ii. cinam. spec. an. 3. i. F. Puluis, qui diuidatur in duas partes: vna cum melle redigatur in formam liniamenti, quo dentes inungantur, pulvis verò aspergatur vel asfricetur.

Si vlcus in fistulam transeat, fortioribus vtendum, vt: *℞. Gallar.*

De Gingivarum inflammatione.

57.

cupul. gland. flor. rosar. balauft. cortic. granator. an. ʒ. j. Coqu. In vino pro collutione oris. Iplis vero gingivis hic pulvis inspergatur.

℞. Gallar. sumach. gran. myrib. cupul. glandum. sem. plantag. ana g. j. vitrioli albi, alumin. scissil. an. ʒ. iv. anther. rosar. ʒ. ij. F. Pulvis. Vel ℞. Mastich. gummi ruperi, acacia: hypocistid. an. ʒ. ʒ. turia prepar. ʒ. ʒ. vitrioli albi ʒ. ij. F. Pulvis.

Utilissima vero & efficacissima est hic aqua viridis, supra de gingivarum excrescentia & laxitate propofita.

Si in cancrum degeneret vlcus, Gordonius hoc vitur.

℞. Rad. bellebor. aristoloch. long. Tartari, aluminis viti, gallar. balauft. p. a. & cum succo sol. olivæ. vel agrimon. & melle. F. vnguentum, quo gingivæ cariosæ illinantur.

Epulit.

Si vero post inflammationem gingivarum carnis excrescentia quædam emergat, iuxta dentes molares, quam Epulida vocant, quod accidit aliquando cum febre & vehementi dolore internæ mandibulæ, vitur Aëtius medicamentis, quæ inflammationem solvunt, atque os colluere hydromelite, pitiana, decoct. semin. lini: iubet, totam item mandibulam contegere cataplasmate, ex hydromelite & semin. lini. Postea ad ipsam carunculam siccantia medicamenta admovet, quale est pulvis alumin. viti aspersus, aut, Recipe. Sulphur. vius, piper. alumin. scissil. p. z. Efficax hic est & vitriolum. Vel ℞. Pulv. gallar. ʒ. j. ʒ. alumin. ʒ. j. F. Pulvis.

Vbi vero tardius consumitur, e-

xedens apponit, quale est ærugo per se, vel cum æquali parte gallarum. Ager autem in æruginis usu monendus, ne salivam deglutiat. Exeditur etiam interdum aqua forti, aqua regis, & oleo vitrioli.

Utilis est hic aqua viridis, cuius antea facta mentio. Si nec his tollitur epulis, forcipe correptam ferro excindit, & vlcus, ut par est curat. Debêtque os post sectionem illam cum decocto myrrhæ & paulo sale collui.

CAPVT. XVII.

De maxillarum morbis, & Symptomatibus.

Fungi maxillarum.

M Axillæ etiam suos morbos Maxilla-
patiuntur. Inter eos autem rum fungus
primò sunt fungi dicti, qui etiam si
interdum è cerebro nascuntur, ut
suprà, lib. i. part. i. cap. 25. dictum
est, læsa proculdubio aliqua fibra
nervea, aut membrana. Ita momini,
cuidam puero dentem ore extractum,
& proculdubio nervum
vel membranam nerveam substratam
læsam esse, è qua fungus pos-
tea enatus est, qui penè totum os
replevit, & puero etiam mortem
attulit.

Syderatio maxillarum.

Syderantur etiam nonnunquam Maxilla-
maxillæ post dentium dolorem. Ita
ʒ. Epidem. Merodoti puero ex denti-
tis dolore syderatio & supercres-
cens in gingivis caro, ac moderata
suppuratio contigit, & tum molares,
tum maxilla ipsa decide-
runt.

Maxilla-
rum syde-
ratio.

*Maxilla cum Capite connexio.*Maxilla
cum ca-
pite con-
nexio.

Maxilla inferior pars capiti per articulationem coniungitur, ut liberè moveri possit. Contrarium tamen exemplum, ubi maxilla inferior capiti planè connata & contuncta fuit, suprà è Columbo, *anatomiæ lib. 15. retulinus.*

*De maxilla inferioris iunctura soluta.*Maxillæ
inferioris
iunctura
soluta.

Aliis plerisque animalibus maxilla inferior ex ossibus duobus per symphysia iunctis constat, & in homine, etiam in infantibus bifida est, & cartilagine copiosa in medio mento iungitur: in adultis tamen ita coalescit, ut ne cōstione quidem separari queat. Violentia tamen magna interdum hæc coniunctura solui, & ossa hæc separari possunt.

Prognos-
tica.

Malum periculosum est, si in partem posteriorem os recedat. De qua Hippocrates, *in coactis. In quatuor distentionibus & in iis, quæ in posteriori partem sunt, dissoluta maxilla mortem afferunt.*

Curatio.

Quapropter curationem etiam tradit Hippocrates, *in lib. de articulis com. 2. t. 33. Sic compago, inquit, maxilla ad mentum dissidat, repone-re os cuiuslibet luminis est. Quod enim eminet, ad motus digitis ab extre-mis parte introsum propellendum: quod intra inclinatur, iniectis digitis repellendum extrosum est. Id autem distentione prius adhibita sic ut ossa distent, faciendum. Reposita maxilla postea, ut ibidem docet, deliganda est.*

*De maxillarum luxatione.*Maxilla-
rum luxa-
tio.

Luxationem etiam patitur maxilla inferior. Quod quidem non facile accidit, cum ob articulationis naturam, quæ undique ossibus, circumvallata est, tum ob muscu-

lorum robur, quos plures & validos obtinet. Si tamen luxetur, tantum in priorem partem propellitur & luxatur, ut Galenus, *comm. 2. in lib. de articulis.* & Celsus, *lib. 8. cap. 12.* docent, & ex anatome patet. Ad posteriora enim luxationem os impedit; ad dexteram sinistram maxillæ caput; ad sinistram dextram caput. Et quidem luxatur vel altera tantum parte, vel utraque. Ut autem luxetur maxilla, necesse est, ut processus rostri similis, acutus etiam dictus, qui sub iugali osse inseritur, ipso osse iugale humilior fiat, & extra os iugale feratur. Fit hoc non nisi maxime oris apertione, ut in nimia oris oscitanda dilatatione, vel si aliquid magnæ molis ore apprehendatur.

Signa diagnostica.

Signa.

Si maxilla luxata sit, os claudere nequit, masticatio tollitur. locutio depranatur, salivæ ore ægro inuito profluit. Et quidem si maxilla ex parte utraque sit luxata, os magis hiat, nec lingua ad loquendum liberè moveri potest, unde fit balbuties, & maxilla inferior cum superiore non potest committi, sed maxilla inferior tota magis prominet, et si ordo dentium inferiorum & superiorum respondeat, & canini sint sub caninis, molares sub molaribus. Processus etiam ossis rostri referentis extra masas utrinque eminentes apparet, & temporales musculi rigidi ac duri sunt. Si verò ex vna parte tantum luxatio facta sit, à parte illà in anteriorem maxilla magis prominet, & in aduersum ipsa & mentum inclinatur, & os distortetur, nec ordo dentium inferiorum & superiorum sibi respondet, sed incisoris sunt canini.

Prognostica.

Prognosticæ.

Prognosticæ.

1. Periculosa vacat maxillæ luxatio, & propterea quamprimum reponenda est, protique musculi affecti cerebrum in consensum trahat propter nervorum ramos, qui à secundo & quinto cerebri pari orti in musculos maxillam mouentes inferuntur.

2. Si maxilla luxata suo loco non restituatur, periculum mortis imminet, & quidem plerumque circa diem 10. & febris continua excitatur, & dormiendi inexpugnabilis necessitas, & bilis sincera per aluum & vomitum reicitur.

3. Si ex vtraque parte maxillæ luxata sit, difficilius restituitur, quàm si ex vna tantum; & propterea luxatio ex vtraque parte periculosior est, & omnia symptomata sunt vehementiora. Nam omnes quatuor musculi maxillam sursum trahentes, afficiuntur, & cum iis nervi inserti, unde dolor exoritur, & ex dolore inflammatio & febris acuta, & per consensum nervorum etiam os ventriculi afficitur.

4. Si post maxillæ restitutionem duodecim dies elapsi sint, periculum relapsus non ita facile amplius metuentum.

Cura.

Cura.

Danda ergo opera, ut quamprimum maxilla restituatur, antequam dolor & inflammatio accedat. Si vero iam spatium aliquod temporis à facta luxatione elapsum sit, utendum prius medicamentis emollientibus & laxantibus, antequam restitutio tentetur.

Videndum verò primò, an ex vna, an vero ex parte vtraque facta sit luxatio. Si ab vna saltem parte, æger vel in sedili collocetur, vel resu-

pinetur in pulvinari, & caput eius immobile à sinistro teneatur. Postea Chirurgus pollices lineis vel linteis vel fascijs subtilibus inuolutas iucius os immitat, & molaribus dentibus imponat, reliquâ manu extra maxillam ad mensum apprehendat, eamque deorsum trahat, deinde retrò versus guttur compellat, postea ad oppositum latus agitet, & simul rursus impellat, ægròque impetret, ut os claudat, atque hæc omnia vno ferè momento fieri debent, ut Celsus inquit.

Si verò ex parte vtraque sit luxata maxilla, eodem modo restituenda est, præterquam quod ad latera non est agitata maxilla, ideoque primò maxilla deorsum trahenda ob musculos, qui processum acutum rostro similem trahunt, qui infra ossis iuguli processum trahi debet. Secundo retrò æqualiter propellenda, quia luxatio in partem anteriorem facta. Tertio sursum & in locum suum compellenda. Maxilla in suum locum restituta, danda opéra, ut in eo retineatur, & non iterum excidat. Itaque medicamenta ex oui albaninibus, & pulueribus astringentibus apponi debent, ac si dolor adsit, musculi oleo rosaceo inungendi. Fascia quoque merito apponatur. Hinc ad aures adducatur, & tandem in capitis vertice colligatur, ut maxilla restituta in suo loco retineatur. Videatur Hippocrates, 2. de artic. & Galenus in eum commentar.

De Maxillæ fractura.

Tandem Maxillæ aliquando fractæ potest idæ, casu duodecim & sinistibus casibus. Aliquando etiam in dentium extractione pars aselli potest, quod malum per se facile patet.

Consolidantur autem ossa maxillæ facili, & quidem 21. diebus, & celeriter callus inerescit: cum sint medullosa, & laxa: quod si non rectè reponantur, dentes vitiantur, atque iniuciles redduntur.

Si verò quid de maxilla avulsam sit, id restitui non potest. Quomodo autem maxilla fracta componenda sit, docet Hippocrat. 2. de artic. qui ibi videatur.

De Maxilla inferioris immobilitate.

Maxillæ
inferioris
immobili-
tas.

Symptoma etiam quoddam occurrit circa maxillam inferiorem. Cum enim facta sit mobilis propter sermōnem & masticationem: cum illa mobilitas tollitur, præter naturam sese habet. Fit autem hoc in tumoribus circa articulum, cum destillationes in articulum circa auriculæ radicem fiunt, & ibi tumores atque inflammationes accidunt. Idem accidit in fracturis, luxatione, maxillæ cum capite coalitu. Pertinet huc & rigiditas illa genarum scorbutica, cuius, in tract. de Scorbutico, cap. 5. facta est mentio. Non absimilis videtur illa maxillarum rigiditas, cuius meminit Hippocrates, 5. epid. cap. 23. in cod. Fæsis, in Eumelo Larissæo, cui crura, manus, maxillæ rigebant.

Signa & Curatio patent è morbis, à quibus immobilitas ista pendet.

DE ORIS VITIIS. CAPVT XVIII.

De Oris inflammationibus, & ulceribus.

S Equuntur iam oris vitia. E morbis sunt, Oris inflammatio & vl-

cera. E symptomatibus; Oris fætor, de quibus ordine dicendum.

Et primò quidem oris Inflammationem quod atinet, nonnunquam ex sanguine & calidis ac biliosis humoribus partes oris internæ, Palatum scilicet & fances inflammantur. Interdum inflammationem excitanti sanguini etiam humores maligni coniunguntur, vt in Thalo accidit, apud Hippocrat. 1. epid. sect. 1. *fla- tu* 1. Inflammationi etiam causam præbent inunctiones ex hydrargyro, è quibus sæpè inflammatio, gangrena & sphacelus excitatur, vt aliquot exemplis docet Guil. Fabric. cent. 2. *obseru.* 92.

Malum per se visui patet. Humoris etiam eam excitandis natura è suis signis cognoscitur.

Est autem inflammatio nunc periculiosior, nunc minùs periculosa, pro humoris peccantis natura. Etenim inflammationes oris, quæ ex solo fiunt sanguine, vna miores; difficiliore, quæ ex sanguine cum bile misto generantur. Perniciosiores etiam sunt oris inflammationes, quæ cum febre fiunt, quàm quæ sine ea sunt.

Curatio.

Vt in alijs inflammationibus; ita etiam hic, si non in vniuerso corpore abundet sanguis, vena primùm aperienda; si alij vitiosi humores, purgatione vtendum. Hinc ad Topica veniendum.

Quod si neutrum horum affuerit, statim ad Topica accedendum. Requiritur autem in principio quæ refrigerant, & repellunt atque alstringunt, in incremento & statu post aliquid discutientium addendum.

Colluendum ergo os sero lactis,

in quo flores rosarum, summitates rubi vel vitis cocta sint: aut decocto plantaginis, prunellæ vel aquis inde destillatis, quibus diamorum, dianthum, syrupus violarum, & similia addenda. Ad discutendum flores chamæmeli addi possunt.

Si tumor dilecti non possit, sed suppuratio expectanda sit, adiuuanda ea & maturanda. Cui rei seruiunt caricæ appositæ. Vel coq. furfur in aqua, dum lentescat (commodum est etiam ficus addere) Colaturæ mel adde.

Eligenda autem semper sunt talia medicamenta, quæ neque sapore ingrata sunt, neque aliquam prauam aut venenatam qualitatem obtinent, quæ medicamenta Græci *σαυανδρῶν*, appellauerunt, & apud Galien. 6. de comp. med. sec. loca. describuntur.

Reliqua exiis, quæ iam de oris vlceribus dicentur, patebunt.

De Aphthæ, & Oris vlceribus.

Aphthæ, equidem dicuntur in specie superficiana oris vlcera quæ infantibus præcipuè accidunt. Interdum tamen etiam latius hoc nomen ab authoribus extēditur, & aliarum etiam partium vlceribus tribuitur. Ita Hippocrates, 1. de natura mulieb. & de morb. mulier. *ἀφθὰ τοῦ στόματος*, scribit, & de Cracis prænot. *ἀφθὰ τοῦ στόματος*, in officio vteri nominat. Et 2. de morbis, fistulam pulmonis aphthæ, id est, vlcere feruido laborare dicit: & Galenus, 9. de comp. med. sec. loca. *ἀφθὰ τοῦ στόματος*, nominat. Verum vt dixi, propriè aphthæ sunt exulcerationes quædam in summa oris superficie, igneæ quippiam caliditatis habentes, vt definit Galenus, 6. de comp. medic. sec. loc. 1. 4. Hærent enim in summa cute, & serpant in

palatū, gingiuas, linguæ latera, eiusque radicem. Interdum profundius sese demittunt, & palatum carnemque linguæ exedunt, cuiusmodi Gallicæ oris pustulæ esse solent, præsertim ab iunctione cum argento viuo. Galenus tamen, quæ putrescunt & exulcerantur, aphthas non amplius nominandas censet, sed erosiones potius, & oris vlcera, quæ & remedia planè peculiararia postulant. Itaque etiam de oris vlceribus postea seorsim agemus. Ita Auicennas Alcolas vocat, quæ oris vlcera esse dicit cum expansione & dilata-tione, seu vt vulgus appellat, vlcera oris ambulantiæ. Mitius verò malum eidem est Bothor in ore, quæ pustulæ sunt non serpentes, sed tales, quæ faciliè suppurantur & delentur, etsi nonnunquam leuiter eas suppurare contingat. Estque Bothor generalis appellatio etiam pustularum faciei, pulmonis & aliarum partium, & variolæ ac morbilli etiam Bothor ab Arabibus nominantur.

Affectio ipsa, cum exulceratio quædam oris sit, ad solutam vnitatem pertinet cum intemperie. Pars affecta est os interna & summa sui superficie, ita vt malum etiam gingiuas, linguam & nonnunquam gurgulionem comprehendat.

Cause.

Gignuntur aphthæ interdum primario in ore, dum ibi prauis humores collecti sunt, quos natura foras expellit; plerumque verò secundi-riò per consensum siue totius, siue alicuius partis. Totius, vt in febribus acutis, & præcipuè malignis, vbi acres & feruentes halitus, per fauces, venas, arterias, & oculos corporis meatus ad os eluantur. Vnde etiam febribus malignis malum

hoc familiare est, atque in iis vlceribus hæc potissimum fauces occupant & sæpè tam sæua sunt, vt deperiscentia fiant, simulque cum faucibus etiam asperam arteriam & gulam attingant. Partis, vt quando vel à capite acres: feruidi & erodentes humores in os defluunt, præsertim biliosi, pituitosi & salii; Vel à ventriculo, vt postea de infantibus dicetur, pulmone, hepate, liene, vtero, eiusmodi halitus sursum mittuntur, à quibus primò pustulæ in ore excitantur, quæ sæpè postea in vlcera desinunt, pro corruptionis & materię in hac diuersitate. Cum enim summæ oris partes carne constant molli & tenera, quam cuticula tenuis inuestit, facili ab occurssu acrimiarum lædi possunt.

Non solum verò ab internis hæc causis aphthæ oris existunt, sed etiam ab externis, vt ab acredine eorum, quæ comeduntur aut bibuntur, aut alio modo assumuntur. Ita in lactantibus infantibus aphtharum causa est aut lac nutricis nimis serosum, acris sua absterfione summas, easque molles admodum in ætate illa partes exulcerans, teste Galeno, 3. *aph.* 24. aut, vt in 6. *de compos. med. sec. loc.* addit, lactans ipse, si lac haustum non probè concoquat, vnde euaporatio acris vel putrida sursum è ventriculo attollitur: nam lac in ventriculis intemperatis faciliè corrumpitur, vt biliosum, acidum, vel aliter deprauatum euadat.

In vtriusque, in adultis scilicet & infantibus adiuuant hanc malam affectionem constitutio aëris calida & humida, pluuiosa, humores putridos gignens, ita vt Epidemium nonnunquam hoc malum fiat. Hinc

etiam in regionibus calidioribus, vt in Syria & Ægypto frequentiora sunt ista vlcera, inde etiam Ægyptiaca & Syriaca antiquitus appellata, teste Aræto. Gibi in ventriculo corrupti, elus fungorum & aliorum, quæ faciliè corrumpuntur, ac malignitatem acquirunt.

Differētia.

Quædam differentias aphtharum, Dissertat ex Galeno, 6. *de compos. sec. loca* centia. *cap. vlt.* & ex 3. *Epidem. comment.* 3. *aph.* 12. sic discerni possunt.

1. Tempore Aphthæ enim alix incipientes sunt, alix vigentes, alix inueteratæ, atque ita quædam leuijores, quædam deteriores.

2. Corporibus subiectis. Nam alia mollia infanti & puerorum corpora occupant, alia duriora adultorum.

3. Materiam, cuiusque prauitate, Quædam enim inflammata sunt, exque calidæ & rubicundiores ex sanguine; quædam igneæ, & flauiores ex bile; quædam non inflammata, minulque feruidæ, ex pituita putrescente; quædam denique ex inueteratis atræ bilis malignitatem exurentem acquirunt. Vnde constat, aphthas ratione materię alix mitiores esse, alias, vt Galenus, 3. *Epidem.* nominat, *maiores*, quæ ex putridis & malignis humoribus ortum habent.

4. A parte affecta, quæ sumitur distinctio, est quod Aphthæ vel in palato hærent, vel in lingua, vel in gingiuis, vel in labiis, vel in faucibus & gurgulione. Quas partes vel superficie tenus vlcérant, vel profundius erodunt, latè serpendo pro malignitatis gradibus.

Postremo ratione accidentium & symptomatum, quædam, cum vehementi dolore sunt coniuncta, quæ-

dam absque eo sunt; alia cum febre sunt; alia febre carent: Alia sunt munda, alia sordida; alia sine crusta, alia cum crusta, & crusta aliquando alba, aliquando flava, aliquando liuida, aliquando nigra.

Signa Diagnostica.

Signa.

Aphthæ faciliè cognoscuntur. Partes enim oris calidiores deprehenduntur, & hinc inde vlcuscula seu tubercula quædam conspiciuntur. Et pustulæ rubicundiores sanguinem prævalere ostendunt; flauiores, atram bilem, albescentes, pituitam; liucentes & nigrescentes, atræ bilis succum: quæ serpunt & vicina depascuntur, iis acridinem insillè significatur, & quidem malignitatis non expertem, si ad nigredinem tendant; si forteant, putredo adest. Causa externæ, ut eorum, quæ edantur & bibuntur acrimonia, atque alia ex ægri & astantium relatione cognoscuntur.

Prognostica.

Prognostica.

1. Aphthæ recentes, præsertim in mollioribus infantium corporibus faciliè curantur moderatè adstringentibus; quoniam ex mitiore materia oriuntur: ægrè sanantur, quæ diuturnæ sunt, & progressu temporis putredinosum quid acquirunt, quæ generis vocabula *supra*, à Græcis dicuntur. Galen. 6. de *compof. med. fec. loca cap. 4.*

2. Aphthæ antiquæ & exulceratæ longè periculossimæ sunt in infantibus. Hos enim consumunt. In adultis verò idem periculum non est. Pueris enim, præsertim lactantibus, imperari remedium aliquod (ad gargarisandum imprimis) nequit, quemadmodum adultioribus. Celsus, lib. 6. cap. 11. Loquitur igitur, Celsus de Aphthis infantum

non recentibus & mitioribus, sed de inueteratis & malignis, quæ à gingiuis incipiunt, & deinde serpendo palatum totumque os occupant, & ad gurgylonem faucisque descendunt. Hæ cum validiora remedia postulent, quæ mollia puerorum corpora non ferunt, iisque uti ipsi per facultatis animalis in illa ætate imbecillitatem nequeant, malum ob has causas ita inualefcere necesse est, ut ægri infantes tandem ab eo consumantur.

3. Aphthæ ex pituita minùs infestant, quàm ex sanguine aut bile; quæ verò ex bile atra ortum habent, ut malignitatis, ita nec periculi sunt expertes.

4. Aphthæ, præsertim inueteratæ, ideo quoque difficulter curantur: quoniam medicamenta vel ritè applicata, tamen à salua faciliè eluuntur, præterea malum breui inualefcit ob loci naturam calidam, & humidam unde putredo sequitur & vlcus *is idem*. Pars quoque cum valde sensilis sit, faciliè ab acribus medicamentis, quibus tamen uti interdum cogimur, irritatur. Ac denique metus est, ne quid cum periculo de medicamentis actionibus in fauces delabatur. Galenus, 6. de *compof. med. fec. loca.*

5. Quæ Aphthæ in pueris nigrae sunt, & veluti crustæ, pessimæ & mox lethales sunt. Paulus, lib. 1. cap. 10.

6. Quando Aphthæ adhibitis conuenientibus remediis non cedunt, sed putrescunt, & corrodendo profundè descendunt, malignæ sunt, & fortioribus medicamentis opus habent. Si autem mala symptomata alia coniungantur, & æger debilis, mortem nunciant.

7. Quando pustule nigrae per febres acutas & pestilentes in ore & lingua apparent, mortem brevis securam lignificant; teste Auicenna, ob materiae malignitatem, & virtutis infirmitatem. Et Hippocrates inquit, 3. prognost. aph. 15. Faeces exulceratae cum febre difficiles sunt, quia ut Galenus explicat, malitiam erodentis humoris indicat.

Indicationes.

Indica-
tiones.

Aphthae ipsae, quatenus vlcuscula sunt, in principio adstringentia & repellentia requirunt. In progressu morbi addantur ea, quae adstringunt, & simul discutunt. Si ad suppurationem tendant, maturantibus illa adiuvanda.

Sordidae Aphthae, extergendae, & si putrescere, vel etiam serpere incipiunt, fortius adstringentia, & quae escharotica sunt, adhibenda. Et quia in ore sapores percipiuntur, ingrata sapore medicamenta, quantum fieri potest, vitanda sunt. Deinde qui os ventriculo & pulmonibus cohaeret, vitendum iis, quae sine periculo (si forte ita contingat) deglutiantur non cathartecis aut septicis; aut si his uti necesse est: provideatur ne per gulam ab aegro demittantur. In corporibus etiam, quae duriora & sicciora sunt, medicamenta valentiora conveniunt, molliora vero mollioribus, ut puerorum, & foeminarum corporibus.

Curatio.

IN INFANTIBVS.

Curatio. Si Aphthae sint ex vitioso nutrice lacte id, corrigatur iis, quae acrimoniam vel salsedinem eius tollunt, bonumque sanguinem generant. Si infans lac male concoquat, parcius lactetur, & bona in ipso concoctio procuretur. Quando

vero infans simul lacte nutritur & alio cibo utitur, Galenus, 6. de comp. med. fec. loc. Cap. ult. nutrice lentius praebet cum modico pane & medulla cerui aut vituli, quae nutritrix mansa, vel semimansa infanti exhibeat, ut ore ab ipso circumuoluta custodia contingant.

Aliis quoque cibis à nutrice infanti malticatis, admisceat cydonia, pyra, sorba, mespila, corna. Quandoque & lactuca, portulaca, solani aliquid addit, si aphthae inflammatae serueant.

Quod si infans mandere nondum possit, nutrice eiusmodi victa alit, eique simul de bona concoctione prospicit. Ipsi vero infanti linctus exhibetur ex diamoro pane mellis rosato, aut si opus videatur, cum oxymelite. Aetius ex Asclepiade gallas contusas aqua decoquit, & cum decocto percolato parem portionem mellis permiscet, rursusque decoquit, ad mellis crassioris spissitudinem, idque ut maximum remedium aphthis puerorum illinit affricando, aut tormento lanae purpureae digito circumuoluto aphthis apprimendo.

Imprimis autem in medicatione considerandus est color aphtharum, ut stomachica haec dicta medicamenta pro varietate humoris, à quo aphthae generantur, recte administrari queant. Nam si subrubeant, primo moderate astringentibus, deinde citra morsum discutientibus vitandum est. Qualia sunt syrupus de rosis siccis, de portulaca, de agresta, de succo granatorum, acerosi citri, diamorum, pulvis ex farina lentium, sumach, rosas. Collutiones ex decocto lentis, violae rubi, vitis, rosae, plantaginis, balaustis, santali.

sumach, acacir, admisto diamoro,
rob ribes, rob nucum, suc. maior.
punic. vel vuz acerb. cum melle.

Si substantiæ fuerint, iisdem uten-
dum, & magis etiam refrigeranti-
bus, ut succo vel decocto solani,
portulacæ, acetosæ, semperuiui.

Pituitosis astringentia cum quadam caliditate & discutientia conveniunt, ut thus, nianna, thuris, mastich. mentha, nux. cupressi, erui. farina, rad. irid. Illyr. rad. aristol. quæ plura simul, vel pauciora cum decocto fol. myrthi, misceantur, usque aphthæ illinantur.

Si denique liuida aut fusca fue-
rint, fortiora discutientia adhibe-
antur, diluendo passulas exsiccatas
& anisum tritum cum melle, aut
pulvere ex flor. chamæmeli, meli-
lori, anethi, fenigreci, cum melle,
aut melle rosato mixtum; aut cum
vino eadem coquatur, adiectis
semper nonnullis astrigentibus,
vt syrupo myrrino, aut diamoro.
Mel. \mathcal{Z} . Robnucum \mathcal{Z} . vi. diamori,
mellis rosati, an. \mathcal{Z} . ii. aquæ plantag.
 \mathcal{Z} . β . M.

Tanquam expertum commendatur in aphthis puerorum præsertim malignis, & epidemiis, rutilanti viuum admoerere ori pueri, quæ sugendo malignitatem attrahat, quâ lesarâ & mortua alia apponatur, atque iterum alia, donec virus omne sit extractum. Sed vtrum fœdum ac abominandum hoc remedium rectè admoderi possit, non immeritò quis dubitauerit.

In adultis.

In adultis.

In aphthis adultorum eiusdem generis remedia conveniunt, paululum tamen fortiora, pro natura corporum. Antequam igitur ad topica veniamus, si sanguinis copia ad-

fit, vena recetur cephalica in cubito, aut cucurbitulae scarificatae affigantur collo vel scapulis. Auriculas etiam sanguinem mutit e venis sub mento & extremitatibus labiorum. Pro euacuatione materiei proximae in partibus oris venae sub lingua tandem aperiantur. Si vitiosus humor aliquis in toto abundat, is conuenienti modo euacuetur.

Vniuersalibus præmissis ad topica veniendum. Quanquam in mollioribus corporibus & in aliis, dum malum recens est, etiam ante vniuersi euacuationem ius vtr̄ licet ad prohibendum mali incrementum. Sunt autem topica & *συμπλῆκη* illa medicamenta, in principio moderate astringētia & siccātia, cuiusmodi sunt, quæ parantur ex rosis, sumach, myrth. foliis, cortic. gran. fol. vitis, rubi, pro collatione oris, in aqua vel vino astringente coctis, addito syrupo granat. acetos. vel diamoro. Fortiora sunt collutio oris ex succis vel aquis rosarum, lactucae, plantagin. portulacæ, virgæ pastoris, solani cum paucis aceto; item decoct. gallar. maturarum, balaustior. fantalorum, acaciz, cum rob pyrorum, cornorum, sorbor. de ribes. Vt *2l. Flor. ros. rubr. balaust. an. P. i. fol. plantag. portulac. solan. prunell. an. M. i. sem. cydon. ʒ. i. sumach. cortic. granat. an. ʒ. ii. Coqu. in vini rubi astringētis & à quæ parte. æqual. portb. i. Colaturæ add. diamor. ʒ. i. Succi. maior. punice. acid. ʒ. ii. Misce pro collatione oris.*

Cortex etiam aurantium cum
melle & alumine mixtus utilis est.
Vel 2℥. Radic. tormentill. ʒ. ʒ. fol.
plantag. M. ʒ. Coqu. in aqu. plan-
tag. ad remanentiā lb. i. ʒ. Colatu-

rx adde *bol. Armeni* ʒ. i. *alum. rosb.* ʒ. xv. *Misce.* Vel ʒ. *Prunell. plantag. cand. equin. salm. an.* M. i. *rad. tormentill. acor. lut. an.* ʒ. iii. *ʒipit. vular.* N. iii. *ʒor. malue arborese, rosar. an.* M. ʒ. Coqu. in vino rubro & aqua ad remanent. lb. i. ʒ. Colaturâ os colluatur. Vel ʒ. *nucum viridum seminaturarum cum cortice contusarum q. v.* asperge aceto, destillain balneo Aqua feliciter aphthas sanat, si in ea spongiola inadesiat, quâ aphthæ illinantur, & aqua simplici, cui pars quarta vini admixta sit, abluantur.

In progressu ea misceantur, quæ astringendo simul discutiunt, ut cyperus, nux cupressi, folia oliuæ sicca, myrrha.

In fine addatur cortex nuc. mosch. cariophil. galla moschat.

Spiritus etiam vitrioli, si ejus gutt. ii. mellis. ʒ. i. misceantur utilis est. Vel ʒ. *Vinarum immaturarum lb. ii. ʒ. cortic. mali gravat. balaustior. sumach. an. lb. i.*

Macerentur in aceto, & destillentur. Destillationi adde *aluminis lb. ʒ. vitriol. ʒ. i. ʒ.* Iterum destillentur, & aqua ista locus affectus illinatur.

Si aphthæ ad suppurationem tendant, iuuentur illæ detento in ore lacte, præcipuè asinino, vel mucilage, semale. hxx. lin. cydon. vel horum, aut passularum decocto.

Sordidæ Aphthæ abluantur aqua saccharata, aut syrap. acetoso.

Utile etiam est decoctum hordei cum melle rosato mixtum. Vel ʒ. *Nuc. mosch. ʒ. i. ʒ. caryophyl. ʒ. i. rad. cyperi ʒ. ʒ. ʒ. areos, corallor. rubr. an. ʒ. i. bol. armen. cand. equin. an. ʒ. ii. mell. rosar. q. l.* F. linimentum.

Fortius exterguntur mel cum tartaro aut alumine mixtum, si spongia leniter affricentur.

Vel oliuæ mutia conditæ masticate.

Si putrescere incipiant, ut Aphthæ amplius appellare oris vlcereis non mereantur, sed in crustis & vlcera degenerent, fortiora requiruntur, & curatio, ut vlcerum iam instituenda.

Vbi tamen monendum, oris vlcera non semper aphthas sequi, sed etiam post inflammationes & per se, ut in aliis partibus, ex affluxu vitiosorum humorum ita fieri, ut & in Gallico morbo excitari. In quibus ut dictum, Stomacis vtendum, quæ astringant, siccant & roborent, quæ pro vlcere natura sint mitiora vel fortiora, & curatio horum vlcerum exiis, quæ postea de columellæ ac tonsillarum inflammationibus, ut & angina & hinc sequentibus vlcerebus dicentur, parebit. Prodest ex Aëtio centaurij minor. vlti cinis illitus cum melle. Item nuc. cupressi. vsta.

Ad sordida oris vlcera utilis est etiam aqua viridis Plateri.

ʒ. *Ængin. aris ʒ. i. alumin. ʒ. ʒ. vitrioli, minij, ana ʒ. i.* Coq. in *vino albi ʒ. iv. aqua rosa ʒ. i.* & cum penicillo loca in faucibus tangantur, cauendo, ne quid deglutatur. Postea lacte caprino, in quo calx ignitus extinctus sit, os colluatur.

Vel vsurpetur aqua viridis, seu gargarismus supra in ore propositus. Ad serpentes & depalcentes Aphthas ac vlcera summè efficax est, teste Aëtio, radix fomiculi vsta per se aut cum melle illita, amurea in æneo vase ad mellis crassitudinē cocta

cocta & illita. Alumen scissile tritum, & cum gallis & oleo exceptum illitumque; Auicennas gallar. alum. balauft. p. x. sumit, & puluerisata per se cum melle applicat.

Vsurpatur etiam a multis Vitriolum vstum & ærugo, & squamma zris cum melle illita. Et vnguentum Ægyptiacum in aqua plantaginis cum paucis aceto dissoluitur, adiecto melle rosato. Monet tamen Guillelmus Fabric. *Centur. 1. obs. 92.* cancris illud vlcenbus esse verissimum.

Cauendum verò, ne quid de medicamentis erodentibus in fauces illabatur.

Ardor relictus mitigetur lacte in ore retento, vel aqua plantaginis, aut solani sæpius mutati.

In vlcenbus Gallicis antiquis, interdum caro putrida tota præcindenda est, & ea parte præcipitati pulvis admouendus, cum gossypio in aqua plantaginis prius infuso.

De Aphtharum curatione plura videantur apud Aëtium, *terr. ab. 2. serm. 4. cap. 39. 42. 43. 44.* Et Orisab. *lib. 4. de loc. affect. curat. c. 68.*

Aqua fortis hausta ad hoc caput referenda & illa vlcera, quæ ex aqua forti incautè hausta, aut veneno sumpto excitantur, quæ curantur lacte bibito, iusculis pinguibus, & mucilagine, sem. sydonior. ac Psyllij, vt postea de morbis Oesophagi dicitur.

De vlcere magno & cancrroso circa radicem linguae, videatur Guillelmus Fabricius, *centur. 4. obs. 20.*

Dist. 4.

In infantibus lac nutricis corrigatur, cibis & potu laudabili & bo-

na nutritio, ac alimenti in infante coctio procuretur. Expedit in cibis vt cydonijs, pyris, sorbis, mespilis, & si opus sit, lactuca vel portulaca. In adultis victus ratio vt plurimum declinet ad frigidum, vitentur acria salsa & acida, & quæ craui sueci sunt & difficilis curationis.

De ossis palati corruptione.

Aliquando etiam os palati perforatur, & corrumpitur seu a vulnere, seu ab humore corroderente: id quod accidit sæpè in lue venerea, Quod vbi euenit, sermo vitatur; cum aer, qui per os elidi debet, simul per foramen illud ad nares penetret, & per eas egrediatur.

Si ex vulnere malum sit, & os sit purum, natura per carnem vel calum illud tandem, etsi tardè, claudere solet. Si verò os nigrum sit, prius radendum. Antequam verò foramen illud claudatur, vel si etiam planè claudi non possit, vt vitium illud sermonis tollatur, fabricanda est lamina aurea instar clypei, quæ in medio vmbonum, seu eminentiam habeat; cui spongiola sicca, foraminis magnitudinis respondens, alligetur, atque ita foramini adapteatur. Vbi enim spongia humorem imbibere, dilatatur, vt lamina firmiter hæreat, & foramen occludat.

Historiam talis morbi & curationis in instir. *lib. 3. part. 1. sect. 2. cap. 11.* Proposuit cum enim studiosus quidam ad nasi radicem, internum quæ oculi dextri angulum cultro vulneratus esset, & cultri fracti pars ferè digiti longitudine, vulnere extrà consolidato, ibi remansisset, accidit, vt post menses quatuor cultri fracti pars illa spontè sua via facta in palato crumperet & eximeretur. Cum verò in superiore parte palati

Ossis palati corruptione.

foramen inde apertum fuisset, præter prædicamenta abstergentia, exsiccantia, laminam auream, modo antea exposito, applicui: qua instructus etiam conciones habere potuit, sine sermonis impediimento. Sensim tamen illud foramen carne impleri vidi, & tandem etiam planè occlusum fuisse ad me relatum est.

Verruca in gutture & lingua.

Verruca
in gutture
& lingua.

Nec prætereunda hæc verruca in gutture & lingua. Marcellus Donatus, de hist. med. mirab. lib. 3. cap. 5. refert, quendam Iohannem Iacobum Fugacinam, ciuem Mantuanum, verrucis quâ pluribus guttur, fauces, & radicem linguæ occupantibus diu vexatum fuisse, quæ deglutitioni maxime officiebant, ut & alterum quendam Atulium Malegnanum vniuersam linguam eiusmodi verrucis, sed longè minoribus conspersam habuisse. Fuisse autem ex illis, quas myrmecias vulgò appellant. Habent autem ortum ex iisdem causis, ut in alijs partibus, de quo suo loco dicemus.

CAPVT XIX.

De fætoze oris.

Symptomata postea oris, quod attingunt, pertinent huc oris apertio vitiosa, dolor faucium & fætor oris. Primum nimirum ad hunc locum referri posset oris clausura, idque aperiendi impotentia, ut & oris hiatus: verum de istis suprâ, cap. 6. dictum.

Pertinet deinde huc faucium do-

lor finetumore, de quo Hippocrates, lib. 1. prædict. & in Coacis: dolentes fauces enim labore & molestia absque tumore manifesto ac suffocatione præceptis exsistunt minantur. Et sanctorum graciliam dolores suffocantes conuulsionem minantur. Verum quæ de his dici possent, è doctrina de angina patebunt. Ideoque hæc solum de fætoze oris agemus.

Oris, seu anhelitus & animæ fætor. Oris fætor. Oris fætor molestum, altantibus præcipue, symptoma est, cuius quidem causa proxima est vapor, seu halitus fetens ex ore egrediens. Verum ille multis ex causis ortum habere potest.

Primum quidem ex ventriculo, cum scilicet cibi fætidus, sumpti sunt ut allium, cepæ, & similes, quod & à vino & cereuisia copiosius hausto accidit. Deinde ubi quidem cibi, qui assumuntur, per se fætidus non sunt, sed in ventriculo corrumpuntur, è quibus eiusmodi vapores fætidus exhalant. Caterum non semper immediatè è ventriculo fætidus iste vapor exhalat, verum etiam ex alijs partibus halitus ille fetens communicatur, ut ex vermibus in intestinis, ex vlcere intestinorum, vel ab ipsis intestinorum excrementis, cum scilicet orificium ventriculi inferius, quo in intestina sese aperit, non ardeat, & ut secundum naturam fieri debebat, clauditur. Tum enim fætidæ excrementorum exhalationes per laxam hanc viam in ventriculum ascendunt, & fætoze suo anhelitum inficiunt, qui propterea etiam stercoreosus percipitur: id quod præcipue in iis evenit, qui crapulâ continuâ orificium ventriculi inferius laxum & debile reddunt. Idem accidit ex humoribus prauis in ventriculo.

meſaraicis; vel circa lienem contentis; ex vtero & fœtu mortuo in eo.

Secundò, fœtidus ille halitus ore egreditur, cùm in dentibus, corroſis & cauernofis, præcipuè gingiuis aut palato aliquid fœtidum continetur, cùm ſcilicet cibi, & caro præcipuè in dentium interſtitijs hæret, atque ibi putredinem, & hinc prauum odorem acquirit; aut cum vlcerata ſunt in ore, vt in ſcorbuticis, aut cum ſaliua fœtidis humoribus inquinatur, id quod interdum in catharris, febribus malignis, item lue venerea contingit.

Tertiò, idem halitus fœtidus exhalare poteſt etiam ex humore corrupto in oſſe colatori deſento, vt & ex vlceribus naſi & partium palato vicinarum.

Quartò ex pulmonibus & pectore, vt in pectoris vulneribus, vlceribus, empyemate; vnde etiã ijs, qui gibboſi ſunt, plerumque os fœtet.

Signa diagnofica.

Signa.

Malum ab adſtantibus facile percipitur. E qua parte verò halitus ille fœtens attollatur & proueniat, facile ex partium modò enumeratarum ſignis patet. Si à ventriculo fit, fœtor maior eſt ante cibum. Si ab oſſe colatorij, ore clauſo aqua pleno etiam percipitur.

Pronoſticum.

Pronoſticum.

Pro cauſe ratione malum magis vel minus periculofum eſt. Si enim anhelitus fœtens in tabidis, vt plurimum lethale ſignum eſt.

Curatio.

Curatio.

Cum halitus ille fœtens ſit proxima fœtidi anhelitus cauſa, vitium hoc aliquo modo quidem corrigi poteſt, ijs adhibitis, quæ ſuauem odorem præſtant.

Detinendi nimirum in ore carioſphylli, nux moſchata, zedoaria, rad. angelicæ, imperatoricæ, cyperij, iſeos, ligni aloës, cortic. citri, fol. lauri, roſimarinij cinnamomum, ſem. aniſi, fœniculi, coriandri, carui, myrrha, moſchus, ambra. E quibus varia parari poſſunt medicamenta, quibus vel os colluitur, vel quæ in ore detinentur pilulæ & Troſchiſci. Vt *℞. Caryophyll. nuc. moſch. ana ꝯ. j. roſar. ꝯ. ij. rad. iſeos ꝯ. ꝯ. cardamom. ligni aloës, cinnamonij, an. ꝯ. j. gall. moſchat. ꝯ. ꝯ.* Cum melle roſato. F. Pilulæ, vel cum mucilagine tragacanthæ aqu. roſ. facta Trochiſci in ore detinendi.

Sed cùm hoc modo fœtor odore ſuaui ſaltem obſcuretur & cauſa etiam non tollatur, cauſa etiam tollenda eſt, quæ non vna eſt, vt ſuprà dictum. Si à cibis, qui grauem odorem ſpirant, ſi fœtor, anhelitus breui ſpontè euaneſcit. Si vitioſi humores ſint in ventriculo, illi euacuandi, & vitium, vnde proueniunt, corrigendum, ventriculusque ipſe roborandus. Imprimis hic aloë vtilis & pilul. aloëphang. vt & abſinthium, vel vinum purgans cum abſinthio.

Et ne cibi, præcipuè caro in ventriculo putreſcat, facile condiendi aromatibus, aceto & acetofiſ. Pani ſemen fœniculi, aniſi & carui permisceatur. In ſine menſæ ſumantur, quæ ventriculum laxum claudunt, & ſuaui odorem ſpirant, vt cydonia, diacydonium, confectio ſemin. aniſi, fœniculi, coriandri & ſimilia.

Si à vermibus, vel alijs partibus fœtens vapor exhalet, partium illarum vitia corrigenda. Si dentes imundi ſunt, mundandi, vt ſuprà

Si oris vlcera adsint, vel à causa alia sabua inquinetur, vitium illud corrigatur. Si tandem à thorace aut pulmone proueniat fortens anhelitus, causa, quæ foetidum anhelitum suppeditat, tollenda.

DE GURGVLIIONIS affectionibus

CAPVT XX.

De Gurgulionis laxatione.

Gurgulio
mislaxatio

FAuces Græcis φάρυγξ ea dicitur regio quæ, vt Galenus interpretatur ante stomachum & laryngem, hoc est, ante gulæ & asperæ arteriæ extremitatem sita est. Nonnunquam tamen φάρυγξ pro Larynge, hoc est, summo asperæ arteriæ capite, vel ipsa quoque aspera arteria vsurpatur.

Et Suidas quidem, atque alij Grammatici Græci genere distinguunt, vt φάρυγξ, propriè fauces significet, φάρυγξ, verò Laryngem aut Tracheam. Sed Galenus indifferenter utroque genere vocabulum φάρυγξ, de summo tracheæ capite & de ipsa trachea accipit.

Eadem faucium regio etiam φάρυγξ, nominatur per metaphoram, quod tanquam angustus terræ tractus inter duo maria veluti vtrinque posita exporrigitur. Hinc φάρυγξ, vocantur tonsillæ, siue amygdalæ: hoc est, glandulæ insignes ad radicem linguae in faucibus oppositæ, saluâ, quæ copiosam continet partes viciâs humectantes.

Inter tonsillas medius pendet gurgulio, Græcis γούργυλιον, particula scilicet cinnola à palato in os pro-

pendens, soli hominum auiumque nonnulli generi propria, ob vocis potissimum modulationem condita, vnde & αλκτρυον τῆς φάρυγξ, à Paulo Ægineta nominatur, lib. 6. c. 31.

Nomen Gurgulionis, vt & Græcum γούργυλιον, factum videtur à sono, qui gargaritendo fit ad illam oris particulam.

Atque hæc propria illius particula in summo ore appellatio est. Klor, verò, siue κλως & σαφύλα, affectionum præternaturalium eiusdem partis nomina sunt. Quando enim gurgulio præter naturam intumescens in longum æquali crassitudine extenditur columinum instar, κλως, & κλως, dicitur. σαφύλα verò, quando ima parte in rotunditatem crassescens, suprâ qua dependet, gracilior efficitur, vt vix à pendiculo suo pendentis speciem præ seferat. Aëtius, tetrab. 2. ferm. 3. c. 4. c. etiam tertiam affectionem addit, quam λυάτης, id est, lorum appellat, quando ex suffitu, vt scribit, nimium ignitus gurgulio, hoc est, desiccatus gracilescit, & loco similis propendet. Accidit idem, cum eb ἀρρωγίαν eius partis, tàm ob paralyfin (paralyis tamen vocem non propriè accipiendo) vt Aëtius seq. cap. docet.

Differtigitur, λυάτης ἀπὸ τῆς κλως, quod in hac gurgulio non extenuatus est, vt in loro, sed crassitiem ex fluxione magnam est adeptus. Arctæus λυάτης, de membranarum vtrinque circa gurgulionem in latum tanquam alarum vel pertilionum explicatione, de qua mox dicitur, interpretatur, de causis acutor. c. 8. Frequentiora autem duo mala sunt, gurgulionis laxitas & inflammatio eiusdem. Illam τὴν γούργυλιον χαλαρότητα

hanc *φυσική*, nominant, de quibus iam dicemus.

Κίρι ergo vel *κίρι*, absolute & cum adiectione, *κίρι χαλαρόν*, est *γουργυλιόν χαλαρόν*, seu gurgulionis laxatio, quæ affectio vulgo casus columellæ appellatur, *der Zassf. fl. gefallen, oder geschessen*.

Fit autem, quando gurgulio multo humore præter naturam perfusus circa inflammationem laxatur & elongatur, ut radici linguae & faucibus incumbat; sicut in catarrhis continuis sæpe accidit. Humor plerumque pituitosus est cerebro demissus, partem illam nimirum humectans. Columella sic laxata mollis est, albicans & concolor palato sine dolore & calore.

Històriam gurgulionis mirè laxati describit Mercellus Donatus, *de hist. med. mirab. lib. 3. cap. 3. ex Leonh. Bontallo eiusdem, cui repente ex columella ita laxata fuerat, ut ad anteriores dentes protenderetur. Aretæus etiam, loco citato, miræ cuiusdam columellæ laxationis meminit, ubi scribit bicornem columellam reddi, geminis membranis hinc atque inde pendentibus, quæ ab utraque parte iaceant quasi vesperilionum alæ.*

Curatio.

Curatio eadem propemodum est, quæ gurgulionis inflammationi siue intemperiem frigidam & humidam rigentibus, de qua, *c. seq.* dicitur. Fiant igitur per venæ sectionem ac cucurbitulas, præmissa, si opus, purgatione capitis ac totius corporis diversiones & evacuationes, ut decet: Capi etiam prospiciatur erthias, aliisque remediis humorem pituitosum abluantur.

Topica autem iunctio, sunt astringen-

gentia & repellentia, postea etiam paululum dissoluentia, & exsiccantia. Imprimis verò & præ ceteris prodest decoctum & aqua plantaginis, caprifolij, myrti, rosarum, rubi, rad. caryophyllaræ, origani, hyssopi, oxycratum, & acerum, quæ interdum sola sufficiunt. Fit ergo gargarismus, vel collutio omnis talis.

℞. Aqu. plantag. lb. i. diamor. vel dianæ. an. ℥. i. M. vsurpentur leni gargarismo. Aut ℞. Flor. rosar. rubr. balast. M. b. sol. acetos. plantag. an. M. i. galar. immat. ℥. ii. alum. vsti ℥. b. sem. cydon. ℥. iv. Coq. in l. q. aquæ ad tertias, pro lb. i. Colaturæ adde diamor. ℥. i. aceti vini ℥. b. M. pro gargarismo. Vel ℞. Fel. plantag. messor. cand. equ. rosar. rub. an. M. i. sol. scabios. M. b. Colaturæ ℞. lb. ii. adde mel. rosar. an. diam. ℥. ii. ace. ros. ℥. b. M. Vel ℞. Fl. malv. arb. ros. rub. sel. prun. utron. salu. vnlm. (quam ob signaturam nonnulli hîc commendant) an. M. b. Rad. torm. ℥. ii. al. crudi mell. ℥. ii. Coqu. omnia in aq. lb. ii. & acet. ℥. viii. ad quartæ partis consumptionem. Colaturâ veteri pro gargarismo. Vel ℞. Decoct. salu. bss. an. lb. b. alum. sacch. ℥. i. diam. ℥. i. mell. ros. ℥. b. M. Vel ℞. Aqu. torm. plant. ros. an. ℥. iii. syr. de ros. sic. myrt. an. ℥. b. syr. vltiv. ℥. i. M. Vel ℞. Aqu. plantag. cent. an. ℥. ii. ros. prunell. an. ℥. ii. b. succ. gran. ℥. i. rob. berberis ℥. b. M. Vel ℞. Sem. fœn. g. m. balast. ℥. ab. ros. rub. P. a. b. rad. tormen. z. a. aqua plantag. s. l. quercus, an. ℥. iii. Ebulliant vrica ebullitione & colentur. Colaturæ admisce Syr. de ros. sic. ℥. b. diamor. ℥. iii. essent. ros. r. rubr. ar. ℥. a. b. spirit. vitriol. ℥. b. M.

Vel *℞. Rad. tormentill. & uular.*
an. q. f.

Coquantur in cereuisia & cum modico melle dulcorentur pro garatissimo. Commendatur & confectio rosar. vitriolata, aut fiat talis pulvis.

℞. Rosar. sicar. balaust. alum. scissil. an. ʒ. ʒ. ʒ. *piper. zingiber. an.* ʒ. i. *myrr.* Contusa & cribrata, per calamum infillantur, vel ut mox dicetur applicentur.

Galeii repellens & discutiens est ex gallarum immaturar. *alumin. scissil. & salis ammoniac. partibus æqualibus.*

Vel *℞. Alumin. vsti, & boli armeni.* p. æ. quibus tritis, cochlearique, siue *capul. vsti*, instrumento impositis columella contingatur.

Ad pulueres hos & similes columellæ rectè applicandos vtile etiam est cochleare & follii Guillelmi Fabricij, quæ descripsit, *cent. 2. obs. 13.*

Aëtius ad valdè laxatam & tumentem columellam hunc puluerem probat.

℞. Piper. myrrh. an. ʒ. i. alumin. scissil. gallar. an. ʒ. i. Contritis vtere, & vestigio enim columellam firmat & resiccat.

Si malum diutius protrahatur, valdè discutientia commisceantur, ut pul. piper. trium generum zingib. cinanom. macis, galang. pyrethr. sal. ammon. sinapi, hyssopi, pulegij, origani, prassij, calamithæ.

Vulgus initio solo piperis longi contactu columellam sanat, ubi scilicet materia pauca est, & caput excrementis non plenum.

Aliis intempestivus eius usus notius est. Addi potest aliquid alumi-

nis & boli armeni, vel myrrhæ, vel myrobal. citrinorum. Nonnulli piperis loco zingiber vtuntur.

Quidam suture coronali applicant emplastrum confectum ex acacia cum aceto, aut ex gallis vstis cum aceto, quo columella eleuatur. Alij ouum recens coctum ad duritiem per medium dissectum, & thure vel zingibere conspersum calidè vertici imponunt. Alij solum quercinum melle inungunt, & vertici applicant. Potest & pulvis olibani, succini, & ligni aloës adpaueri.

Vel *℞. thus & gallas puluerifatas,* & cum farina tritici, & melle virgin. in formam emplastri redigantur, & vertici imponantur.

Quidam nuces iuglandes cum spiritu vini contusus vertici imponunt. Alij fermentum vetus syncipiti imponunt, linteolo inductum, cui nonnulli admiscunt puluerem succini albi. Alij matricariam recentem cum fermento contundunt & applicant, aut syncipiti illinunt axungiam leporinam. Ore verò excipere iubent suffitum ex succino albo, puluere caryophyllorum, ligni aloës, mastiches.

In non delicatis quidam vtuntur stercore albo canis ossa comedentis, siue pulueris forma, quo columella attollatur, addito pauco cinnamomo, siue cocto illo in vino cum foliis formâ gargarismi.

Vel *℞. Pulv. capul. glandium ʒ. i. albi graci, ʒ. ʒ. pip. long. zingib. an.* ʒ. i. M. Nonnulli etiâ ceruici topica imponunt.

Si defluxio ita acris & salsa sit, vt columellæ erosionem efficiat, humore contemperato & euacuato, diuersionibusque usurpatis exulcerationi ipsæ extergentia, altringen-

De Gurgulionis inflammatione, & exulcerat. 23

tia & tandem solidantia adhibeantur.

Pauetur ergo gargarismus ex aqua, melle simpl. aut melle rotato & diamoro. Post extensionem partes erofae sepe tangantur specillo lana obvoluto & intincto in hoc liquore.

℞. Aq. ros. plantag. an. ʒ. iii. mellis despumati ʒ. iii. liq. ʒ. ii. Ferueat unica ebullitione. Aut ʒ. Succ. moror. rubr. moror. Celsi de cornis, an. ʒ. ʒ. ʒ. mellis despumati, ʒ. ii. Coq. ad iustam consistentiam, postea in eo dissolue liq. ʒ. iii. alumin. scissil. ʒ. i. ʒ. Iterum leniter coq. pro columellae et rosae illunitione.

CAPVT XXI.

De Gurgulionis inflammatione & exulceratione.

Aliquando etiam inflammatur gurgulio, & Graecis *αἰμαρῆσις*, *μαρῆσις*, nominatur & quidem interdum retenta sui naturali figura, molae tamen auctus, interdum alienam; vix scilicet à pediculo suo pendentis figuram acquirit, & tunc *σαρκώδης* appellatur. Et quidem affectio quae *σαρκώδης*, seu vix dicitur, rarius gurgulionem accidit, frequentius vero is ita inflammatur ut naturalem suam figuram magnitudine tantum mutata retineat. Galenus, *6. de compos. med. sec. loca cap. 30.*

Causa.

Causa.

Causa est defluxus humoris è capite ad gurgulionem, qui humor sanguis imprimis tenuis est, aut pituita cum sanguine mixta, de quo etiam Hippocrates, *2. de morb. Atabes* & à cæteris humoribus deducit, qui colore & specie doloris discernuntur.

Quod si materia acris aut salssa sit, non solum inflammationem, sed & exulcerationem efficit, nisi maturè occurratur. Affectio ipsa cum sit inflammatio, morbus est in temperiei cum materia & magnitudine aucta, & si exulceratio sequitur, etiam cum soluta vinitate.

Signa Diagnostica.

Signa.

Malum oculis est expositum, aperto ore & depressa lingua, adest tumor, dolor, ardor, & rubor cum deglutendi, difficultate, & suffocationis quodam periculo, interdum & cum febre.

Et quod signa causarum attinet, ex sanguine magis est affectio partis; si pars ipsa rubicundior sit, & dolor in ea sentitur pulsacilis; ex bile si colore sit citrina, & dolor adlit punctiuus, atque sic de cæteris.

Prognostica.

Prognostica.

1. Quanto magis vuula est inflata in apostemate, & quanto magis elongata in relaxatione, tanto magis nocet operationibus, & tanto deterius est signum.

2. Gurgulionem inflammatione laborantem incidere, aut scarificare, aut vix periculosum est, praesertim quamdiu rubicundus, tumidusque fuerit. Sequitur enim sanguinis fluxus, qui faciliè sedari non potest, & à quo suffocationis periculum imminet ob decubitum ad pulmones. Vicinarum quoque partium inflammatio metuenda est, ratione doloris attrahentis. Hippocrates *3. pregn. aph. 31.* Idè ad excisionem non statim festinandum est, sed extrema prius remedia tentanda sunt.

3. Contractas & rotundas vuas, & sanguinolentas, aut subnigras Chirurgia aggredi non decet, sed tenues & oblongas, & summa parte

imminutas & resolutas, & non valde sanguinolentas, sed albicantes: hæ enim inflammatione carent, cum venæ extenuatæ sint, & sanguine destituta, Paulus, *lib. 6. cap. 31.*

4. Quibus gurgulio totus excinditur, vel eroditur, raro, clarè & distinctè loquuntur. Obseruavit tamen Bauhinus *vt in theatro anatomico*, refert, vt & Guillelmus Fabricius Hildanus, *Cent. 2. obs. 21.* aliquos quibus columella fuit erosa, distinctè & articulatè locutos fuisse. Si etiam gurgulio totus excinditur, periculum à *steno* imminet, cum particulatam deficiat, quæ impetum itruentis frigidi aëris auertere, & aliquid de cerebri destillationibus excipere, & à pectore auertere solita est.

Cura.

Vt in aliis inflammationibus, ita & in gurgullionis inflammatione primum vniuersalia præmittenda, & si plethora adsit, venæ sectio, imprimis cephalicæ, instituenda, postea etiam vena sub lingua aperienda, aut cucurbitulæ cum scarificatione ceruici aut scapulis affigendæ. Fiant etiam diuersiones per clysteres, frictions & ligaturæ extremitatum & similes. Sin vitiosi humores abundant, ij euacuandi.

Topica remedia initio sunt repellentia, quæ forma gargarismi & pulueris usurpentur, atque vbi moderata est fluxio, austera illa sint, vbi vehementior, acerbæ quæ fortius adstringunt & repellunt, docente Galeno, *6. de compos. med. sec. loca, c. 3.* His mel additur, ne exasperando dolorem pariant, fluxionemque irritant.

Moderata ergo sunt diamorum succus ex moris cum melle. Diluantur hisucci cum aquis, aut decoctis rosarum, plantaginis, prunellæ, myrtillorum, rubi, sumach, balast. gall. hordei pro gargarismo, vel collutione potius. Nam valida, & multa gargarisatione plus materiz ad locum affectum attrahi potest.

Vt *℞. Diamori, ʒ. vi. vin. granat. ʒ. ℞. decoct. rosar. balast. sumach. lb. ʒ. ℞. M. pro collutione oris.* Vel *℞. Aqu. plantag. equiseti, prunella, an. lb. ʒ. flor. rosar. rubrar. M. ℞. balast. p. i. Ebulliant vnica ebullitione, adde diamori, ʒ. iiii.*

Aut *℞. Fol. plantag. portular. an. M. ʒ. flor. ros. rubr. sol. myrt. an. M. ℞. caruc. granat. ʒ. ii. Coq. inf. q. aquæ, pro lb. ʒ. ℞. Col. adde succ. malor. granat. ʒ. i. acct. rosar. ʒ. ℞. rob. nucum ʒ. ii. ℞. M. pro gargarismo vel collutione oris.* Vel *℞. Aqu. fragor. prunelle, an. ʒ. i. ℞. nymph. plantag. ros. an. ʒ. i. syr. cerasor. ʒ. ℞. rob. rubes ʒ. iiii. diamori ʒ. ii. nitri præp. ʒ. ii. M. pro gargarismo.*

In primo principio, vbi exigua est fluxio, sufficit gargarismus ex posca vel vino granat. vel sine gargarisatione liquor resupinato capite in ore teneatur, immutando quando incalcescit.

Fortiora sunt rob. de tibes, rob. nucum viridium, syrup. de agresta, succus cornor. & sorbor. acacia, hypocist. melle etiam hæc subacta. Decocta item myrti, & baccar. eius sol. tenerorum quecus, mellepillor. vitis, capular. glandium, sumachi balaustrorum.

Pulueris forma conueniunt rosæ, balaustris, coruc. granat. hypocist. gallæ; & prius enumeratarum plantarum

tarum folia exsiccata.

E. g. \mathcal{L} . Pulv. *spong. sambuc.* \mathfrak{z} . j. *summit. centinod. prun.* an. \mathfrak{z} . j. *flor. ros. rub.* \mathfrak{z} . β . F. Pulvis.

Applicantur cum cochleari aut specillo concavo, sine *εκευρωσάτω*, instrumento, vt Paulus nominat, vel instrumento à Guillel. Fabricio depicto, *cent. 2. obseru. 21.*

Ager etiam sepius lambat mel rosatum, vel robnucum, quod multum commendat Galenus, 6. de *compof. med. sec. loca cap. 1.* Ex narratione de Hortulano.

Vel \mathcal{L} . Fol. *plantag. bdellij minor.* an. m. j. *prunell. m. β . flor. ros. rubr.* p. j. *passular. maior. cum aill. contras.* \mathfrak{z} . j. *sem. cydon.* \mathfrak{z} . j. Coq. in suffic. quant. aq. Colat. \mathcal{L} . \mathfrak{m} . j. *mell. rosar. diamori* an. \mathfrak{z} . j. β . Vel \mathcal{L} . *Flor. ros. rubr.* p. ij. *balaustr. sem. sumach.* \mathfrak{z} . j. β . fol. *plantag. prunell.* an. p. iij. *cap. glandium* \mathfrak{z} . j. *alumin.* \mathfrak{z} . j. Coq. in f. q. aq. ad tertias, colentur. Colat. \mathcal{L} . \mathfrak{z} . ix. in quibus dissolue robnucum, moror. syr. myrsini, an. \mathfrak{z} . β . ol.

⊕. \mathfrak{z} . β . M. pro gargarismo. Vel \mathcal{L} . Fol. *quercus, alchimill. plantag.* an. p. ij. *hyssopi* p. j. *cort. granat. nuc. cupress. balaustr.* an. \mathfrak{z} . j. *sem. rad. glycyrb.* \mathfrak{z} . ij. *alum. roch.* \mathfrak{z} . β . Coq. in aq. *plantag.* lb. j. β . ad medieta-tem. In colatura dissolue mellis ros. colat. syr. *fl. ecam.* an. \mathfrak{z} . β . *deros. sic. myrsini,* an. \mathfrak{z} . ij. *phlegm. alumin.* \mathfrak{z} . β . M. pro gargarismo.

Atque hæc ferè in principio conueniunt.

Postea repellentibus admisceantur nonnulla moderatè discutientia, cuiusmodi sunt flor. *chamamel. meliloti, anethi, sem. fenigræci, folia althææ, maluæ, radix iridis, cyperi, hyssopi, ficus, thui, myrrha.* Vt \mathcal{L} . *Prunell. hyssop.* an. m. j. *flor.*

violar. bord. an. m. β . *glycyrb.* \mathfrak{z} . β . *ruar. passar. exacimat.* \mathfrak{z} . j. *caicar.* N. v. Coqu. in aq. *simp. Colat.* \mathcal{L} . lb. j. *oxymell. simpl. mell. rosar. diamori,* an. \mathfrak{z} . j. Vel \mathcal{L} . *Rad. maln. alba.* an. \mathfrak{z} . iij. β . *violar. purp. bord. mundi,* an. p. j. *sem. mala. albez. cydonior.* an. \mathfrak{z} . j. *4. frig. maj.* an. \mathfrak{z} . β . Coqu. in aq. *comm. purz. f. q. colaturæ* \mathcal{L} . \mathfrak{z} . iij. in quibus dissolue *diamori* \mathfrak{z} . j. *nitritrochisc.* \mathfrak{z} . j. M. pro gargarismo: Si fluxio fuerit frigida.

\mathcal{L} . *Piper.* \mathfrak{z} . β . *radic. irid.* \mathfrak{z} . ij. *succ. glycyrb.* \mathfrak{z} . j. β . *sachar. cand.* \mathfrak{z} . ij. *mell. rosar. collat.* \mathfrak{z} . j. M. F. Lohoch, quod calidè xger sumat.

Rondeletius in muliere, quæ penè suffocabatur, feliciter vsus eclegmate Scribon. Largi ex pipere, myrrha & melle, cuius vsu maximam pituitæ quantitatem, quæ circa columellam & fauces collecta erat, reiecit.

Sæpe etiam, vt monet Galenus, 6. de *comp. med. sec. loca. cap. 3.* in principio quippiam ex discutientibus addendum est, quando scilicet corpus ægri prauis humoribus refertum est, & particula affecta sua natura debilis.

Si verò simul dolor rhemens adfuerit, mitigantia dolore quoque misceantur, quale est contusa glycyrrhiza cum mellis & aquæ paræ mensura, cocta & gargaritata, lac gargarisatum, vel emulso seminis papaueris, vel ptisanæ.

Quod si inflammatio, in duritiem vertatur, (quod tamen rarius fit, quoniam locus affectus est calidus humidus, & materia tenuis ac fluxilis) emollientibus, vtendum, vt radicibus & fol. *althææ, melilag. sem. lina, fenigræci* & postea discu-

cientia addantur, vt glycyrrh, radix
irid, puleg, organ, calamint.

Si ad suppurationem tendat, ma-
turetur decocto caricarum cum a-
qua mulla, aut cremore ptisan.
hord. vel auenz cum decocto pas-
sul. decocto glycyrrh. aut fursur.
tritici. lotura calida. Vel *℞. Rad.
glycyrr. 3. ij. fl. malu. arborese. p. ij.
sinfaris tritici in peria ligati 3. β.
caricar. ping. N. iv. iuinbar. N. v.
Coqu. in aq. comm. pro 3. ix. in
quibus dissolue, mellis passul. 3. j. β.
cremor. ptisanæ, auenz. 3. j. M. pro
gargarismo.*

Si non succedat, fetto aperiatur.
Post puris effusionem extergentia
& desiccantia vsurpentur, vt aqua
mulla, aqua hordei cum melle ro-
tato. Item succus agrimon. aut cau-
lium succus cum melle.

Si columella putrescere & in gan-
granam transire incipiat, tali gar-
garismo vtendum. *℞. Origan. hys-
sop. an. m. ii. scabios. m. j. glycyrrh.
3. β. Coqu. in aqu. pro lb. j. Colat.
adde xymell. f. 3. iij. M.*

Si vlcus vix putrescat & serpat,
chalcantio & similibus metallicis
vtendum est. Et vitilis etiam hic est
aqua viridis supra posita, & aqua
viridis Plateri.

Ad vlcera Gallica conuenit aqua
fortis bene diluta, vel aqua, in qua
decoctum est sublimatum, adhibita
simul vniuersali morbi Gallici cura-
tione. Mitius est hoc.

*℞. Vnguenti Egyptiaci 3. β. alu-
minis 3. β. mellis rosæ colati 3. j. β.
M. pro linimento, quo vlcus con-
tingatur.*

Si remediis hisce malum curari non
possit, ad Chirurgiam veniendum,
vt Paulus monet, *lib. 6. cap. 3.* ne ex
affluis irritationibus tussis & vigi-

lie, aliquando & suffocatio sequa-
tur.

Itaque vuula corrupta & marcida,
quæ non amplius tumet, nec rubi-
cunda est, atque ita sanguine & vi-
ta destituta, abscindenda eo modo,
quem monstrat Paulus *ibid.* & cuius
Aëtius meminit, *tetrab. 2. cap. 41.*
qui forcipe obtorquere, & prius il-
laqueare vuulam iubet, vt stupida
effecta minus sanguinis profundat.
Sed hæc Chirurgica operatio pericu-
lo non caret; refertque Valescus de
Taranta, *lib. 3. cap. 3.* historiam ci-
iusdam presbyteri, cui pleutorico cum
vuula fuisset abscessa, sanguinis flu-
xus in tanta quantitate ad pectus se-
cutus est, vt inde maxima pectoris
angustia & respirationis difficultas
oborta, ægërque cum amplius san-
guinem è pectore euicere non pos-
set, suffocatus sit. Ideo quæ ipse o-
cto canones in vuulæ abscessione in-
stituenda obseruandos proponit. 1.
est, vt vuulæ abscessio non tentetur,
nisi corpore prius euacuato, vt &
monet Hippocrates, *3. prognost. aph.*
21. 2. ne fiat affluxu humorum ad-
huc durante. 3. nisi vbi alia reme-
dia non satisfecerint. 4. nisi tumor
ille valdè lædat & molestus sit. 5. in-
stituendam esse in aëre lucido. 6. an-
te vuulæ abscessionem, & post eam
vsurpanda esse gargarismata astrin-
gentia. 7. ne nimis rubra & tumida
abscindantur, sed solum alba & ver-
sus radicem angusta. 8. non abscin-
datur, nisi quantum magnitudinem
naturalem excedit.

Vbi etiam incisione opus est ali-
quid, si fieri possit, relinquatur, ne-
cessarij vsus gratia.

Ad vuulam tamen commodè &
sine periculo abscindendam pecu-
liare instrumentum inuenit Guil-

Iohannes Fabricius, idque depinxit, *cet. 2. obseru. 21.* Et si fluxus sanguinis metuatur, & putrefactio aliqua addit, cauterium actuale commodissimum est, quod quomodo adhiberi debeat, docet Paulus, *loco alleg.* Et peculiare atque ad hanc rem idoneum instrumentum descripsit Guillelmus Fabricius, *loco allegato.* Hieron. Fabricius ab Aquapend. *de operat. Chirurgicis, titulo de vna chirurgia,* præcisione facta, quam forficula instituit, exiguum ferramentum in cochlearis formam factum bene calefactum non ignitum admo-uet.

Dietæ.

Victus ratio talis sit, qualis in aliis inflammationibus præcipitur, imprimis quies & inedia in principio morbi competit. Vrsurpentur in cibis, quæ leniter astringunt, ut succus cydonior. granator. moror. vuarum immaturarum. Mastice æger tenera mori vel quercus folia. Vitet laboriosas deglutiones, respirationes, loquelam.

CAPVT XXII.

De tonsillarum inflammatione, & ulceribus.

Tonsillarum inflammatione.

G Landulæ duæ utrinque ad radicem linguæ paulò supra laryngem positæ sunt, quæ Latinis tonsillæ, vulgo à figura amygdalæ, Græcis *αμυγδαλæ*, & *αμυγδαλæ*, vocant, cum quod inter se oppositæ, tum quod circa isthmum oris sitæ sint. Galeno autem, 3. *de sympt. causis* cap. 4. *¶ In lib. de tumoribus p. n.*

cap. vlt. αμυγδαλæ sunt illarum glandularum tumor aut inflammatio. *αμυγδαλæ* inflammatio eorum, quæ circa isthmum sunt locorum, hoc est, partium, quæ os & gulam intericiunt.

Tonsillæ igitur cum conditæ sint, ut congregata salina laryngem & trachæam rigent, sæpe humore nimio ex frigida destillatione oppletæ intumescunt, sed sine inflammatione, ita ut colorem suum naturalem retineant, & dolore careant.

Interdum verò eas occupat inflammatio cum rubore, ardore ac dolore & siti, & cum quadam deglutionis ac respirationis difficultate. Quæ inflammatio in abscessum degeneratione pus intra fauces effunditur, unde sæpe vlcus sordidum graueolens relinquitur.

Fiunt tamen ibidem vlcera citra inflammationem ex destillatione salis vel acris, molles illas partes exedente, aut tali halitu eo ascendente, quod lue Gallica infectis familiare est.

Nonnunquam maligna & serpentina vlcera in iis partibus oriuntur, tempore imprimis verno & pestilente aëris constitutione, teste Aëtio, *retrahib. 2. serm. 2. cap. 46.* Siue ex præcedente inflammatione effrata, siue ex quavis alia causa, ut ex aphthis in pueris & adultis, quæ prauis humoribus abundant.

Interdum etiam tonsillæ planè indurantur, unde Mercurialis, *de morb. pueror. lib. 2.* Paulum Æginetam sub tonsillis etiam scrophulas, seu tumores duros & scirrhosos complecti, scribit. Vide etiam historiam tumoris eiusmodi cancri, apud Guillelmum Fabricium, *centur. 3. obser. 84.*

Tonsillarum vlcus.

Causæ.

Causæ.

Causæ eædem sunt, quæ inflammationis gurgilionis. Concitatur scilicet inflammatio tonsillarum ex affluxu humorum ad illas; qui cum calidi sunt, partes illas calidas & humidas inflammant, in his præcipuè, qui multo sanguine abundant; cum copiosi tumesciunt: cum acres & salii, erodunt.

Et quidem tonsillæ magis obnoxie sunt inflammationi, quàm gurgulio, propter molliem & laxitatem substantiæ & temperamenti proprii, ac loci caliditatem ac humiditatem.

Inflammatione etiam tonsillatum magis laborant, qui sanguine magis abundant. Priuatim verò, ut Aëtius scribit, *lib. modo citato cap. 45.* pueris hoc malum frequens est ob teneram corporis texturam, & ob ætatis, & lactantibus è lactis vitio & praua qualitate.

Puellis quoque vsque ad menstrua purgationis tempora hoc malum frequens est, Aëtius, *lib. I. cap. 9.* In adultis verò generatur hoc malum ex nimia meri potatione, ac multâ & audiore deuoratione ciborum, maxime acrim & asperorum. Ita ceratâ audiuis comesta faciliè aciditate sua tonsillarum inflammationem, & gurgilionis laxitatem efficere perhibentur.

Signa Diagnostica.

Signa.

Tonsillis tumefactis foris sub maxillas tumor tactu visûque deprehenditur, & intus seu frustulum quoddam faucibus adhærescetem ole sua premit, obstatque, ne facilius fiat deglutitio, idque sine siti & ardore.

Inflammatis iisdem præter deglutendi, & quod Paulus addit, *lib.*

6 cap. 30. respirandi difficultatem, dolor adest, rubor, ardor situs, interdum & febres.

Maligna tonsillarum vlcera partim alba sunt maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, quæ ferro inuruntur. Accidit ergo siccitas in deglutendo, & suffocatio confectum incidit, maxime cum rubor subit mentum, aut ubi hæc acrimonia præterit, *lib. I. cap. 46.* illa infestans succedit, & cum hac putrefactio, ut docet Aëtius, *terra. bibl. 2. serm. 2. cap. 46.*

Prognostica.

1. Tonsillarum inflammatio morbus acutus est, & sæpe suffocationis periculum minatur.

2. Tumor autem vel resoluitur, vel suppuratur, vel induratur.

3. Tonsillæ in febribus denigratæ & arefactæ mortem imminere portendunt.

4. Vlcerata tonsillarum quædam familiaria sunt & mitia, quæ scilicet sunt munda, exigua, non altè descendencia, nec inflammata, nec dolorem excitantia: quædam aliena & pestifera, quæ lata sunt, caua, quoddam concreto humore albo, aut liuido, aut nigro sordentia, quæ aphthæ etiam nuncupantur. Quod si concreta illa sordes altius descendere, elchara gignitur: quam rubor insignis, inflammatio & venarum dolor circumstuit, sicut in carbunculo. Exigua quoque & rara exanthemata oriuntur, quibus superuenientia alia in vnu vlcus coalescunt, latumque vlcus efficiunt. Id si interius in os depatendo serpit, columellam exedit, & linguam quoque & gingiuas ac aliosque sensuum occupat, unde dentes labef. clantur & nigrescunt. In columellâ etiam

Prognostica.

phlegmone erumpit; atque non multis post diebus phlegmone, febris, fortore, inediaque consumpti intereunt.

5. At si in pectus per trachæam id malum inuadat, eodem illo die strangulat, pulmo enim & cor neque talem odoris fœditatem, neque vlcera, neque serofos humores sustinent, sed tussis ac spirandi difficultas enascitur. Aræteus, *lib. 1. cap. 9.*

6. Tonsillarum vlcera sine febre secutiora sunt.

7. Tonsillarum vlcera ætate suborta peiora sunt, quàm quæ aliis oriuntur temporibus. Citò enim ferpunt.

8. Serpentina circa fauces vlcera, quæ magnam molestiam exhibent, & acuta magis sunt, vt plurimum spirandi difficultatem adferunt. Videantur plura eiusmodi prognostica apud Hippocrat. *lib. de dentitione.*

9. Glandulæ istæ facillè indurantur, & in scirrhum degenerant, qui nunquam aut rarè curantur.

10. Aliquando tonsillarum tumores suppurantur & abscessus extrà erumpunt, & ægri sanantur: cuius rei exemplum est apud Dodonæum, in *observat. cap. 16.*

Curatio.

Curatio.

Si levis sit inflammatio, circa initia gargarismi adhibeantur astringentes, cauendo, ne mel multum admisceamus, quod suâ acrimoniâ malum irritaret, vt monet Aëtius, *loc. citato, cap. 48.*

Reinstituta autem inflammatione, rectè & vtiliter illud admiscetur. Vt *℞. Aqu. plan. ag. lb. j. s. flor. ros. rubr. m. s. sem. cyd. n. 3. j. s. Semel ebulliant; C. sacuræ adde diamor. 3. j. s. dianuc. 3. s.*

M. pro gargarismo, quo tepidè interna oris colluantur. Nam inflàmata neque frigus tolerant, neque multum calorem. Aut *℞. Fol. plantag. m. j. flor. rosar. rubr. P. j. cortic. granat. 3. iij. gallar. immatur. N. iij. fol. prunell. m. j. nuc. cupress. 3. ij. Coqu. in f. q. aqu. pro lb. Colat. adde dianuc. 3. ij. s. Misce pro gargarismo.*

Vbi vehemens est inflammatio, vt periculum sit à suffocatione, statim cephalica secetur, repetita sanguinis detractiōe in magna plethora; aut primùm basilica, postea cephalica aperiatur.

Vbi venæ sectio locum non habet, aurium scarificatio vtilis. Cucurbitulæ etiã venæ sectionis vicariæ esse possunt.

Frictionem longam in carpo rusticis familiarem esse, scribit Rondeletius, *lib. 2. cap. 4.* Prodesse autem reuera ob diuersionem.

In feminis, vbi opus, vena tali primò incidatur. Ad euacuandam postea materiam coniunctam prodest secare venas sub lingua. Si cum sanguine vitiosi humores simul redundant, clysteres & pharmaca leniter purgantia exhibeantur.

Deinde ad topica veniendum est, quæ primùm sint repellentia, vt decoctum ex rosis, balaustris, fol. plantag. vitis, rubi, sorbis, cornis, mespilis, gallis, sumachi, fol. & bacc. myrti ac similibus, quorum formulæ antea sunt propositæ. Repellentia autem practici ferè omnes solum intà applicant. Abiis tamen & vulgata consuetudine dissentit Rondeletius, qui, *alleg. loco*, non vult astringentia solum in parte interna, & relaxantia in externa applicari, sed ea intus & extrà adhibet. Cuius eni-

partes laxæ sint, non amplius esse laxandas censet, cum defluit materia, sed cum consistit fluxio, ut materia ad exteriora trahatur. In principio verò astringentia extrâ etiam apponit in lateribus arteriæ sub maxilla inferiore. Quod in seipso expertum esse scribit, & anginam & defluxionem ad fauces prohibuisse, & multos à serophulis incipientibus sanasse. Verùm omnino hæc cautio opus est, & videndum, quæ materiæ affluentis sit copia. Si enim corpus adhuc plenum sit & affluxus magnus, nulli author fuerim, ut repellentia extrâ apponatur: cum facile fieri possit, ut materia ad interiora repulsâ periculosam anginam excitet. Sempërque tutius materia ad exteriora, quàm interiora fertur.

Possit repellentia pituitaræ succus gargarisetur, in quo decoctæ sunt passulæ vel iuiubæ, aut sursur, decoctio, aut decoctum glycyrrhizæ, sicum & hyssopi. Lac tepidum gargarisatum acrum collutionum mordacitatem temperat.

Extrâ etiam insinatur gutturo oleo amygdalarum dulcium, liliorum alborum, chamæmeli, aut fomento cum spongia ex decocto chamæmeli, meliloti, althææ, malvæ, scabiosæ, sem. lini, fœnigræci: aut cataplasma exisdem paratum cum farina hordei, sem. lini, fœnigræci, althææ, hordei, ol. chamæmel. amygdalar. dulcium, butyro recenti, aut cataplasma ex pane albo & melle apponatur, vel emplastrum de' meliloto. Soluetur ita tumor, & quod reliquum est, discutietur.

Post cataplasma, de quo dictum ablatio nem, partes circumposita-

na molli oleo nardino irrigata, ne partibus illis refrigeratis materia introcedat.

Interdum materia spontè suam materiam ad externa conuertit, natis utrimque in collo infra aures tumoribus, vel spontè, vel scalpello apertis pus effluit, atque ita consillæ abscessu liberantur, sicut & in angina fieri consuevit, teste Hippocrate, 6. aphor. 37.

Sitonsillæ inflammatae in abscessum tendant, quod deprehenditur augescente inflammatione & exacerbationibus circa vesperam fortioribus factis cum horrore & inæqualitate, nonnunquam & cum febre, ut docet Aëtius: tunc suppuratione sine mora adiuvetur gargarismis ex aqua mulsa calente, decocto caticarum & hyssopo cum glycyrrh. vel decocto caticarum in lacte, vel decocto passular. vel iuiubar. cum viol. & malua.

Vel ℞. *Farina triticea in petia ligata* ʒ. j. *Caricar.* ʒ. iij. *radic. malva.* ʒ. j. *℞. aqu. communis* lb. ij. Coqu. ad consumptionem quintæ partis. Deinde colentur. Fiat gargarismus.

Foris cataplasma applicetur ex farina hordei, tritice. & fœnigræci. cum decocto ea caricis, rad. althææ, & melle, vel emplastrum diachylon.

Vt ℞. *Fol. malva, rosular. an.* m. j. Coqu. ad molliem, & per setaceum traiciantur. Adde *farina triticea* ʒ. j. *℞. croci* ʒ. b. *butyris. sale. q. s.* F. cataplasma.

Celsus vaporem aquæ calentis ore excipere iubet. Coniecto pure, quod ex dolore & tumore remittente cognoscitur, abscessus collutionibus acrioribus rumpatur, ex

hyssopo, pulegio, thymo, calamintha in sapa aut mulla coctis & gargarizatis, aut ferro aperiatur eo modo, quem Aërius, *tetrab.* 2. *serm.* 2. *cap.* 45. & Pulus, *lib.* 6. *cap.* 30. tradant, aut deuoratis maioribus frustis panis. Rupto abscessu aqua mulla gargarizetur primum per se, postea admixta lenticula & rosis, vel plantagine, quibus immorandum est, donec vlcus ad cicatricem perducatur.

Si ex longo valde refrigerantium & repellentium vsu, vel alijs etiam tonsillæ indurescant, quod fieri solet non præmissa phlebotomia, vel purgatione, ante topica gargarisini emollientes & resoluentes conueniunt, vt.

℞. Rad. alibæ mund. lilior. alb. an. ʒ. β. fol. violar. malua, an. m. j. scabiosæ. prunell. an. m. β. extremit. sambuc. ʒ. ij. bord. P. j. ficus. N. iij. sem. fenigræc. malua, an. ʒ. j. nidihurund. ʒ. β. Coq. in f. q. aqu. adendo in fine. sem. cydon. lini, an. ʒ. β. aq. scabiosæ, caprisol. an. ʒ. ii. pro lb. ij. Colaturæ adde mell. rosar. colat. ʒ. iij. diamor. ʒ. j. Misce pro gargarismo.

Si tonsillæ induratz deglutitionem & respirationem impediunt, medicamentis emolliiri nequeant, Celsus & Paulus ad Chirurgiam accedunt, tonsillæque extrahere conantur. Sed Chirurgia hæc neque facilis est, neque ruita. Qua dere videtur Hieron. Fabric. ab Aquapendente, *de operationibus Chirurg. titulu de tonsillis.*

Ad nomas siue serpentina vlcera tonsillarum, præmissa venæ sectione, corporis euacuatione & diuersionibus, conuenit diamorum ex aqua mulla, insperso puluere flor.

ros. rubr. vel sumach. Paulus succum exprimit ex malo punico dulci cum cortice catulo, cuius partes æquales sex misceat cum vna parte mellis, & ad mellis spissitudinem cocta illinit. Vrtilis est & hic gargarismus suprâ propositus, cuius hæcenus aliquoties facta est mentio Possunt etiam aristolochia & iris & chalcitis adhiberi cum melle, aliquando & Andronis & Musæ pathilli. Muiabiliter Aëtio crustas aufert stercus caninum cum melle illitum, & vstarum hirudinum cinis cum melle, & centaurij minor. cinis cum melle.

Expertum quoque in vlceribus tonsillarum nialignis linimentum ex cineribus centaurij minoris, & ex puluere stercoris canini, si cum melle ad iustam spissitudinem misceantur. Addi potest aliquid de puluere radices iridis. Vide Galenum, 10. *de simpl. med. facult. cap. de stercore canino.* Tabernæmonranus commendat tanquam experimentum, decoctum radic. morsus diaboli.

Omnia autem oris vlcera vehementioribus exsiccantibus & astringentibus gaudent, quam externa vlcera, cum ne amplius serpent, tùm quia semper à salua sunt humidiora, vnde & medicamentorum vis infringitur.

Post irritationes ab acrioribus hisce medicamentis factas gargarizetur decoctum glycyrrhizæ; quod paratur ex vino nigro dulci, ex mastiche, myrrha, croco, deinde etiam addito amylo, & tragacantha. Cohibito iam vlcere depascente, laeo gargarizandum cum terra Samiâ mixtum. Crustis sublati & purgato vlcere hoc conuenit.

℞. Flor. ros. rubr. ʒ. β. croc. ʒ. iij. ba. laust. myrrh. an. ʒ. j. nuc. pineat. ʒ. j.

Tritis & subactis cum melle veteri ad illitionem. Progressu temporis addi possunt, *amygd. ij. alumin. fissil. ʒ. j.* Vide plura huius generis apud Aetium, loco citato capite 46.

Dieta.

Abstinendum ad acibus, à fumo, à Solis æstu, à vino, ab exercitio & motu corporis, atque animi nimio, præsertim ab ira, balneo, & omnibus, quæ affluxum humorum augere possunt.

CAPVT XXIII.

De iis, quæ in guttur vel gulam incidunt, eximendis.

Illorum, quæ in gulam inciderunt, eximit.

Accidit nonnunquam, ut siue dormientibus siue vigilantibus etiam per incuriam aliquid in guttur vel fauces illabatur, quod suffocationis metum & alia pericula afferat. Quæ res qua ratione eximendæ sint, dictum quidem in Institut. lib. 3. part. 1. sect. 2. cap. 10. Addere tamen quædam libet.

Sunt autem, quæ in guttur vel fauces incidunt, alia animata, alia inanimata. Ex animatorum genere sunt primùm hircines, quæ vel natationem in stagnis, ore imprudenter excipiuntur, vel vna cum aquis minutissimæ ipsæ adhuc hauriuntur, & faucibus vel gulæ affixæ attracto sanguine grandescunt. Adhærent verò vel palato versus superiorem vasi partem, & cum sanguis sine screatu egreditur, vel gutturi, ubi sanguis cum screatu exermittitur: & quidem si in initio sit trachææ, tussis continenter affligit;

vel gulæ, & tum deglutitio impeditur, vomitusque concitatur: vel denique ipsi ventriculo sunt affixæ, atque tunc nullum impedimentum in deglutitione sentitur, adest verò vomitus, cum quo sanguis reicitur.

Hircinum nonnullæ venenatæ sunt, quæ & grauiora symptomata accerunt, ut syncopen, tremorem cordis, febrem acutam, & vlcera deniq; maligna. Agnoscuntur quod magna habent capita, corpore sunt lanuginoso, colore nigræ aut virides, maculis, vel lineis variis distinctæ, quemadmodum eas describit Auicenna, 1. canon. sen 4. doct. 3. capite 22.

Vbi cumque verò hircio ore concepta hæret, titillationis sensum obscuro suo motu efficit, punctio quoque sentitur, dum sanguinem ligat, & sanguis ex ore tenuis ac paucus per interualla exspuitur, quoniam ab exilibus seu capillaribus venis hircio sanguinem allicit. De quo Hippocrates, 2. prædict. Quibus sanies sanguinis frequenter & noctu & interdum repleatur, cum neque capitis dolor progressus fuerit, neque tussis, neque vomitus, neque febris præbenderit, neque pectoris aut dorsii dolor tenuerit, in hircinæ & sanies inspiciende, num quid vlcus in eo loco an hircio comparet.

Quando igitur hircio in ore ita hæret, ut oculis conspici queat: Chirurgus eam idoneo instrumento apprehendat, & caput eius fortiter stringat: ne si medio fortè corpore præcindatur, pars eius anterior cum capite intus affixa remaneat.

Vbi verò hircio profundius latet, ut chirurgiæ locus non sit, medicamentis res peragenda erit. Ilaque

Itaque Rhaſes gargarifmos præcipit ex acerbis & amaris, quibus offenſa hitudo ſponte ſeſe retrahat, vel quibus enectetur, qualia ſunt ſinapi cum aceto gargarifata, aut ſal cum aceto, aut cepæ ſuccus. A proprietate valere creditur ſuccus ſalicis. Iubent & nigellam ac ſinapitritum gutturi inſuſſilare. Enecant etiam abſinthium, abrotanum, lupini, menthaſtrum, naſturtium, ſem. ſanctum, aloë, hiera, agaricus.

Amotam vel enecatam hiru-
dinem æger ſciteatu, tuſſi, vel vomitu
reiicere conabitur. Si eduſta hiru-
dine exſpuitio ſanguinis perſeueret,
venulis adhuc hiantibus, vnde hi-
rudo ſuxit, non ſtatim ille ſuppri-
mendus eſt ſed permittendus, mo-
nente Auicenna, vt moderatè ef-
fluat, ne retentus venenoſitate ſua,
quam ab hiru-
dine contraxit, no-
ceat. Eadem quoque venenoſitas
corrigatur exhibita theriaca aut mi-
thridatio, aut terra ſigillata cum Ze-
doario, diſſoluto, tormentilla &
ſimilibus.

Postea ſiſtatur ſanguis gargarif-
mis ex d. coctione cortic. mali gra-
natis, balaustiorum, & ſumach, vel
pulvere inſuſſilato ex balaustijs, thu-
re, ſangu. draconis, amylo.

Quod ſi hiru-
do ſtomacho inhæ-
reat, medicamenta Rhaſes exhibet,
quibus vermes enecantur & eiiciun-
tur, ægrum in balneum ſiccum,
ſive Laconicum ducit, vbi ſiti vehe-
menti contracta, poſtea aquam fri-
gidiffimam eger ore contineat, ſem-
per eam permutando, ſi incaluerit
vt hiru-
do aſtu etiam afflicta, pro-
repat in os ad reſciendum ſeſe frigi-
da, qua alioquin naturaliter dele-
ſcatur. Probat. & hoc.

℞. Farin. lupinor. pul. turbitib.

agarici, ſem. nigell. an. ʒ. ii. Incor-
porentur cum ſucco abſinthij &
hanc trochiſci pondere ʒ. j. ablua-
tūrque vlcus in decoctione ſem.
nigellæ, detūrque vnus ieiuno iſto-
macho.

Interdum animalia alia dormien-
tibus in os irrepunt, quod de lacer-
tis ac ſerpentibus comportum eſt.
Hæc eodè modo in balneo ſiccum cum
aqua frigida ore recenta projiciatur,
aut appoſita ad os ægri vaſe lactis ca-
lentis pleno, cuius nudeſcit etiam
vexatum animal prorepat; præſertim
ſi vaſ illud ita diſpoſitum ſit, vt (plen-
dentis ſolis radios excipiat. Oportet
autem ægrum pronocapite in ven-
trem incumbere. Quidam & aſſatim
hoc bibere iubent ad vomitum vs-
que: vt ſimul cum lacte animal red-
ditum quod ingreſſum eſt, excu-
tatur.

Inanimata, quæ vel caſu vel ſpontè
deglutita in gutture aut gula ſub-
ſiſtunt, ſive mole ſua in hærentia,
vt bolus panis, vel carnis non ma-
ſticatus, annulus, moneta grandior,
nucleus pruni: ſive acumine ſuo ſe
inſigentia, vt fragmenta vitæ, acus
ſpina piſcis, os acutum, & ſimilia,
ſuos etiam modos habent, quibus
eximantur.

Et quidem ſi craſſum quid deglu-
titum inhæreat, niſi immiſſo idoneo
inſtrumento apprehendi & eximi
queat, ægri ceruix aliquoties pugno
concutiatur, ita vt depreſſa illam
teneat humoruſque eleuatus, qua
concuſſione res in gula hærens ad
ventriculū delabatur; aut ſi propè
fauces hæreat, tuſſi per os reiſcia-
tur. Iuſcula etiam carniū pingui-
a, vel cum butyro parata liberaliter
& aſſatim hauriantur; vel piſſana
cum mellè aut oleo amygdalarum

dulcium, vt lubrica reddita gula, facilius, quod illapsum est, in ventriculum descendat, aut vt vomitus saltem istis singulis prouocetur. Rhases quoque agrum in balneum aquæ tepidæ se dimittere iubet vsque ad mentum, vt viæ in gula emollias vtitur, quodque *centur. 1. obseru. 36.* delineauit.

Si his nihil proficitur, candela cerca mediocriter crassa, vel stylus plumbeus nonnihil incuruatus sumi potest, quo melle vel oleo oblitio & in gulam demisso res ibi subsistens in ventriculum detrudatur.

Si acutum est, quod infixum hæret, neque oculis ita patet, vt forcipe præhendi possit, tussis excitanda, oxymel continuò lambendo, aut stemutatio quoque si locus affectus proprius sit trachææ artetiz, vel ipsa etiam sit trachea. Vehementi enim hac corporis concussione, spiritus simul expulsiōnem adiuuante, res obhærens excludetur.

Si obiecta est gula, aqua mulsæ crebrò gargarisetur, oleum etiam & pingues sorbitiones & albumina ouorum cruda & lubricantia alia bibantur.

Vtilis est & continuus vsus eclegmatum emollientium, vt quod paratur ex mucilagine, semine maluæ radic. althææ, ficibus, passulis, iuiubis, sebesten & similibus cum syrupo violarum. Tandem magni boli deglutiantur, vel ficis siccæ integræ, quo impetu id, quod subsistit, in ventriculum simul detrudatur.

Quod si his modis nihil perficitur, Rhases instrumentum commendat ex plumbo factum, quod foraminulis multis exilibus pertusum est instar retis, quorum vsus est, vt dum instrumentum vertitur

retrahiturque, res gulæ infixæ illis foraminulis implicetur, simulque educatur, & vt respiratio per illa non impediatur. Quem imitatus est procul dubio Guil. Fabricius in fabrica sui instrumenti, quo ad res gulæ & faucibus infixas extrahendas vtitur, quodque *centur. 1. obseru. 36.* delineauit. Qui etiam videatur eadem *cent. obseru. 31. 32. 33. 34. 35.*

Si nec hoc modo suo loco moueri res immixta possit, naturæ & tempori negotium totum committendum. Progressu enim temporis calor naturalis coquendo & alterando rem illam mutat (si eius naturæ talis sit) & imminuit. Et vt maturius id fiat, natura in coctione adiuuanda medicamento ex radicibus althææ, ficibus, farina sem. lini, frængræci, hordei, aut mucilagine ex istis paratis, flor. cassiæ, butyro, oleo amygdalar. dulc. chamæmeli, lilior. albor. pingued. gall. & similibus.

Quod & faciendum, si ossiculum, vel simile quid inflammationem in œsophago excitet. Hac enim ad suppurationem perductâ & abscessu rupto æger ab angustia & dolore liberatur. Exenplum de spina gulæ infixæ habet Dodonæus, *in obseru. cap. 17.*

Compertum est ab Arculano, ossiculum acutum gulæ infixum post bimestre spatium per cutem in collo aperta spontè via exiisse. Beniuēniū deuoratâ acum decēniō post perforato stomacho extrusam vidit. De acubus cum vrina emissis meminit Iohan. Langius, *lib. 2. Epist. 40.* De acicula per aluum cum grauissimis symptomatibus deiecta videtur Guil. Fabricius, *allegata centuria 1. obseru. 34.* Quod si tale quid na-

turam moliri videmus, ne ventriculus vel intestina lædantur, exhibendus cremor hordei, iuscula pinguis, lac amygdalarum dulcium, oleum amygd. dulcium, cassia.

CAPVT XXIV.

De Angina.

A Ngina Latinis ab angendo, quæ vox à Græco ἀγγν, id est, suffoco, & strangulo deducitur; Græcis ἀνίαν & κνίαν, & masculina terminatione, Hippocr. lib. de loc. in homine, & 4. de rat. viſſ. in acut. aph. 30. usurpatur ἀνίαν & κνίαν, eodem etymo, à suffocando scilicet, dicitur. Etsi enim, ut postea in differentijs dicitur, posteriores Græci inter Grætas voces dum per α ἀνίαν & per κ κνίαν, scribitur, differentiam quadam constituerint, & ἀνίαν, quam à canibus ita appellari censent, seu quod canibus familiaris sit, seu quod ægri hiantes ore, & exerta lingua spiritum ducere cogantur, canum per æstum sitientium more, pro grauiori affectu habeant; ἀνίαν, verò, quam dictam putant, quod sitis ea frequenter corripiantur, pro leniore malo; tamen Galenus 3. prognost. text. 18. hanc de literis contentionem tanquam inutilem contemnit, quod & 4. de viſſ. rat. in acutis, text. 30. facit.

Etenim & ἀνίαν & κνίαν, apud Hippocratem, & antiquissimos Medicos Græcos generale nomen est, quale apud Latinos angina, quod in genere sumptum, omnem faucium & gutturis affectionem,

spirationem nullo in thorace vel pulmone vitio existente, difficiliorrem reddentem, & deglutionem impediendam, seu meatuum, per quos spiritum attrahimus, cibumque & potum assumimus, angustiam, spiritum difficilem reddentem, & deglutionem impediendam significat. Etsi enim per morbos thoracis, pleuritidem, peripneumoniā & alios respiratio lædatur, tamen affectus ille angina non dicitur, cum illæst faucibus fiat. Hippocrat. tamen interdum distinguit inter faucium inflammationem & anginam. Ita 6. epid. sect. 8. r. 1. inquit. *Quibusdam verò faucium inflammationes aderant, alijs angina.* Vbi procul dubio anginam intelligit inflammationem musculorum laryngis, quæ respirationem difficilem valde reddit & viam spiritus intercludit inflammationem verò faucium, partium aliarum vicinarum; quæ spiritus & cibi viam non ita intercludit. Possunt enim & tonsillæ & musculi ossis hyoidis, & musculi in radice linguæ inflammari, ut postea dicitur, quæ partes omnes etiam in faucibus sunt: quia tamen harum partium inflammatio à gutture longius distat, anginam per se non parit. Anginæ ergo in genere ita sumpta causa erit, quicquid spiritus cibique & potus viam angustiorē reddere, & hoc modo vtriusque meatus capite & principio quasi occluso respirationem difficiliorem reddere, & deglutioni cibi ac potus impedimento esse potest, quod cum pluribus de causis fieri possit, duplex angina statuitur, vna propriè dicta & exquisita, quæ est ab inflammatione lumarum gulæ & gutturis partium, sanguine & venarum iugularium ramis in partes illas effuso,

altera notha, quæ provenit à fugida & pituitosa destillatione, è capite in fauces & ceruicis ac colli musculos decumbente, & tumorem *admodum*, sine febre, rubore ac dolore excitante; etsi dum primò fluxio concitatur, quidam inæqualis calor & horror sentitur, qui tamen paulò post desinit.

Possit tamen & illa in faucibus inflammatio, quam Hippocratem ab angina discernere diximus, forsitan angina notha appellari, & ita duplex angina notha constitui, vnâ ratione causæ, altera ratione subiecti. Nam & harum partium inflammatio sepe etiâ respirationem & deglutitionem non parum lædit.

Quò etiâ referri potest angina illa, quæ fit à luxatione vertebrarû ceruicis, versus anteriora vel latus, siue à causis externis, siue ab humore frigido affluente fiat, idque citra inflammationem.

Si enim inflammatio accedat, vel ab inflammatione luxatio ortum habeat, ad exquisitam anginam pertinet, & acutissima angina est, ut postea de differentiis dicetur. Videatur etiâ infra Quæstio.

De Angina exquisita.

Angina
exquisita.

Angina ergo exquisita est angustia summæ gulæ & gutturis partium, seu faucium, ab inflammatione earundem ortum habens, difficilè respirationem reddens, deglutitionemque lædens. Seu est inflammatio in facibus & summo gutture, angustiam earundem partium & hinc difficultatem spirandi inferens, ac deglutitionem impediens. Seu, ut Galenus breuiter definit, 4. de rat. *vid. in acut. text. 20. & 2. ad Glaucon. cap. 1.* est *angustia* & *angustia* *per fauces* *autem* intel-

ligitur pars, quæ gulæ & gutturi præiacet, & duo dictorum meatuum ostiola comprehendit. Imò, ut suprà dictum, *quæ* etiâ pro larynge & summo asperæ arteriæ capite accipitur, ut ita, dum Galenus anginam per inflammationem *quæ* seu faucium desinit, non solum intelligenda sit ea pars, quæ gulæ & gutturi præiacet, sed ipsa etiâ larynx eiusque muscoli. Et quamvis simul vicina complecti soleat inflammatio, ut glandulas vtrinque circa radicem gutturis ad latera trachæ positas, & musculos ossis hyoidis, musculos item in radice lingux, & glandulas, quæ tonsillæ dicuntur, & quæ sub auribus & inferiori maxilla consistunt: tamen partium harum à gutture longius distantium inflammatio anginam non parit, nisi malum faucibus, id est, parti ex gutture & gulâ constitutæ, communicatum respirandi impedimentum afferat.

Dodonæus etiâ anginam statuit ex inflammatione pulmonum fieri, de qua postea in differentiis de cyaniche dicetur.

Causæ.

Ergo causæ ut aliarum inflammationum, ita & huius in angina est sanguis, seu purus, seu biliosus, pituitosus aut melancholicus. Et his quidem è venarum iugularium ramis in has partes effusus. Nam frequentissimè fit hoc malum per viam fluxionis, rarè per viam congestionis.

Affluit autem sanguis vel per modum attractionis, si fauces & guttur vehementer caleant & dolent; vel per modum transmissionis, si loca illa imbecilla sint, laxa, & ad suscipiendum fluxionem idonea;

pleonexia verò humorum adfit siue in toto, siue in capite, ac imprimis circa fauces. Vbi enim sanguis vel copiosus in corpore adest, vel impurus, atque is ad caput fertur, cerebrum verò robustum est, id cum non recipit, sed maximam partem per easdem venas ad subiectas partes retrudit, vnde inflammationes earum variz gignuntur, parotides, ophthalmiz, anginae & similes. Hinc etiam iuuenes senibus angina crebrius corripuntur, quò multo biliosòque sanguine, qui aptissima huius mali materia, abundant, & qui habitus corporis sunt crasso, ac multo sanguine, praesertim in capite, abundant. Viros quoque frequentius quàm foeminas angina corripit, ex Caelio Aurelio statuitur; idque videtur obseruasse Hippocrates, 6. *epidem. sect. 7. tom. 1.* ubi epidemicam sui temporis constitutionem describens, quàm angina, tussis, peripneumoniz vagabantur, paucissimas foeminas aegrotasse scribit. Aliam tamen causam non reddit Hippocrates eo ipso in loco, quàm quod non petinde atque viii in publicum prodibant, & ita aeris externi iniuria sese non obiciebant. Id tamen, quod dicitur, foeminas minùs ex sua natura anginae esse obnoxias, quàm viros, de vera & exquisita angina intelligendum. Habent enim foeminae sanguinem frigidiorè, & praeterea laryngem minorè, ac gutturi partes & venas angustiores exioliòque, sanguinem non ita facillè abiciunt. Interim consillarum, columellae, ac laxarum in faucibus partium inflammationibus, quae minùs exquisitam, seu notham anginam, quam Hippo-

crateni, loco allegato, simpliciter faucium inflammationem appellare, & ab angina distinguere diximus, gignunt, ob partium laxitatem, & excrementitiorum humorum abundantiam magis obnoxiae sunt quàm viri. Ad pleonexiam etiam humorum, quae anginam excitat, cumulandam faciunt haemorrhoides & menses suppressi, victus ratio multo & calido sanguini generando apta, potus vini meracioris.

Saepe quoque angina accidit in febris, ubi materiae pars ad locum depellitur, ut ita febris tum potius comitata sit, quam appellatur, quàm symptomatice; talesque anginae sunt serè epidemicae, quae nonnunquam publicè grassantur, qualis fuit illa, quae anno 1517. multos sustulit, ut annotauit Forestus, lib. 6. *obsen.* 2. atque illa, quae anno 1544. & 1545. plurima Germaniae inferioris loca Rhenique accolae vexauit. Sunt enim quaidoque etiam anginae, ut pleuritides, peripneumoniz & similes morbi epidemicae. Nam etsi humores qui morbos epidemicos excitant, praecipuè si non pestilentes sint, & imprimis à fluxionibus prouementes, à manifestis aeris alterationibus, frigiditatibusque & caliditatis ac humiditatis excessu proueniant: tamen occultae etiam qualitates ab aëtorum influxu pendentes miscentur. Atque hinc accidit, nunc ad laryngem, & fauces, ut nunc ad pleuram, nunc ad pulmones humores fluant, ibique subsistant, nunc ad alium perueniant.

Externae, causae sunt, quaecunque fluxiones humorum ad istas partes

concitare valent, quales sunt plu-
uioſa anni conſtitutio & imbres affi-
dui, vt eſt 3. *Aphor.* 16. *Aphor.*
item quæcunque caloris & frigidi-
tatis in aëre & ventorum ſtatibus,
quorum hæc comprimens expellit
humores ad guttur & fauces, illa
laxando facit, vt humores ad fau-
ces aſſuant. Præterea ſubita à ma-
gno aſtu refrigeratio, hauſtus plu-
nus potus frigidiſſimi, lotio capitis
intempeſtiua pleno corpore, nimia
capitis teſtura vel nulla, vocis ni-
mia intentio, denique ſectus capitis,
cervicis aut locorum prope fauces,
infixæ in faucibus, vel gula ſpinæ
vel oſſicula, vt & vertebrarum cer-
uicis luxatio, ſi nimirum non ſo-
lùm ipſa anguſtiam in locis iſtis pa-
riat, ſed & inflammationē excitet.

Quidam etiam à cibis quibuſdam
& medicamentis peculiari vi & pro-
prietate anginam induci ſtatuant,
vt cereſis, fungis quibuſdam, an-
dacoſia, vt habet Auicennas,
quæ trifolij ſpecies eſt, quæ ſcilicet
in ſe vel vinũ ſuſcoſandi, vel qua-
ritatem aliquam laryngi & faucibus
oculto modo aduerſam habent,
eas quæ ſanguini inflammationem
excitaturò ſuſcipiendo aptas reddūt,
aut quocunque modo has partes
vellicant & offendunt, & ſanguini
ad eas aſſuxi occaſionem præ-
bent: ſicut cantharides veſicæ pecu-
liari modo aduerſæ ſunt. Verũ de
hoc dicitur infra, *quæſt.* 2. Non-
nulli hæc etiam referunt eam ſuſſo-
cationem, cuius Areæus, *lib.* 1. *paſ-*
ſion. acut. c. 7. memini, quæ accidat
ex ſpiritus ad calidiſſimum & ſiccifi-
ſimum conuerſione, quod aliqui
de aëre illo craſſo, qui è carbonibus
recentibus & multo ac cereuiſia fer-
mente attollitur, explicant. Verũ

vt poſtea in *quæſtione* 1. dicitur,
non loquitur Areæus de cauſa ex-
trinſeca adueniente, ſed intrinſe-
cus hærente, vbi vitium præcipuè
eſt in pectore. Non tamen iſta ſuſ-
focatio huc pertinet, ſed ad reſpi-
rationem læſam, vt poſtea dicitur.
Neque enim omnis ſuffocatio an-
gina dicenda eſt; aliàs enim & ca-
tarthi ſuffocatiui ad anginam redu-
cendi eſſent, ſed ea ſaltem, vbi nul-
lo in pectore vitio exiſtente (quod
tamen in ſuffocatione illa ab Are-
æo deſcripta accidit) ob faucium
inflammationem ſuffocationis pe-
riculum imminet. Vnde nec ardor
in faucibus ardentibus peſcipitur, &
vulgò *die Brenne* nominatur, cum
ſcilicet fauces & lingua exſiccantur,
exaſperantur & demigrantur, angina
nominandus eſt.

Differencia.

Differentias anginae quatuor recē-
tiores Græci vt ex Galeno, 4. *de*
loc. affect. cap. 3. & Paulo Aegineta,
lib. 7. cap. 2. & Tralliano, *lib.* 4.
cap. 1. videre eſt, recenſent. Inflam-
mantur enim ſeu *φάρυγξ*, id eſt gulæ
muſculi; ſeu laryngus, id eſt, gut-
turis ſeu capitis trachæ arteriæ:
ſæpè etiam, quæ utramque hanc
partem connectunt. Has ergo diffe-
rentias vt recentiores Græci etiam
vocalibus diſtinguerent, generica
illa vocabula *φάρυγξ*, & *κωάτης*,
cũ aliàs ſpecierum nominibus de-
ſtinuerentur, certis differentiis ac-
commodauerunt.

Prima differentia nomine gen-
eris *κωάτης*, ita dicta, vt authoribus
placet, quod ſuibus ſit familiaris
(quæ tamen differentia linguæ Græ-
cæ analogiæ non reſpondet, idè quæ
potius à propoſitione *κω* & *άτης* no-
men hoc deductum videtur) nomi-

Differen-
tiæ.

natur, vbi interni faucium musculi vel ambitus faucium interior inflammatur, ceruice quoque ad linguæ radicem simul comprehensa: & tumore foris ac intus apparente.

Secunda *απ' αὐτῆς*, vbi externi faucium & colli musculi linguam & os hyoides contingentes, & qui œsophagum firmant ac retrahunt, sunt inflammati, tumore sese nonnumquam etiam ad pectus diffundente.

Tertia *αὐτῆς*, ita dicta, quod canes eâ frequenter corripiantur, aut quod homines eâ laborantes veluti canes sitibundi linguam exerant, cum inflammatio in internis laryngis seu gutturis musculis delitescit, & neque intus, neque foris in ceruice tumor appareret, vnde etiam latens angina appellatur, tantusque est dolor, & spirandi difficultas tanta, vt æger erecta ceruice & ore hianti, ac linguâ exercitâ, canum sitientium more, spiritum trahere cogatur.

Cuius generis & illa est angina, quam describit Galenus, 4. *apbor.* 33. cum, inquit, nullo neque ore multum aperto in faucibus, neque extrinsecus tumore apparente æger deglutire non potest. Symptoma n. perniciosum est ob inflammationem musculorum gulæ substratorum, interdum verò gulæ ipsius morbum. Est enim partibus illis per nervos & ligamenta commune quid & societas cum spinali medulla & membranis ipsum ambiens, ac postea huc extrinsecus adiacentibus vertebrarum ossibus. Cum itaque ad partes inflammatas ligamenta & nervi tenduntur, vertebras quoque vel intus, vel ad latus trahi necesse est. Nam si in alio tantum nervorum exortu ten-

sionem fieri contigerit, ad latus: si vtroque, intus fiet vertebrarum distorsio.

Hoc loco facienda est mentio anginæ, quam describit Remb. Dodonæus, *cap.* 18. quam etiam latentem appellat, in qua circa laryngem & asperam artemam talis dolor sit, vt nec contingi, quantumcûmque leniter, citra gravissimum dolorem queant, sed nec moveri sursum, nec attolli. Quamobrem non spiritus tantum cum difficultate trahitur, sed & cibus & potus æger trahit, aut non dimittitur. Inflammari autem statuit Dodonæus per huiusmodi anginam non interiores ac latentes laryngis musculos (id quod sectione deprehendisse scribit) sed pulmoneum.

Verum enim verò nulla est angina propriè dicta sine musculorum circa laryngem inflammationem. Itaque morbus, quem describit, vel non fuit angina, sed peripneumonia, quæ tamen ob communem membranam laryngem & vicinas partes in consensum trahit, vnde respiratio & deglutitio fuit læsa; vel fuit angina, quæ tamen subito in peripneumoniam gravissimam mutata est.

Quarta est *απ' αὐτῆς*, vbi externi præcipuè gutturis musculi inflammantur; tumor tamen intus manifestè conspicitur, ore deducto & lingua depressa. Et cum hæc quarta differentia, nisi medicamentis occurratur, facile in *αὐτῆς* degeneret, & si affectus augeatur, etiam interni tandem musculi inflammantur, Galenus, 4. *de lat. affect.* *cap.* 3. in differentia tamen externæ quàm internæ gutturis partes affici scribit.

Verùm istam accuratiorẽ nominiũ distinctionẽ à posterioribus Græcis introductam Galenus, loco modo allegato 3. prognost. aph. 58. non magnificat, cùm omnis angina sit faucium, id est, partis ex gutture & gula constitutæ, inflammatio: & Hippocrates vno *αἰσθησι*, nomine omnes istas differentias complexus est. Non prætereundum tamen, Hippocratem, lib. 3. de morbis, etiam in nominibus quandam differentiam nobis servare, & duas anginarum species ponere: *αἰσθησι*, quæ sit angina gravissima, & *μικρὴ αἰσθησι*, quæ mitior sit.

Præter enumeratas istas quatuor anginarum differentias Galenus, 4. de loc. affect. c. 3. addit quintam ex 2. epid. sect. 2. ex luxatione vertebrarum cervicis, quæ tamen potius ad anginam notham referenda est, nisi inflammatio ipsi coniungantur. Fit autem, ubi cervicis vertebrae ad anteriora laxatae fauces comprimuntur, cauo ponẽ in ceruice apparente. Quod accidit vel à causis externis, ictu, casu, vel ab affluxu humoris pituitosi vincula vertebrarum laxantis, & vertebrarum internodia lubrica reddentis, aut copia sua vertebrae sede sua deficientis, vel à vicinis musculis inflammatis, quibus vertebrae ad anteriora trahuntur. Atque ubi anginae coniungitur inflammatio, vera angina est, dolorque etiam fortis ad contactum in ceruice sentitur. Vide Hippocrat. 2. epid. sect. & Galenum, 4. de locis affect. cap. 3.

Aëtius, qui quatuor illas differentias in tres contrahit, hanc vertebrarum ad anteriora laxationem quartam numerat, eamque propriè *αἰσθησι*, à veteribus appella-

tam, aut quoniam lingua à luxata vertebra luxta radicem suam à proprio loco de pulsa æger hinc ore ac exertat linguam spicuum ducere cogitur, eanum per æstum sitientium more.

Sunt & aliæ quædam anginarum differentiarum, quod scilicet inflammatio alia maior, alia minor est; unde etiam magis vel minus periculum expectandum: & quod alia est à sanguine puro, alia à sanguine cum aliis humoribus mixto: ut & quædam epidemia est & maligna, alia malignitatis expes.

Signa Diagnostica.

Signa.

Anginam ex quiete exiis, quæ hactenus dicta sunt, cognoscere non ita difficile est. Verùm cùm sit morbus periculosus & peracutus, qui celeris motu sæpe omnem Medicum diligentiam superat, vtile est, etiam imminenti signa cognoscere, ut omni modo eius incrementum præcaueatur.

Si quis ergo sine manifesta causa collum vix mouere & vix deglutire potest, ac difficulter spirare incipit, & dolorem ac calorem insuetum circa fauces percipit, anginam imminere suspicio est, præsertim si tempus verum & pluviosum ac humidum sit, aut angina aliàs populariter grassetur.

Præsentem autem angina, in quacunque etiam parte sit, adsunt imprimis duo: primum difficilis respiratio citra aliquod thoracis ac pulmonis vitium, ita ut sæpe & suffocationis periculum imminet. Unde Plautus in Mostellaria, act. 1. 3. vers. 61.

In anginam ego nunc me velim verti, ut venissee illi Fauces præbandam & exocem.

Deinde

Deinde deglutitio difficilis, adeo
vt nonnulli potus per nares resiliat.
Neque enim deglutitio solum œso-
phagi ministerio perficitur, sed
etiam musculi duo à larynge exorti,
œsophagici dicti ac circulatores,
quod suis fibris transuersis semicir-
culum imitantes œsophagum com-
plectantur, cibi & potus deglutiti-
onem atque ad inferiora detractionem
adiuvant, dum laryngem degluti-
tionis tempore sursum trahunt, vt
descendenti cibo locum concedat:
præterea etiam musculi faucium,
dum ad suum principium contra-
hantur, cibum ad œsophagum de-
trudunt. Hi ergo musculi cum in
angina afficiantur, non mirum est
deglutitionem lædi. Postea dolor
circa guttur & fauces percipitur,
rubor item & calor, plerumque &
tumor, febris adest continua. Lin-
gua ipsa intus tumet & rubet, &
quodammodo coarctata est, vnde
etiam eius motus impeditur.

Et si enim in angina notha, quæ
fit ab humore pituitoso fauces oc-
cupante, febris non semper adest;
in angina tamen exquisita febris
continua semper adest, seu vt
symptomata ex inflammatione ge-
nerentur, seu sit primario, cui angina
accedit.

Differentiæ quoque non difficul-
ter patentiunt. In synanche est minor
respirationis difficultas, deglutiti-
onis verò maxima, vt etiam liquida
vix transire possint, sed potus sæpè
per nares reiciatur. In parasynan-
che inter omnes differentias respi-
rationis difficultas minima est, &
rubedo foris in cervice conspicitur,
dolorque percipitur, si locus
contractetur: cum inflammatio fo-
ras vergat. Interdum etiam pe-

rius rubet, quia ibi prorepunt duo
musculi ad cartilaginem scutiformem.
In cynanche verò neque in
faucibus intus, neque extra in cer-
uice quicquam ruboris vel tumoris
apparet, & tamen fauces vehemen-
ter interdum dolent cum metu stran-
gulationis, ita vt æger erecta cer-
uice & aperto ore spirare cogatur;
lingua est liuida & nigra, & vt scri-
bit Hippocrates, 4. de rat. viul.
in acut. inflexa vel reorta, ob sum-
mam venarum circa linguam reple-
tionem, adest quoque febris acuta.
Seu vt Hippocrates 3. de morb.
describit: ex angina dicta homo suf-
focatur, & fauces magis occupare
videtur, vt neque saluam, neque
aliud quicquam deorsum trahat,
oculi affecti sunt, & veluti ijs, qui
strangulantur, prominenti & per
eos contentè intuetur, neque eos
convertere potest, crebris se iactat
& exilit, fauces & facies incen-
duntur, ac etiam collum. His ve-
rò, qui intuentur, nihil mali ha-
bere videtur, & visus atque audi-
tus hebescit, nihilque præ suffo-
catione intelligit, neque quid di-
cat, aut audiat, aut faciat, sed iacet
ore hiante saluam effundens. In
paracynanche respiratio non est tam
difficilis, nec dolor tantus, & ru-
bor ac tumor aliquis intus circa
fauces deprehenditur. Si ex luxa-
tione sit angina, plerumque id ac-
cidit à causis euidentibus & violenti-
a. Postea etsi sit ab inflamma-
tione & affluxu humorum, depre-
henditur ex inspectione ceruicis.
Cervix enim circa primam & se-
cundam vertebra, excauat ob
depressam vertebra, & difficilis
redditur respiratio ob angustiam fau-
cium ex compressione. Videatur

etiā hippocrat. 2. epid. sect. 2. ubi incipit : *ἡ δὲ τῶν ὑδαρῶν καὶ ἀνδρομαχῶν ἡ δὲ*, &c. Egregiè enim & prolixè eo loco describit Hippocr. earū angina speciem, quæ ex vertebra rum cœli *καρδίας ἐκκρίσις*, inclinatione & perturbatione oritur: quem locum propterea Gal. 1. 3. de loc. aff. c. 5. dignum iudicauit, ut commentatio cum explicaret. Videatur etiā libro secundo Protrēt. commentario secundo.

Signa causarum & humorum ex aliis locis patent. Sanguis abundans ex habitu corporis aliisque signis cognoscitur, adest n̄ aut distensio, calor faciei est rubicundus, facièsque ruborem & calorem habet insignem. Si adit bilis, ardor & dolor maior est cum siti, oris amaritudo, & morsus circa guttur. Si ex pituitoso sanguine fit, dolor minor est, febris exigua, tumor citra insignem ruborem. Et ut Galenus, 4. aphor. 34. & 4. de rat. viſſ. in acut. 1. 30 docet sanguis biliolus plerumque laryngis prius mulculis quā faucium, seu gulæ inflammationem parit, sicuti pituitolus sanguis potius facium seu gulæ inflammationem, & glandularum, quā laryngis excitat. Cū enim laryngis venæ sint exiles, in eas rari n̄ sanguis tenuis penetrat; crassius verò, qui eas penetrare non potest, in faucibus potius & glandibus subsistit. Angina etiā bilioſa maximè æstate & autumno proueniunt: quod in æstate bilis generatur & in autumno retinetur, quæ æstate genita est. At pituitosa ferè fit ex pituita hyeme genita.

Prognostica s̄

1. Angina teste Galeno, 1. aph. 12.

& 2. aphor. 19. Tralliano, lib. 4. c. 1. Celſo, lib. 4. cap. 4. pestiferū acutumque malum est, quod celeriter ad finem properat, ac periculo non caret, ægròque laquei modo strangulat & suffocat. Etsi enim pars absolute princeps non afficiatur: ea tamen pars afficitur, sine qua cor, membrum nobilissimum saluum esse non potest; quæ scilicet destinata est respirationi, & simul deglutitioni inservit, quorum neutro homo carere potest. Adest simul febris continua, quæ & cordis & ipsius corporis vires labefaciat, idèoque Galenus, 1. aph. 12. hoc modo laborantibus salutis spem in virium robore consistere scribit. Et suffocatur plerūque æger, vel quia tumor eò vigue creuit, vel tāta facta est vertebra rum colli luxatio: ut faucibus coarctatus spiritus planè percipiat, vel quia rupto tumore pus in pulmones ruit còsque implet.

2. Et quidem quo maior est faucium & gutturis angustia, eò periculosior est angina, præsertim si febris & ipsa sit acuta. Atque ita *καὶ ἂν* à posterioribus Græcis in specie descripta omnium periculosissima est & grauiſſima, quæ intra vnam diem plerumque intra 4. iugulat, de quo Hippocrates, 1. aphor. 34. *Si febrem habentis suffocatio repente superueniat, nullo tumore in faucibus existit lethale est.* Et 3. progn. 16. & in Coac. *Angina grauiſſima sunt & celeriter intereunt, quæcumque nihil conspiciunt, faciunt in faucibus neque ceruice, plurimum verò dolorem inferunt, atque oribopnā.* Hac enim in eodem die, & secunda, tertia, & quarta strangulant. Neque enim tum paruitas mali significatur, quod nihil conspici seſe prodit, sed quia magnus dolor adest, & summa

respirandi difficultas, significatur tumorem in internis gutturis partibus hære, ibique conclusum spiritui aditum præcludere, atque ita subito strangulare. Aliàs si respiratio & deglutitio nõ valde lædatur, neque magnus dolor adsit, paruitas mali significatur. Idem tamen Hippocrates 3. de morb. *αυράχῳ*, ad novum diem protrahi posse docet.

3. *Παραυράχῳ*, paulò minori cum periculo coniuncta est, & potest diutius protrahi, de quo Hippocrates 3. prognost. 17. *Quacunque vero dolorem aliqui alteri similem inferant, in faucibus vero tumorem & ruborem existant, valde quidem lethales sunt, recedentibus vero dunturniores, si magnus rubor adsit, quia tandem in synanchen transit.* Sic mortua quinta die Phytionis vxor, 3. epid. sect. 2. l. 7.

4. Minus periculi autem adhuc est à *αυράχῳ*, in qua plus læditur deglutitio, quàm respiratio. Homo enim sine cibo & potu aliquantisper vivere potest, non verò sine respiratione, præsertim cum febris coniuncta est, eaque acutior. Et tumor ad interna vergens euocari longius & medicamentis digeri potest.

5. Leuissima est, & omnium minimè periculosa Paralynanche; quia inflammatio longius à gutture abest; Hinc Hippocrates, 6. aphor. 37. *Angina correptio, si tumor in collo appareat bonum.* Et ad eum morbum fertur. Et 7. aphor. 49. *Ab Angina decedens tumor & rubor in pectore superueniens bonum; quia extra morbus fertur.* Et 3. prognost. 18. *quibus vero fauces & cernix simul rubent, he sunt dunturniores, & maxime ex ipsa leuantur, quibus cernix & pectus rubo-*

rem contraxerit, nisi erysipelas inire recurrat. Et aphorism. 20. 3. *prognost. Securissimum est, si rubor quàm maxime foras, in cernicem scilicet & pectus feruntur.* In his nimirum duabus disferentijs neque dolore nimium vexatur æger, neque difficultate spirandi tenentur. Etenum cum partes hæ sint glandulosæ, molles & laxæ, affluentem humorem sine magna difficultate recipere, & quia laryngis musculi non inflammantur, respirationis via nõ intercluditur. Eadem sententias iisdem ferè verbis tradit Hippocr. lib. de Coac. prætor. Historias autem & eventus differentiarum 6. Epidem. sect. 7. ubi de sanguis angina epidemiz loquens tandem concludit: *In summa, quis scilicet deglutire non poterant, his valde mireri, & tolerare faciles erant: pessime vero his, quibus vna spiritus sublimis erat.*

6. *Anginalaburantes nisi celeriter colla expiant, malè habent.* Hippocrates in Coac.

7. Angina biliosa periculosior pituitosa; quia & dolorem maiorem & febrem, & maiorem respirandi adfert difficultatem.

8. Si in angina tumore, & rubore intus in faucibus apparente, rubor die non critico evanescat, remaneat verò tuberculum sine dolore, quod nec naturæ nec artis beneficio suppuratur, mortem vel ruboris recidivum minatur, ex 3. progn. 19. Mortem quidem, quia relicta foris crassa materia tenuior & feruentior intrò ad gutture conuersa est: ruboris recidivum, quia materia calidior ex accidente aliquò intò repulsa est, non autem discussa.

9. Si in angina tumore & rubore foris apparente illa subito intrò

euauuerit, malum: quia materia ad interiora recurrens suffocationem parit, ex 6. aph. 25. Nisi tamen criticè discussa, aut aliò defulsa materia hoc fiat, atque æger melius habeat.

10. Si febre desento repente collum interqueatur, ac vix deglutire queat, nullo tamen tumore inius vel foris apparente lethale est 6. aph. 25. ob luxationem scilicet vertebrarum.

11. Pueris angina ferè accidit ex vertebrarum cervicis intrò luxatione, 3. aph. 26. Huius curationem Paulus Ægineta, lib. 9. cap. 27. non aggreditur: cum nullam, uti censet, illa recipiat: quod tamen intelligendum est non de luxatione, quæ ex crudorum humorum: fluxu paulatim facta evenit, quæ antequam planè perficiatur, curati potest: neque etiam ex crudo tuberculo, modò vertebrae non planè suo loco deiecerit: quales fuisse videntur anginae, quas Hippocrates, 2. epidem. sect. 2. describit ex vertebrarum colli luxatione facta, quorum tamen neminem, qui tùm laboratur, mortuum fuisse refert: sed quæ sit ab inflammatione, vertebrae distendendo violenter suo loco dimouente. Hæc enim omnino incurabilis: cum quia ipsa inflammatio reductionem vertebrarum prohibet, tùm quia respiratio & deglutitio valde laeditur.

12. Quibus ex Angina in pulmonem fit conuersio, intra septimum diem moriuntur: si verò hos effugiant, Eproui, id est, purulenti, euadunt, 5. aph. 10. & 3. prognost. 20. Si angina materia in pulmonem conuertatur, desipientiam affert, & ægri magna ex parte Eproui, sunt. Eproui, enim sunt abcessu repeto & in

pulmonem effuso: vapores verò calidi sursum exstuantis delirium excitant.

13. Si strangulatis & suffocatis, ita & anginis, spuma circa os appareat, lethale signum est, 3. aph. 43. Extremam enim cordis angustiam significat, feruoremque summum, à quo materiam agitante spuma illa excitatur.

14. Quando in angina magna sit spirationis angustia, & spuma iam in ore apparet, nulla sanitatis spes relinquitur, nisi æger adhuc viribus valeat, & nutrimentum appetat. Quando verò infirmo ægro febris inuadescit, & facies ægri sit viridis & sinus oculorum demigrantur, extremæque frigent, & lingua nigra ac crassa cernitur, lethale est. Nam in forti febre multa inspiratione opus est, quam angina negat, teste Auicenna capite proprio.

15. In anginis subarida sputa gracilium mala, Hippocrates, in Coac. Angina enim talis est periculosa, sine tumore in collo & faucibus, uti prognost. 2. dictum, quo plerumque ægri suffocantur. Et licet, quod rarissimè fit, suppuretur: si tamen sputum sit subaridum, febrilem calorem maximè indicat, quo sputum glutinosum & crassum redditur. Quæ enim ut ibidem, habet Hippocrates, anginasi non celeriter expunt colla, lethaliter habent.

16. Qui in angina tumores faucium sine vlla ratione repente euanescent, lethales sunt, in Coac. Et si enim aliquando præcedente euacuatione, vel repellentium vsu tumor subsideat: tamè si sine his, atque ita præter rationem id fiat, malum periculosum est, cum non soluantur morbi manētibus us, quæ eas faciūt,

causis. Significatur enim materia ad interiora recessus, unde periculosior in partibus internis morbus excitare potest, vel quod interdum accidit, ad partem vnde discedit, repente iterum delata subito suffocationem inducit.

17. *In anginis sine signis dolores in caput conuersi, lethale, in Coar.* Etenim eum fiant sine crisi, aut materia translatione, & manente eadem gutturis & faucium, angustia, ac difficilis respiratio; malum non imminui & tolli, sed diffundi, & cerebro communicari significant. Eodem modo si in hypochondriis, vel cruribus dolor excitetur, & angina non soluat, morbi augmentum & humoris vitiosi etiam alias partes occupantem redundantiam significat.

18. Qui vehementer suffocantur, aarium pinnas expirando contrahunt, inspirando vero dilatant. Galenus, 3. *epidem.* 2. *comm. text.* 4. Cui enim ob extremum suffocationis periculum, aut caloris vehementiam membranarum respiratori inseruientium motus necessitati satisfacere non possit, natura ad cartilagineas illas diducendas sese conuertit, quasi aliquod commodi inde perceptura.

19. Soluitur autem angina vel tumoris *disquisitio*, causa eius reuulsa distracta; euacuata aut discussa; aut tumoris maturatione, pus ex illo aperto euacuatione, aut materia ad aliam partem translatione quod ex doloris & tumoris subita cessatione, pulsusque mutatione cognoscitur. Optimum autem est, materiam discuti, vel tumoris maturatam materiam euacuati; alio eam transferri periculosum, ut iam dictum.

20. Transfertur autem materia vel ad cerebrum, ubi statim dolor capitis grauis, deliria & phrenitis sequitur, vel ad musculos colli, ubi dolor & tumor, interdum & conuulsio excitatur; vel ad pulmones & pleuram, unde dolor pectoris, tussis, difficilis respiratio oritur; vel ad cor, unde tremor eius, lyncope & pulsus obscuritas excitatur.

Indicationes

Quas alie inflammationes habent indicationes, eadem & in angina obseruanda, saltem partis affectae habita ratione. Nimirum sanguis & materia, quae adhuc affluit, aut affluens est ad partem affectam, reuellenda, deuanda; quae vero iam affluit, adhuc tamen in paruus venis consistit, vel in parte fluctuat, ne in partem recipiatur, atque in eo consistat, repellenda, & in parte affecta foras protrudenda per altituentia: quae vero extra venas effusa est in partis spatia, & repellere non potest, insensibiliter discutienda est per digerentia, quod tutissimum est; vel si digorentibus non cedat, & ad mutationem tendat, maturatio adiuuanda, & diligenter simul cauendum, ne adstringentibus & refrigerantibus foris quocunque tempore applicatis materia intra repellatur, sed relaxantia potius extrinsecus adhibeantur, quibus materia foras euocetur, periculumque suffocationis aueratur.

Curatio.

VENÆ SECTIO.

Cum ergo angina sit inflammatio, & quidem eius partis à qua praesens periculum suffocationis imminet, & à sanguine vel solo, vel cum alio humore mixto ortum habeat: in omni angina sanguinis missione

Indica-
tio 91.

Curatio
Venæ
Sectio.

& euacuatione opus est. Estque vena sectio optimum, presentaneum & compendiarium in hoc morbo remedium. Ideoque ut sanguis ad fauces suens reuellatur & euacuetur, periculūque maximè virgens auertatur, vena sectio statim & sine omni mora instituitur, præmissò, scilicet glystere.

Et quidem aperiatur in cubito cephalica aut mediana, aut utraque si magna adsit plethora. Hoc enim modo & vena in brachio aperta, & vniuersum corpus promptius euacuatur, & non parùm sanguinis à parte affecta auertitur. Et primò quidem mediana, hinc cephalica aperiatur, si vtriusque sectione opus. Et si inflammatio alteram partem magis affligat, vena in oppositum primum in brachio reuulsione gratia, postmodum in latere eodem aperienda, aut si semel saltem venam aperire liceat, vena in eodem latere secetur. Si verò nullum lateris discrimen sit, aut dubitetur, vtra pars magis affligatur, sanguis ex dextro brachio emitatur, cum repar sit plerumque pars mittens.

Si nientes vel hæmorrhoides suppressæ sint, quæ vena primò aperienda sit, auctores dissentiunt. Alij enim sapientiam, alij venam in cubito primò aperiendum censent. Verum distinctione hic opus videtur. Et enim si periculum non urgeat, ex poplite vel talo sanguinis missio primùm instituenda, ut mentes suppressi reuocentur, & sanguis ad partes distantes reuellatur; imprimis si purgationis tempus instet. Et si malum augeatur, mox vespere aut sequenti die cephalica aperienda; non tam negligens reuulsione, quàm in curibus institui

possunt. Si verò morbus urgeat, & periculum instet, quod plerumque fieri solet, mox vena in cubito aperienda. Periculosum enim est, neglecta cephalica cum affecta parte communicante in distantissima parte venam secare. Vena autè brachij aperta postea vena in poplite aut talo secare licet. Sic enim & virgenti affectioni, ac celerem reuulsioneu & euacuationem requirenti, & suppressæ euacuationi satisfit. Imò sunt optimi Medici, qui in angina periculosa non solum in suppressis mensibus venam primò in brachio secandam censent, sed etiam hæc mensibus, Et tali in casu, dum sanguis per venas superiores euacuatur, cucurbitulas femoribus affigendas censent, ut minor hæc sanguinis vertus superiora retrahat.

Eualetur autem sanguis maiore vel minore copia pro eiusdem abundantia, magnitudine ipsius affectus & virium robore. Et verò fuerint, qui in angina etiam vsque ad syncope sanguinem euacuandum censuerint, postulat sententia Galeni, qui *aphor. 4.* scribit, in ardentissimis febribus, in maximis inflammationibus & vehementissimis doloribus, vsque ad animi deliquium sanguinem detrahendum esse: tamen Græci, Aëtius, *teirab. 2. ferm. 4. c. 47.* Paulus Aegineta, *lib. 4. cap. 37.* Trallianus, *lib. 4. cap. 1.* vt & Arabes plerique, item Cælius Aurelianus, *lib. 3. acut. cap. 4.* & posteriores Medici plerique, sanguinem non semel atque confestim, sed sæpius & repetitis vicibus euacuandū censent; nec, si confestim euacuerit, animi deliquio superueniente, suffocatio, quæ antea urget, augeatur, egerque suffocetur. Quamquam enim ipsa inflamina,

tio, si sit magna, tale præsidium requirere videatur: prohibet tamen id respirationis difficultas, & imprimis suffocationis periculum. Respiratio enim cum sit actio vitæ valde necessaria, quâ ne exiguo tempore viuis homo carere potest: plus valet hic prohibendo difficultis respiratio, quâ ex animi deliquio succedente ad largam sanguinis effusionem ita augeri possit, ut illico suffocatus æger interiret, quàm magnitudo inflammationis eam indicando. Itaque ubi minor est spirandi difficultas, copiosius, si inflammationis ratio postulet, sanguinem mittere licet, ut inflammationis faucium musculis. Si autem respirationis difficultas valde urgeat, id quod accidit, inflammationis laryngis musculis, cavendum est à larga sanguinis missione, quæ animi deliquium inducere possit, seu tum partitis vicibus, quatuor vel quinque horarum intervallo sanguinem euacuare commodius est. Et repetita venæ sectio plus reuellit, quàm una larga sanguinis euacuatio. Præterea cum sæpe accidere soleat, ut ad partem prædictam novus fluxus fiat, repetita venæ sectio etiam humores iterum fluentes auertit. Videndum tamen, ne nimis parè prima vice sanguis euacuetur, ne antequam alteram aut tertiam sectionem adhibere possimus æger interim moriatur.

Et quidem primò in opposita parte vena aperitur, deinde in brachio lateris affecti. Et si malum fere inducias, manè una vena aperta potest, vel peri vel sequenti die alter. Foramen non hac nimis angustum, ne crassior sanguis intus remaneat, nec

nimis amplum, ne spiritum magna cõpia dissipetur.

Grauidæ et si sanguine emissio interdum abortiant, tamen in morbo tam periculoso necessitas postulat, ut sanguis, sed minore copia detrahatur. Et plurimæ grauidæ ita sanguine abundant, ut venæ sectionem sine abortus periculo tolerare possint. Imò compeitum est, nonnullas feminas, nisi sanguis vis detrahatur, abortire aut in alia mala periculosa incidere. Fiautem sanguinis euacuatio ex vena cubiti.

Si phlebotomiam vires non ferant, aut saltem repetitam sanguinis euacuationem non tolerant, cucurbitula cum scarificatione apponantur cruribus, vel supra renes, postea etiam in brachium, non in collo. Nam si statim in principio cucurbitula parti in loco affecto propinqua applicantur, maior ad partem affectam fluxus concitabitur, malumque augebitur. Postea verò in loco propinquo applicari poterunt; sicut venas sub lingua secare licet, ut postea directur. Simul etiam alia adhibeantur, quæ repellere possint, ut lousures, & fictions, ac ligaturæ extremorum, & cucurbitula in partibus, remotionibus ut modo dictum.

Purgatio.

Venæ sectione peracta mox instituenda purgatio, præcipue si bilis in corpore abundet, ut illa phlegmæ irritatione motus humorum fiat *expulsus*.

Purgatio
tionem

Cum autem angina coniungatur febris, de purgatione initio anginæ instituenda auctoribus discernunt, dum alij & plerique omnes Græci ac Arabes summum periculum attendentes, mox in principio purgant cum essent alij vero, inter quos præcipuus est *M. Astruc*, ad cuncta

tem humorum respicientes purgationem in principio prohibent.

Verum febris natura hic attendenda. Nam tamen quod plerumque fieri solet, si febris vel præcedat anginam, vel simul cum ea inuadat, & materia peculiari naturæ motu humores viciosos extrudere conatus ad fauces depellatur, atque ita humores turgentis materiz conditionem referant, & errabundi quasi à natura è venis expellantur, nondum immobiles sint, & licet ad certam partem farantur, vagabundi tamen adhuc quasi sint, & tales, qui etiam ad aliam partem mox moueri possint, sicut sæpe angina in pleuritidem & peripneumoniam mutatur, ad turgentem materiam merito referuntur, & propterea ex consilio Hippocrat. 1. *aphorism.* 22. statim euacuandi sunt: Id quod egiã à doctissimis Medicis hæctenus cum commodo ægrotorum factum fuit, & ipse Hippocrates præcipit, lib. de locis in hom. & lib. 3. de morb.

Et omnino sunt in ea sententia, & si angina sit inflammatio, (quod & pleuritide, peripneumonia, parotidibus & similibus affectionibus intelligendum) primam tamen occasionem ei præberi à cacochymia, (nisi causa externa sanguinis affluxum exciet, vt spinæ vel ossicula gulæ infixæ, vel vertebrae luxatio.) Natura enim irritata à prauis humoribus, os ad partes corporis externas detrudit, ad latera, tonsillas, fauces, post aures, ad linguam, & alias partes. Verùm vt in hæmorrhagijs narium criticis, quæ in febribus acutis à natura sæpe instituuntur, non præcipue sanguinis, sed cacochymiz

causa ea euacuatio à natura instituitur: ita & hic natura quidem viciosos humores expellere conatur, non tamen eos sine sanguine extra venas protrudit, sed cum sanguine permixtos extra venas in spatia partium effundit, vnde inflammatio excitatur. Et ipsi tales humores è venis effusi, acrimonia & prauitate sua naturam stimulant, maiori sanguinis affluxu occasionem præbent.

Si autem inflammatio præcedat, neque ea ex humoribus vicijs à corpore protrusis ortum habeat, & postea febris sequatur, non adeo multum commodi ex purgatione prouenit, nisi forsitan metuatur, ex affluxu humorum viciosorum inflammationem augeri posse.

Et quidem maturè statim in initio instituenda purgatio. Narratque Alexander Trallianus, lib. 4. se eodem die sanguinem misisse & purgasse, his verbis: *Post missionem sanguinis, si nullus laxitatis sensus orisatur, sed cibi & aeris transiens adhuc impediatur, etiam venas lingue subiectas incidere ne graueris, neque in crastinum differre, sed eodem die facito.* Ego sanè memini, me, cum usus valdè urgeret, venam manè aperuisse, diluculo lingua subiectas secuisse, & vespere ex cremore ptisana extractum scammonij exhibuisse, atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix potuisse dissolvere. Imò alium quendam noui me, post quam brachiorum duorum venas in cubito secissem, repurgasse, sequens die non expecto. Et omnino affectus grauitas sæpe purgationem ita urget, vt statim instituenda sit, nec tempus matutinū expectari possit. Et si enim & ad venæ sectionem, & ad

& ad purgationem horæ matutinæ sunt commodissimæ, tamen utraque etiam tempore vespertino institui potest, si quid mali impediatur, vel ut venæ sectio vel purgatio maturetur, urgeat. Itaque si suffocationis periculum urgeat, manè instituta venæ sectio, vespere exhiberi potest purgans. Sic non solum Trallianus, ut modò diximus, vespere purgavit, sed & Galenus, 14. *M. M. cap. 8.* in quodam, cui lingua tumescere erat, ut ore contineri non posset, purgans vespere exhibuit.

Eligantur autem purgantia, quæ febrim non augeant, nec humores valdè agitent, cassia, manna, tamarindi, tyropus rosar. & violar. sol. rhubarbarum, electuarium diasebesten, diacatholicum. Si humor pituitosus admixtus sit, fortiora usurpare licet. Ut *℞. Symp. rosar. solut. ʒ. ij. vel iv. Aqu. cichorij ʒ. ij. M. Vel ʒ. Manna ʒ. j. b. vel ʒ. ij. Dissolve in iuseculo pulli, vel decocto ptunorū, iterum coletur. Exhibeatur horis duabus ante prandium. Vel ʒ. Rhubarb. elect. ʒ. iv. cinamom. ʒ. b. Infunde in decocti communis flor. & fruct. vel aqu. endiv. ʒ. iij. vel ʒ. iv. In colatura dissolvatur manna ʒ. j. vel ʒ. i. b. Colatura exhibeatur, postea detur seri lactis caprini lb. j. vel lb. j. b. Ita enim purgatio sine insigni calefactione perficitur. Vel ʒ. Electuar. de psyllio ʒ. b. Dissolvatur supra ignem in decocti florum vel fructuum, vel pectoralis, vel aqu. cichor. ʒ. iij. b. In colat. dissolvatur manna ʒ. j. Iterum coletur. Adde syrup. violar. ʒ. b. M.*

In humore pituitoso addatur agarius. In melancholia admixta sena & manna exhibeatur. Sæva enim & manna in actionis modo & tempo-

re valdè conveniunt.

Recentiores Chymici hic etiam vomitoria & antimomialia exhibent, sed nulla evidenti ratione adducti. Neque ea tutò in morbo, qui aliàs suffocationem minatur, exhiberi possunt. Ita refert Trincavellius, lib. 5. cap. 7. de ration. curand. part. corporum affect. feminam quandam sumpto medicamento purgante, & quidem cassia saltē, excitato vomitu, statim strangulatam interisse.

Verum quia facultas deglutendi plerumque est impedita in angina, frustra sæpe præscribuntur purgantia, quæ æger deglutire non potest. Rondeletius equidem pilulas dissolvit. Verum vix hoc tutum est, propter abominandum enim saporem facile vomitus excitari posset, qui in hoc affectu minimè tutus. Et modò æger liquida deglutire possit, facillè alia purgantia concinnari possunt, ut pilulas dissolvere opus non sit. Vbi verò planè purgantia sumere æger non potest, clysteres aciores ex emollientibus & cholagogis, & quidem, si febris acuta cōiuncta sit, electmentiosis constantes iniciendi, & iterum acque iterum deinceps reiterandi sunt. Ut *℞. Malur. parietar. mercurial. centaurij minoris, an. m. j. Coqu. in aqu. simpl. Colat. ʒ. lb. j. adde electuar. diacathol. de succo rosar. an. ʒ. j. b. mellis rosar. collatis ʒ. j. ol. violar. ʒ. ij. salis ʒ. b. F. Clyster. Vel ʒ. Decocti emollient. ʒ. ix. in quibus dissolvatur elect. diasebesten. ʒ. j. diaphane. ʒ. iij. ol. violar. ʒ. j. b. sal. gem. ʒ. b. M. F. Clyster. Vel ʒ. Decocti fl. & fr. ʒ. ix. in quibus dissolvatur elect. lenitiv. ʒ. vj. de psyllio ʒ. b. syr. ros. Sol. ʒ. j. sal. gem. ʒ. j. M. F. Clyster.*

Repellentia.

Repellentia
112.

Statim post primam sanguinis missionem purgantia vsurpanda sunt, ne inflammatio augeatur. Debent autem repellentia solum intrus in faucibus, non verò extrà adhiberi, ne materia magis ad interiora & versus fauces repellatur.

Vsurpanda verò sunt repellentia forma gargarismorum & collutionum oris, vel linctuum. Etsi enim quidam & suffumigij formâ talia exhibeant: tamen cum omnia, quæ in sanum resoluta ore & faucibus hauriuntur, guttur & fauces exasperare & suffocationem augere solent, à plerisque hic modus reuocatur. Et quidem forma gargarismorum, seu collutionum utilissima est. In infantibus tamen, qui gargarisare non valent, sæpe linctibus vtendum est.

Quatuor
medica-
menta à
Galeno,

In Medicamentis autem inueniendis hic non solum ad communem, quæ ex natura inflammationis sumitur, indicationem respiciendum, sed etiam ad partis affectæ conditionem. Nam cum, vt Galenus, 1. de comp. medic. ser. loc. cap. 1. docet, non solum rarior & mollior sit superficies tunicæ oris, quàm est cutis, quæ totum corpus ambit, & præterea ex medicamentis aliquid faciliè in ventriculum vel pulmonem defluere possit, sint illa talia, quæ omnis acris & malæ qualitatis, quæ vel fauces lædere, vel deglutitæ nocere possunt, expertia. Et cum diutius in ore, ubi gustus toties est, detinenda sint, quantum fieri potest ingrato sapore vtant, ne nobis accidat, quod Medico illi seu imprudenti seu imperito accidit, qui solum reseruit *ibid.* Gal. gargaris-

ma ex acramento sutorio constans adhibuisset, magnum cum insuauitate nocumentum gulæ & asperæ arteriæ extremitati, ac ventriculo & pulmoni intulit.

Commendatur à Galeno, 6. de comp. med. ser. loc. cap. 1 quatuor medicamenta, quod ex musto, quod ex moris, & quod ex nucum corticibus viridibus cum melle, quod insuauitatem & nimiam astringendi vinum, quæ est in his succis, temperat, conficitur.

Primum ex musto fit, iniiciendo ad decem musti heminas, tres heminas rhois cortiariorum, aurcius, qui obsonis inspergitur; vel ex vtriusque parte æquali, Cuiusquidem plures aliæ descriptiones ibidem leguntur. Alterum ex moris fit: ℞. succi mororum heminas vj. ad strigmenticiam spissitudinem coquito. Deinde ritas croci 3. j. myrtæ 3. ij. omphacij 3. j. alumin. sciss. obol. iij. mellis heminam vnam addito. Vel ℞. croci 3. β. alum. 3. iij. β. iniiciatur, & passi hemina vna, & vini maris expertis austeri hemina vna. Coctura autem fit vsque ad compagem melleam. Tertium fit ex mororum rubi succo, eodem modo, vt ex succo mororum. Quartum denique fit ex nucum corticibus viridibus, si eorum succus exprimatur, per linteum excoletur, coquatur, & tandem mel, veluti in eo: quod ex moris, fit, admisceatur. Inter hæc autem medicamenta primum est mitissimum, secundum fortius, tertium adhuc fortius, quartum fortissimum, quod etiam præcipuè à Galeno commendatur. Hoc enim vinum astringendum subito magis tenuitate habet, æque ita prolapdus penetrat, cuius

rei argumentum est, quod succus ille manibus tractatus ita alid inficit, ut facile abstergi non possit. Vario autem modo, ut Galenus ibidem docet, ad diuersa morborum tempora cuiusmodi medicamenta parantur. Si enim in ipsis astringens qualitas præualeat, principis conueniunt. Si verò mitigatoria & laxatoria ac coenocoria, in doloribus & vigoribus inflammationum. Imò si vnum saltem horum medicamentorum præsto sit, id ipsum per aquam simplicem solui, & per additionem parabilium cuius temporis & scopo accommodatum reddi potest. Sunt autem parabilia ex astringentibus, rosæ, & myrti baccæ, & myrtus, & lentiscus, & rubus caninus, & galla omphacitis appellata, & Aegyptiæ spinæ fructus, omniæque aluminis genera. Post hæc parabilia sunt rhus culinariæ & coriariæ, & succus, qui ex Syria effertur: atque hic quidem per se amiscetur, culinariæ autem & coriariæ rhus aqua prius decocti, viles misceantur. Est autem & glaucum ex parabilibus, & emphacium, & cyrtini, & balauitia. Ex discoloris autem parabilia moderata sunt caricarum & susinum decoctum, & aqua mulla, in qua origanum, aut hyssopus, aut thymus, aut calamintha, aut polegium, aut mentha odorata, quam hedystrum vocant, sint decocta: fortiora autem sunt etiam hæc, si diutius coquantur, amplius autem & niri spuma, aut ipsum aded nirtum vsum: fortius verò his est sulphur viuum. Vtilis est & succus malorum, chriotum, & rob cornorum, ac sorborum, tyiopus granatorum, myrtillorum, de luc-

cis, diamorum ut & decocta & aquæ prunellæ, plantaginis, polygoni, agimoni. maluarum arboræ, solior. rubi, myrti, radic. pruni syluestr. sumach, senen rosarum, balauitia, cortices granatorum, hypocistis, acacia. Atque ex his eligantur fortiora vel mitiora, prout maior vel minor fuerit inflammatio, humorumque affluxus, & prout corporum natura sese habet. Mollioribus enim & fœminarum corporibus mitiora, fortiora durioribus adhibenda. Ita etiam in laryngis inflammatione primò mitiora adhibenda medicamenta, ne dolor & symptomata fortiorum velu exasperentur. Idcirco præcipiò illa valida astringentia, galls, balauitia, sumach, hypocistis, vix sola usurpanda, sed modicè saltem; ubi opus est, reliquis admiscenda. Monendum & hoc, in angina, quæ à spina vel ossiculis, vel aliis rebus acutis gulæ inhaerentibus, fit, astringentia lecum non habere. Talis enim inflammatio citò ad suppurationem duci potest. Ab astringentibus verò tum dolor intenditur. Cum enim talia corporis acutum infixum magis parti impingant, dolorem intendunt.

Attendendum & hoc, pro humoris inflammationem existentis varietate medicamenta etiam varianda esse. In sanguine crassa & bile refrigerantium & repellentium vis intendenda; in pituita autem resoluentium; in melancholia emollientium.

Succi vel illuntur faucibus, vel dissoluntur in decoctis aut aquis, illique os celluntur petus, quàm ut gargatibus fiat, ne nimia gargantione affluxus augetur.

Eadem collutiones oris ex aquis destillatis & decoctis plantarum modo enumeratarum parantur.

In principio ergo sequens gargarismus vel oris collutio utilis est.

℞. Hord. integr. P. ij. sol. vitis, plantag. an. m. ℥. flor. rosar. rubr. P. ij. balaustr. 3. b. fragor. sebest. 3. j. b. sem. acetos. 3. j. Coq. in aqua comm. pro ℔b. j in qua dissolue Succicor. nuc. ingland. virid. 3. j. syr. gran. 3. j. b. m. Vel ℞. Rad. alibae, 3. b. sol. rubi, m. j. alum. vsti, 3. ij. sac. 3. b. Coq. in aqua comm. pro 3. x. In quibus dissolue mell. rosar. colat. 3. ij. b. succi myrtillor. recent. 3. j. M. Vel ℞. Ag. plant. prunel. ros. an. ℔b. 3. acetis ros. 3. b. succi granat. 3. j.

In quibus dissoluatur, *diamori, rob nucum*, an. 3. i. b. pro oris collutione. Vel ℞. *Aq. radic. alibae*, ℔b. j. Coq. in ea *flor. malua arborca*. Colat. adde *syr. de succo cydonior.* 3. iii. Vel colluatur eo lacte, in quod lens palustris cocta sit.

Aliàs si dolor non vrget, sola repellentia usurpanda.

Vt ℞. *Fol. plantag. prunell. an. m. b. flor. rosar. rubr. malua arbor. an. P. ii. balaustr. sem. cydon. an. 3. i. Coq. in aqua hordei, ℔b. b. ad tertiz partis cō umptionem. Colaturæ adde diamori, diannc. an. 3. i. M. Vel ℞. Summitat. rubi, m. i. balaustr. cortic. granator. an. 3. i. Coq. in aqua simpl. Colaturæ ℔b. i. adde diamori. rob nucum, an. 3. i. M. Vel ℞. Agrimonia, plantaginisan. m. i. rosar. rubr. cortic. granator. sem. acetosa, portulac. an. 3. ii. Coq. in aq. f. ad ℔b. i. Adde diamori. diannc. succi granator. an. 3. i. b. F. gargarismus. Vel ℞. Ag. prunell. acetosa, ros. rubr. an. q. s. diannc. rob sambuci, an. cochlear. i.*

M. Linctus etiam profuit ex diamoro cum succo granatorum, vel ex syrupo de iuiubis, myrtino, diamoro.

Si dolor sit vehementior, admiscenda sunt medicamenta, quæ dolorem leniendi vim habent, & præcauent, ne fauces exasperentur. In quem vsum hac vtilissimum, possintque in eo coqui summitates rubi, reliquis etiam addi glycyrrh. iuiubæ passulæ.

Recentiores hic laudant sal prunellæ, siue nitrum præparatum in oris collutionibus.

Deinde ex Conradino, *lib. de feb. vngar. cap. 119.* hanc aquam.

℞. Sempervina mai. q. v.

Contundatur succusque exprimitur, & singulis ℔b. addatur *Salis ammoniaci*, 3. b. reponantur in loco humido, donec sal liquefeat. Postea aqua destilletur, qua fauces colluantur. Si verò hæc aqua in promptu non sit, sumatur aqua semperuiuæ vulgaris, & in eius libra vna dissoluatur salis ammoniaci, 3. i. ac modo dicto adhibeatur. Vel. ℞. *Centros viuos viii. sed maior. m. iv.* Contundantur, & succus exprimitur, quo fauces colluantur.

Vel ℞. *Aq. sempern. mai. ℔b. i. b. & admisc. succum ex quatuor cancris viuis expressum.*

Verùm ista etsi in angina etiam suum locum habere possint: tamen ab authoribus horum medicamentorum inuenta & usurpata sunt ad linguæ ardorem, siccitatem & nigredinem in febribus ardentibus, quod malum vulgè *die Breuche* nominatur, quod ab angina differtè supra diximus. Istud enim faucium & linguæ incendium & siccitas febrium acutatum symptoma est, neque

ab eo tam subito suffocationis periculum, ut in angina, imminet.

Valdè etiam in hoc affectu prodest calida extracta cum aq. plantag. dissoluta, & collutionis loco adhibita, ut & decoctum cortic. ligni berberum, vel cortic. interioris corryli. Ut & decoctum avenæ rubescens, item decoctum sol. & cymarum cerasi arboris. Pauperiores vantantur aquâ fabrorum, vel aquâ & aceto inuicem mixtis, vel aquâ hordei.

Notandum autem hîc in uniuersum, quæcunque in calidæ valdè & sanguineæ angine incremento & statu imponuntur, eadem pituitosæ initiis præscribi posse: Et quæ declinantibus illis, eadem vigenibus his debent adhiberi.

Deriuantia.

Deriuantia.

Postquam venæ sectio in cubito & purgatio est instituta, etiam venæ narium, & quæ sub lingua sunt, aperiantur, aut hirudines venarum, frontis, post aures & cervici applicentur. Nonnulli & scarificationes aurium adhibent. Trallianus, ut supra dictum, eodem mox die, non expectato crastino, venas lingue subiectas incidit. Sed Galenus, neque sine ratione, in principio anginæ venam in cubito lecat, ut reuellar, quod influit; post principium autem venas sub lingua, ut quod in parte affecta vel locus vicinis collectum est, euacuetur, in lib. decur. rat. per sang. miss. cap. 9. & 4. de rat. vitæ in acut. aph. 30. Si tamen morbus admodum velox esset, primo die venam sub lingua cui Tralliano legare liceret.

Digerentia.

Malo procedente & auferente, quod secundo, & tertio die accide-

re solet, præpositis repellentibus digherentia admiscenda. Monentque hîc doctissimi Medici plerique, in angina rarissimè solis repellentibus, & non nisi eum imminet inflammatio, aut ubi primum incepit, utendum esse, & contra solis discutientibus vix etiam nunquam utendum esse, atque in eo differre curationem anginæ ab aliarum partium inflammationibus, in quibus in principio sola repellentia usurpantur: post statum vero repellentia omitti possunt: idque ob partis affectæ naturam. Cum enim partes, quæ in angina afficiuntur, ferè sint laxæ & molles, citòque inflammationem admittant, etiam in principio discutientium aliquid addendum, ne humor qui influxit, nimio refrigerantium usu impactus hominem suffocet; in fine etiam aliquid astingentium addendum, ut partes roborentur & ne solo discutientium usu in parte laxa & molli maior, vel nouus humorum affluxus concitetur. Vbi ergo morbus augmentum sumpsit, gargarismis utendum discutientibus ex decocto thimi, pul. calam. hyssop. orig. beton. glyce flor. cham. meli sem. lin. fœn. & similibus.

Vel ℞. Glycyrrh. rec. ʒ. i. passul. mundat. Par. x. dactyl. carat. an. P. iv. sem. alb. fenig. an. ʒ. ij. bord. m. reg. P. j. fl. viol. cham. an. P. ʒ. Coq. Col. adde mell. ros. col. ʒ. ij. ciner. birund. ʒ. ij. croet. ʒ. B. F. gargarismus.

Vel ℞. Hyssopi, puleg. an. m. ʒ. betonit. P. ij. rad. glycyrrh. ʒ. iij. passul. minor. ʒ. j. Coq. in f. q. aqu. fluuiat. pro ʒ. ix. In quibus dissolue oxymel. simpl. ʒ. j. diamori ʒ. iv. M.

Vel ℞. Aq. albae, lb. ʒ. hyssop. ʒ. ii. syr. de betonit. ʒ. j. B. M. Vel M iij.

Digerentia.

℞. Fol. plantag. prnell. an. m. ℞. balanst. flor. resar. rubr. cham. an. P. j. cast. ping. N. iij. bordes in. ℞. sem. lini. fæn. an. 3. j. Coq. in aq. simpl. Col. ℞. ℥. i. Cui adde melissosaces col. 3. j. dianuc. 3. j. ℞. F. gargarisimus.

Commendatur & aqua è fol. & flor. periclimeni. In statu augeantur discutientia & emollientia. Galenus consistente fluxu crocum & myrrham addit, quæ concoquere & diluere valent, erocúsque similiter lenienter astringit, Vt.

℞. Fol. prnell. violar. an. m. j. scabios. malv. albor. an. m. ℞. flor. chamamel. melilot. an. P. j. glycyrrh. ras. 3. ℥. sem. fæn. 3. ij. caruab. pingu. N. nj. assel. 3. ℞. Coq. in aq. hordei f. ad tertiam consumptionem.

Colaturæ *℞. lb. j. in qua dissolue cassia recent. extract 3. ℞. myrrb. 3. i. c. flor. 3. ℞. mell. resar. colat. 3. j. Misce pro gargarisimo.*

Ad dolorem leniendum valet succus ex pane albo in aqua vel lacte cocto expressus, item cremor ex furfuribus tritici expressus, vt & mucilago semini lini, cydonior alchææ, succus prisanæ, lac amygdalarum dulcium, & sem. 4. frigid. maior. item cassia cum parte æquali olei amygdalarum dulcium mista.

Declinante tandem morbo coquitur aliquid deinde hirundinis, aut dissolvitur in colatura cinis combustarum hirundinum & cochlearum combustarum: Vel, quod nonnulli pro secreto habent, cauctorum combustorum, aut cribratum album canis, aut gallinæ. Illiure etiam licet faucibus illa stercora melle excipia.

EXTRA ADHIBENDA.

Exsiccania, & resoluentia.

Dum hæc incūs faucibus adhibentur, tentandum omni modo, vt inflammatio exteriora versus trahatur, & discutiat, in quem vsum multa passim ab authoribus proponuntur, vt oleum dulce amygd. dulc. chamæmeli, anethi, lilior. alborum, quorum aliqua spongia vel lana succida applicari possunt, succus cucumeris tyloest. melle subactus, & huius generis alia. Inter quæ tamen ab initio, vbi corpus non satis euacuatum fuerit, mitiora eligenda, ne humoribus attractis malum augeatur.

In principio ergo & prima statim die anterior colli pars illinatur, oleo chamæmelino, amygdal. dulcium, vel liliorum alborum.

Vel *℞. Ol. lilior. alb. amygdal. dulc. violar. an. 3. ij. pingued. capon. 3. j. empl. de melilot. q. s. M. F. linimentum. Vel ℞. Mucilag. gummi Arabie. tragacanth. sem. cydonior. aq. ros. extr. an. 3. ij. buri recentis insulsi, pingued. porcini. an. 3. i. stercor. hirund. 3. ℞. ol. virri, chamæmel. an. q. s. M. F. linimentum. Præstantius est vnguentum Varandæ.*

℞. Paulu. nidi hirund. stercor. canis cinium macerati, columbi, an. 3. j. rad. ireos. flor. chamamel. an. 3. ℞. pingued. gallinar. 3. ℞. ol. lilior. alb. 3. j. ℞. cera flaua parum. M. pro vnguento, quo collum & partes tumentes inungendæ.

Vel parentur cataplasmata ex farina vel cremore sem. lini, fæniçæci, alchææ, malux, hordei, flor. chamæm. meliloti, & similibus.

Vel *℞. Farina bordes, pulpa passul. an. 3. ij. pulu. rad. alibææ, 3. j. Cum ol.*

amygd. dulc. Fiat cataplasma. Hoc etiam vtile est.

℞. Farin. bord. ʒ. j. mucilag. sem. lini & albaa. cum aqua malua facta, an. *ʒ. ʒ. pulu. flor. chamamel. ʒ. iiii.* Cum oleo chamamel. amygdalar. dulce: an. q. l. Fiat cataplasma.

Nidum etiam hirundinis cataplasmatris modo foris applicandum admisceri vulgatum est, idque cum commodo ægrorum fieri vñ deprehensum; de quo postea quæst. 3. dicitur.

Vt *℞. nid. hirundin. N. i. fol. malua, violarum an. m. i. flor. chamamel. molito*, an. m. ʒ. *rad. althæe, ʒ. vi. lilior. albor. ʒ. ii. ficum, N. iv.* Coquantur ad mollitiem contusis adde *farin. sem. lini, senigræc. bord. an. ʒ. iiii. buryi recent. ʒ. ʒ. olei amygdal. dulc. chamamel. viol. an. q. f.* Cataplasma ad interiorem colli partem.

Vel *℞. Nidum hirundinis, Coq. in decocto radic. althæe*, ad pultis consistentiam. Adde *Ol. amygdal. dulcium, anctibi, an. ʒ. ii. croci ʒ. i. cassia, ʒ. i. ʒ. i.* Fiat cataplasma. Vel *℞. Farin. tritic. ʒ. ii. sem. lini, senigræc. an. ʒ. i. caricar. ping. ʒ. ʒ. nid. hirundin. contusi, ʒ. i.* Cum oleo lilior albor. Fiat cataplasma.

Vel *℞. Stercor. hirund. ʒ. i. farin. fabar. ʒ. ii. oleum chamamel. liliorum alborum an. quantum satis* Fiat cataplasma.

Paratur & tale emplastrum vel cataplasma ex nido hirundinis.

℞. Nid. hirundinis, ʒ. ii. unguent. dialthæe, æq. an. ʒ. i. ʒ. i. rad. iridis ʒ. ii. ol. myrs. lilior alb. an. ʒ. ʒ. cera flava q. s. Fiat emplastrum. Cataplasma de nido hirundinis. D.

Pauli Lutheri.

℞. Pulvis nidi hirundin. ʒ. ii.

radicis alb. chamamel. an. ʒ. iiii. senigræc. ʒ. ʒ. mucilag. ficum cum aq. chamam. expr. ʒ. i. ol. chamam. lilior. alb. amygd. dulc. an. ʒ. ʒ. i. Fiat l. a. cataplasma.

Aliud emplastrum ex nido hirundinis.

℞. Nidor. hirundin. N. i. Coq. in aq. malua. ʒ. vi. Postea colentur & exprimantur fortiter. In colatura coqu. *Rad. mal. bryon. althæe, an. ʒ. ii. sem. lini, ʒ. i. nigell. ʒ. i. herb. violar. parictar. an. ʒ. ii. ol. lilior. chamam. axung. porcin. an. ʒ. iiii. cera, ʒ. ii. F. l. a.* emplastrum.

Aliud ex cineribus hirundinis & albo græco paratur h. m.

℞. Ciner. hirund. stercor. canis per icunium emaciati an. ʒ. ʒ. pulu. croci, florum spica, an. ʒ. i. benzoes ʒ. ʒ. mellis ʒ. iiii. F. cataplasma.

Vtile est etiam cataplasma ex medulla cassiæ cum oleo chamamel. & vnguento dialthæe, & emplastrum de meliloto.

Vel *℞. Sem. cumini ʒ. i. absinthij viridis contusi, farina bord. ʒ. ʒ. albi græci, ʒ. iiii.* Cum melle fiat Cataplasma.

Vel *℞. Emfuris tritici, albi græci, an. q. v.* Cum melle fiat cataplasma.

Laudatur etiam epithema ex aque scabiosum lb. i. & spiritum vini ʒ. j. loco affecto admouendum.

Fortiora sunt emplastra, si aliquid fermenti, vel cæpa sub cineribus cocta addatur. Nonnulli etiam mel anacardinum & vesicatorium applicant. Notandum etiam, vt medicamenta ista semper calida actu applicentur.

Si materia rebellis digerentibus non cedit, etiã in parte affecta, vel ei

vicina cucurbitulas affigere licet, sub mento scilicet, si tumor circa fauces & maxillas existat, in collo verò inter 2. & 4. vertebra, cum affectus internis musculis tumor foris non apparet. Et si materiam ad externa vergere videmus, adiuuandus est motus materię appositis cerulci cucurbitulis cum scarificatione, ut sanguis ad circumferentiam extrahatur.

Maturantia.

Maturantia.

Si verò malum discutientibus non cedit, indicio est, ad suppurationem tendere, quod plerumq; quarto vel quinto die contingere solet. Quod si animaduvertatur, adiuuanda est maturatio, tum externis, cum internis medicamentis.

Intus quidem vile est frequenter cassiani extracti, seu medullam cassiæ in ore tenere, ut paulatim liquefcat in gulam descendat. Lenit enim maturat & resoluit. Gargarismi verò & collutiones fiunt ex lacte tepido cum saccharo, vel ex decocto radic. althææ, malur, lilior. alb. caricarum, dactylorum, iuiubarum, passulorum.

Vel ℞. Flor. malv. violar. an. m. i. scabios. summ. at. melilot. an. m. b. nido hirundin. ʒ. b. caricar. pinguum, N. v. passular. ʒ. b. semin. lini. ʒ. ii. cydon. ʒ. i. Coq. in aqu. hordei simpl. Colat. adde sapa ʒ. ii. F. gargarismus.

Vel ℞. Pussular. exacinat. ʒ. i. glycyrrh. ʒ. b. caricar. ping. N. v. sem. alibæ ʒ. ii. cydonior. ʒ. i. Coq. in hydrom. vel aqua pro gargarismo.

Vel ℞. Dactylos N. ii. caricar. pinguum ʒ. b. chamame. p. i. sem. lini. sameracis, an. ʒ. i. Coq. in aqu. f. ad medietat. consumpt.

Colat. ℞. lb. i. in qua dissolue sap. ʒ. ii. M. fiat gargarismus.

Extra verò applicari possunt emplastra maturantia, ex farina & remanentiis decocti sem. lini & fœnigr. cum butyro non salito, adipe gallinæ, & oleo lilior. alb. & quæ antea fuerunt proposita, ex nido hirundinis.

Vel ℞. Nido hirund. pulv. ʒ. b. sem. lini, sanigræ. radit. alibæ. an. ʒ. b.

Coqu. ad formam pultis, & addatur ol. chamamel. ʒ. i. Fiat cataplasma.

Ut autem facilius rumpatur abscessus, aliquid nitri, vel cineris hirundinis, vel stercoreis canini addi potest.

Vel ℞. Sem. sinapi, ʒ. i. Coq. in hydromel. lb. i. Pro gargarismo.

Nisi spontè abscessus rumpatur, æger ut sciretur & leni tussis, vel viid præstet conetur. Nonnulli præcipiunt, ut æger spongiolam filo alligatam, aut carnem fassam semicoctam deglutiat, ut filo attracto abscessus rumpatur. Alii panis crustam deglutire iubent. Verum cum liquidus cibus vix deglutiiri possit, multò minus solida deglutiuntur. Commòdum ergo ceream candelam oleo, anygdal. dulc. illitam in œsophagum immittere, ut ita rumpatur abscessus. Alii hiantè ore linguam deprimunt, & cultro ligneo acuto, vel scalpello tumorem, si conspiciatur, aperiunt. Quæ omniatamen cautè peragenda, ne in periculum suffocationis æger coniciatur.

Abscessu rupto, ne pus in pulmònes aut gulam in suat, id prònc capite expuat æger. Postea vlcus intergatur collutione vel gargarismo cum

cum hydromelite vel aqua saccharata, vel decocto hordei adiuncto melle. Et si post puris evacuationem vlcus quiddam sordidum, vel putridum præ se ferat, fortius detergentia & putredinem inhibentia vsurpanda, qualia supra in vlceribus oris proposita sunt.

Vel ℞. Fol. scabios. agrimon. an. M. j. nucum cupressi, ʒ. j. radic. aristoloch. longa, iridis Florentinae, an. ʒ. ʒ. flor. rosar. rubr. p. ii. myrrha. ʒ. i. Coq. in hydromelite ad lb. i.

Ad consolidandum vsurpetur linctus ex bolo Armeno cum syrupo vel melle rosato; aut pulvis ex thuris, myrrha, rosarum, boli armeni aequalibus partibus. Qui si melle excipiat, forma linimenti exhiberi potest. Interdum tamen accidit, vt angina neque resoluitur, neque etiam intus tumor rumpatur, idque cum summo agri periculo. Cum enim, vt supra etiam dictum, detur anginae species, eaque deterrima, in qua nullus tumor, nulla rubedo intus vel ex ra apparet, aegroque tamen suffocationis periculum imminet, cuius Hippocrates in Prognost. Galenus 4. de loc. aff. c. 3. Aëtius, scirab. 2. serm. 4. cap. 47. meminerunt, in qua aliis remedijs nihil proficit: in vltima desperatione sub maxillis & supra collum altioribus plagis scarificationem nonnulli instituerunt, & aegrum à suffocatione imminente liberarunt, nonnunquam pueri, nonnunquam sanguine effluente, aegroque ita leuato vt postea reliquis præsidijs locus esset. Quæ de re scribit Anton. Beniuacius, de abusi. morb. caus. cap. 38. Angina laborabat Nicolaus Rota, sed nullus tamen rubor, aut tumor, vel intus in gula, vel extra videbatur,

& ipse nihilominus vix spiritum trahens, quicquid prætere edendum sumeret, per os statim & nares reiciebat. Quare cum arescente corpore palente iam facie, ac verticibus oculis spes omnis sublata esset, & Medici, quibus cura demandata fuerat, egrum non amplius adirent, me licet iuniorum conuocant, egrum ostendunt, & quacunque acta fuerant, exponunt. At ego cum & aegrum ipsum ad mortem tendere, & Medicos, quæcunque opportuna fuerant, præsidia adhibuisse intelligerem, corpi mecum ipse cogitare, satis scire esset, egrum ipsum Deo, & natura, vt ceteri Medici incuratum dimittere, an aliquid, licet insolitum, vtile tamen auxilium expectari: Verum adhortantibus his, qui agro assistebant, consilium capio, & locum altioribus plagis sub ipsis maxillis, ac etiam supra collum incido, ex quo cum sanies multa prorumperet, adeo morbus leuatus est, vt sanitibus ipsis spiritum simul, & cibum capientibus, facili deinde ad bonam valetudinem aegro ipsi daretur regressio.

Hoc etiam in curatione anginae animaduertendum, semper vsque ad morbi declinationem aliquid detergentis medicamenti admiscendum esse, sicut in omnibus inflammationibus, quæ tenui cute teguntur; per quam semper aliquid refultat, id quod in angina copiosissimi sæpe sputi reiectio monstrat. In quem finem mel commodè adhibetur.

Atque vt vsum topicorum hactenus propositorum in summam contrahamus: in principio vtendū repellentibus, & nonnihil abstergentibus in augmento abstergentibus & repellentibus parum digestum admiscendum: in augmenti

sine & circa principium status abstergentia cum aequali quantitate digerentium & adstrigentium permiscenda; in declinatione tandem fortè scilicet digerentibus utendum, & paululum saltem ioborantium & adstrigentium admiscendum.

Specifica medicamenta.

Specifica. A proprietate prodesse traduntur fungus sambucinus coctus & bibitus, & foris etiam impositus. Lignum quoque hederæ à proprietate valere dicitur ad apostema gutturis. Unde Ioannes Marquardus in *practica* scribit, quod comedens ex cochleari de ligno hederæ, vel bibens ex vase hederaceo, nunquam vel rarò in apostema gutturis vel vuulæ incidat. Commendatur & ad tumores faucium rumpendos, si in decocto radicum alihæ & ficuum cum pauco Zingiberis, addita vini quarta parte inaceretur, & decoctum diu in faucibus teneatur.

Commendant etiam tanquam expertum lupi guttur, seu asperam arteriam, si angina laborans per eam bibat. Laudatur & hirundinum pulvis, si sale aspersi vinà cum pennis in fictili comburantur, & cinis melle mixtus illinatur, Galenus, 6. de *comp. med. sec. loc.* Et Celsus, lib. 4. cap. 4. scribit: Vulgo audio, si quis pulvis hirundinis ederet, anginà toto anno non periclitari, serena. lingue cum ex sale, cum is morbus viget, comburi, carbonemque cinis, cum: in aqua mulla, que potui datur, inficari & prodesse.

Laudant & filum sericum purpura tinctum, quo vipera strangulata sit, collo circumligandum, Galenus, 6. de *simp. med. faculi*. Vagrigana, l. 7. de *car. morb.* cap. 1. Commendantur & exuvie serpen-

tis in oleo amygdal. dule. coctæ; si in oleo illo lintem tingatur, colloque circumpunatur. Stercus item canis ossa comedentis, vt & cochlææ cum testis vstæ, & caneri vsti. Item rasura dentis castorei ʒ. j. vel ʒ. ss. pondere in aqua, scabiola propinata; vel rasura dentis apri, si eius ʒ. j. cum ol. amygdal. dule. recent. ʒ. ss. misceatur, & cum saccharo candido albo dulcoretur ac assumatur.

Reijcit tamen hæc à proprietate substantiæ medicamenta Petr. Paulus Pereda idè, quod angina est morbus manifestus, non occultus. Et non abs re est, medicamento- rum quorundam, quæ à proprietate substantiæ hic prodesse creduntur, rationes reddi posse. Ita ster- cus hirundinis & canis, vt & cochlææ & caneri combusti proculdubio vi exsiccandi & discutendi, quàm à sale imprimis habent, hic profunt. Si quæ verò sunt medicamenta, quorum causa facilè reddi non potest, illa proculdubio causæ anginæ opponuntur, in qua aliquid maligni & occulti inesse potest. Quæ ratione forsàn filum purpura tinctum, quo vipera strangulata fuit, prodest. Refert etiam Cardanus, lib. 7. de *varietate rerum* cap. 28. quod rubeta cocta & pro emplastro imposita adèò anginolis pro- fit, vt quendam hoc auxilio iam iam moriturum liberarit; credi- que & filum, quo rubeta suspensa interit, conferre. Vide etiam Plinium, l. 30. cap. 40.

APHYROTOMIA.

Si extremum suffocationis periculum immineat, & moriendum sit, ne antequam materia discutatur, vel maturetur, homo suffocetur, vt

æger seruetur, *æpupulæm*, quæ *æpupulæm*, à Paulo Ægineta, *lib. 6. c. 30.* nominatur, seu incisio tracheæ sub larynge inter duos annulos tertium & quartum & quintum tentanda. Quod antiquum iam ab Asclepiade & Anthillo vsurpatum est remedium, vt ex Paulo Ægineta, *loco citato*, & Cælio Aureliano, *lib. 3. c. 4.* videre est: de quo postea *quæst. 4.* dicetur. Modus operandi in Institut. *l. 5. p. 1. s. 2. cap. 7.* propositus est.

Diatæ.

Ac si sit temperatus. Sedeat aut decumbat æger erecto corpore, & omnino ea figurâ, quâ se leuari senserit. Victus sit tenuissimus, cremor pitæ, & in nostris regionibus ius pulli & carnis, ac, si vires requirunt, oua sorbilia. Utilia quoque sunt pruna & passulæ cum saccharo decoctæ, & iuscula cum lactuca, portulaca, & semen quatuor frig. maior. alterata. Potus sit aqua hordei, syrupo violato, vel syrupo de succo citri dulcorata, vel aqua mulsâ: vel cereuisia tenuis. Vinum, & omnia, quæ fluxionem humorum conimouere & febrem augere possunt vitentur.

Quod si æger planè deglutire non possit, nonnulli cannulam intra gulam immittere iubent, ac deinde liquidum alimentum per eam infundere, modo inflammatio ad illas partes non peringat. Alij fistulæ bubulæ vesicam alligant, sicut in clysteribus fieri solet, eamque succo nutriente implent, cuiusque extremitatem initio gulæ apponunt, vesicamque comprimunt, vt liquor in œsophagum descendat.

Quæ omnia si frustra tententur, ad clysteres nutrientes confugereli-

cet, de quibus in Institut. dictum. Perfecta equidem nutritio inde sperari non potest; iuscula tamen talia bene nutritientia & facilis coctionis, si in tenuiorem quandam chyli substantiam conuertantur corpus non nihil reficere possunt, donec via iterum alimentis per os assumendis pateat. Nonnulli etiam odore panis & carniū vaporis ægrum reficiendum censent.

De epidemia angina anni 1565. vide Dodonæum, *observ. cap. 18.* Et de cynanche, quæ intra 10. horas ingulauit, Antonium Brassauolam, *in comment. aph. 10. sect. 5.* Et de alia, quæ horis 12. ingulauit, Antonium Brassauolam, *lib. 4. de vitiis ratione in acut. & Fernelium, lib. 5. patholog. cap. 9.*

De Curatione Angina ex vertebrae colli luxatione.

Vnica hic indicatio est, vertebra à suo loco remotam in suum locum restituere. Ergo cucurbitula cervicis parti, qua fouea apparet, affigenda, vt vertebra suo loco restituitur; aut quod tutius est, cumprimatur per anteriora colli iuxta latera asperæ arteriæ vertebra, illa, atque extra, & in sedem naturalem pellatur.

De Angina notha.

Angina, quæ notha appellatur, Angina notha oritur à pituitosa & frigida materia è capite in fauces, aut cervicis & colli musculos decumbente, & tumorem *induratum* efficiente. De ea loqui videtur Hippocrates, 2. de morbis, dum scribit: *Oritur autem angina, cum pituita in capite agitata deorsum confertim fluxerit, & in maxilla ac citra cervicem confluxerit.* Abestque in angina notha inflammatio.

quæ anginam veram constituit. Itaque et si etiam à melancholia angina fieri possit postea ex. Heurnio dicitur: tamen ea non est notha angina, sed quia melancholice admiscetur sanguis, parit veram anginam. et si non puram.

Signa.

Signa.

Cognoscitur ista angina, quod inflammatio, calor, rubor, febris abest, dolor est exiguus aut nullus. Atque cum à materia in externis colli musculis herente excutitur, minus periculosa est hæc angina. Diuturnior contra est, ita ut dolores sæpe longo tempore durent.

Curatio.

Curatio.

Eadem ferè indicationes hinc sunt propositæ, quæ in angina vera. Nam humor qui affluit, euacuandus est, repellendus, qui affluit, discutendus, vel maturandus, & deinde euacuandus. An ergo venæ sectio vsurpanda sit, docebit habitus corporis & plenitudo. Est enim humor anginam istam produciens venæ sectionem non requirit: tamen ne à sanguine affluente morbus augeatur, si abundet, venæ sectione immittendus & reuellendus est. Humor pituitosus per clysteres acres & medicamenta conuenientia euacuetur.

Vrsurpentur etiam alia reuulsoria auxilia, ut vincula, frictions, lotiones extremorum & cucurbitulæ, cum scarificatione cruribus & dorso supra renes impostæ.

Gargarismus primò die talis vsurpetur.

℞. Fol. plantag. prunell. flor. rosar. rubr. an. M. j. balauftior. ʒ. j. Coqu. in hydromelite. Colaturæ ℞. lb. j. mell. rosar. colat. rob. nucum, an. ʒ. vj. Fiat gargarismus. Sequētib⁹ diebus.

℞. Nucis express. ʒ. ʒ. balauft. ʒ. ij. mast. ʒ. iij. Coqu. in hydromelite. Colaturæ. ℞. lb. j. Adderob. nucum ʒ. j. mel. ros. ʒ. ʒ. b. alumin. ʒ. ʒ. myrrha, croci, ana ʒ. ij. F. Gargarismus. Malo procedente talis vsurpetur.

℞. Passular. ʒ. j. caricarum nu. vj. sem. lini, fanigræ. ana ʒ. ʒ. sinapi, radic. pyrebræ, ana ʒ. j. In colaturæ lb. ij. dissolue myrrha, croci, an. ʒ. ii. F. Gargarismus.

Celebre fuit apud antiquos medicamentum Diabellæ, id est, ex ruta sylvestri dictum, quod descripsit Galenus, 6. de comp. med. sec. loc. c. 1. Quod quia hirundines recipit, appellatur etiam ab Arctæo Diachelidonium.

Si dolor urgeat citra statum talis fiat Gargarismus.

℞. Sem. maluæ, canlis an. ʒ. j. ficus num. iv. Coqu. in decoct. glycyrr. lb. j. ʒ. b. Adde myrrin recent. sine sale, ʒ. ʒ. F. Gargarismus. Ad maturandum talis utilis est.

℞. Caricarum pinguium, ductylor. ana num. vj. passularum, iunubar. an. ʒ. ʒ. sol. hyssopi M. j. myrrha ʒ. j. croci ʒ. ʒ. Coq. in hydromelite pro gargarismo. Potest etiam addi pulvis hirundinum.

Paratur autem pulvis hirundinum hoc modo.

℞. Hirundines, trücentur capite, & sanguis supra plumas extillare permittatur, deinde pauco sale conspergantur, & in fictili comburantur. Pulvis hinc gargarismis addi, vel etiam melli ad discutendum admisceri potest.

Pulvis hirundinum

Extra collum inungatur oleo chamæmelino, amygdal. dulcium, lilior. albor. vnguento dialthææ. Postea imponatur cataplasma ex farinâ hordei, semine lini, fæ-

nigræ, ficubus & siminibus. In statu.

℞. Malæ cum radicibus, albae, meliloti an. M. i. Coquatur ad mollicem. Contusis adde farina sem. lini, senigræ. an. 3. B. pingued. porci sine sale 3. x. ol. amygdal. dulcium, ebamemel. an. q. s. F. Cataplasma. Vel 2. Nidi hirundinis 3. i. B. emplastride melilotæ ii. medulle cassiæ 3. B. Cum s. q. sapæ F. Cataplasma.

Angina à
melan-
cholia.

Cæterum annon merito adhuc alia constituenda sit nothæ anginae differentia, quæ ab humore melancholico & atro proveniat, lectori indicandum reliquo. Facit eius mentionem Heurnius, de morbis pectoris. Oritur autem ea maxime in feminis melancholis, quibus menses non fluunt, & sæpè in cancerum degenerat. Vidit talem ter Heurnius, bis in duabus puellis, & semel in nupta fetè senescente. Nigredo quædam ad epiglottida ferè apparuit. Nupta deglutiendi difficultate periit. Atque exesus œsophagus ac musculi sternohyoides, ita ut cibus per interiora, profluere ac exesibus iugularibus hæmorrhagiâ interiit vna, altera sensim contabesceret.

QVÆSTIO. I.

An omnis Angina sit ab inflammatione.

An omnis
angina sit
ab inflammatione.

Angina per inflammationem vulgo, & quidem ex Galeni doctrina, 4. de rat. viçibus in acutis text. 20. & 2. ad Galæcon. cap. 1. definiri, supra diximus Galenus tamen, 4. de loc. affect. cap. 5. addita Hippocratis, ex 2. eisdem. sententia, etiam inter anginae species recenset eam, quæ ex vertebrarum ad interiora luxatione & percussione fit. Et Aretæus,

lib. 1. cap. 7. aliam, quæ sit solius spiritus prava conuersione ad calidissimum & siccissimum mutati vitio, nulla capitis per se inflammatione laborante, addit.

Verum enim verò non omnis suffocatio, multò minus respiratio læsa est angina. Equidem si vocabulum anginae spectes, quod ab ἄνω, deducitur, omnis suffocatio angina dici posset: vsus tamen obtinuit, ut propriè & in specie illa suffocatio saltem dicatur angina, quæ saluo thorace à faucibus & gutturis, & partium huc pertinentium læsione provenit. Et quidem cum vulgatissimè à partium harum tumore & inflammatione accidat, angina etiam harum partium inflammatione determinatur. Luxatio verò vertebrarum cervicis, etsi eandem suffocationem inducere possit: tamen cum rarius accidat, & à causâ externa pendeat, inter anginae quidem in genere ita dictæ differentias referri potest; tamen alterius curationis, quàm ea, quæ ab inflammatione provenit. Angina verò, cuius Aretæus mentionem facit, vix ad anginam commodè referri potest, sed potius ad suffocationem læsam, de qua parte secunda dicitur, pertinet: cum, sicut ipse Aretæus scribit, in pectore vitium, si, ubi spirandi initium ponitur, quòdque hominem celeriter eadem die iugulet. Neque tamen, ut nonnulli existimant, de ea suffocatione loquitur hic Aretæus, quæ ex aère crasso & denso, qualis è carbonibus accensis exhalat, originem habet. Expressè enim scribit Aretæus, causam mali non extrinsecus aduenire, sed intus excitari. Sed si ea, quæ tradit Aretæus, diligenter perpendamus, de acutis-

simā aliqua pulmonis inflammatione, aut certe de æstuosissima & acutissima febre, quā spiritus calidissimus redditur, loqui videtur. Heurnius anginam hanc fieri existimat ob inflammationem nervi qui enatus ē colli vertebrais, ac per pericardium elatus etiam diaphragmati implantatur. Videatur etiam Hippocrates, 1. *de ratione vultus in acut. text. 21. & seqq.* & Galenus, in *commentario*. Et fortassis talis fuit angina, cuius mentionem facit Dodonæus, in *observat. cap. 18.* qui in dissectis talibus ægris demortuis pulmones putulentos fuisseprehendit. Scribit autem eodē loci Dodonæus, distillante à cerebro humores asperæ arteriæ ramos primò repletos fuisse. Deinde eodem ad alia vasa transmissis liberari quidam arteriam, pulmonis autem malè affecti partes à dolore occupari. Tale quid Polemarchi uxori, 5. *epid. sect. 61.* accidit, quæ cum primū angina teneretur, sanguine missis faucium suffocatio desit, sed humore ad pulmones proculdubio decumbente septimo mortua est.

QUESTIO II.

An humor Anginam excitans à cerebro & capite defluere possit.

An humor anginosus excitans à cerebro destuat.

Docet id expressè Hippocrates, dum 4. *de rat. vultus in acut. text. 30.* scribit, anginam fieri, dum hyeme & vere fluxio multa & viscosa ad iugulares defluerit venas: Id quod ex capite fieri, Galenus, in *comment.* rectè docet.

Videtur tamen huic opinioni aduersari id, quod angina est tumor calidus à sanguine ortum habens: in hyeme verò, quæ pituita est metropolis, frigidi & crudi humores

cumulantur, & inde excernuntur, ut in catarrhis & coryza fieri videmus. Deinde quod excrementa cerebri per nares & palatum præcipue euacuentur, per quas vias in spatia illa, in quibus angina generatur, pertingere non possunt.

Verū sciendum, excrementitios humores, qui in cerebro colliguntur, præcipue ea parte, vbi venæ & arteriæ primū in eius substantiam inferuntur, non omnes per palatum & nares euacuari; sed in vasa regurgitant, atque hinc, si post aures defluerint, parotidas, si per iugulares ad faucium & gutturis venas, anginam excitant, ut istos varios defluxionum modos Hippocrates, in *lib. de locis in homine & de glandulis* explicauit. Vnde etiam isti humores non soli & separatim, ut dum per palatum & nares fluunt, in fauces irruunt, sed quia per venas feruntur, sanguinem seu comitem seu vehiculum adsciscunt. unde inflammatio excitatur, sed huius vel illius humoris particeps.

QUESTIO III.

An verasit angina, quæ à fungorum esu & similibus venenatis rebus oriri dicitur.

Cognata quæstioni præcedenti est & illa ista, an illa suffocationis species, quæ à fungorum esu & similibus venenatis inferitur, sit angina. Etenim supra in causis anginæ diximus, à nonnullis etiam inter causas anginæ recenseri fungos & similia. Etenim fungi quidam pariunt quasi suffocationem, id quod Pausaniæ puellæ accidisse refert Hippocrates, 7. *epid.* Idem accidit ab helleboro albo & aconito, & vntor apud Harpalidem, *lib. 7. epid.*

An vera sit angina à fungorum esu, &c.

ex usu medicamenti purgantis suffocationem quasi incurrebat. Herba bella donna dicta similem qualitatem habet, de qua Heurnius: *loci causa*, inquit, (verum in talibus iocus locum ita tunc non habet) *serpulus de radice degrassi maceretur in vini 3. i. s. horis ad summum duabus & deinde percolato, ac digitis presso id vini recentis additur, quod poculum replicat. Totum potandum parafris praebeatur. Et inde, ut paulo post, qui biberint, nihil prorsus edere possint magno spectantium oblectamento. Dissentiunt fucus à usu acetopos datus. Id enim praesensissimum antidotum. Idem habet Ioh. Baptista Porta, lib. 14. *Magis naturalis.**

Verum sciendū talia venenata, si saltem angustiam quandam & quasi suffocationem sine inflammatione inducant, ad causas anginae referri non posse, patetque latius suffocatio quam angina. Si verò occasionem praebeant, ut sanguis ad fauces confluat, atque inflammationem excitet, inter causas anginae merito referunt.

QVÆSTIO IV.

An nidus hirundinis aliquem in angina curanda usum habeat.

An nidus
hirundi-
nis ali-
quam
vim ha-
beat.

Vulgatum esse apud Practicos, ut nidus hirundinis topicis medicamentis ad digerendum & discutendum in angina admisceatur, supra dictum. Aliqui tamen id improbant. Reprehendit primò usum nidi hirundinis Mercurialis, scribitque Practicos plerisque male consilium veterum intelligentes existimare, hanc vim inesse nido hirundinis, cum tamen eam habeat avis. Nam hirundo ad anginam commendatur, de quo Celsus, lib.

4. cap. 4. *Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederet, angina cito anno non periclitari, servatūque, cum exsaler, cum is morbus viget, comburi, carbonemque eius curritum in aqua mulsā, quæ potui datur, infricari, & prodesse. Et pulvisculus ex hirundinibus etiam gargaritis admiscetur. Verum cū vim aliquam peculiarem ipsa avis in hoc morbo habere tamē usu deprehensū iā est, etiam nidum prodesse, atque vis illa proculdubio nido inest, ob exciementa pullorum hirundinum, eaque sale multo abundantia, sicut & vis stercoreis canini, si biduo vel triduo tantum ossa comederit, proculdubio à sale proficiscitur. Deinde Petr. Paulus Pereda etiam usum nidi hirundinis hūc improbat, quod terra repellat. Verum non omnes terræ æqualem vim repellendi habent, nec ipse negare potest, stercore hirundinis digerere. Ideoque si quis omnino metuat vim repellendi in terra, ea maxima ex parte, ubi stercore hirundinum destituitur, separari potest, ut vis resolvendi, & attrahendi quæ est à stercore, fiat fortior. Neque enim existimo nidum hirundinis, præcipuè ob terram, quæ ei inest, adhiberi, sed potius ob stercorem hirundinum, quod, ut Galen. 10. *de simp. med. fac. & G. de comp. med. fac. loc.* docet, acre & discussorium est; id quod ex historia Tobia patet, qui ex stercore hirundinis calido ipsi in oculos illapso excecatus est. Quam acrimoniam cum admixta terra temperet accommodatissimum discutiendis tumoribus, præsertim faucium & gutturis, est remedium, imprimis si hirundin aliqua peculiaris vis contra anginam uelit.*

QVÆSTIO. V.

An laryngotomia ſua & utilis ſit.

An laryngotomia
tota &
utilis ſit.

Equidem nonnulli laryngotomiam planè improbant, utpote quæ periculofa ſit, cùm primò oſſa, & cartilagineſ, à quibus & trachea pulmonis arteria conſtat, coaleſcere nequeant, ex ſententia Hippocratis, 6. aph. 18. atque ita ægro interitus aſſeratur. Deinde metuendum ſit, ne ſanguis è vulnere effluens in pulmones ruere, ægrumque ſuffocare poſſit. Tertio etiam Aretæus & Aurelianus fide experientiæ hanc operationem deſtitui exiſtimant.

Verùm vulnera tracheæ planè inſanabilia non ſunt, ſicut exemplo docet Albucaliſ Chicurg. lib. 3. c. 43. atque aliquot etiam Schenkii, lib. 2. obſ. 40. collegit. Atque ipſe etiam arteriam ita vulneratam, ut vulnus in cavitatem eius penetraret, ſanatam fuiſſe bis vidi. Et quamvis ipſa cartilago non coaleſcat: tamen carnis duræ & veluti calli interueniunt, & membranæ, quæ iunguntur annuli aſperæ arteriæ, conglutinantur. Neque etiam de fluxione ſanguinis in pulmones metus eſt, ſi ſectio rectè inſtituatur. Nullum enim inſigne vas eſt eò loci. Iis verò, qui experientiæ fidem in dubium vocant, meritò ea exempla, quæ paſſim apud Medicos occurrunt, opponenda, quæ Schenkii l. alleg. collegit. Reſertque etiam Ant. Muſſa Braſſanoloſ, in comm. in 4. Hipp. lib. de vict. rat. in æditi, ſe ſuis manibus, cùm chirurgus quidam impetrans id non auderet, angina laboranti morti propinquo quæ ut diſſecuiſſet, quod & aliàs pluries cum ſelici ſuccellu te tentaf-

CAPVT XXV.

De Strumis in collo & bronchocele, ac hydrope gutturis.

TAndem inter colli vitia meritò Strumæ. etiam ſtrumæ dictæ explicandæ; Strumæ autem, quæ Græcis *χυφάτις*, dicuntur, ſeu *αἰνῶν*, *χυφάτις*, id eſt petris è mari promientibus, ſeu *αἰνῶν*, *χυφάτις*, id eſt, ſcrophis, vnde & vulgò ſcrophulæ dicuntur, quod ſcrophis, id eſt, quibus frequenter in collo oriuntur, etſi in genere pro omnibus induratiſ tumonibus & peculiatî membranæ conſuſis, quæ in glandulis, in collo, ſub axillis, in inguinibus, ut & mammis oriri ſolent, accipiuntur, ut ex Celſo l. 5. c. 28. & Aëtio, tetrab. 4. ſerm. 3. cap. 5. videre eſt: in ſpecie tamen à nonnullis ſtruma pro tumore in gutture accipitur, de quo agere huius loci eſt: de reliquis huius generis ſtrumis de tumonibus in genere dicendum.

QVÆSTIO.

An bronchocele, & ſtruma in gutture ſit idem morbus.

Verùm cùm tumorum horum natura & curatio rectè explicari & tradi non poſſit, antequam hæc quaſtio expediatur, eam, quæ aliâ poſtponenda eſſet, huic capiti præmittere liber. Fecit autem huius controuerſiæ iam mentionem Ioh. Langius, lib. 1. epiſt. 243. ubi ſcribit bronchoceleſ, ſeu hæmiatium gutturis

An bronchocele & ſtruma in gutture ſit idem morbus.

gutturis longè diuersum à Struma fuisse vet eribus tumoris genus. Celso scilicet, *lib. 3. cap. 28.* Strumam esse tumorem, in quo subter concretæ quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur: id quod in ceruicæ, alis, inguinibus, in lateribus & mammais quoque accidat: bronchocele verò sit pendulus circa guttura tumor à bocij, ventricosi poculi similitudine bocium appellatus, inter cutem & asperam arteriam: in quo modò caro pituitosa, modò humor aliquis meli aut pulci similis membranulis includitur, interdum etiam pili minutulis ossibus mixti reperiuntur. Verùm consuetudo sit dicendi magistra, parùm referre putat bronchocele & charades strumas quoque appellari.

Verùm etsi forsitan hæc ita sese habeant, & strumæ vocabulum pro tumore, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine oriuntur, quæ febres mouent, atque alio tumore, quàm qui hodie hoc nomine appellantur, (strumæ enim hodie notæ febrem non excitât) & forsitan pro apostemate aliquando scirrhuso acceperint: tamen de hoc etiam adhuc quæstio est, an strumæ hodie notæ differant à bronchocele. Nam video & hac de re etiam inter anthores discrepantiam. Alij enim bronchocelelem sub strumis comprehendunt, & bronchocelelem statuunt esse strumam in gutture; alij verò eos tractatione seiuungunt & separant. Hieron Fabric. *de oper. chirurg.* hanc differentiam constituit, quo bronchocele sit tumor non in glandula aliqua, sed supra arteriam asperam obortus, struma verò in collo sit tumor in glandula aliqua ex iis, quæ asperæ arteriæ adiacent, potissimum

in his, quæ sub larynge statim hinc inde ad asperæ arteriæ latera ponuntur, atque ita bronchocelelem sumit pro abscessu aliquo penitiori membranz incliso ad *apixæ*, id est, asperam arteriam enaro, strumas verò sumit pro glandularum in collo tumidibus. Idem statuit etiam Franciscus Peccettius, qui *lib. 1. chirurgiæ cap. 23.* strumas glandularum tumores esse scribit bronchocelelem verò tumorem seu abscessum magnum, mollem & rotundum inter cutem & asperam arteriam: Et ex Guidone scribit, si huiusmodi tumor in capite oriatur talpariam seu talpam dici, in collo bocium, in testiculis herniam (carnosam scilicet) Distinguit etiam strumas, & bronchocelelem Platerius, etsi alio modo, ut postea dicetur. Ut ergo, quæ utriusque sit natura, videamus seorsim de utroque affectu dicemus.

De Strumis in gutture.

Strumæ ergo in gutture sunt tumores in glandulis, quæ asperæ arteriæ adiacent, orsi è pituita lenta & crassa, aliquando etiam peculiari came geniti, peculiati membrana conclusi.

Hippocrates in *Coacis lib. 2. tertii sect. aphor. 2. ex disinct.* Hollerij, ab anno 14. & 42. strumas fieri docet; ab ea verò ætate ad annos tres & sexaginta strumas fieri negat. Quod procul dubio verum est, ubi ab interno humorum vitio strumæ fiunt; cum ea ætate materia amplius deesse videatur. Interim non videtur impossibile, etiam post 42. annum strumas fieri posse ab aquarum vitiosarum potu, quod illis accidit, qui ad Alpinos populos veniunt. Tumores enim hi quibusdam locis endemij sunt scribitque Hieron. Fa-

Strumæ
in gutture.

bricius ab Aquapendente, tales tumores frequentes esse in quadam Bergomenfis agri parte, vbi cum viri tum mulieres fecerint omnes antea In collo gestant tumores magnos, molles, mobiles, & pendulos, doloris expertes. Idem morbus & Allobrogibus & Alpibus, ac Carinthiæ Scythiæ Alpinæ inhabitatoribus, & Hispaniæ quibusdam locis familiaris est.

Tumores hi, vt diximus, & strumæ & scrophulæ dicuntur. Platerus tamen inter eos talem facit differentiam, & strumæ illos tumores in gutture appellat, qui sunt magni & penduli, & sæpè cum gutturi profundè incumbunt, rauedinem vel dyspnoeam aliquam efficiunt; scrophulæ verò eos saltè tumores, cum vna simplex glandula vel ex duabus, tribusque nonnunquam instar vix complicata prominet, appellat. Nam etiam scrophulæ, seu porci tumores hi saltè prominet, non dependent.

Causæ.

Causæ

Oriantur autem strumæ hæc imprimis ex humore crasso & lento, quem vulgò pituitosum esse statuunt, cui interdum etiam melancholicus admisceatur. Platerus tamen non sine causa hæc monet, non satis rectè vulgò statui, ex sola pituita, aut melancholia hos glandularum tumores deduci. Ex his enim si strumæ & eiusmodi tumores alij ortum haberent, non tam diuturni essent, sed putredini & corruptioni obnoxij, & in pus mutarentur, vt alij ex humoribus simpliciter excrementitijs orti tumores. Ipsæ verò è succo nutriente hos tumores orti statuit. Cum enim glandulæ, quàm alix carnes crassiore succo nutriantur, si is quantitate, & qualitate moderatus sit, eas in suo

naturali statu conseruat; si verò qualitate & imprimis quantitate excedat, tumores varij excitantur. Etenim si aliquid humorum planè excrementitiorum admisceatur, tumores eiusmodi citius in abscessum abeunt. Si verò succus ille nutriendus solus sit, sed copiosior, quàm vt parti omnis apponi possit, in eiusmodi tumores degenerat. Naturaliter enim talis humoris non plus in corpore generari debet, quàm vt partibus illis nutriendis sufficiat. Si verò plus eius generetur, tunc tumoris causa est. Natura enim vt vitiosos humores alios ad alias partes prorudi, vt in scabie, erysipellate, bubonibus, arthritide videre est: ita etiam quod in alimento est ignobilius, non partibus nobilibus apponit, sed glandulis, vnguibus, capillis. Quapropter etiam si talis ignobilis, seculenti, & crassi alimenti plus generetur, natura rectè agens ad illas partes, cum quibus conuenientiam habet, glandulas scilicet prorudit, ex quo proinde etiam carnem, aut carni quid simile generare tentat. Vnde etiam Author definitionum Medicarum strumas dicit carnem siccam, & Aëtius ex Leonida carnem subalbescentem facillè auferentem. Et quidem peculiaris membranæ strumæ includuntur, quæ & ipsa à facultate formatrice, quæ omnibus partibus viuentibus insita & nunquam otiosa est producitur. Dum enim ab affluente humore superfluo membrana distenditur, & forsitan etiam rumpitur, natura nouæ quali membranæ texturam aggreditur.

Platerus his causis addit etiam semen & facultatem formatricem in utero, & scrophulas has, vbi sunt alicui loco familiares, à parenti;

bus in liberos propagari potius, quā cibi vel potus alicuius peculiaricausa euenire, statuit. Quod ut non raro verū esse existimamus; ita potum & causas ante propositas reiciendas non censemus: cū obseruatum sit, eos, qui sani in talia loca peruenerunt, si aliquandiu ibi degant, strumas tales contrahere.

Habet autem humor ille ortum à cibis crudis & crassis, vnde etiam ætati puerili, quæ tales humores cumulat, malum hoc familiare esse ex Hippocrate modò dictum est, imprimis ex potu aquarum crudarum & niualium: Qua de causa, qui Carinthiam & Styriam, & alia ibi loca Alpes versus incolunt, plerique bronchoecle laborant. Langius equidem lib. 1. *epist.* 43. & lib. 3. *epist.* 4. qui eò loci videatur, in hydrargyrum, seu aquas ex montibus metallorum feracibus scaturientes, & Mercurium in se continentes causam huius rei refert. Et omnino negandum non est argentum viuum peculiari modo pituitam ad fauces & glandulas sibi protrudere, ita ut etiam extrà inunctus saluationem exciret & dētium vacillationem pariat: Quia tamen in Hungaria & Transylvania, atque alibi etiam in magna copia Mercurius prouenit, vbi tamen morbus ille epidemius est: malo simpliciter ex aquar. crudarum, & ex niue liquecente resolutarum potu fieri, quas Hippocrates lib. de aëre, aquis, & locis *ἡ δὲ αἰτία ἐκ τῆς κατὰ τὴν φύσιν ἀκαταστάσεως* nominat.

Signa Diagnostica.

Signa.

Affectus ipse per se patet. Apparet enim tumor rotundus, pendulus, propriæ membranæ inclusus, qui propterea ad tactum mobilis est,

& à cute separari potest.

Prognostica.

1. Strumæ hæc ut omnes difficulter curantur, in pueris tamen facilius curantur, quàm in adultis.

Prognostica.

2. Liberæ ac nulli vasi implicatæ strumæ curantur facilius, quàm quæ vasi implicatæ sunt.

3. Excisione sine periculo vix curantur, propter nervos recurrentes eò loci latentes, qui si læduntur, vox perit: quod cuidam accidisse refert Galenus, 1. de loc. affect. cap. 5. qui cū strumas in profundo in collo incumbentes excinderet, & inter secandum quoddam vas non specillo secaret, sed vnguibus euelleret, imprudens ob ignorantiam simul nervos recurrentes distraxit, atque hoc pacto puerum liberauit à strumis, sed mutum reddidit. Idcoque strumæ, quæ in anteriore colli parte sunt, periculosiores sunt, quàm quæ in posteriore.

4. Nisi folliculus radicitus excindatur, malum reuerti solet.

Cura.

Materia tumoris causa tollenda est, & si quæ materia affluat, ea etiam euacuanda. Quod sit; dum vel insensibiliter absorbitur ac discutitur, vel in pus mutatur, vel excinditur.

Cura.

Primò ergò, si adhuc vitiosi humores, præcipuè pituitosi, qui causæ antecedentis rationem habeant, in corpore abundant, ij tollendi, & corpus conuenienter euacuandum, cū: per vniuersalia, tum per ea quæ caput iungant.

Deinde corpore euacuato ea medicamenta exhibenda, quæ materiam strumarum absorunt, absor-

bent & exsiccent. In quo genere primò est radix scrophulariæ, quæ nomen inde habere videtur, quod scrophulus in medietate, item radices verticæ mortuæ, filipendulæ, gladioli, Laudatur & radix rusci, cuius efficaciam sibi quoque compertam esse testatur Fallopius, si eius in puluerem redactæ drachma vna singulis diebus cum vino assumatur. Vel ℞. Rad. rusci ʒ. ss. iridis ꝑ. ix. Cum vino dulci vel mulsâ inhibeatur diebus 40.

Plurimum etiam commendatur spongia, ac sequens medicamentum ut secreta in multis probatum commendatur.

℞. Spongiam nouam, crudam non lotam, quæ calculis & nodulis sit refertissima. Infundatur tota in f. q. cerevisiæ, ita tamen, ut aliquandiu decoctum sufficiat. Coque cum cereuisiâ, ut absumatur quantitas duorum transuersorum digitorum. De eo bibat æger vesperti, cum cubitum iacet, haustum calidè. Sin autem assumptâ illa potio præ nausea noquit, addi possunt aromata pro libitu, aut radix polypodii quæni.

Amplius de Villanova hunc puluerem laudat, utpote à quo omnes infra vigesimum quintum annum infallibiliter curentur.

℞. Cineris spong. marina & palca marina, ass. s. sepiæ, piperis longi & nigri, zingiberis, cinamomi, salis gemmæ, pyrethri, nucem cupressi, gallarum quercus, rosar. an. ʒ. ii. Fiat Pulvis.

De quo æger læptus de die & nocte in ore aliquid teneat, & paulatim deglutiat. Idem & cibis inspergi poterit.

Idem & alios pulveres proponit. Valde etiam commendatur hic pulvis.

℞. Rad. aris. aloch. rotunda, rapba-

ni, spatula scirpa an. ʒ. j. sol. pimpinellæ, pilosellæ, rubiæ maioris, an. ʒ. ij. scrophulariæ, filipendulæ, an. ʒ. ʒ. ss. anisi ʒ. ij. zingiberis ʒ. i. turbut. opt. sol. senæ elect. an. ʒ. ij. sacch. albiss. ʒ. iiii. F. Pulvis, de quo sumatur singulis diebus cochlear vñ cum vino albo vel aqua gemistæ. Vel ℞. Lapidis spongia ʒ. iiii. Sal. gemmæ ʒ. ij. salis variari ʒ. j. Fiat Pulvis Sumatur à quadra vltima quotidie ex vino ʒ. ʒ. vel ʒ. ii. Alius pulvis contra strumas.

℞. Spong. marin. pile marin. corall. rub. ust. ʒ. ii. papyri tenuiss. & albiss. & omnium combust. an. ʒ. ʒ. ss. Quibus cineribus admisc. rad. scrophular. mai. ʒ. iiii. off. sepiæ, sal. gem. gallar. an. ʒ. ij. nuc. mosch. piperis long. & alb. zingib. an. ʒ. i. cinamomi ʒ. i. ʒ. ss. sacchari ʒ. i. ʒ. ss. M. F. Tragma.

Ex pulueribus istis cum syrupo betonicæ vel alio conueniente fieri possunt etiam electuaria. Vel talis paratur potio.

℞. Rad. scrophulariæ, filipendulæ, an. ʒ. ʒ. ss. sol. agrimonie, pilos. pimp. an. m. i. flor. betonicæ, rosar. marini, an. P. i. Coq. in vino albo vase clauso. Colatura dulcoretur saccharo, & addatur aq. cinamom. ʒ. ʒ. ss. pro duabus vel tribus dosibus.

Tertio topica usurpanda, & primò Topica emollientia & resolucentia. quidem danda opera, ut materia tumoris causa insensibiliter discuti & absumi possit. Et adhibetur serè medicamenta, quæ scitis has applicari solent, & primo quidem emollientibus, incidentibus & discutientibus utendum. & imprimis ea eligenda, quæ strumis priuatim prodesse compertæ sunt, ut scrophularia & similia, atq; ut corpus mollius vel durius, tumor recentior, vel antiquior fuerit, ita fortiora, vel mitiora usurpanda. Ut ℞.

Rad. alibæ ʒ. i. mucilag. sem. lin. *Seni-
græci*, an. ʒ. vi. pingued. gallin. *humana*,
an. ʒ. i. ol. amig. dulc. ʒ. b. *croci* ʒ. b. *ce-
ra* q. s. F. vnguentū. Vel ʒ. *Rad. scro-
phularia autumnō effusa & purgata* q. v.

Contundantur cum f. q. butyri re-
centis, inq; siccile operculo clausum
loco humido reponantur per dies 15.
Deindolento igne calefiāt & colen-
tur. Linimento hoc strumæ illinan-
tur. Vel ʒ. *Folia cupressi*. F. Puluis.

Puluis hic vino conspergatur & in
missam vnam redigatur. Hoc medi-
camento strumam illines, & tertio
die denum solues, tum locum expri-
mas, quem contractum inuenies. De-
nuō medicamentum induces, atque
iterum obligabis per triduum, donec
struma euanescat.

Et talia plurima passim à Galeno,
Paulo, Celsō, Rhase, Auicenna & a-
liis describuntur, quæ omnia hic cu-
mulare opus non est, præsertim cum
plurimi diffidat huic curationi in an-
tiquis strumis. Quamquam enim Ga-
lenus & alii curandas hoc modo stru-
mas esse præcipiant, ac Valescus de
Tarata in strumis vnus annu talibus
resoluentibus cum felici successu se
vsum esse scribat: tamen si sint anti-
quiores & perfectæ ac membranæ
conclutæ, hoc modo integra curatio
vix superari potest.

Itaque vbi per emollientia & resolu-
entia tumor discuti non potest, ad
maturationē & suppurationem veni-
erit dum. Vt ʒ. *Rad. lilior. albor. al-
ibæ siccis*. Coqu. ad mollietiem.

Deinde adiecta farina triticea & o-
leo dulci, vel liliorum alborum, ac
pinguedine asferina vel gallinacea
fiat Cataplasma.

Vel alia maturantia applicentur,
quæ passim nota sunt. Insistendum
autem tamdiu vsq; suppurantium,

neq; locus antè aperiendus, donec to-
ta materia intus conclusa in pus mu-
tata fuerit, Vomica enim adhuc con-
clusa calor etiam conclusus manet,
atque reliquum etiam materiz faci-
lius in pus vertit. Quod si vomica
citiùs aperiatur, cū humoribus etiam
spiritus & calor effunditur, quo ex-
spirante reliqua pars materiz postea
tardius & cum difficultate suppura-
tur. Cui & hoc accidit, quod pars
materiz suppurata facit, vi & reli-
quum facilius in pus mutetur.

Vbi verò struma fuerit in pus mu-
tata, aperienda est vel medicamento,
vel fetto aut cauterio. Aperienda vomica
pus euacuandum, deinde sinus ex-
purgandus vnguento Apostolorum,
medicamento de apio, vel simili, hinc
sinus carne implendus & cicatrice
claudendus. Imprimis verò hoc vn-
guentum ad strumas suppuratas &
aperatas commendatur.

ʒ. *Olei laurini* ʒ. i. cerussæ pulueris a-
st. & cum aqua *rosa lancia* eisdem
ʒ. i. *aluminis rosæ* ʒ. b. *salis commu-
nis* ʒ. ii. F. vnguentum. Vel applice-
tur Emplastrum diachylum compo-
situm. Vel ʒ. *Rad. iridis* ʒ. iiij. Coq.
in aceti & mellis ʒ. vi. Contundantur
minutum & addantur *terebinthina*,
unguenti dialibæ, an. ʒ. iii. *pulu. cu-
mini, fenigræci*, an. ʒ. i. *cera*, q. s. Fiat
Emplastrum. Vel ʒ. *Galbani, bdelli*
an. ʒ. i. *ammoniæ* ʒ. ii. *sordis alucrio-
rum apum, esypi*, an. ʒ. ii. *terebinthina*,
piciis liquida, an. ʒ. i. b. *baccar. lanri*,
staphidis agræ, camini pyrethri, an. ʒ.
b. *stercoris caprini, ouilli, asferini* an.
ʒ. iii. *axungie porci, seni caprini, cerui-
ni, vesini*, an. ʒ. i. ol. *chamæ. lilior. al-
bor. cera*, an. q. s. F. Emplastrum, quod
potenter resoluuit. Vel ʒ. *Rad. bion-
nie, cyclamini, cucumeris agrestis, iridis*
an. ʒ. ii. Coq. in vino albo & coctur.

Deinde adde armoniaci aceto dis-
soluti, bdellii, epos anacis in ele. sifa-
mino dissoluti, an \mathfrak{z} j. ster cori. co. hini,
caprini, an \mathfrak{z} j. b. j. ladani, stiracis, cala-
mitae, an \mathfrak{z} j. b. i. o. r. u. n. a. u. a. l. i. s. q. f. F Em-
plastrum. Vel \mathfrak{z} l. Emplasti de meli-
loto \mathfrak{z} j. bdellii aceto scilicet dissoluti
 \mathfrak{z} ij. castoreo pingui \mathfrak{z} j. b. i. u. l. a. r. a. d. i.
resol. col. cupressi, an \mathfrak{z} j. ol. t. b. a. m. mel-
litol. albor. amygdalar. amar. an. q. f.
F. Emplastrum.

Scdio.

Quod si nec hoc modo curatio sperari potest, extrahenda est struma: quod quidē sic primò sectione, quæ quomodo peragenda sit, in Instit. lib. 8. part. 1. sect. 2. c. 13. dictum.

Septica

Quod si æger ferrum non admit-
tat, alius modus superest strumas
tollendi per medicamenta, seu cau-
stica & corrodentia, seu septica &
putrefaciencia. Hæc autem in re dili-
genter obseruandum, ne partes vici-
næ à medicamentis his lædantur &
inflammentur. Ideo muniendæ sunt
vnguento refrigerante Galeni, rosa-
to Mesuæ, & limilibus. Perficitur,
autem hæc res duobus modis. Alij
scarificationem præmittunt, & stru-
mam in minutissima scarificant, de-
inde inspergunt puluerem paratũ
*inforis diaboli fucat. in umbra 3. i. ar-
senici rubri, vitrioli, lithargyri, auripig-
menti*, an. 3. i. Pulueri impone em-
plastrum diachylum, quod post 24.
horas demum denue & vide, an stru-
ma sit castigata. Nisi fuerit, aufer
scalpello cutem mortuam, denuo
quod insperge puluerem, & emplas-
trum imponito. Post 24. horas ca-
stigatæ scrophulæ illuatur locus bu-
tyro & vitello ouimixtis in formam
lunimenti. Et ita singulis 24. horis li-
uimentum mutabis, donec caro
morta decidit.

Alij fine scarificatione mox medi-

camenta caustica & septica adhiberi
alij tamen alia. Follopium in corpori-
bus rusticis vixit trochiscis de
minio, quos describit Iohan. de Vi-
ge, lib. 8. cap. 13. vbi & familia me-
dicamenta plura reperiuntur, pro
quibus ille, vt meliores hos substituit.

*℞. Auripigmenti, arsenici crystal-
lini, an. q. s. Mille cum pasta ex farina
triticea, & F. trochisci. Pro qui-
bus etiam in apertam vomicam hoc
medicamentum imponit.*

℞. Arseni i rubri, sandal. acba Gra-
corum, an. ʒ ii. axungia suilla q. s. M.
fiat vnguentum.

Et plurimi quidem censent, arsenicum hac in re primatum obtinere. Verum cautione opus est, & non temerè adnouendum. Nam supra modum vehemens ac virulentum est, febres excitat, & plurima alia prava symptomata inducit, & in minima etiam quantitate multa præstat. Ideoque ultra quantitatem dimidii grani triticei non adhibendum, & quidem in corpore robusto, & loco à membris nobilibus remotiore. In corporibus verò mollioribus & iuxta membra nobilia minor quantitas adhuc adhibenda, semperque præstat minimam quantitatem vna vice applicare, & postea idem medicamentum, si opus sit, repetere, quam nimia quantitate ægrum lædere. Et cum per dies tres duret operatio eius, eo tempore ager semper vt febricitans aliquis regendus, & contra malignitatem muniendus. Itaque cum non sine periculo arteriæ applicetur, præstat lapide caustico, quo fonticuli applicuari solent, quemque in Iulstii. lib. 5. cap. vlt. describimus, vti.

Quando glandula iam corrupta &

absumpta fuerit, crusta inducta à farina parce remouēda butyro loto cum farina triticea & axungia suilla. Crusta dempta si quid adhuc vitio si reliquum fuerit, illud etiam per medicamenta erodeant, vt vnguentum Agrippæ & similia, tollendum, & tandē vlcus, vt fieri solet, sanandum.

Est tamen adhuc alius modus strumas sanandi, quæ ab exili radice pendet. Illas enim serico filo, aut setis equinis versus radicem constringere licet, & quidē in dies atq̃idē, donec resiccatæ fuerint, & spontē deciderint. Potest etiam medicamento exsiccante actio vinculi promoueri & adiuuari.

Tandem de curatione strumarum non prætereundū vulgo ferri, Reges Galliz solo actu sanandi strumas vim habere. De quo etsi alij aliter sentiant, & alij in imaginationem, alij in aëris mutationem & motum corporis causam huius rei reiciant: vana hæc esse facile patet. Cū autem hæc vis à Clodoueo primo Galliz Rege profecta sit, atque inde ad successores per traducem, nullo respectu familiæ habito, translata sit, procul dubio donum est supernaturale diuinitus concessam. Nam cū dictus Clodoueus primus Galliz Rex esset idolorum cultor, Clotildis vxoris monitu & precibus persuasus est, vt Christiani nomen profiteretur. Cū ergo à Remigio Rhemensi Archiepiscopo, baptizatus & chrysmate vinctus esset, ab eo tempore hanc vim strumas sanandi accipit, & quasi per traducem in omnes suos successores deriuauit. Solent autem passim & vicinis & peregrinis locis quotannis strumis laborantes affluere, quibus Rex manum imponit, & hæc verba Gallico sermone profert.

Le Roy te touche, & Dieu te guarit: Rex te tangit, & Deus te sanat, atque apposito crucis signaculo, ab vno & tūto Deo vni eam deriuari, publice proficitur. De qua mirabili strumas sanandi vi, solis Galliz regibus Christianissimis diuinitus concessa, peculiarem librum conscripsit Andreas Laurentius, qui videatur.

De Bronchocele.

Bronchocele vero definit Celsus, *Bronchocele lib. 7. cap. 13.* quod sit tumor in cer-

uice seu collo inter cutem & asperam arteriam quo modò caro hebes, modò humor aliquis melli aqueve similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pilis immixti.

Quæ autem & de causis eius & de curatione vulgò traduntur, parum ab iis, quæ de causis & curatione strumarum dicta sunt, differunt. Ideoque ea etiam non repetemus. Hoc verò non prætereundum, Felicem Platerum aliam planè & à vulgata opinione diuersam de generatione & curatione bronchocele sententiam habere, quam proponere libet.

Ille autem statuit, bronchoceleum seu gutturi herniam esse tumorem in colli anteriore sede, seu gutture amplo spatio extuberantem, qui tensus est admodum, vt cū pulsatur, sonum edat, & cū premittur, sicut vter cedat, sed mox iterum attollatur; quibus à struma facile secernatur.

Causam autem huius mali statuit esse flatum sub cutem membranamque generalem cuius substratam, adnexamque in celli anterioribus irruptentem. Collectionis autē aëris eò loci causam esse statuit luxationē, seu auulsionem cutis cū

Curatio
stru-
marum à
contactu
Regis
Galliz.

membrana illa, quæ eò loci crassior est & rubicundior, quàm alibi, à subiectis asperæ arteriæ musculorūmq; colli anteriorum sedibus, spatiumq; illic efficiētis, in quod ob sagam vacui aër, seu status è vicinis locis irrūpens illud non solum implendo, cūtem membranāque in tumorem eleuat, sed & continuationē distendens in vniuersum adauget, vnde nomen rectè acceperit tumor, quod bronchocele, quasi ruptura seu hernia gutturis, appelletur.

Causam autem auulsionis membranarum statuit esse conatum vehementem, qui fit, dum spiritu retento excrementa vel fœtū in partu excludere nituntur, aut buccas vehementer inflant.

Vernūmenimverò etsi facile concedimus, causam principalem esse auulsionem entis & membranæ illius à partibus vicinis: tamen verò vix simile videtur, solum flatum, utpote mobilem, nec facile vno in loco hærentem, malum tam diuturnum procreare posse, & tangenti aliud etiam facile deprehendere est. Ideoque mihi probabile videtur, in vacuum illud spatium, præcipuè membranis extensis, succum aliquem & nutrimentum crassius effundi, è quo natura carni quid simile formet. Vnde etiam, ut ipse Platerus statuit, nisi malo huic maturè occurratur, vix dum amplius abigi posse, sed toto vi-

tae curriculo permanere illic, quo prius excreuit, sese circa vicina vasa implicante, & us pertinacius adherescente.

CURATIO.

Curatio ergo, vt ex Plateri sententia rectè instituat, principio, netumor incrementum sumat, astringentia sunt applicanda, vt emplastrum ad rupturam, & quæ in hydropse solent adhiberi, vt membranatum illa contiguitas soluta iterum iungatur.

Idem tamen etiam interna quædam astringentia & siccantia exhibet, commendatque puluerem aluminis vsti 3. ss. poudere exhibitum. Possunt & alii pulueres antea de strumis propositi exhiberi.

Si verò tumor iam incrementum semperit, discutientia antea in strumarum curatione proposita etiam hic locum habere possunt.

De hydropse gutturis.

Non prætereunda hic rara affectio gutturis. Solent enim interdum partes quædam priuatæ ab aqua intumescere, non solum internæ, vt pulmō & vterus, sed etiam externæ. Et vidi semel atque iterum, & idem annotauerunt alii, toto corpore saluo, manum tantum intumuisse tumore aquoso pertinacissimo. Idē in gutture factum in puella, vidit Montanus, qui etiam hydropem illam gutturis per incisionem curauit.

Curatio.

Hydrops gutturis.



LIBRI SECUNDI
PARS SECUNDA,

DE

ASPERÆ ARTERIÆ,
PVLMONIS, MEDIASTINI,
DIAPHRAGMATIS, THORACIS
præter naturam affectionibus

PRÆFATIO.

Summam tractandorum continens.

POSTQVAM hætenus morbos & symptomata, quæ partibus inter caput & thoracem intermedijs accidunt, explicauimus, ut ad vitia thoracis, & partium in eo contentarum accedamus, ordo postulat. Hâc ergo secundâ libri secundi parte dicemus de affectibus præternaturam asperæ arteriæ, de pulmonis morbis, puta eius intemperie, inflammatione, seu peripneumonia, obstructione, de grandine & calculo, ac vermibus in pulmone genitis, de hydropo pulmonis; de pulmonis cum thoracis

P R Æ F A T I O.

membranis coalitu, de ruptura & erosione vasorum pulmonis; de mediastini inflammatione; de diaphragmatis inflammatione; de pleuritide seu inflammatione pleurae & musculorum thoracis, de vulneribus & fistulis, de empyemate, de hydropse pectoris, de vertebrarum dorsi luxatione & gibbositate, de fracturis costarum, & earum ad interiora compressione. Hinc dicendum de symptomatibus, quæ inde proueniunt, puta de respiratione laesa, asthmate, suffocatione; vocis & locutionis laesione, tussi, dolore lateris & pectoris, sputo sanguinis, & grandinis, ac calculorum & vermiculorum è pulmonibus reiectione.



CAPVT PRIMVM

DE ASPERÆ ARTERIÆ

morbis.

Asperæ
arteriæ
morbis.

DAVCIBVS & guttulis succedit arteria, Græcis, *σπαστική*, dicta ad differentiā earum, quæ à sinistro cordis ventriculo in uniuersum corpus distribuuntur: Item *σπαστική*, quod ex bronchijs, id est, annulis cartilagineis constat. Habet ea naturalem constitutionem suam, ut passim ab Anatomicis describitur; à qua si deflectat, varij morbi in ea oriuntur.

Morbi intemperiei.

Intemperies.

Et primò quidem morbi intemperiei corripitur, quam inducit imprimis aër, quem inspiramus, ut & quem expiramus, qui si frigidior fuerit asperam arteriam refrigerat; si calidior calefacit, si humidior, humectat; si sicus exsiccat. Possunt idem præstare etiam cibus & potus. Hinc ab aqua frigida vel potu alio congelato, aut glacie refrigerato aspera arteria refrigeratur. Eadem tamen intemperies accidere potest ab humoribus & materia, quæ eam præterlabitur, siue à capite ad eam confluat, siue à pulmone & thorace reuocatur. Possunt etiam in-

temperies partium vicinarum tracheæ intemperiem aliquam inducere. Ita œsophagus inflammatus calidam intemperiem arteriæ asperæ communicare potest.

Cognoscuntur autem istæ intemperies à causis antecedentibus scilicet vel calefacientibus, vel refrigerantibus, vel humectantibus, vel siccantibus, item ex vocis mutatione, oris ariditate vel humiditate, caliditate vel frigiditate, deglutienti difficultate, vel facilitate, ut & iuantibus ac nocentibus.

Si verò intemperies à materia in corpore contenta inducatur, arguunt eam tussis, sensus grauitatis, dolor, anhelitus difficultas. Materia autem & humoris natura etiam intemperiei speciem indicat.

Simples autem intemperies & qualitates, siccitatem si excipias, faciliè sanantur, remotis, quæ eam induxerunt, causis, & contrariis adhibitis; difficiliùs verò intemperies sanantur, quæ à materia fouentur.

De curatione autem in genere hoc tenendum, cum partes à quibus aspera arteria constat, sint fragilissimæ & exangues, in refrigerandum vsu

cautus esse debet Medicus. Cum etiam pars hæc sicca sit, & à cerebro defluentia excrementa subinde recipiat, audacius siccantibus uti licet; exasperantium tamen usus vitandus.

Intemperies autem simplices saltem remotionem causæ eam inducentis & contraria medicamenta indicant.

Si adsit materia eam fouens; illa remouenda.

Si nimirum intemperies sit calida, alteretur frigidis, *syrupo violarum, rosarum, cucurbitæ, mucilagine seminis psyllij, & similibus.*

Si frigida sit intemperies, conueniunt species & rosula diaireos, diacalimen hæc, diabyssopi, syrupus de hyssopo, de beionica. Extrahungatur collum oleo irino, cassino, & similibus.

Si temperies sit humida; utile est decoctum ex aqua hyssopi cum melle, species diaireos, diacalamini hæc.

Si intemperies sit sicca, utendum syrupo violarum, iuinbino, de glycyrrhizæ, lacte, emulsione seminis papaueris, amygdal. dulc. pinearum. Extra collum inungendum oleo violar. amygdal. dulc.

Si cum materia sit intemperies, ea cura requiritur, quæ in catarrho ad pectus labente propolita est.

Asperitas.

Asperitas. Deinde aspera ateria patitur morbum superficiem, cum scilicet, quæ intus & secundum tunicam interiorem naturaliter leuis esse debet, aspera redditur & inæqualis.

Causa. Quod si à rebus acerbis immodicè detergentibus & erodentibus, ut falso & acri catarrho, rebus acidis, oleo, quod licet alias partes lenire & leuigare possit, asperam

tamen arteriam & oculos exasperat præcipuè si sit, rancidum, vel frictione tale euaserit, rebus item oleosis & rancidis aliis, ut nucibus & similibus: puluere item & fumo vaporibusque acerbis, quos cum aëre inspirando attrahimus, accidit. Longa etiam oratio & vocis intensio asperam arteriam reddunt; humores item maligni, ut in lue Gallica; item vapores acres in febribus malignis ex inferioribus partibus eleuati.

Asperitas asperæ arteriæ cognoscitur ex causis, quas modo enumerauimus, & ex utilitate, quam præbent lenientia & damno, quod oritur ex acrimonia & acidorum usu. Imprimis autem ex effectu cognoscitur, nimirum ex saucedine vocis, quæ ex asperitate arteriæ huius excitatur.

Asperitas autem asperæ arteriæ cura lenientia & leuigantia remedia, & emplastica morsu expertia postulat. Cuiusmodi sunt amygdal. tragacantha, bolus armenus, amygdala dulces, nucleis pineis, daëtyli, ficus, lac, vinum dulce, diapendium, diatrage. frig. syrupus de iuinb. diacod. syr. de glycyrr. lobochi de psyllis, de papauere, succus & extractum glycyrrhizæ. Imprimis hic profunt hypoglottides, ac pilulæ & trochisci sub lingua tenendi, ut pilula bechicæ, trochisci bechij, oleum amygdal. dulc. cum saccharo cando.

Atque omnino huius loci sunt arteriaca dicta medicamenta, quod membranz arteriam asperam succingenti profunt. Composita talia ex antiquis multa proposuit galenus, 7. de compos. med. secund. loca. Verum cum, ut idem Galenus, ibid. cap. 1. ait, omnium simplicium

Signa.

Cura.

Arteriaca medicamenta.

medicamentorum vires exquisitè non oporteat eum, qui compositum quodnam sit factururus, simplicia arteriaca hic proponere libet.

Est autem illorum triplex genus. Primum completur lenientia, quæ sine omni mordicatione læugant, qualia sunt, *butyrum recens* s. *sale amyllum*, *lac mustum dulce decoctum*, *passulæ*, *dactyli*, *iniuba*, *amygdala dulces*, *pinei recentes*, *glycyrrhiza*, *tragacantha*, *gummi Arabicum*, *cremor præsana hordeacea & triticea*, *mucilago*, *sem. psylli cydoniorum*, *emulso seminum quatuor frigidiorum maiorum*.

In secundo genere sunt, quæ abstergunt simul nonnihil, citra tamen rosionem. Et possunt etiam in hunc finem vsurpari medicamenta ex priore classe, si quæ sunt huius generis propria adduntur. Sunt autem talia, *saccharum*, *mel*, *saccharum penidum*, *carica*, *syrupus violarum iniubinis*.

In tertio genere sunt paulò actiora, quæ exsiccant, abstergunt, & discutunt, vt *byssopus*, *rhymum*, *radix ireos*, *semen rutice*, *cinnamomum*, *amygdala amaræ*, *spica*, *ibus*, *myrrha*, *seebimbina*, *farina orobi*, *spec. diatreos Salomonis*.

Esti verò pluribus modis talia exhiberi possunt, vt syruporum, linctuum: tamen commodissimè ferè in hypoglottidas, seu trochiscos sub lingua tenendos, qui paulatim liquecant, conformantur. Harere enim necessum est.

Composita multa talia, vt dictum apud Galenum, 7. de compos. med. sec. loca exstant. Vnum atque alterum saltem addemus.

℞. Sem. cydon. psyll. spec. tragacanthi sig. an. 3. i. Fiat nodulus,

qui mæd fiat in decocto passular. & glycyrrhizæ. Vel 2℥. *Glycyrrhizæ rec. in taleolas secta q. l. pass. min. cass. exir. sacib. cand. sem. cydon.* Ebuliant parùm & pro vsu seruentur. Vel 2℥. *Rad. alibee* 3. i. *glycyrrb. brancæ vrsina* an. 3. 8. *pass. mund. iniubar. sebesten*, an. N. x. *flor. viol. malvæ* an. P. i. *sem. 4. frigid. maior. cydon.* an. 3. iii. *bordei mund.* P. i. Fiat decoctio, an. lb. i. dissolu. *syrup. violar.* 3. viii. *iniubini*, 3. i. M. pro tribus dosibus. Vel coquantur ad spissitudinem & addatur saccharum penidium. Fiat lohoch.

Angustia aspera Arterie.

Tertiò patitur aspera arteria morbos cavitatis, seu angustiam, quæ fit à rebus extra comprimentibus, laqueo, manu, similibusque causis asperam arteriam extrà coarctantibus; ab inflammationibus item & tumoribus asperæ arteriæ incumbentibus; bolis item grandioribus deuoratis, vel rebus aliis duris deglutitis in œsophago subsistentibus, & arteriam, quæ à posteriore parte gulæ adiacet; comprimentibus, luxatione vertebrarum ceruicis. Quò etiam refertur potest natia pectoris angustia, item nimia obesitas, vnde arteriæ comprimentur, & angustiores redduntur. Obstruitur à rebus extrà in eam illapsis, humoribus crassis & glutinosis confertim à cerebro in eam illabentibus, vel pure ex rupto pulmonis abscessu, vel etiam abscessibus in faucibus ruptis, seu grumulis sanguinis vnde cumque in eam illo pssis; grandine item & calculis in pulmone genitis; & tandem à carne quæ post vulnera vel vlcera arteriæ in ea nata eius meatum claudit.

Asperæ autem arteriæ angustiam signa præfaciunt causæ eam extrinsecus,

internæ, quæ aptæ sunt canalem hunc comprimere, vel obstruere. Monstrant eadem effectus, respirationis difficultas, & imminens suffocationis metus modò maior modò minor, pro angustia, à qua provenit, ratione tussis item, præsertim si extra illapsa sit causa angustia.

Et quidem inter morbos asperæ arteriæ angustia gravissimus & periculosissimus est, qui suffocando & spiritus intercipiendo hominem iugulat, siue id fiat à laqueo, siue à catarrho confertim in pulmones illabente, siue à sanguine in tracheam influente, siue à rebus aliis in eam illapsis. Cuius rei historias collegit Schenckius, *lib. 2. obs. 14.* Pro causarum etiam ratione malum nunc facilius, nunc difficilius curatur. Angustia enim asperæ arteriæ, quæ ob gibbum ex asthmate fit ante pubertatem, non curatur. Hippocrates, 6. aphor. 46.

Ad prognostica pertinet & hoc, quod ea, quæ in asperam arteriam illabuntur, interdum magno conatu in ipsum pulmonem detruduntur; quæ postea tamen interdum tussu reiciuntur, interdum vomitum ibi excitant. Ita Alex. Benedictus, *lib. 3. cap. 18.* annotavit, Lucetius cuidam cum nucem ponticam dentibus frangeret, oborto risu, nucem in arteriam delapsam, & accipiti conatu ad interiora propulsam, ubi ruptis venulis vomica in pectore exorta est, quâ tandem sanata obsessis meatibus vox rauca semper percepta est. Sic anno 1620. cum hic vir quidam cerasa comederet, nucleus cum maximo suffocationis periculo & tussu maxima ingatur, & tandem in ipsum pulmonem illapsus est. Vnde suffo-

cationis periculo cessante in eam venit opinionem, illum suffocationis metum non à nucleo, sed catarrho, præcipiti, cui aliàs valde erat obnoxius, provenisse. Verùm duravit per interualla tussis ista tribus septimanis, & dolorem quandam gravantem in dextra thoracis parte sensit. Tandem cum nocte quadam vehementer integram horam tussivisset, nucleuq. illum picuta abductum tussu reiecit, & ab ea liberatus est.

Curatur autem angustia asperæ arteriæ, causæ quæ eam excitant, ablatione. Si extra quid arteriam comprimat, illud tollendum. Si etiam extra quid in eam illapsum sit, tussu reiciendum. Si verò causa obstruens interna sit crassius & viscidus humor, is incidendus, attenuandus & extergendus, ut facilius tussu eici possit, *syrupo scilicet de hyssopo, capilli Veneris, de prassio, glycyrrhiza, oxymelte cum melle, vel decocto aut aquis hyssopi, capilli Veneris, prassij, loch. de pina, de sesila, & similibus, quæ postea in obstructionibus pulmonis proponuntur.* Si superiore parte œsophagi quid hæreat, ac asperam arteriam etiam coarctet, tum conqualatis pugno dorsu, vel intra scapulas vertebis quibus gula adiacet, impacta in ventrè detruditur, quò tandem larynx & dilatari, & liberiùs aëremittere possit.

Vulnera & ulcera asperæ Arteriæ

Tandem etiam morbos. soluta vitæ patitur aspera arteria, vulnera scilicet, quæ præcipuè à telis, gladus, vel aliis causis externis inducuntur. Quandoque etiam à tussu violenta, & magna vocis intentione, ut in pulmone, ita in asperæ arteria vasa rumpuntur.

Curatio:

Causa.

Exulcorationem verò inducunt acres humores & erodentes, præcipuè salsi & nitrosi, vt appellat Hippocrates, 4. de rat. vict. in acut. à cerebro defluentes, vt & humores acres & veneuati in lue Venerea.

Signa.

Vulnera autem externa asperæ arteriæ sensui patent, & ægri vel adstantes referunt, quæ causæ ea induxerint. Et si dubitetur, an vñus ad cauitatem arteriæ penetret, id faciliè manu, candela, vel alia re vulneri adnota, dum æger loquitur, & omninò ex aënis per vñus egressu cognoscitur. Ruptura autem vasorum ex tussi nimia, vt & vocis intensiōe, quæ præcessit, ac præcipuè sanguinis sputo, quod sequitur, innotesceit.

Prognostica.

Interna autem exulceratio patescit è causis quæ præcesserunt, vel adsunt, catarrhis salis, medicamentis acerbis, lue venerea, vt & iis quæ exulcorationem consequuntur, dolore, tussi, sputo sanguinis in principio quidem puro, hinc purulento, aut materia purulenta, & sordida, vt & crustularum, quas Græci *ipuitas*, vocant reiectione. Interdum etiam bronchia & cartilagine asperæ arteriæ tussi reiciuntur, quod tamen ex pulmonibus frequentius accidit, raro ex aspera arteria, quæ durior est, quam vt viuente homine tantam corruptionem pati possit. Symptomata equidem, quæ vulneribus & viceribus arteriæ superuenire solent, recenset Hippocrates, 2. de morb. Verum, vt mihi quidem videtur, non agit è loci Hippocrates de aspera arteria extra pulmones vulnerata vel exulcerata, de qua nunc nobis sermo, sed de eius ramis iam per pulmonis substantiam disper-

sis; cum inter cætera expressè scribat, in vulneribus eiusmodi tandem *apixia*, pulmonis renici.

Vulnera autem asperæ arteriæ periculosa sunt, & plerumque insaniabilia, præcipuè si substantia ipsa cartilaginea sit vulnerata, præcipuè per. transversum dissecta, quæ vix coalescit. Interdum etiam inflammatio accidit, & hinc gangrena & sphacelus, quæ ægtu subito iugulat.

Aliquando tamen sanantur, præsertim si vñus inter duos annulos, atque ita membranam cartilagineam connectentem incidat, cuius rei exempla collegit Schenckius, lib. 2. obseru. 40. Et ipse his vulnera arteriæ asperæ penetrantia sanata vidi. Si autem moriatur æger, iugulatur, vel statim sanguinis effusione, qui in arteriam illapsus ægrum suffocat, vel lentè, quod post aliquot septimanas factu vidi, cum aliquid caruncula vulneri succrescit, quod ægrum tandè suffocat.

Vlcera, quæ internam asperæ arteriæ partem occupant, difficilia quidem curatu sunt, ob partium situm & naturam, cui difficulter & non omnis generis medicamenta applicari possunt. Plerumque tamen sanantur, modo non sint profunda, & cartilagine exedantur & putrilago accedat.

Cura.

Vulnerum asperæ arteriæ curationem quod attinet, cutis labia distantia coniugenda, & deinde emplastris convenientibus extra adhibitis vñus, vt moris est, conglutinandum. In ore verò, vt & intus conglutinatio iuuatur, continuò aliquid medicamenti detinendū, quod liquatum sensim per viam asperæ arteriæ delabatur; id quod facilius fiet, si æger supinus iaceat, vt

rotula diatragacanth. frigid. diacodii, & similia. Vel ℥. Spec. diatragac. frigid. 3. i. gummi Arabici, boli Armeni. an. 3. 6. rad. consolida sub cineribus coct. 3. i. syr. myrtin. q. s. Fiat electuarius. Vel ℥. Conferv. ros. rubr. rad. consolida maioris, an. 3. i. boli Armeni, spec. diatragac. frigid. gummi Arabici, an. 3. 6. syr. de resis siccis q. s. Fiat electuarius

Potest etiam exhiberi lohoch sanum & expertum,

Eger vero non multum loquatur, & omnia quæ tussim excitare possunt, præcaueat.

Vlcera quoque curantur detergentibus, siccantibus, id quod amissum est regenerantibus, & cicatricem inducentibus. Detergunt mulla, mel rosatum cum aqua bordes. Siccant & glutinât bolus armenus, thus, mirra, radix aristolochia puluerisata, & cum melle in formam eclegmatis redacta. Et si ab humoribus acribus & salis vehementer detergentibus vlcera eiusmodi ortum habeant, lac commodissimum est, cuius solius vsu humorum acrimonia temperatur, sordes detergentur, ac quod deest, restituitur: Imprimis si lac debito modo præparetur, & eas, quas debet, condiciones habeat, de quo vide Galenum, 5. meth. med. cap. 12.

QVÆSTIO.

An vlcera aspera Arteria sint sanabilia?

Vlcera
aspera ar-
teriz an
sint sana-
bilia

Galenus equidem, 5. meth. med. cap. 12. ubi ex professo de curatione vlcetum asperæ arteriæ tractat, & propterea hac de re videri potest, scribit se non paucos eorum, qui hoc morbo laborant, curasse,

quod & Aëcius, retrab. 2. serm. 4. cap. 64. se factitasse testatur. Marcellus Donatus tamen, de historia medica mirabili, lib. 3. c. 1. recenset historiam cuiusdam, qui omni diligentia à Medicis adhibita, nihilominus hoc morbo perijt. Et omnino non simpliciter affirmandum, esse sanabilia hæc vlcera, vt etiam de vñneribus dictum. Etenim cum sanies non nisi tussu reiici possit, facile sit, vt isto conatu partes vlceratæ lacerentur. Quibus accedit & hoc, quod aspera arteria non carnosâ est, cuiusmodi partium vlcerata & vlcera facile sanantur, sed dura & cartilaginosa. Præterea cum membra vlcerata siccatione indigeant, etiam hac de causa asperæ arteriæ vlcera difficilius sanantur, cum continuo humiditas quedam, præcipue è vicinis consillis, destillet: & imprimis, cum aspera arteria natura sua sicca sit, & vehementius siccari possit.

Et omnino ista rationi consentanea sunt. Quapropter statuendum, vt & Auicennas, 3. can. sen 10. tr. cap. 18. docet, si vlcus in principio sit, & saltem externam superficiem asperæ arteriæ occupet, sanabile esse: si vero vlcus penetrauerit, & ipsas cartilagineas asperæ arteriæ erodierit, tale vlcus vel planè insanabile esse, vel omnino difficulter curari.

CAPVT II.

De Pulmonis intemperie.

Aspera arteria in ipsum pulmonem tendit & inseritur. Ideoque proximum est, vt de eius mor-
bis

Pulmonis
intemperie.

bis dicamus. Quæ autem naturalis sit constitutio pulmonis ex Anatomicis petatur. A qua cum defleſcit, varios morbos patitur. Inter eos sunt, primò morbi intemperiei, cum pulmo vel nimis caleſcit, vel refrigeratur, vel humectatur, vel ſiccatur; & quidem nunc ſine materia, nunc cum materia.

Cauſa.

Cauſa.

Morbum intemperiei ſine materia inducunt cauſæ ſimili qualitate præditæ, imprimis aër, quem ſpiritu ducimus, qui quæ ad pulmonem parum alteratus deſertur, præcipuè in ijs quibus columella deſt. quamcumque enim qualitatem aër habet, eam pulmoni imprimit. Hinc qui tempore hyberno per loca niuola, aut ventis frigidis expoſita iter faciunt, iis, pulmones refrigerantur. Idem interdum euenit à potionibus nimis frigidis, imprimis quæ glaciæ refrigeratæ ſunt, quarum portio aliqua, licet exigua, per aſperam arteriã in pulmones deſluit. Pertinent & huc, quæ tota ſubſtantia pulmonibus aduerſa ſunt. Quanquam enim talia occultis qualitatibus præcipuè pulmonibus noceant: tamen & ipſæ ſæpè vñà qualitatum manifeftarum exceſſus habent, quos & ipſos pulmonibus imprimere poſſunt. Extrà quoque applicata thoraci medicamenta pulmonem alterare poſſunt. Ita refert Galenus, 10. *meth. medic. cap. 9.* quod quidam impoſito præcordiis refrigerante medicamento difficultate reſpirandi laborauerit, alter verò tuſſierit. Aſſiciuntur etiam & alterantur pulmones à vicinis quibuſdam partibus, vt corde hepate, liene. Hæ enim partes ſi in-

caleſcant præternaturam, plerumque etiam pulmonis intemperiem illam communicant.

Intemperies autem cum materia ſit; vbi ea in pulmone vel ſenſim, ſeu ob facultatis concoquentis, ſeu expellentis imbecillitatem colligitur, vel aliunde conferentim affluit. Imprimis autem à capite ad pulmonem materia tranſmittitur in catarrhis ſæpè à gutture & faucibus, quarum partium inflammatio nonnunquam in pulmonem conuertitur. Frequentiſſimè autem ab ipſo hepate, imò per hepar à toto venoſo genere, ſeu multo ſanguine, ſeu vicioſis humoribus repleto tranſmittitur. Nonnunquam etiam à thorace materia, vt pus & ſanies, pulmoni & communicatur; quod interdum quoque à membrana coſtas ſuccingente, vt à coſtarum muſculis inflammatis, accidit. Nec extra culpam ſemper eſt vterus, à quo etiam ſanguis ad thoracem conuertitur, teſte Hippocrate: niſi quis malit à venoſo genere, antequam ad vterum ſeratur, ad pulmonem mitti ſanguinem.

Signa Diagnosticæ.

Calida pulmonis intemperis cognoscitur ex cauſis, quæ præceſſerunt, irâ nimia & diuturna vocis intentione, motu nimio, inspiratione aëris calidi, medicamenis & cibis nimis calidis intemperie vicinorum viſcerum calidi; è rubore genarum, qui prouenit à fumis calidis aſcendentibus, ſiccitate lingæ & faucium, ſiti ingenti, quem potus non ſedat, & frigida aëris inſpiratione, è magnitudine, celebritate & frequentia anhelitus, vt & pulſum

Signa.

differentia simili, languore corporis, & quod æger caulis, quæ calorem augendi vim habent, offenditur, iuuatur ab iis, quæ refrigerant.

Frigidæ pulmonis intemperiei signa sunt causæ refrigerantes, quæ præcesserunt, imprimis mori in aëre frigido, & locis ventis borealibus expositis, imprimis si corpus & præcipue os non muniatur aduersus hæc aëris iniuriam, potus frigidus, imprimis qui glacie refrigeratus est, aut antea frigore congelatus fuit. Respiratio est tarda, parua & rara, pulsusque similis, expiratio est frigidior. Æger frigidorum vsui offenditur: commodum ex calidis, præsertim aëre calidioris percipit.

Signa pulmonis humiditæ petuntur à causis humectantibus, quæ præcesserunt, à vocis raucedine, anhelitu frequenti cum sibilo & stertore, sputo multo: & læsione ab humectantibus & comodo ab exsiccantibus.

Sicca intemperies tandem cognoscitur, quod causæ exsiccantes præcesserunt, motus & vocis intensio diuturna & nimia. Morbo hoc imprimis aurifabri & Chymici, ac qui circa metalla occupantur, infestantur, à quorum valde exsiccantibus halitibus cum aëre, quem inspirant, attractis pulmones exsiccantur. Morbo hoc affectu paulatim contabescunt, & si mortuorum pedus aperitur, nullum vlcus in pulmone apparet, sed pulmones veluti fumo exsiccati conspiciuntur. Respiratio est parua & frequens, sitis continua, sputum paucum. Exsiccantibus æger læditur, ex humectantibus emolumentum percipit.

Intemperis verò cum materia in-

notescit ex humorum in corpore redundantium notis, quæ alibi, & quantum pulmones spectat, postea proponentur.

Prognostica.

1. Intemperies sine materia, (sicca Prognostica. excepta, quæ plerumque incurabilis est) quam quæ cum materia committitur, facilius curatur, nec suffocationis periculum coniunctum habet.

2. Periculosior verò est intemperies cum materia. Nam grauiora inde excitantur symptomata, atque ob visceris situm medicamenta difficilioribus eo penetrant, & maius & minus periculum coniunctum habet morbus, pro virium robore & debilitate, & ipsius materię conditione, quæ coctionem vel facilius vel difficilius recipit, & facile vel difficulter excernitur.

3. Si pulmonis intemperiei catarrhus coniunctus sit, curari ea non potest, nisi catarrhus prius tollatur & sistatur.

Indicationes.

Si simplex intemperies sit sine materia, indicat contraria alterantia, si cum materia, etiam ea, quæ materiam à pulmone reuellunt & euacuant. In frigidis tamen adhibendis cautè agendum, nec nimis frigida exhibenda, quorum vsu pulmo offenditur, ac tussis inde & alia mala interdum excitantur.

Pulmo autem euacuatur commodissime per tussim: cum per arterias per ipsam dispersas quæ in vnâ magnam tandem coeunt, materia reclusissime euacuetur. Licet autem per urinam & aluum etiam aliquando ista euacuatio fiat: tamen hoc rarissime accidit. Est verò tussis à materia concitetur, expultrice ex-

Pulmo quomodo euacuatur.

citata ad eliciendum ea, quæ molesta sunt; ars tamen naturæ subsidio venit medicamentis, quæ bechica & tussim excitantia appellantur.

Sunt autem ea, quæ facile per asperam arteriam in pulmonem destillant, & crassam & viscidam materiam incidunt atque extenuant, & ob acrimoniam aliquam, quæ prædita sunt, naturam ad tussim itimulant.

Medicamenta autem, quæ pulmoni adhibentur, vel interna sunt, vel externa. Interna quæ per os sumuntur, alia per asperam arteriam latera in pulmonem sensim destillant; alia vero statim in ventriculum descendunt, & per viscera reliqua ad pulmones transeunt. Priora ita sint comparata, & talia eligenda, quæ nec pulmonem offendunt, nec nimis liquida sunt, statim in ventriculum destillant, sed talia quæ medicorem crassitudinem habent, qualia sunt cœlegrmata siue lambilia, vel si sunt duriora, talia tamen, ut in ore detenta sensim liquefcere & in pulmonem destillare possint. Posteriora, & quæ mox ad ventriculum perueniunt, quod attinget cum circuitus, viaque, per quam ad pulmones talia medicamenta perueniunt, longus sit, & longæ ambages, medicamenta ea validiora sint, & maiora copia, & frequentius exhibeantur, ut ubi ad pulmones perueniant, vires adhuc morbo curando sufficientes obtineant.

Externa pectori applicantur extrâ, quod cum sit maxima ex parte osseum, ut validiora ea sint, oportet. Cauendum autem hic, ne refrigerantia, repellentia & adstringentia valida pectori applicemus.

Nam & frigus pulmoni inimicum, & vitiosos humores talia medicamenta in pulmonem ab externis partibus compellunt.

Curatio.

Calidum ergo pulmonem refrigerant medicamenta ex *violis, endivia, papavere, bordeo, nympha, syrupo violar. decoct. bordeo, lacte de psylla*. Extrâ inungatur thorax *oleo violarum*. Vel fiat epithema ex decocto lactucæ, violar. endiviæ.

Curatio.

Pulmones refrigerantia.

Dixta medicamentis respondeat. Aër, quem spiritui trahimus, sit actu frigidus, qui nisi talis sit natura, arte comparctur, ut alibi dictum. Potus sit aqua hordei simplex, vel cum iulepo violatum. Ager à vino absteat. Cibi quoque refrigerandi vim habeant, & condiantur endivia, lactuca. Vigiliis nimias æger vitet. Quies mortui præferenda; cum motus calorem augeat, ut & silentium sermoni. Vitanda est ira & exandescencia.

Frigidam verò pulmonis incemperiem cortigunt *hyssop. prastium capillus veneris, helenium, thymus, calamimba, insulago nicotiana, radix ireos, crocus*, quem nonnulli pulmonis animam nominant, qui & ex ovo forbili, vel cum alijs medicamentis sumi potest, & cum linimentis misceri. Et ex his parata decocta & aquæ. *Syrupi item capill. veneris de hyssopo, de glycyrrhiza, de prastio, de calamimba, species diatrachant, calid. diatreas Salomonis, diaprastium, ut & suffusus aromaticus*.

Pulmones calefacientia.

Extrâ illinatur pectus *oleo irvino, amygd. amarar. vitaceo, anelbino*.

Dixta medicamentis sit similis. Aër sit calidus, & nisi talis sit natura, ut antea comparctur. Potus sit vinum & mulsum. Cibus sit carnes ani-

malium aromatibus conditæ. Vtilis est pulmonis & totius corporis exercitatio, quæ calorem viscerum excitat.

Pulmo-
nes sic-
cantia.

Humidam pulmonum intemperiem corrigunt medicamenta calida modò enumerata. Habent enim eadem etiam vim siccandi, vt & decoctum ligni guaiaci, & salsafra.

Extra pulmonem exsiccant aquæ salsæ, sulphuræ, bituminosæ, vt & sacculi milio ac sale pleni pectori impositi.

Aër sit siccus vel sua natura talis, qualis est maritanus & montanus, vel suffitu herbarum calidarum & siccarum modò enumeratarum, vt & aromatum, & lignorum calidorum suaueolentium, vt & styracis, thuris, myrrhæ, benzoes, aris redditus. Suffitus etiam ad exsiccandum pulmonem ore excipi potest. Dieta medicamentis contentiar. Potus ergo sit vinum hyssopo, marubio, helenio, vel aromatibus conditum. Cibis etiam vim siccandi habeat: quales sunt aues montanæ. Vtilis est etiam corporis ac imprimis pulmonis exercitatio, quæ sit multo sermone & locutione.

Siccos pulmones humectant *castæa, glycyrrhiza, viola, iuniba, pasiflora, amygdala dulces, semen melonum.*

Extra conuenit aquæ dulcis tepidæ balneum & oleum amygdalarum dulcium. Imprimis verò ad siccitatem pulmonum corrigendam utilis est dieta.

Aër sit humidus naturâ, vel arte talis factus. Potus & ipse vim humectandi habeat, qualis est vinum album dulce, decoctum hordei, emulsio seminis melonum & amygdal. dulc. In cibis conueniunt

oua sorbilia, carnes hædinæ, vitulina, pullorum gallinaceorum, pisces saxatiles, caro gammarorum & cancrorum ac testudinum: lac imprimis recens. Vtilis est & somnus, quies & animi tranquillitas.

CAPVT III.

De Pulmonis inflammatione, siue Peripneumonia.

POST intemperies pulmonis de inflammatione eiusdem agere libet, vt intemperie cum materia. Etsi enim & magnitudo aucta accedere possit: tamen magis hædic intemperies. Vlcus verò, quod interdum accedit, ad solutionem continui pertinet, de qua infra.

Pulmonis
inflam-
matio.

Peripneumonia autem, & *ardor* *pneumonia* Celso, lib. 4. cap. 7. morbus peripneumoniacus, vulgò pneumonia (est enim hic morbus ex eorum genere, qui à parte affecta nomen acceperunt) est phlegmone pulmonum cum febre acuta, spirandi difficultate & tussi.

Morbus est primò intemperiei cum materia, quia sanguis p. n. ad pulmonem affluxit, deinde in magnitudine aucta, quia est tumor parenchymatis pulmonum, quibus interdum & soluta vnitas & accedit. Pars affecta est pulmo interdum secundum vnum vel alterum lolum, interdum totus.

Oritur autem hic morbus ex sanguine, vt aliz etiam inflammationes omnes, vel solo, vel bilioso, vel pituitoso. Et pletumque, (interdum enim solam plethoram huius inflammationis causam esse impossi-

bile non est) vt etiam supra dictum, in talibus inflammationibus humores vitiosi in venis cumulati prima mali occasio sunt, quibus cum sese natura exonerare cupit, simul eos cum sanguine ad partem aliquā corporis protrudit & deponit. Sanguis autem semper præualet, etsi motui primam occasionem alius humor præstare possit. Aliàs non esset inflammatio.

Infunditur autem sanguis in pulmonem à dextro cordis sinu per venam arteriosam. Nonnunquam aliis morbis succedit peripneumonia, vt anginæ, pleuritidi, dum è faucibus & lateribus humor *πύρρα* *πύρρα*, repente in pulmones irruit. Etsi enim à pleura ad pulmonem nullus sit vasorum ductus: tamen quia pulmones cum pleura communem membranam habent, quæ omnes thoracis partes inuestit, per eam malum hoc vicinis partibus & pulmoni communicari potest, de quo postea de pleuritide dicitur. Accidere tamen etiam potest, vt humores ad fauces, aut pleuram ruentes in venas recurrant, quos cum natura iterum aduersus thoracem pellere conatur, eos per venam arteriosam in pulmones trudit, vnde tum pleuritidis in peripneumonia degenerat, causâ antecedente, quæ pleuritidem auctura erat, ad pulmones conuersâ. Potest enim, vt Galenus 7. *aph.* 11. docet pleuritis in peripneumonia mutari & degenerare, potest & pleuritidi peripneumonia superuenire.

Degeneratio fit, cum priore cessante morbo alter succedit; superuenire vero, cum priore permanente alter accedit.

Sanguinis in pulmonem effusi

pars aliqua in arteriæ asperæ ramos impulsâ ichore præmum, hinc cruore sputum imbuunt, tandem mutatus & coctus per tussim copiosius eiicitur, illasâ pulmonû substantia. Hæc enim si lædatur, phthisis succedit.

Causæ autem, quæ faciunt, vt materia ad pulmones fluat, ferè omnes sunt, quas postea in pleuritide recensebimus, vehemens scilicet exercitatio post quietem longam & corpore repleto, clamor & vocis intensio nimia. Ira etiam sanguinem commouere potest, vt ad pulmonem confluat. De quo Hippocrat. 6. *epid. com.* 5. 8. præcepta atque acerba iracundia cor & pulmonem in sese, & ad caput calorem & humorem trahit.

Aër frigidus & aquilonius australem præcipue sequens, aër enim frigidus pulmoni est inimicus, qui facilius pectus afficit, si ab aëre tepido partes thoracis laxatæ sunt. Facit huc & aquarum lacustrum & stagnantium vsus tempore hyberno: vnde Hippocr. *de aere, aquis & loc.* scribit, in regionibus lacustribus & paludosis frequenter obseruari pulmonias, Hyeme scilicet. Aqua enim eiusmodi non glaciata potius inferioribus partibus nocet, atque ipse Hip. per æstatem alui profluvia, intestinorum difficultates, lienes magnos, hydropem adesse scribit; de aqua verò glaciata scribit, 5. *aph.* 24. frigida, veluti nix & glacies, pectori inimica tussiles mouent, venarum ruptiones & destillationes efficiunt. Cum enim tales aquæ non destuant, sed aquæ pluuiæ noua semper infusatur, tempore æstiuo, cum sol easurit, corrumpuntur, hyeme verò glaciuntur, & frigidæ ob niuem & glaciem quadunt.

Pertinent huc & medicamenta venenata, & præcipue lepus marinus qui peculiari vi pulmones exulcerare, & hinc inflammationem eius excitare solet. Nonnunquam & in constitutionibus epidemis talis est humorum malignitas, quæ peculiariter pulmones lædere apta nata est. Hinc obseruatae sunt epidemice peripneumonix quibusdam annis, siue solæ, siue cum pleuritide coniunctæ, in quibus tempestiue, id est, primo, secundo, aut tertio detractus sanguis profuit, quarto aut quinto die nihil iuuat, ægro septimo vel octauo die extincto: qualis fuit ea quæ anno 1564. & 1565. inferioris Germaniæ & Rheni accolæ inuasit. Vide Dodonæum *in obseruat.*

Rariùs ad catarrhum & asthma sequitur peripneumonia. Notham tamen seu spuriam quandam esse volunt, quando tenuis & acris de stillatio cerebri confectum in pulmones illapsum, ardore p. n. accenso febrem cum tussi & spirandi difficultate infert, qua & sensim æger conficitur sine vlcere, & cruoris expuitione. A pituita tamen capite in pulmonem delapsa in pulmone putrescente faciliùs ledi, & tussi superueniente pulmo concuti potest, ut sanguinem inflammationis causam attrahat, unde vera peripneumonia generatur: Et tum catarrhus peripneumonix occasio potius est, quàm causa.

Causa verò proxima inflammationis pulmonis est calor putrescentis pituitæ, ob quem attrahitur sanguis copiosior, & antea calidus facile incalescit.

Magna autem est inter peripneumoniam & pleuritidem cognatio,

imò sæpissime coniunguntur. Differunt verò præcipue loco affecto. Galenus equidem, 4. de caus. pulm. c. 12. respiciens ad diuersitatem compositionis, vel structuræ partium pulmonis & pleuræ, inter peripneumoniam & pleuritidem sic discernit, quòd pleuritis à tenui & bilioso, peripneumonia verò à pituitoso & crassiore sanguine ortum habeat, cum tenuis & biliosus sanguis in rara & laxa pulmonum substantia non adhaereat. Sed commodissimum erit saltem loco affecto hos duos morbos distinguere, ita ut si soli pulmones afficiantur, & pleura non sit affecta, peripneumonia, pleuritis verò excitetur, cum pleura vel sola, vel cum pulmonibus inflammatur. Causam communem esse posse, & humorem qui producit pleuritidem, peripneumoniam quoque gignere posse, & contra vel ex eo patet, quod angina & pleuritis sæpè in peripneumoniam mutantur, & cum pleura plerumque pulmones simul afficiuntur. Et sanguis etiam si biliosus, nihilominus in substantia pulmonis p. n. eò effusus hæere potest. Quamvis enim laxa & molli sit pulmonis substantia; talis tamen est: ut non minùs tenues in ea humores, quàm in spongia aqua contineri possint. Imò miorem quantitatem tenuis humoris recipere posse videtur pulmo, quàm crassi. Crassa enim poros citò obstrunt seu obstruunt. tenuiora verò penitus sese insinuant. Neque ipse Galenus alibi id negat, ubi phlegmonem hanc *spuriam* esse statuit.

Differentia.

Dantur etiam aliquæ peripneumonix differentix. Prima est à par-

te affecta. Afficitur enim vel totus pulmo, vel eius pars & quidem dextra vel sinistra. Secunda à causis. Sanguis enim qui inflammationem pulmonis excitat, vel purus est, vel biliosus. Vnde Hippocrates, *lib. de intern. affectione* etiam erysipelate pulmonem affici posse scribit. Verum Hippocrates non solum eam, quæ à bile multa admixta sit, inflammationem erysipelas hic appellat, sed illam, quæ à sanguine; quæ verò à pituita, bile, & sanguine permixtis, inflammationem, ut videre est, *lib. 1. de morb.* ubi de erysipelate pulmonis inquit, quod sanguis plurimus è venis magnis trahitur, & *lib. de intern. affect.* hunc tumorem potissimum è sanguine oriri scribit. Contrà de inflammatione pulmonis, *lib. de morb.* inquit, hanc fieri, cum pulmo commotam & humectatam pituitam & bilem ad se traxerit, & *in lib. de intern. affect.* pulmonis inflammationem fieri, cum ad sese pulmo sanguinem, aut pituitam salis traxerit, & paulò post morbum hunc ex pituita suam originem habere asserit.

Verum forsàn Hippocrates illam differentiam hic intelligit, quæ ex causa & generationis modo diverso provenit, cuius etiam suprà facta est mentio. Aliquando enim causa inflammationis à venis magnis, id est, è vena arteriosa è dextro ventriculo cordis affluit; qui sanguis cum sit calidior, inflammationem erysipelati similem excitat; aliquando verò pituita è capite defluens inflammationi huic occasiorem præbet. Hanc enim ubi pulmo natura sua rarus imbibit: atque ea calorem concipit, inflammatio

excitatur. Aliquando verò sanguis est picuifosus, vel melancholicus. Tertia à modo inuadendi. Accidit enim peripneumonia vel per se, & à principio, nullo alio morbo præcedente, vel aliis affectibus, ut angina & pleuritidi, superuenit.

Signa diagnostica.

Et si peripneumonia plurima sit, Signa. gna cum pleuritide habeat communia, quibusdam tamen distinguitur. Difficultas enim spirandi maior est, quàm in pleuritide, & cum periculo suffocationis, ut æger erectus spiritum ducere cogatur. Et si enim ægi in supino decubitu libenter permanerent, ut virium debilitati convenientiori: tamen ad erectum corporis situm ipsos cogit respirationis difficultas & angustia. Hoc autem signi thorax facilius dilatarer, quippe qui decumbentibus in se concidit, èò quod pectoris partes in spiam declinant, quæ erecta thorax etiam simul fertur non amplius seipsum grauant; ut Gal. 4. *de loc. affect. cap. 7.* docet. Interdum, nec bibere nec loqui commode possunt ob respirationis angustiam. Nam maior refrigerandi cordis necessitas urget, cum inflammatio sit cordi vicina, quàm in pleuritide, ut pulmo inflammatus humore plenus, etsi plurimum distendatur: aërem, ut opus excipere non possit. Itaque æger erecta ceruice & confertim respirat, crebra anhelatione vexatur, intumescit, nares extendit, non secus ac equus post cursum, & linguam crebro exeret, pectus ei sonum edere videtur, & grauitas inesse quam pectus capere nequit. Hippocr. *lib. 3. de morb.* Difficilem hanc peripneumonicorum respirationem sub-

limem vocat Hipp. 3. *epid. sect. 2. comm.* 4. scribens; in ea summum moueri thoracem ad aperta scopula vsque. Et quidem principio peripneumoniæ, præsertim biliosæ, respiratio est frequens & magna, quæ tamen breui, ob virium debilitatem & instrumenta spirandi affecta, in paruitatem mutatur, & frequentia augetur. Suspiratio est calida, & vbi plurimum effluit, alleuationem sentiunt, & multum aërem frigidum attrahere cupiunt. Cordis enim calor temperatur non solum refrigeratione, quam præstat aër inspiratus, sed etiam expulsiōe fuliginum, quæ expiratione perficitur, quæ fuligines cum in peripneumonia ob magnum incendium copiosissimè colliguntur, ad earum subitam expulsiōem, vehementem expirationem æger molitur, ac sæpè tam magnam vt exsufflationis nomen mereatur.

Pectoris angustia adest cum dolore, dolorque non est pungens, sed grauius, spinam attingens, vbi membranæ pleuram ambientes sustentantur, isque dolor remissior est, nisi membrana simul inflammata fuerit. Nam deprehensum est in dissectis peripneumonia mortuis, sæpè membranam pulmones ambientem simul inflammari, & aliquoties, vt dictum, simul cum pulmone pleuram quoque inflammatione corripì, vbi dolor acutior, & punctatior est; vbi verò ipsæ membranæ primariò non afficiuntur, sed visceribus quæ ambiunt inflammatis extenduntur, dolor tantum grauius excitatur.

Febris acuta est, & quidem acutior, quam in pleuritide, ob cordis vicinitatem. Adest etiam anxietas

& iactatio, vt Hippocrates, *de morb.* habet, ægrique sicum & figuram decubitus sæpè mutant, quod sit ob febris vehementiam summam respirandi difficultatem, & virium debilitatem. Ob summam enim respirandi difficultatem & angustiam ægri sese frequenter erigunt, & sedere conantur, ex corporis hac erectiōe aliquam alleuationem sperantes, ob virium tamen imbecillitatem erecti diu sedere non possunt, ideòque situm iterum mutare coguntur. Pulsus est magnus ob vehementem arteriæ percussione, & vsum urgentem: languidus tamen ob virtutis imbecillitatem.

Facies rubet ob vapores calidos ad caput exhalantes, & sanguinem simul secum rapientes, male imprimis, vbi cutis est tenuior, & propterea sanguinis color ibi euidentius efflorescit. Eadem de causa oculi & yenz temporum tument, lingua flaua est, vel lentore multo obducta, tandemque nigrescit, sæpè accidunt deliria, sitis magna adest & potus frigidi, imprimis verò aëris frigidi appetentia ob linguæ & faucium à calidis vaporibus ex inflammato pulmone exhalantibus inductam siccitatem, quæ ori ventriculi ob communemunicam communicatur: vnde pulmones etiam membrum siticulosum appellantur.

Signa differentiarum quod attinet, ac primò ratione subiecti, quia intersepimento quodam pulmo in partem dextram & sinistram diuiditur, prout hæc vel illa afficitur, ita dolor & grauitas in dextro vel sinistro latere magis percipitur. Si verò vtraque pars sit inflammata, in toto pectore as dolor sentitur. Idem quoque ex altera clauicula,

vel hypochondrio condolente assisti-
maripotest. De qua re videatur Hip-
pocrates, *Cocci text.* 400. in codi-
ce Foessij, vel comm. 1. in lib. 5. sect. 2.
apud. 47. in Hollerio: *In pulmonis
inflammationibus, si lingua tota fiat
alba & aspera, viraeque pulmonis por-
tes inflammatione laborant: quibus
vero dimidia lingua qua parte id appa-
ret, inflammatio assigit. Et quibus
quidem ad unam claviculam dolor sub-
bit, iis una superior pulmonis ala la-
borat: quibus vero ad ambas clavicu-
las dolor extenditur, amba superioris
pulmonis ala laborant: quibus ad me-
diam costam, media, quibus vero ad
septum transversum, inferior, quibus
vero una tota pars laborat, quae ei par-
ti respondent, omnia agrotant. Si qui-
dem agitur suspense utriusque pulmonis
partes acuta diu tantam inflammatione
derineantur, ut ad latus adhaereant,
illa corporis parte resolutionem patiun-
tur, quia morbo respondet, & ad costam
liuores sunt, quos veteres *sterni*, *ictos*
vel *sideratos* vocabant. Quod si tanta
non est inflammatio, ut adhaereant, do-
lor quidem totum occupat, neque ta-
men resolutionem sentiunt, neque lino-
res habent. Quibus vero totus pulmo,
una cum corde inflammatur, ut pro-
cedat in latus, resoluitur totus ager,
iacet frigidus & sine sensu. Moritur au-
tem secundo & tertio die. Haec Hip-
pocrates.*

Resolutionem autem seu paraly-
sin, quae ex pulmonis inflammatio-
ne fit, quod attinet, triplicem eius
causam reddit Desid. Iacotius in
comment.

Prima est, quia primi inter costa-
les recipiunt a pulmone noxam &
tumore premuntur. Quoniam au-
tem ab illis ad brachia derivantur
nervi, ideo fit, ut eiusdem lateris

brachium sensu & motu bene desti-
tuatur. Deinde quia musculorum
thoracem mouentium calor internus
resoluitur & facultas motrix labefa-
ctatur, cuius defectus resolutio est.
Postremo quia extincto calore cor-
dis & suffocato, morte repentina,
circa syncopen tamen, veluti atto-
niti affecti moriuntur, denegata su-
bito vi mouendi. Verum commodi-
ssimum est statuerè, fieri hoc ob
consensum spinalis medullae & arte-
tiarum & intercostalium. Etenim si
pulmones tanta inflammatione la-
borent, ut sanguis etiam in arteriam
magnam copiosè irruat, ita ut etiam
arteriae intercostales repleantur &
tumeant, & hinc etiam iamuli illi,
qui per foramina vertebrarum tho-
racis in spinam penetrant, fit inde, ut
& nervi à spinali medulla ibi pro-
gredientes comprimantur, atque
ita paralytis partium, in quibus ner-
ui illi reholuuntur, excitecur.

Tertius molesta est, ob pulmonem
primò affectum, cum qua sputum
redditur sanie primum tenuiore,
mox cruore, aliàs alio colore tin-
ctum, nonnunquam spumofum. Et
ipsum sputum & hinc sequens stertor
quali quidam peripneumoniam à
similibus affectionibus discernit.
Cuius rei exemplum est apud Hip-
pocratem, lib. 5. epid. Larissa, inquit,
Hipp. sthenes pulmonis inflammatione
Medici detineri, saluò tamen, vi-
debat. Principio quidem lacta se ex-
ercens duro in loco supinus cecidit, su-
per incidente ei aduersario, & lanis
frigida, eum amplexus, & gravior si-
bi videbatur. Post die verò febris &
tussis sicciò, aspiratio crebratenuit.
Quinto autem die cruentum paucum
serexant, & delirare cepit. Cum tussis
urgere, tum dolor pectus & dorsum

inestabat. Sexto postquam sternutasset, sanguis ex naribus effluxit ad quatuor ferè heminas. Sub vesperam neque loquebatur, neque quid fieret, aut quid diceretur, sentiebat. Undecimo mortuus est. Quinque autem diebus quandoque bene sentiebat, quandoque verò minime, febre liber erat. Sputum verò nullum exercebatur, neque stertor detrahit, quoniam sputum non aderat.

Signa
differen-
tiarum.

Signa differentiarum ratione causæ quod attinet, patent ea ex notis humorum in corpore redundantium. An autem per venas sanguis afflueret, an verò catarrhus malo occasionem præbuerit, etiam facile patet. An suppressa aliqua euacuatio vel lochia retenta mali causa sint, etiam latere non potest. Et quæ purgationes in puerperio retentæ sequantur symptomata, docet Hippocrates, de morb. mulier. lib. 1.

Diversitatem autem humorum inflammationem excitantium ex sputi colore & substantia cognoscimus; aut si æger non exspuat, ex aliis humorum signis.

Prognostica.

Prognos-
tica.

1. Peripneumonia vehemens & acutum malum est, quod plus periculi, quàm doloris habet, ut Celsus, lib. 4. cap. 7. ait, paucique eâ correpti evadunt.

2. Etque peripneumonia periculosa, quàm pleuritis; quia pulmo præstantius viscus est; cordique vicinus, & soluta continuitas in hoc non facile coalescit.

3. Cum vna salus pleuriticorum & peripneumonicorum consistat in vitii robore, teste Galeno, 3. prorrh. aph. 4. & 10. meth. med. cap. 5. si magna adsit virium debilitas, valde periculosa peripneumonia est.

4. Periculosa est peripneumonia,

in qua nihil expuitur. Arguitur enim humoris contumacia & naturæ infirmitas, 3. epid. comm. 1. aph. 4. ac in ipsa peripneumonia, ut & pleuritide sæpe plus iuvat facile & copiose expuere, quàm ipsa coctio, ac pleurique ex defectu expuitionis moriuntur.

5. Scretio flava, & multum permixta sanguine, si in peripneumonia inter initia excernatur, salutis indicium est; si septimo die tardius, minus securè, Hippocrates, 2. prognost. aph. 50. Nam in longius tempus morbus protrahitur. Interim verò multa ægro aduersa acciderent, atque imprimis vires deiici possunt. Quo quidem aphorismo non probatur sputum, vel quatenus flavum vel rubrum est. Scretio enim flava sincera improbat, 2. prognost. 46. & rubra tanquam cruda improbat, à Galeno, 1. aph. 12. sed quatenus ex flavo & rubro mixtum conficitur. Tunc enim aliquod coctionis signum exhibet, quæ si statim primis, tertio scilicet vel quarto, diebus appareat, morbum non ultra diem centesimum duraturum significat.

6. Sputum quodcumque dolorem non tollit, malum: quod verò soluit, bonum. Hippocrates, in Coacis.

7. Si lingua initio nigrescat, celebriores sunt liberationes, postea verò tardiores. Hip. 1. de dieb. indicatoriis.

8. In pulmonis inflammatione quibus circa initium vrinx crasse sunt, deinde ante quartum diem tenues evadunt, mors impendit. Hippocrates in coacis.

9. Sudores circa ceruicem & caput oborti, mali sunt, nisi vrinx multæ & crasse proruperint, & sputa cocta prodierint. Hi enim su-

dores mali sunt ex suffocatione, impetu & violentiâ. Hippocrates, *de ratione vultus in acutis.*

10. Iudicatur autem peripneumonia brevissimè in septem aut novem diebus, longissimè octodecim, vel viginti diebus. Vbi æger viginti diem trasgreditur, non moritur peripneumoniâ, sed tussit & pus exspuit, & pectus dolet. Empyicus enim fit, nisi in diebus criticis pulmo expurgetur. Hippocrat. 2. & 3. *de morbis in libro de internis affectionibus.* Et si enim, ut *pregnasti.* 2. dictum, peripneumonia periculosior morbus est, quàm pleuritis, & pauci ex ea evadunt, ac propterea etiam, ubi lethalis est, citius interimit, quàm pleuritis; tamen quæ mitior est, & salutis spem præbet longiore indiget tempore, ut integrè indicetur. Nam ut ex iis, quæ Galenus, 7. *aphor.* 31. tradit, colligi potest, in morbis pulmonis periculosos morituri breui moriuntur; qui verò evadunt, non nisi longiore tempore evadunt.

11. Si lethalis futura sit peripneumonia, vigilia adest continua, aut somnus levis, à quo delirium, ægèque morbi vehementiam non sentit, frigent extrema, vngues lividi curvantur; hi quarto aut ad summum septimo die moriuntur. Aëtius, *terrabili.* 2. *serm.* 4. *cap.* 66. Si verò ad salutem permute-
tur, sanguinis è naribus fluxus fit, aut alia perturbatio, biliosus multus excrementibus cum signis coctionis & in die critico. Vnde infra *quæst.* 1.

12. Si inflammatio in pus convertitur, si per viam & alvum excernitur, liberantur ægri. Per quam autem viam id fiat, dicitur de pleuritide. Si autem in pulmo-

nes irruat, aut suffocantur ægri, aut ad tabem deducuntur. Aëtius, *loco allegato.*

13. Pleuritide & peripneumonia detento, diarrhæa superveniente, malum, 6. *aph.* 16. quodd tamen solum verum est, cum non ab ingessis ea oritur; sed ob magnitudinem morbi etiam ventriculus & hepatis afficiuntur, ut ventriculus nec cibum concoquere, nec hepatis chyllum attrahere possit. Aliis & in mitiore peripneumonia bonum indicium est diarrhæa, cum coctionis signis antecedentibus criticæ evacuationis loco sit. Itaque tutior & utilior tum est diarrhæa, quæ sit in morbi principio, quàm quæ sit in fine vel statu. Illa enim causam antecedentem utiliter tollit; hæc verò nec antecedentem, nec coniunctam, sed vires potius proster-
nit.

14. Quibus ex angina in peripneumoniâ fit mali conversio, intra septem dies moriuntur; sin hos effugiunt, purulenti evadunt, 5. *aph.* 10. Membrum enim nobilius ac principii inferius ac vicinum, materiam vitiosam talem tolerare diu non potest, sed id efficit, ut morbus cito, vel ad bonum, vel ad malum terminetur.

15. Qui empyi sunt ex peripneumonia, si natu maiores sint, id est, inter senes & ætatis medij, potius intereunt, quàm natu minores; cum expultrix facultas in iis languida sit, ut pus reici fati nequeat, quo retento & pulmonem exedente, frustra curatio instituitur, 2. *progn.* 99.

16. A pleuritide peripneumonia malum, 7. *aph.* 11. quoniam translatio fit ab exterioribus ad interiora, &

à minùs nobiliss ad nobiliora, cordique propiora. Sed cùm *in coactis* contrà scribatur, peripneumoniã, quæ post pleuritidem fit, mitiorem esse; sciendum ex Galen. *in comm.* 7. *aph.* 12. aliud esse, morbum alium in alium transmutari; aliud verò, morbo morbum superuenire. Nam transmutatio vnius morbi in alium fit, quando priore cessante alius aduenit; superuenit verò morbus alius, quando altero manente alter superuenit. Ideoque cùm, vt Galenus explicat, *loci alleg.* loquatur de peripneumonia superueniente pleuritide, omninò ea periculosa est. Arguit enim humoris excitantis pleuritidem tantam copiam, vt in plura affecta totus contineri non possit, sed in pulmonem retundet. Si pleuritidis in peripneumoniã ita mutetur, nullum pleuritidis signum remaneat, paucitas omninò humoris indicatur, quæ etiam peripneumoniã adeò periculosam excitare non potest.

17. Contrà à peripneumonia pleuritidis bonum, quia ex morbo periculoso minùs periculosus excitatur, quamuis id raro accidat, vt Galenus, 7. *aph.* 11. docet.

18. A peripneumonia phrenitis malum, 7. *aph.* 12. Facta enim materiz calida à pulmonibus ad caput translatione, si ad interiora capitis feratur, phrenitidem excitat, quæ periculosa est. Aliàs etiam ad peripneumoniã delirium sequi solet, non cum tanto periculo calidis vaporibus ad caput ascendentibus, & cum spiritibus mixtis.

19. Quibus vrina in peripneumonia crassa & cocta appareat, circa quartum verò attenuatur, lethale est. Hippocrates, *in coact.*

20. Quibus in peripneumonia abscessus fiunt ad aures, aut ad sedes thoracis inferiores, & in longum exeunt, seu in fistulam abeunt, vt materia euacuari queat, item abscessus ad crura omnes vires sunt optimi verò sunt, qui fiunt signis coctionis in sputo apparentibus. Criticæ enim expulsiõis huiusmodi abscessus soboles sunt. Hippocrates, & Galenus, 2. *progn. aph.* 64. 65. & *in coact.*

21. Grauedines & sternutamenta per omnes morbos, qui in pulmone sunt, preuenire & superuenire malum est. Hippocrates, 2. *progn.* 49. Etsi enim, vt Galenus, *in comment.* docet, per se grauedines peripneumonici non officiunt, cùm humor inde ad pulmonem non descendat; per accidens tamen dupliciter male sunt, vt signum scilicet & vt causa. Vt signum, quia monstrant adeò magnam esse pulmonum affectionem, vt capiti etiam committetur, idque repleat; vt causa, quia sternutatio, quæ grauedinem comitatur, thoracem concutit, pulmonemque inflammatum lædit.

22. Peripneumonia, vt ex dictis patet, quinque modis finitur. 1. Coctione & sputi excreatione, qui modus tutissimus est. 2. Crisi quâ deriuatio & euacuatio fit materiz per hemorrhagiam narium, fluxum mentis, hæmorrhoides, sudores, aluum, vrinam. 3. Abscessu post aures, vel in cruribus. 4. Suppuratione, ex qua expyema fit, aut phthisis. Et quidem post suppurationem rupto apostemate duo modi ad salutem, duo ad mortem tendunt. Si nimium pus per sputum vel vrinam, vel aluum eicernatur, æger conualefcit; ad mortem fertur suppuratio,

si propter copiam puris æger vel suffocetur, vel phthisis exulcerato pulmone sequatur. s. Morte, ægro per sputi suppressionem strangulato. Nam ubi spirandi difficultas adest magna, ut ægri ferè suffocari videantur, febrisque est vehemens, & sputi nihil vel parum reicitur, virèlque sunt debiles, lethalis morbus est.

Indicationes & curatio.

Indica-
tiones &
curatio.

Cùm peripneumonia sit inflammatio, etiam aliarum inflammationum modo indicat, ut materia, quæ ad pulmonem fertur, auertatur, quæ affluit, euacuetur, ut postea de pleuritide pluribus dicetur. Est enim eadem ferè peripneumoniz, quæ pleuritidis, curandæ ratio.

Curatio autem peripneumoniz omnino maturanda est, ob summum periculum, & in id omni studio incumbendum, ut materia resoluatur & discutiatur, ac materiæ suppuratio præcaueatur. Aut si id fieri nequeat, ut sputum & pus quam citissimè educantur, ne pulmonem corumpant.

Itaque si vires & alia permittant, vena basilica eiusdem lateris, in qua inflammatio percipitur, aut utriusque, si pulmo secundum utramque partem inflammatus sit, aperiatur. Sanguinis enim missione venis exinanitis sanguis non solum affluens ad vacuum implendum introcedit, sed etiam ille, qui iam in parte affecta est, iuecedit. Euacuetur autem sanguis eâ copia, quam sanguinis plenitudo iudicat ac vires permittunt. & liberalius quidem, ob subitum, quod morbus minatur, periculum. Vires tamen nullo modo liberaliore sanguinis missi ne deiciendæ sunt; cum in hoc præcipue morbo, ob maximam respirationis

angustiam, ex virium debilitate non mediocriter periculum imminet. Præstat potius, si vires id ferunt, venæ sectionem in altero brachio repetere. Et si peripneumonia sit sanguinea, copiosius sanguis educatur, si biliosa, parcius, si pituitosa, adhuc parcius.

Si verò peripneumonia alteri morbo, qui iam aliquandiu duravit, succedat, & vena iam antea ægro aperta sit, videndum, quid vires ferant. Si enim vires ferunt, sanguis moderatè adhuc euacuari potest. Si verò metuendum sit, ne venæ sectione vires deiciantur, brachiis & thoraci cucurbitulas scarificatas applicare licebit, quæ à profundo thoracis ad cutem & partes externas sanguinem trahunt.

Primo tamen brachiorum musculis adhiberi cucurbitulas utile est, ut aliquo modo sanguis euacuetur, & à pulmonibus auertatur, postea & scapulis vel pectori, si id carnosum sit. Et si enim locus vicinus esse videatur: tamen à pulmonibus aliquatenus distat, & ab interioribus ad exteriora trahitur. Et cum adhibeatur cucurbitulæ, tum vel antea venæ sectio præmissa est, vel vires ob debilitatem venæ sectionem non ferunt. Ideoque non tanta plethoradum adesse potest, ob quam attractio ad partem affectam metuenda sit. Quem in finem & ligaturæ, frictiones ac cucurbitulæ sine scarificatione extremis adhibendæ.

In eundem etiam finem & clisteres infundere decet, & medicamentis aluum mouentibus primis diebus & materiæ impetum à pectore auertere, & humores vitiosos, si contingant, ac in corpore abundent, euacuare. Cauendum tamen, ne fortioribus

medicamentis humores nimium agitentur, febris incendatur, vitæque deiciantur: sed sufficiunt mitiora, quæ aliàs pectori amica sunt; vt syrupus rosarum solut. de cassia cum manna, diaprun. simplex, quibus tamen rhabarbar. agaric. & similia benigniora purgantia addere licet. Vt *℞. Decocti peEtoral. ʒ. iii. in iis dissolue, manna ʒ. j. vel ʒ. .j. ʒ. ʒ. Colat. adde syrhp. rosar. sol. ʒ. vi. M.*

His peractis omni studio laborandum, vt materia per sputum è pectore eiiciatur, quod iis medicamentis fit, quæ postea de pleuritide proponuntur. Valentiora tamen illa sint hæc, & eorum vsus frequentior. Vtilia hæc sunt, *carica cum hyssopo cocta, hydromel. in quo hyssopus, scabiosa, pulmonaria, salvia, radix iridis & similia* sint decocta, item *oxymel.* Pro humoris tamen peccantis ratione delectu quodam medicamentorum opus est. Si enim materia sit calidior, vsurpentur *viola, iuniba, sem. 4. frigid. maior. bordei, rad. alibæ, syrupus violar. iunibuns.* In frigidiore materia conueniunt *aqua mulsæ, hyssopus, capillus Veneris, origanum, Oxymel.* in vtraque causa hæc locum habet.

℞. Rad. glycyrrh. ʒ. ʒ. capill. Veneris, hyssop. an. m. ʒ. scabios flor. papau. errat. an. p. ii. iunibar. scabsten. an. N. 10. ficus N. iv. sem. malu. melon. an. ʒ. ii. passular. ʒ. i. Coqu. in aqu. fusli. Colat. dulcoretur saccharo cando. Vel ʒ. sum. Marsæ card. ʒ. ii. sem. 4. frig. maior. excort. ʒ. ʒ. pinear. mundat. amygdal. dulc. excort. an. ʒ. iii. aqu. scabios. capill. Veneris, endiu. papau. erratic. an. ʒ. iii. F. Emulsio, quæ dulcoretur saccharo cando, vel iulepo violatum. Vel ʒ. Spec.

diatrag. frigid. ʒ. ii. diatr. simpl. ʒ. ʒ. sacchar. penid. ʒ. ʒ. Cum syrhp. papau. erratic. & violar. F. Loch.

Si validioribus expectorantibus & incidentibus opus sit, quando scilicet sputum crudum & tenax est, oxymelite loch de caulibus, tussilagine, prassio vti licet.

Topica quoque eadem ferè, quæ in pleuritide, conueniunt, quæ scilicet feruorem pectoris ac pulmonis nonnihil lenire ac mollire & digerere ac discutere possunt, sed omnia calidè applicata. Fortiora tamen hæc requiruntur & quæ ad interiora penetrant. Eam ad rem etiam forma medicamenti aliquid facit. Nam profundius penetrat vis ceroti & emplastri, quàm vnguenti. Cerotum tale fieri potest.

℞. Butyri recent. adip. anser. an. ʒ. ii. ol. ricinac. amygdal. dulc. amar. an. ʒ. ʒ. pulu. irid. Florent. hyssopi, marub. an. ʒ. ii. Ceræ q. f. F. Cerotum.

Aut omisâ cerâ eadem excipiantur terebinthina lota cum aceto forti, & emplastrum conficiatur.

In peripneumonia biliosa parentur fomenta ex aqu. violar. cum modico aceti. Inunctiones fiant ex ol. viol. chamæmel. amygdal. dulc. & similibus.

Diatra.

Dixta quoque eadem ferè est, Dixta quæ in pleuritide. Cibi non sint salsi, neque acres, neque austeri, neque aluum altringentes, sed potius extenuantes. Hinc commendatur ptisana cum mel. Plerique etiam dulcia commendant, de quo postea, *questione 2. dicitur.* Postquam verò cessante defluxione

QVÆSTIO III.

*An dulcia in peripneumonia
conueniant.*

sputum laudabile iam apparere incipit, inscula pinguis, monente Celso, exhibere conueuit. Laudatur etiam decoctum hordei vel simplex, vel cum passalis & glycyrrh. hydromeli. in quo fol. hyssopi cocta sint, vel oxymel dilutius, vel hydrosacchar. s. ex aqua pura. Aut tale.

℞. Aquapurg. lb. iv. sacch. cand. glycyrrh. ʒ. iii. sem. anisi ʒ. i. cinamomi ʒ. b. Coq. ad tertiæ partis consump. Colat. adde mulepi viol. ʒ. ii.

Omnis autem potus paulatim sumatur, nec frigidus sit. Abstineat æger ab omni motu, præsertim sermone multo, & vocis intensione & clamore.

Reliqua ex doctrina de pluritudine patebunt.

QVÆSTIO. II.

*An in peripneumonia hæmorrhagia
narium utilis sit?*

An ia peripneumonia hæmorrhagia narium sit utilis.
Et si Aëtius, *tetrab. 2. serm. 4. cap. 66.* scribat; si ad salutem perueniat morbus, hæmorrhagia narium copiosâ solui; tamen Galenus, *3. de cris. cap. 3.* scribit contingere interdum, ut per sanguinem fluentem de naribus pleuritis soluantur; non tamen lethargus aut peripneumonia fluxum sanguinis amat. Præsupponit proculdubio hic Galenus peripneumoniam, ut & lethargum simpliciter à sanguine pituitoso licet; cum tamen, ut supra dictum, peripneumonia à sanguine, & sæpe etiam bilioso, fieri possit, hæmorrhagia narium tum utilis est.

Hippocra. 2. de morb. in peripneumonia curatione primis diebus dulces sorbitiones exhiberi iubet, ut, quod pulmōibus inhaeret, eluatur. Et alii etiam dulcia pectori amica sunt. Verum alij dulcia improbant, utpote quæ calida & faciliè bilefcentia febrem augēt, & ad iecoris ac lienis inflammationem nocent. Et cum Hippocr. ubi de pleuritis curatione agit, acidas potiones exhubeat, quo sputum facilius proueniat, eadem quoque peripneumonia competere videntur, cum eadem fere sit cura pleuritis & peripneumonia.

Verumenimvero sciendū; dulcia non vnus esse generis: alia enim sunt calidiora, alia potius temperata imò nonnulla aquosa, à quibus posteriora non faciliè nocere possunt. Et quæ sunt calidiora, non per se & sola, sed iis, quæ impediunt, ne faciliè bilefcent, diluta exhibentur. Et quamuis dulcia magis hepar offendere possūt, quàm pulmonem, cum ad hepar integra & parum mutata perueniant; ad pulmonem verò exigua eorum portio proximè pertingat, tutius omnino est, dulcia minus calida eligere, & aliis permixta exhibere. Et si humores, qui in pulmōe continentur, crassiores sint, acidis admixtis vis incidendi & extenuandi intendi potest. Vnde oxymel medicamentis thoracis affectibus conuenientibus admixtum ad viscidorum expectorationem accommodatissimum est remedium, *3. parat. vlt. in acut. comm. 2.*

An dulcia in peripneumonia conueniant.

CAPVT IV.

De vasorum pulmonis, & primò de asperarum Arteriarum angustia.

A Speræ arteriæ, quæ per pulmonem disperguntur, cum & aërem, qui inspirando attrahitur, admittere & fuliginibus exitum præbere debeant, causæ eâ de causâ factæ sunt, nullumque humorem vel aliud quicquam in se continere debent. Quæ naturalis earum constitutio si lædatur, morbum in cavitate seu angustia patiuntur.

*Causæ.**Causæ.*

Fit autem hæc angustia, vel ab obstructione, vel à compressione, vel ab exsiccatione.

Obstructionem efficiunt humores crassi in bronchiis pulmonis hærentes, siue ibi sint geniti (quod tamen rarius accidit, cum pulmones nutriantur sanguine tenui, & puro, è quo successus faciliè colligi non potest) siue à capite transmissi, ut & à venis & reliquo corpore. Idem præstat crudum tuberculum, vapor crassius, calculi & grandines in pulmonibus geniti, carunculæ item & vesiculæ, ut & vermes in pulmone procreati. Sanguis item, qui ex gutture, œsophago, ore, pulmone, thorace vulnerato eò effunditur, ut & pus post ruptum partium vicinarum abscessum in pulmonem illapsam, aut è thorace in pulmonem imbibitum.

Comprimendo asperas arterias an-

gustiores reddunt eadem ferè causæ, si in arteriis lævibus & vena arteriosa ac substantia pulmonis consistant, asperæ quæ arterias comprimant; humores nimiorum crassi vel in pulmone geniti, vel per venam arteriosam in eum effusi, crudum item tuberculum extra arterias asperas consistens, eademque comprimens, calculi, vermes. Neque enim semper (quod de asthma & catarrho suffocatio notandum) materia per asperam arteriam tantum in pulmones defluit, & bronchia pulmonis obstruit, sed sæpè etiam per venas in pulmones effunditur.

Idem accidit in hydropse pulmonis, in hydropse pectoris, in emphyemate, quando humores seu in pulmone seu in thorace consistentes asperas arterias comprimunt, inflammationibus pulmonis, septi, transversis, mediastini, in gibbositate & luxatione vertebrarum dorsis, in lienis, tumoribus, ventriculi, hepatis.

Tandem si asperæ arteriæ validè exsiccantur, angustiores redduntur, nec satis dilatari possunt ad aërem hauriendum. Quam siccitatem imprimis auras & vapores metallicos inducere posse, atque idè Chymicis & aliis qui metalla tractant, familiarem esse, suprà dictum. Ita refert Heurnius de morbis pectoris, typographo cuidam adèd siccatus fuisse pulmones, ut aridum pomum retulerint.

Signa diagnostica.

Angustia bronchiorum pulmonis in genere ex effectis cognoscitur, respirandi nimirum difficultate ut & plerumque tussi.

Hippocrat. lib. 2. de morbis, etiam pulmonis repleti mentionem fecit, cuiusque

Signa.

Pulmo repletus.

eiusque symptomata describit hoc modo: Si pulmo repleatur tussis, difficultas spirandi quæ sit creccta cernice, & anhelatio detinet, linguam exerit, pulsus velut ex igne rubentibus impletur, prius occupat, dolor acutus pectus & scapulas vexat, neque sedere, neque recumbere, neque stare potest, sed infirmis est viribus. Hic quarto serè die moritur, quem si superauerit, spes plerumque superest, sepe tamen etiam septimo die periculum subit, quem si effugerit, conualescit. Verùm inflammatione potius quam pulmonis & acutum malum, quam simplicem obstructionem describere videtur.

Causas verò quod attinet, obstructio cognoscitur ex causis, quæ præcesserunt, nimirum catarrhis & humoribus pituitosis de capite in pulmonem delapsis apostemate aliquo partium vicinarum è quo rupto pus in pulmonem effunditur: empyemate & pure in thorace contento, pulmonis & thoracis substantiam penetrantibus, ut & partium vicinarum vulncribus, è quibus sanguis in thoracem effunditur. Respiratio est difficilis cum sonitu, quandoque etiam cessat, & remittit, ubi pituita excernitur. Speciem materix, id quod tussi elicitur, indicat. Si crudum tuberculum adsit, seu obstruendo, seu comprimendo angustiam pariat, difficilis est respiratio & alidua, nec citra stertorem & strepitum, nec vlla ante fuit destillatio, malum sensim gignitur, & æger aliàs benè habens de difficili respiratione conqueri incipit, quæ in dies augetur, tussis, quæ coniungitur, sicca est, adestque maxima pulsus inæqualitas.

Si humores vitiosi in leuibus

arteriis, & pulmone hærentes comprimendo angustiam pariant, catarrhus abest, & vitiorum humorum vel in hepate, vel toto corpore redundantium signa adsunt, respiratio est difficilis, tussis abest, de quo postea dicetur.

Calculos & grandines in pulmone cognoscere, difficile est, & vix aliter cognosci possunt, nisi ex spuito præcedente & symptomatibus sequentibus. Si quis nimirum sputum crassum & viscidum valde exspuat, postea verò eiusmodi sputum cesset, & respiratio absque sonitu difficilior reddatur, suspicio est, materiam in calculos, vel grandines conuersam esse.

Vermes etiam non faciliè cognoscuntur, nisi ubi tussi reiciuntur, & præcessit plerumque tussis diuturna, quæ nullis remediis vinci potuit.

Tumores pulmonum, diaphragmatis, mediastini, pus in thorace è suis signis cognoscuntur.

Si ex pulmonis & asperarum arteriarum exsiccatione proueniat, angustia cognoscitur ex defectu sputi, macie totius corporis, ac præcessit causa, quæ talem siccitatem in pulmonibus generare potuit.

Prognostica.

1. Angustia asperarum arteriarum pulmonis nunc plus nunc minus periculi coniunctum habet, pro causarum, à quibus illa pendet, varietate. Quod enim causa vehementior & pertinacior est, eò etiam plus periculi est metuendum. Simul tamen respiciendum ad respirationem læsam, tussim, pulsus, & alias actiones læsas, quæ magnitudinem morbi determinant. Ergo

Prognostica.

si obstructio sit à multis crassis, crudis & viscidis humoribus, vel subito suffocationis periculum imminet, vel morbus diuturnus expectandus.

2. Angustia, quæ sit ex humore viscido & crasso, vel crudo tuberculo in laevis arteriis consistente, cum pulvis magna æqualitate, solet cordis palitationem, respirandi difficultatem, ac tandem suffocationem & mortem afferre, ut Antipatri Medici casus docet, de quo Galen. 4. de lor. affect. c. ult.

3. Angustia valorum pulmonis à siccitate plerumque incurabilis est, & tandem levis morte hominem enecat. Reliqua ex ijs, quæ de alijs, pulmonum morbis dicuntur, patebunt.

Indicationes.

Indicatio.
acc.

Materia, quæ angustia bronchiorum pulmonis causa, seu obstruendo, seu comprimendo id præster, tollenda: quod sit si materia viscida attenuetur, detergatur, expectoretur. Crudum tuberculum attenuantibus & exsiccantibus absumatur. Grandines, calculi, vermes tussi eiciuntur, partes tamen materiam ad pectus mittentes simul euacuanda & roboranda sunt. Siccitas pulmonis emendanda est, ut supra de intemperie sicca pulmonum dictum.

Curatio angustia Arteriarum pulmonis ab humore frigido & crasso.

Curatio
lateius.

Vt igitur materia crassa commode euacuari possit, primò præparanda est incidentibus & detergentibus medicamentis, è capillo Veneris, hyssopo, prassio, pulegio, radice, enula, iridis & similibus, quæ postea proponuntur.

Vt ℞. Capill. Veneris, hyssop. scabios. prassian. M. B. rad. belen. iros, an. ʒ. ii. sem. anis, fœnicul, an. ʒ. i. passular. glycyrrh. an. ʒ. ʒ. B. fenug. N. vi. Coqu. in aqu. l. ad remanentiam tertiæ partis. Colaturæ adde Syn. capill. Veneris, de hyssopo, an. ʒ. j. oxymel. scillit. ʒ. ʒ. B. M. pro duabus dosibus, & portio hæc bis, vel ter iteretur.

Vel ℞. Rad. fœnicul. glycyrrh. iros, belen, an. ʒ. ʒ. B. capill. Veneris, insil. scabios. hyssop. prassian. sacrorum an. M. B. iunubar. Scheffen. an. N. xx. caribcar. N. vi. passular. ʒ. ʒ. B. sem. anis, fœniculi, malua an. ʒ. i. Coq. in l. q. aquæ puræ. Col. ℞. B. j. adde oxymel. scillit. syr. de prass. de glycyrrh. an. ʒ. j. B. Aq. cinamoni ʒ. ii. M. pro 4. dosibus.

℞. Syr. de prassio, de hyssopo, de glycyrrh. an. ʒ. j. oxymel. l. ʒ. j. B. Aq. scabios. veronica, hyssop, an. ʒ. iii. M. pro 3. dosibus.

Præparata materia euacuetur. E.g. in decocti supra secundo loco parati suff. quantitatem. agarici iroschicati, ʒ. j. sem. caribam. ʒ. vi. Ebulliant: ita alium simul mouebit.

Vel ℞. Pil. de agaric. ʒ. ii. as. saierib. ʒ. i. cochiar. ʒ. ʒ. B. Cum oxymel. scillit. F. Pilulæ xxv.

Nonnulli frequenter ad purgandum in obstructione pectons ab humore crasso vtutur trochiscis de violis, à Mesue, cap. de asthma, descriptis; quos tamen reprehendit Alexander Massarias, eà de causa, quod non sit compositio satis artificiosa, nec diagrydium satis correctum. Verum potest diagrydij loco sumi extract. scammoni. Possunt etiam sine scammonio hoc modo parari.

℞. Flor. violar. Martiar. non nim

minum exicatorum, 3. iii. *turbib elect.*
3. j. *β. agaric.* 3. j. *succiglycyrrh.* 3.
ii. 6. *inanna*, 3. i. 6. *Cumisyruo vio-*
larum.

Fiant trochisci, quorum 3. ii. vel
iii. in decocto pectorali, vel liquore
conueniente exhibeantur.

Vinum medicatū tale fieri potest.

℞. *Rad. helen. ireos*, an. 3. *β.*
turbib. electi, 3. ii. *scab. carduiben.*
an. P. ii. *sem. anisi*, *cinamomi*, *ga-*
lange, an. 3. i. Adfundatur *uini men-*
sura vel 6.

Sumat æger manē iusculum gal-
li, & superbibat haustum vini. Im-
primis commendatur ius galli decrepi-
ti purgans, in quo radix ireos &
semen cæthami coctum sit. Vel pa-
retur hoc modo.

℞. *Gallin antiquum euisceratum*,
in ventre eius contusa imponan-
tur, *sem. cætham.* 3. i. *rad. polypod.*
3. vi. *passular.* 3. i. *β. ficum* 3. j. *fac-*
mic. an. 3. ii. *agar. rab.* 3. *β.* *turbib.*
elect. 3. j. *β.* *zingiber.* 3. ii. Coqu.
donec caro ab ossibus separetur.

Vel ℞. *Gallum decrepitum euis-*
ceratum, ventremque eius sequen-
tibus reple.

℞. *Passular. ficum*, an. 3. i. *β.*
glycyrrh. hyssop. satureia, thymi, an. 3.
β. *sem. feniculi* 3. i. *caribam.* 3. *β.*
turbib. elect. 3. ii. *agarici trochisc.*
3. *β.* *zingiberis* 3. i. Coq. in aq.
pura.

Decocti detur manē haustus, qui
si non satis aluum moueat, adda-
tur mannæ aliquid.

Quauquam autem purgantia ta-
lia humore saltem in vniuerso corpore
euacuare videntur: tamen hoc
modo reuollunt & humores ad pul-
mones tendentes retrahere possunt.
Idcoque nec reuellentia & detri-
uantia omittantur, vt vomitus,

clysteres, & diuretica. Auicennas
tamen fortia diuretica improbat,
quod subtilē extrahant relicto cras-
siore.

Corpore toto euacuato, danda o-
pera, vt continens seu proxima cau-
sa è pulmone tollatur. Ideoque ad
materiam crassam, & viscidam atte-
nuandam, incidendam & detergen-
dam adhibeantur, *capillus Veneris*,
hyssop. prassium, *puleg. calaminiba*,
scabiosa, *rad. ireos*, *pimpinell. helenij*,
sem. anisi, *feniculi*, *scilla*, *ammo-*
niacum, *mullepedes vsti*, *sulphur*,
& hinc composita, *symp. capill. vene-*
neris, *de hyssop. de prassio*, *scabiosa*,
oxymell. f. compositi scillar. extr. ireos,
helenij. spec. & rotula diurecos. diuir.
Salomon. locb. de caulibus, *scillit-*
icum.

Videntum tamen, ne nimia me-
dicamentorum caliditate humores,
exsiccantur, & magis crassi ac lenti
reddantur. Ideoque vtile est atte-
nuantibus & incidentibus hume-
stantia permiscere, vt *glycyrrhi-*
sam, *passulas*, *caricas*, *iuiubas*, *pi-*
neas, *maluam*, *althæam*.

Vt ℞. *Passul.* 3. j. *β. sem. feniculi.*
3. *β. hyssopi*, *salua acutifol.* an. M.
β. capill. Veneris P. j. *iuiubar. se-*
besten. an. N. xii. *dactylor. sine nu-*
cleis, *ficum*, an. N. iv. *glycyrrhise*
rase, *sem. anisi*, *cinam.* an. 3. ii. *rad.*
helenij, 3. *β.* Conscindenda, conscin-
dantur & coq. in lb. iii. aq. in vase
duplici, Colatura dulcoretur *sacch.*
albi 3. v. Fiat potio clara.

Vtile est & hic ius galli decrepi-
ti, si in eo thoracica medicamenta
coquantur.

Vtile est & oxymel, quod à Cra-
tone, *conse. 79.* commendatur.

℞. *berb. hyssop. verame. scabios.*
marrub. origan. pulegij, carduibened.

an. M. j. Rad. *ireos*, 3. vi. *zingiber*.
3. b. *agar. alb.* 3. b. Infunde in *aceti*
lb. j. b. *Aq. veronic. carduib.* an. lb. b.

Stent in vase vitreo obturato loco calido per triduum, deinde ebulliant lento igne & colentur.

℞. Colaturæ lb. i. b. mellis, lb. b. Coqu. ad syrupi formam, qui aromatizetur cinamomo, calamo aromatico, de quo sumat æger manè cochlearia duo vel tria.

Vel ℞. *Glycyrrb. rasa* 3. ii. *sem. anisi confusi*, *feniculi*, an. 3. b. *spir. vini* lb. vi. Stent in vase vitreo bene obturato Macerentur dies duos. Postea adde mellis lb. ii. *ambra grysea* g. xii. *mosibi*, g. x. *sacch. alb.* 3. ii. *solutiois perlar.* 3. i. Stent per dies x. quotidie agitando, postea clarum separetur. Dosis 3. ss. cum 3. ii. lactis caprilli ieiuno stomacho.

Valdè etiam commendatur terebinthina, quæ non solum pulmones abstergit, sed & hepar, lienem, renes, simulque aluum citra noxam soluit: ut & oleum amygdalarum dulcium recens expressum ad 3. vi. cum saccharo sumptum, quod pulmones & pectus relaxat, & detergendo humores viscidos per aluum enacuat.

Imprimis hæc commendantur elegmata: seu loch vulgò dicta ut loch de caulibus, de prassio, de pino, passularum, de hyssopo, de scylla, sanum & expertum, & quod ad asthma dicitur.

Nonnulli diabutrum commendant, hoc modo paratum.

℞. *Caricar. ping. da cil. passular.* an 3. ii. Contusa in aqua mulsa, lb. iii. per diem infundantur. Hinc coquantur & exprimentur.

Colaturæ expressæ adde butyri

recentis aquâ fontanâ diligenter loti, & non falsi 3. iv. Iterum coquantur, & colentur. Postea adde *amygd. amarar. pinear. mundatar. consasar.* an. 3. ii.

Et omnia simul in mortario miscantur, addendo paulatim *Succi glycyrrb.* 3. b. *pulu. tragacanth. sem. urtic. hyssop. ireos, thym. saturia, prassij* an. 3. b. *cinamom. zingiberis, pyrcib.* an. 3. ii. *caryop. gala. g. piperis nigri, anisi, carui, cardamomi* an. 3. b. *ligni aloes*, 3. j. *pulmon. vulpis* 3. ij. M. Galenus in *fine lib. 6. de comp. med. s. l.* Aliquot ex veterum scriptis medicamenta recenset, atque inter ea, & hoc.

℞. *Succi scilla cruda, mellis part. æquales*, Coq. lento igne. Dosis 3. ii. ante & longe post cibum. Vel ℞. *sulphuris visui* (flores commodiores essent,) *sem. ruta sylvestr. aristol. absynib. abrotan. ammoniac.* an. 3. b. Terantur & fiant cum aceto trochisci magnitudine fabæ, quorum manè & vesperti tres exhibeantur cum liquore conueniente.

Cum internis medicamentis & Externa.
externa coniungenda. Illinatur nimirum pectus. Ol. *amygdal. dulc. chamamel, anethino, lilior. albor. cbeirino, additis mucilaginisbus & pinguedinibus emollientibus.*

Vt ℞. Ol. *amygdal. dulc. lilior. albor. rutacei*, an. 3. vi. *adip. gallin. anser.* an. 3. b. *mucilag. sem. fœnigræc. cum aq. scabiosæ* 3. iii. *pulm. rad. ireos beleny, croci*, an. 3. i. Cera parum. F. linimentum.

Interea non omittantur diuersiones, & si catarrho malum foueatur omnia illa, quæ suprà de catarrho diximus, hæc locum habent. Fonticuli etiam in brachijs excitari possunt; quibus materia auertitur.

Pectore expurgato danda opera, vt exsiccantibus, & absorbentibus reliquæ in pulmone absumentur. In quem vsum medicamenta pleraque ad humorem crassum expectorandum hæcenus propõsita adhiberi possunt. E quibus tamen fortiora eligenda.

Vt ℞. rad. *belen. ari. scyllæ. sulph. benzoe. & similia.* Vt Rad. *ireos, z. ii. belen. ari.* an. z. i. *angel. scilb.* an. z. i. *glycyrb. z. i. hyssop. saturnia. pulg. marrub. calamimb.* an. M. i. *sem. fœnicul.* an. z. ii. *urtic. cruce. cartham.* an. z. i. *β.* Coq. cum melle. Fiat syrupus.

Cui sub finem adde *croci, z. β.* Commendatur & syrupus de Nicotiana.

℞. *Nicotianæ sicca* N. iii. *capill. Veneris, scabiosæ,* an. M. i. *hyssop. marrub. calamimb.* an. M. β. *caricæ. dactylor.* an. N. x. *rad. angel. fœnicul.* an. z. i. *β. sem. fœnicul. anisi,* an. z. iii. *urtic. z. β. rad. ireos, z. x.* Coqu. in aqu. lb. iv. & addito melle & saccharo. Fiat syrupus.

Est & efficax decoctum ligni guaiaci, & sarsæ parillæ, si pectoralia addantur.

Laudatur & ros Solis, si ei cum sem. botryos, glycyrrh. & marrubij sp. vini affundatur. Est & utilis aqua cinnamomi.

In finibus & pituitoso ac frigido temperamento præditis, efficaces sunt aquæ pectorales dictæ, quæ humores crassos coquunt, colique ac flatus dissipant, vires roborant, & sputum facilius reddunt.

Vt ℞. Rad. *ireos, helen. fœnicul. glycyrb. cassilag.* an. z. β. *mors. diaboli.* z. iii. *verone. scabiosæ. hyssop. saluæ. marrubij, capilli Veneris* an. M. ii. *cinnamomi, gratior. sumperi,*

an. z. β. *sem. fœnicul. anisi, scylla prepar.* an. z. ii. *fœnium, N. x. amygdal. amarar. pinearum,* an. z. β. *croci, z. β.* Affunde spir. vini optimæ q. s. Stent in infusione diebus 14. postea destillentur.

Hoc loco de aquis pectoralibus eiusmodi monendum, etsi multa in iis sint, quæ destillato vires suas communicant: tamen multa etiam sunt, quæ per alembicum non eleuantur, vt glycyrrhiza, amygdalæ, pinæ, ficus, passilæ, & similia. Quare commodius esset, talia in spiritu vini, vel aquis eiusmodi macerare, & liquorem istum postea aquæ pectoralis loco vsumpare.

Vcl ℞. *Spir. vini optimi, z. iv. aqu. cinnamomi, z. β. ungul. cabal. lin. scabiosæ,* an. z. iii. *sacib. candi, z. ii.* Misc. vel fiat eclegma.

℞. *Ammon. aceti. scilb. diss. z. ii. sem. urt. maluæ,* an. z. i. *fl. sulph. d. iv. croci, d. β. cum mell. scilb. F. lohoh.* Vcl F. hic puluis.

℞. Rad. *glycyrrh. ireos, belen.* an. z. i. *ari, d. ii. cinnamomi, z. ii. sem. urtic. nasturtian. z. i. pulmon. vni-* *pis prepar. z. ii. croci d. i. fl. Sulph. z. i. benzoes d. β. sacch. candi, z. vi* F. puluis.

℞. *Flor. sulphur. z. i. β. benzoes, g. vi. ammon. g. iii. croci, g. iv. margar. prep. d. i. mescb. d. β.* Fiat puluis, de quo quantum cuspidè telli capi potest, detur vespèri in ouo sorbili, vel oxymelite scilicet. vel aqua scabiosæ.

Pueris datur semen fœniculi in lacte coctum.

Vcl ℞. *Flor. sulphuris, z. i. β. benzoes, d. i. rad. belenij, z. β. ireos, z. i. croci, d. i. sacch. candi, z. β. F. puluis.*

℞. *Ammon. z. i. β. croci, d. β.*

flor. benzoei, vl. sacchari candi, succ. glycyrrh. q. s. f. pilulæ xxx. sumantur vna vice vi. vel vij.

Vel 2℔. Flor. sulphur. 3. i. extr. belem. 3. i. sacch. alb. in. aqua scabiose diss. 3. iii. ol. anisi, gutt. iv. Fiant rotulæ. Vel 2℔. Spec. diatr. f. 3. i. diatr. ag. calid. 3. 6. balsam. sulphur. 3. 6. sacchar. in aq. scabios. dissolut. 3. iv. vel v. Fiant rotulæ.

Diatra.

Diatra ab humore frigido.

Aër quem spirando æger attrahit sit calidus, siccus, attenuans & liber. Ideoque in conclavi, in quo æger versatur, suffumigia ex styrace, thure, myrrha, benzoë, moscho, ambra. Vitetur aër frigidus & crassus.

Cibus easdem qualitates habeat, ideoque condidatur hyssopo, thymo, fœniculo, baccis juniperi, cinnamomo, & imprimis croco. Vtiles sunt passulæ, amygdalæ, pinæ, pistacia, & imprimis commodum estius galli decoreti cum thymo & croco. Militi quoque cibi non inutiles sunt, si æger aliàs eos ferat. Vitentur verò alstringentes & crassi succi, vt pisces, caro suilla, lac & similes. Potus sit vinum tenue & subdulce, vel melicratum aut mulsum, in quo thoracica medicamenta cocta sint. Possunt & cerevisiæ medicare fieri cum salvia, hyssopo, foremarino & similibus. Utiles est & potus ligni guaiaci. Æger sitim non ferat, sed sæpius, verum moderatè bibat: quia humectatione opus est, ad eam, quæ iam incisa & deteresa est in pulmone, materiam rursi eiciendam. Somnus sit nocturnus moderatus, capite & pectore non nihil eleuato.

Curatio angustia arteriar. pulmonis à reliquis causis.

Si à spiritu aut flatu crasso obstructa sunt vasa pulmonis, is discutendus & dissipandus est medicamentis flatu discutientibus, quæ alibi proponuntur, è quibus thoracica eligenda, vel hæc iis admiscenda, & danda opera, ne flatu iterum generentur.

Si tuberculum est causa angustia, danda opera, vt attenuantibus & exsiccantibus absumatur, qualem facultatem aromata habere, Gal. 7. de comp. med. sec. l. in fine scrib.

Sunt etiam vtilia hic ammoniacum, sulphur, benzoe, theriaca, mitridat. sales chymici, & similia enumerata.

Si à grandine & calculo sit angustia, locum habent millepedes & aselli, si nimirum in olla comburantur, donec albescant & melle excipiantur. Potentius sit medicamentum, si adiciatur semen milii Solis.

Si à sanguine, extra venas effuso proveniat angustia, fluxus sanguinis cohibendus, vt postea de curatione sputi sanguinis dicetur; qui verò in vasis pulmonis, præsertim arteris hæret, si concretus sit, per poscā, oxymel, coagulū leporis, mumiam & similia dissolvendus, & per sputum actussum eiciendus.

Si à siccitate pulmonis proveniat angustia, lac amygdal. dulc. & sem. melon. detur, syrupus de pomis, violis, borrh. iuiubæ, dactyli, ficus, passulæ, lac & similia, vt suprâ, de intemperie pulmonum sicca dictum.

Curatio angustia à reliquis causis.

CAPVT V.

De angustia læuium pulmonis arteriarum.

Angustia
læuium
Pulmonis
arteriarū.

ET si modò, vbi de causis angustia asperarum pulmonis arteriarum dictum fuit, etiam læuium arteriarum eiusdem facta sit mentio: quia tamen hæc etiam obstrui & angustiores reddi possunt, vt asperas arterias non comprimant in specie, & peculiariter de læuium arteriarum in pulmone angustia aliquid dicendum est, imprimis cum hæc tractatio doctrinæ de asthma non parùm lucis allatura sit, & affectus ipse cognitu necessarius sit, cum hominem sæpè subito in vitæ periculum conicere possit, etsi ante nec de difficultate respirationis, nec de dolore & grauitate pectoris nec de tussi conquestus sit. Cuius rei memorabile exemplum recenset Gal. 4. l. aff. c. vli. Locum, quia notatu dignus est, interdum adicubere libet. Ea, inquit, quæ Antipatro medico acciderunt, nemo est, qui nesciat, cuiusque qui Medicam artem publicè apud Romanos professus est. Agebat hic aetatem sexaginta quidem annis minorem sed quinquaginta iam annos exiisset. Is correptus aliquando febre, quamquam ephemera, idque ab euitantis causa, declinante iam fibre, vt, quid sibi factò opus esset, intelligeret, pulsum asperis tangere aggressus est. Cum autem omne inæqualitatis genus in arteriarum motione inueniret, in primis quatuor reuertitur: est, orinde verò, cum sese non fibre planè sentiret, illico balneum subit: quippe laboribus ac vigiliis corpus fatigauerat. Atque tenus quoque videtur,

donec diem certum præciterisset, versus est, quo cum nulla appareret febris, ad solida negotia pertractanda prodit: atque arteriam in extrema brachij sui parte tangens admiratus est perseverantem in pulsibus inæqualitatem. Occurrens itaque mihi, extendit manum ridens, inspicique pulsum tangere. At ego subridens, quid, inquam, portendit hoc quod proponis anigma? ille iterum ridens obnixè orauit, vt tangerem. Igitur inter tangendum omnigenam in pulsu inueni inæqualitatem, non solum in multarum pulsationum cumulo, quam systematicam (id est congregatricem) vocant, verum etiam in una arteria distinctione. Proinde miratus, quomodo adhuc viveret, cum talem haberet pulsum, interregavi, num dissimilis esset ei respiratio: ille verò nullam se sentire respondentem, obseruans equidem, an aliquando mutaretur, quippe sex mensium spatio assidue arteriam tangebam. Cūque ab initio interrogaret, quamnam corporis dispositionem mihi videretur posse huiusmodi pulsum efficere, atque per quem modum, inque eua febrim: ad eam questionem respondendi, in conuenerat: de pulsibus iam detraasse methymusmodi inæqualitatem. Quinque ob magnarum in pulmone arteriarum angustiam id evenire putant: angustia, verò causam esse dixi viscerum inflammationem. At tibi hanc ob causam id nunc accidisse impossibile est, quippe febre fuisses affectus. Relinquitur ergo: vel obstruendum ex liquidis & crassis & viscosis humoribus, vel erandi cuiuspiam tuberculi ortum in huiusmodi te dispositionem induxisse, tum ille respondens, oportuisse

(inquit) me suspiriosa orthopnea laborare. At ego probabilis: inquam, ipsum dicere, sed à veritate aberrare: quippe fieri nonnumquam huiusmodi orthopneam, quam diximus causam: id verò cum in asperis, non in leuibus arteriis crassus & lentus humor cumulat. Proinde omnem ei vitius rationem, atque medicamenta quoque hand aliter, quàm asthmaticis, adhibere insimus: deinde sex (ut dixi) mensibus elapsis, leni quadam spirandi difficultate affectus est, accedente simul cordis palpitatione, in primis quidem semel, deinde his, atque ter, postea quater, ac sæpius quoque antea simul spirandi difficultate ad quindecimum usque diem: post quem difficillima de repente obort aspiratione, resolutus statim obit aliorum quorundam exemplo, qui cordis affectibus laborant.

Causa.

Causa.

Causa autem huius angustie est duplex: obstructio & compressio. Obstructio fit à crassis, viscidis & pituitosis humoribus, qui quidem vel in pulmone, ex eius coctione vitiosa generantur, vel aliunde transmittuntur, id quod sæpè fit ex hepate, dum illud crudo & pituitoso sanguine scatet, cuius pars aliqua per venam arteriosam in pulmones transfunditur, & quidem sæpè certis intervallis, ut infra de asthma dicetur. Non verò materia huius obstructionis crassa è capite destituit. Hoc enim si fieret, prius à bronchiis pulmonis reciperetur, & difficultas spirandi ac tussis excitaretur. Deinde eadem obstructio fit à crudo tuberculo, de cuius generatione postea dicetur.

Comprimuntur verò hæc leues arterie itidem à crudo tuberculo, si primum in pulmone generatum extrahantur.

leuibus arteriis incumbit. Idem fit ab inflammatione pulmonis, ut etiam Gal. I. all. innuit.

Signa diagnostica.

Deprehenditur hoc malum è sola signa, pulsus inæqualitate, nimirum tam systematica, quàm quæ est in vna pulsatione, qui nunc est parvus, nunc magnus, celer, tardus, rarus, frequens, vehemens, atque inter pulsationes aliquæ decurtantur, aliquæ intermittunt, aliquæ interciunt. Cum enim natura fulgines ob angustiam harum arteriarum non possit satis expellere, fit lucta quædam, & natura causæ morbi sic se opponens, vi, quod molestum est, expellere conatur. Vbi autem natura hunc suum finem assequi non potest, aut dimidia facta est obstructio, syncopes aut suffocationis periculum imminet. Aliàs nihil molesti percipitur, nec difficultas respirandi, nec tussis, nec dolor, aut grauitas. Vbi tamen malum incrementum sumit, tandem ipsis arteriis communicatur, & tunc, quæ antea non aderat, difficultas spirandi superuenit, tandemque etiam palpitatione cordis, syncope & suffocationis metus.

Causarum signa quod attinet, si à crassis humoribus fit obstructio, pulsus est durus per tensionem; si per tuberculum, durus per tensionem & siccitatem. Si ab humore fit obstructio, pulsus magis variabit: si à tuberculo, inæqualitas magis erit vniformis, vt potè à causa magis fixa proueniens. In obstructione æquales plures simul adesse possunt: at in tuberculo plures sunt inæquales.

Vbi tandem malo incrementum sursum & materia asperis arteriis commu-

communicata accedit difficilis respiratio, si malum sit à crassis succis, difficultas respirandi non est vniformis, sed nunc maior, nunc minor pro causæ ratione, si verò sit à tuberculo, vniformis est difficultas respirandi, nisi forsan causa aliqua externa accedat.

Si malum sit ab inflammatione, ea ex febre & aliis signis supra propo-
sitis cognoscitur.

Prognostica.

Prognostica.

1. Malum hoc longè periculosum est, à quo homo sæpè accedente syncope, vel suffocatione subitò perimitur.

2. Quò in pulsus inæqualitate plures sunt magnæ, vehementes, celeres, intercedentes & æquales pulsationes, eò minus malum est: quo autem plures sunt languidæ, parvæ, decurrunt, intermittentes & crebriores, eò maius periculum indicatur.

3. Quò minus actiones cordis læduntur, minòrque est in syncope propensio, eò malum minus est: quò verò hæc maiora, eò maius periculum imminet.

4. Quæ à crassis & viscidis humoribus est obstructio, non ita difficulter, curatur, præsertim si recens fuerit; quæ autem angustia prouenit à tuberculis, curatu difficillima est, vt postea de tuberculis pulmonis dicetur.

5. Quò maior cachexia coniuncta est, eò periculosius est malum, cuius rei causa postea in quæstione dicetur.

Indicationes.

Indicationes.

Causa angustiam pariens est tollenda. Ideòque si humores crassi & visciidi sunt, attenuandi, extergendi & euacuandi sunt. Crudum tuberculum, seu has arterias obstruat, seu

comprimat, attenuandum & rescicandum. Inflammatio si adfit, ea debito modo curanda.

Curatio.

Curatio.

Crassi autem & visciidi humores quomodo præparandi & euacuandi sint, è pulmonibus, capite præcedente iam dictum est, vt ea hic repetere opus non sit, & dicetur de eo etiam in asthma. Nam eius curatio ab huius causæ sublatione pendet. Vnù saltem hic moneo, quod etiam in curatione asthmatis repetendum, nonnullos paroxysmo asthmatico ingruente vomitum præcipere. Quæ res etsi alicui à veritate aliena videri possit: aliquoties tamen vidi, vomitu spontè superueniente à paroxysmo liberatos fuisse. Quærenda ergò huius rei causa: quæ nulla alia videtur, quàm quod inateria, quæ ab hepate ad pulmones ruit, ad ventriculum cõuertitur. De quo postea in quæstione dicetur.

Crudum tuberculum quomodo curandum sit, dicetur postea cap. 8.

Inflammatio pulmonis quomodo curanda sit, iam antea cap. 3. dictum.

QVÆSTIO.

Quenam sit causa hydropis, qualiumque arteriarum obstructione laborantibus superuenire solet.

P. Salius Diuersus de aff. partie. cap. 21. censet idè hoc fieri, quòd perseverante malo calor innatus, quoniam non sufficienter euenturur languescat, atque inde hepar debilitetur, cuius ratione postea aliqua hydropis species succedit.

Hydropis in obstructione largum arteriarum causa quoniam

Veramenimverò, cum sæpè satis maturè scit cachexia prodari, vbi cor adhuc satis bene valere deprehenditur, & hepar nihil à pulmonibus, sed pulmones potius ab hepate,

accipiant, credibile est, vel à pulmonibus refrigeratis hepar refrigerari, vel quod vero similis videtur, primam mali causam in hepate habere, quod cum si debile, sanguinem pituitosum & frigidum generat, qui cum necessariò ad dextrum ventriculorum cordis mittatur, porrò etiam ad pulmones peruenit, & huius mali causa est. Cum enim vena arteriosa & arteria venosa per totam substantiam pulmonis in minutissimos ramulos diuile dispersantur, & multis anastomosibus coniungantur, facile ex vena arteriosa in arteriam venosam humores transferri possunt.

CAPVT VI.

De aperture vasorum pulmonis.

Aperio
vasorum
pulmonis.

Quatuor
modis
pulmonis
vasa ape-
riuntur.

Aperio
vasorum
pulmonis
Causa.

Angustia vasorum pulmonis opponitur eorum aperture, & proinde de hac post illam merito agitur. Ad morbos enim pulmonis, & quidem meatuum vitia & illi pertinent, cum vasa sanguinem continentia in pulmone, quæ clausa esse debent, aperiuntur. Id quod, vt in alijs etiam partibus, fit quatuor modis, *ἀνεμωσι* scilicet, *διὰ τὴν ἀνεμωσίν*, *ἐκ τῆς ἀνεμωσίν*, & *διὰ τὴν ἀνεμωσίν*.

ἀνεμωσι, seu osculorum in venis vel arteriis apertio fit primò à causa externa euidente, quæ proximè & solè orificia vasorum aperire potest, medicamentis scilicet abstergentibus & orificia vasorum aperientibus, qualia sunt aloë & similia, vel causis nimis laxandi vim habentibus. Deinde à causa interna, quæ vel est proxima, sanguis scilicet vasorum orificia aperiens; vel

antecedens, sanguis scilicet aut copia peccans, aut calidus, aut acris, à quo facultas irritatur; quibus & motus sanguinis ad superiora addi potest. Vt enim à sanguine orificia vasorum in pulmone aperiantur, causa non semper primario in pulmone hæret, sed sæpè ad pulmonem ab alijs partibus transmittitur.

Procatarecticæ causæ sunt, quæ vel sanguinem cumulant, vt suppressa eiusdem consuetæ per nares, hæmorrhoides, menstrua, euacuatio, & aliæ plethoræ causæ, vel calidiorē reddunt, vt corporum motus, vehemens aër, cibus, potus, medicamenta calida; vel ipsum ad pulmones & superiora commouent, vt motus nimius.

Διὰ τὴν ἀνεμωσίν, id est, transcolatio siue transsudatio fit ob vasorum & tunnicarum in iis raritatem, cuius causa est sanguinis tenuitas & serositas.

Ἐκ τῆς ἀνεμωσίν, id est, ruptio vasorum fit primò à causis externis euidentibus, quæ proximè vasa in pulmonibus rumpere valent, vt lapsu ab alto, vel percussione & contusione pectoris, ira cum clamore, intensione vocis subitâ & magna ac vehemēti, non à leuiore quasi per gradus ascendente, tussi nimia, conatu magno graue pondus attollendi, vel loco mouendi, saltu, imprimis post balneum, vbi vasa & totum corpus rarius redditum, cursu, iucta, retentione, spiritus in conatu excrementa excernendi, & sætum excludendi. Hinc Hippocrates, 3. Aphor. 29. scribit: iuuenibus sanguinis expuitiones, sicut & phthisin esse familiares: Et 5. aphor. 9. eadem ab anno 18. ad 35. frequentius accideret. Id quod Galenus non tam atrox

Διὰ τὴν ἀνεμωσίν
an

Ἐκ τῆς ἀνεμωσίν
causis ex-
ternis.

Iuuenibus
phthisis
cur fami-
liaris.

ratione accidere docet, quàm propterea, quod in ea ætate constituti in vita & victu errores committunt. Etenim iuvenes pugnare, aliisque exercitijs vici solent, sæpe frigori immo se exponunt, cibo & potu supra modum se replent. Quibus causis omnibus faciliè veniis, præsertim in pectore, rumpi contingit, vnde sputum sanguinis primò oritur, quod nisi tempestivè curetur, phthisis subsequitur. Præterea sanguinem calidum & biliosum cumulant, qui non solùm rupturam, sed & reliquas causas, quæ vasa in pulmone aperiunt, inducere potest. Eisdem ob causas viri etiam frequentius aperiionem vasorum pulmonis patiuntur quàm femine, Galenus, 4. de loc. affect. cap. 5.

A causis
internis.

Deinde rumpuntur vasa pulmonis à causa interna, eaque vel proxima, quæ est sanguis pulmonis vasa distendens; vel antecedens, sanguinis abundantia seu sola, seu cum spiritu flatulento; vel procacitica, quæ scilicet vel sanguinem auget, vel ad pectus commouet; vt motus corporis nimis, animi pathemata vehementiora, & ira imprimis.

Et præcipuè causæ istæ vasa rumpunt, cum vasa extensioni resistunt ob frigus externum. Tum enim illorum tunice frigore contractæ & induræ ad rupturam promptæ & paratæ sunt. Hinc Hippocrates, 6. epid. sect. 3. τὸ ψυχρὸν καὶ σπῆν πνεύματι, quod etiam habetur 6. aphor. 24.

Frigus verò ipsum per se vas aliquod frangere non potest, sed vel potum aliquem, vel plenitudinem accedere necesse est, de quo Galenus, 4. de loc. affect. cap. ita scribit: Πρὸς τὸν ἵψον περὶ τὰς ρυτίδας οὐκ ἔστι, sed quia vasa sunt tunice

frigida ac suaduræ & ad extensionem contumaces reddens, vt rumpantur, paratiora efficiunt: ruptionis verò causa est aut vehemens motus, aut humorum abundantia.

Diæsporia verò seu erosio fit ab humoribus acris & salis, seu à capite destillantibus, seu aliunde ad pulmonem fluentibus. Quò faciunt acrium & pravorum ciborum usus, inedia acres humores coacervans, & similia.

Signa Diagnostica.

Si *anisthoretis*, vasorum pulmonis sit, præcesserunt causæ vasorum orificia aperientes, quæ modò enumeratæ sunt. Et sanguis è vasorum orificiis apertis exit mediocri copia & sine dolore.

Si *diæsporia* adsit exit sanguis serosus, paucus & sine dolore.

Si à *pleth.* seu ruptura vasa pulmonis aperiuntur, præcessit plethora, & causa aliqua rumpens antea proposita; & sanguis statim copiosus exit.

Si sit erosio, præcesserunt salæ è capite destillationes, sanguis est acris, & propter humoris acris admixtionem malè coloratus apparet: percipitur sapor salis & acris, præcesserunt causæ acres humores cumulant, & primò quidem sanguis purus exspuitur, progressu verò temporis & erosione auctà copiosior, tandemque sputum puris sequitur. Quæ signa confirmantur, si nulla causâ violenta præcessit.

Præterea an à copia sanguinis, quæ tam *anisthoretis* quàm ruptionis causa esse potest, vt supra dictum, an verò ab acrimonia eiusdem proveniat vasorum pulmonis aperiio, ex eo quoque discernitur: quod si

à copia sanguinis, quæ naturæ oneri erat, ea proveniat, sanguinis, copiâ evacuatâ is sponte subsistit, signâque redundantis sanguinis adsunt; si verò acrimonia sanguinis proveniat, sanguis ita facile lûsti non potest.

Prognostica.

Prognostica.

1. *Diagnositi*, minimè omnium periculosa est, & adstringentibus facile sanguis sistitur.

2. Post hanc minus periculosa est *anæquæ*, ob quam si sanguis rejicitur, is sponte sæpè copiâ nimîâ evacuatâ subsistit, osculis spontè iterum sese occludentibus. Observatûmque sæpius in conlueto sanguinis, hæmorrhagiæ narium, hæmorrhoidum, mensium fluxu suppresso sanguinis superabundantem copiam absque ullo damno è pulmone, osculis vasorum reclusis, evacuatum fuisse: quod etiam Fernelius, lib. 5. de part. morb. & sympt. c. 10. annotavit. Et Ludovicus Duretus de seipso scribit, in comment. super Coac. Hippoc. aphor. 46. sibi, cum olim familiaris fuisset narium hæmorrhagia, & quidem cum commodo valetudinis usque ad annum ætatis quinquagesimum, tûm ea suppressa, nec tamen *anæquæ*, statim temporibus quiescente, quasi data porta prorupit, ille per *anæquæ*, vasorum pulmonis, atque quidem sæpè & multum; quæ tamen sedata nullam pulmonis offensionem reliquerit, præter summam corporis infirmitatem. Si tamen oscula vasorum vel nimium dilatata, vel motu continuo impulsâ iterum convenire nequeant, interdum ex nimia sanguinis profusione mors

sequitur. Aut si sanguis effusi portio in pulmone retineatur, illic putrescens pulmonem corumpere potest.

3. Periculosior est ruptura vasorum. Nisi enim intra tertiu & quartum diem ruptura consolidetur, inflammatio facile accidere potest, à qua, cum tussis pus exiret, edum si vulnus in dies maius efficitur. Et quamvis callus ulceri obducatur: tamen leui de causa, ut vocis intensione, vel risu immoderatione iterum rum-pitur. Galenus, meth. med. cap. 14. Celsus, lib. 4. cap. de Tussi.

Admodum etiâ periculosa est vasorum pulmonis apertio, quæ sit in vulneratione, percussione & contusione thoracis.

4. Periculosissima verò est *diagnositi*, seu erosio vasorum. Etenim vlus sordidum, quod tum inducitur, non facile consolidatur; & ut vitium humoris corrigatur, longiore tempore opus est.

5. Si ruptura & erosio vasorum pulmonis sit recens, & antequam phlegmone accedit, non ita difficulter curatur. Si verò phlegmone accedat, exigua sanationis spes superest, ea præcipuè de causa, ut dictum, quod pus & sanies tussis & pectore expurgare oportet, quâ vlus semper maius & deterius efficitur. Hinc Galen. 5. meth. med. cap. 13. & 14. scribit: se omnes curasse, qui è pulmone sanguinem expuèntes mox primò die ipsius opera vli fuerant; Qui verò post biduum aut triduum ipsius opera vli essent, horum aliquos sanatos esse, quos autè phlegmone sic occupavit, ut iam febricitarent, eorum sanè nullum perfectè restitutum fuisse.

6. Morbus reversione faciens ma-

gis, quàm ab initio vrget, Hippocrates, de intern. affection.

Indicationes.

Indica-
tiones.

Apertum vas quocunque modo apertio facta fuerit, claudendum est. Modus verò id præstandi varius est pro causarum diuersitate. Si nimirum ab *anæsthesia*, sit apertum vas, orificium vasis apertum obturandum & astringendū est. Si à *distentione*, densantia & incalescentia requiruntur. Si à ruptura, ruptum vas vniendum atque agglutinandū. Si ab erosione, sarcotica primū, quibus quod deperditum est, regeneretur, & hinc consolidantia requiruntur.

Præterea si vitium sit à causâ interna, eaque adhuc duret, aut vasorum agglutinationem impediat, extollenda. Sanguis nimium ad pulmones affluens reuellendus & auertendus, copiosus imminuendus; calidus & acris refrigerandus & mitigandus, humores biliosi & acres alterandi & euacuandi sunt.

Curatio.

Curatio.

Cum à vase in pulmone aperto sequatur sanguinis effluxus & hinc sputum sanguinis, vas apertum claudi non potest, nisi prius sanguis sistatur, & si forsân sanguis concretus circa vasa hæreat, is prius tollatur. Ideoque siue per *anæsthesiam*, siue per rupturam, siue per erosionem apertum vas in pulmone fuerit, commodissimè instituatur venæ sectio, quæ ferè plerisque scopis satisfact. Est enim, vbi causâ rupturæ amplius non adest, vt dum à contusione, lapsu vel clamore nimio vas apertum est, sanguis saltem sistendus sit, & hinc vas claudendum & vniendum; vbi verò causâ adhuc adest, id quod in plethora accidit, vbi à copia sanguinis vasa ape-

riuntur, non solum sanguis sistendus, & vas apertum claudendum sit, sed præterea etiam copia sanguinis minuenda: tamen his quoque omnibus satisfact venæ sectio. Etenim dum sanguinem aliò auertit, eius fluxum sistit, dum verò eius copiâ imminuit, causâ morbi tollit.

Aperienda autem est vena in cubito. Si tamen consueta aliqua euacuatio suppressa sit, venâ in pede etiam aperiri potest, vt ad remotiora fiat reuulsio, deinde vena in cubito aperiri potest, vt in inflammatione pulmonis dictum. Qua in re tamen distinctione opus est, vt infra, *part. 3. cap. vlt.* in quaestione dicitur. Et quidem, si necessitas id requirit, bis vel ter eodem die vel spatio bidui sanguis mittendus, si virium lapsus timeamus. Si enim venæ apertio sæpius repetatur, & in plures vices sanguinis missio distribuatur, efficacior sit reuulsio, virisque minùs deiciuntur. Et quidem convenientius sanguis mittendus, vbi copia sanguinis proxima & primaria apertionis vasorum causa est, in plethora scilicet, & vbi consueta aliqua sanguinis euacuatio suppressa est, sanguisque est calidior.

Si verò à prauitate humorum, qui vel officia vasorum aperiunt, vel vasa erodunt, apertio vasorum proueniat, atque in iis, vt Galenus, *5. meth. med. cap. 14.* scribit, qui parum sanguinis habere videbuntur, ad quandam succi probitatem redactis humoribus detrahere aliquid sanguinis poteris, tum rursum rescicere eisdem etiam rursum purgare, atque rursum rescicere, denique si res uadeat, sanguinem mittere, potissimum quibus velut

limus vitiosus & crassus totus sanguis est. Atque qui validi sunt, multique sanguinis, iis statim ab initio sanguis mittendus.

Quod si vires non ferant venæ sectionem, cucurbitulæ cum scarificatione partibus inferioribus reuulsionis gratiâ applicandæ, vel etiam hepatis, si à plethora sit ruptura. Hirudines etiam, præsertim si sanguinem autem fundere consuetæ sint, hæmorrhoidibus applicari possunt.

Et omnino danda est opera, ut si consueta aliqua euacuatio, vel mensium vel hæmorrhoidum suppressa sit, ea reuocetur; sed per ista, quæ diximus, media. Nam menstrua per medicamenta menses mouentia hic mouere non licet. Cum enim sint calida, & sanguinem vehementer mouere, & venas aperire possunt.

Nec omittendæ alix reuulsionones, quæ sunt cucurbitulis sine scarificatione, frictionibus, ligaturis & aliis, quæ citra euacuationem & virium deiectionem sanguinem reuellunt. Si defluxio sit à capite, ea reuulsio instituenda, quæ catarrhis debetur, ut suo loco dictum.

Deinde si sanguini vitiosi humores permiscantur, quæ qualitate sua vitiosa vasorum apertionis causa sint, & qualitas illa vitiosa corrigenda, vitiosi humores euacuandi. Ideoque & tum exhibenda alimenta boni succi, quæque acrimoniam sanguinis mitigant, ut psilana, amylium, tragacantha, succus granatorum, syrup. de portulaca, borragine, iuiubis & similia.

Ad purgationem exhibenda pulpa tamarindorum, syrup. ros. solut. myrrhæ, manna, rhubarbarum. Scammonio cautè utendum. Vi-

dendum enim, ne purgantibus fortioribus exhibitis sanguis magis agitur, & fluxioni aptior reddatur.

Tertiò danda opera, ut grumi sanguinis in pectore ac pulmone dissoluantur, cum non solum glutinationem vasorum impediunt, sed & retenti grauius symptomata excitant, & pulmones corrumpant.

Exhibendum autem oxycratum, seu posca, id est; mixtura ex aqua & aceto 3. vi. vel ix. mens. Sit autem posca, ut Galen. *f. meth. med. c. 8.* tradit, ista mixta, ut potu sit iucunda, & ne ob acetum copiosius tussim excitet. Ita enim & concretum sanguinem dissoluit, & ad glutinandum non nihil facit. Detur autem non frigida nec calida, sed tepida, & quidè bis vel ter de die, vel etiam trium aut quatuor horarum intervallo. Graci recentiores, ut Paulus Aegineta, Aëtius, Orisbasius, commendant coagulum cerui, hædi, leporis imprimis, quæ ut dissoluta coagulant, ita coagulata dissoluit, ut docet Dioscor. *lib. 2. cap. 26.* Et quia acredinem non obscuram obtinent, vix magnitudine ciceris exhibent ex aqua calida alstringente, aut oxymelite. Galenus tamen, *10. de simpl. med. fac. tit. coagulum*, propter acrimoniam formidat coagulum dare ad reiectionem sanguinis in thoracis affectu, scilicet adstrictione requirente. Poscæ igitur vsus tutissimus. Forestus ad sanguinem congelatum exhibuit mumiam & spermæ ceti. Donatus post poscæ assumptionem commendat puluerem leq.

℞. Rhabarb. 3. i. vel. 3. iv. mumia ʒ. v. vel vii. rubia tinctor. ʒ. iv.

Detur cum vino rubro, aut aqua plantaginis exguo aceto coniecto.

Grumos sanguinis in pectore resoluentia.

Langius, l. 2. *epist.* 31. hunc pulverem commendat.

℞. Rad. angelic. ʒ. ij. coagul. lepor. ʒ. ʒ. succin. ʒ. ʒ. far. orob. rubr. ʒ. ii.

Exactè contusa cribro excernantur, ac de illius pulveris farragine ʒ. j. dissoluatur in *insularii cerasolis aut gingidis li quoris ʒ. iii. ʒ. ʒ. oxymel. j. F.* hantus.

De medicamentis verò grumos sanguinis in thorace dissoluentibus aliquid difficultatis oritur, quo scilicet tempore exhibenda sint, cum si iis utamur, vasa non claudantur, sed potius aperiantur. In ista autem re perpendendum, an plus urgeat sanguinis impetus, quam sanguis coneretur. Nam si ruptura sit in pulmonis vasis, & metus sit, ne inflammatio excitetur, aut fluxus sanguinis augeatur, malique aliquid afferatur, statim sistendus est. Vbi autem iam ex parte aliqua impetus sanguinis cessat, ut ex eo cognoscitur, quod iam minus fluit, & color non est amplius admodum florido, grumos dissoluentibus uti, & postea agglutinantia exhibere licet: imò medicamenta ex utrisque composita, exhiberi possunt: exempli gratiā, oxymel & syrup. de portulaca cum bolo Armeno. Si verò ruptis vasis pectoris exspuatur sanguis & ex eo tantum periculū phthysicos immincat, primo cum expurgare & dissolvere, postea conglutinare liceat. Idem faciendum, sanguisque concretus statim dissolvendus, si is est pulmonibus tantum per *insularii* excat, cum tum tantum inflammationis periculum non adsit.

Si catarrhus à capite defluens apertionis vasorum pulmonis causa sit, & vasa aperta conglutinari non

possint, nisi catarrhus desinat, danda opera, ut primum catarrhus sistatur, de quo suprà lib. 1. *part. 2. cap. de catarrho dictum.*

Hicsta peractis, & omnibus, quæ consolidationem vasorum impedire possunt remotis, danda opera, ut vas ipsum statim consolidetur, dum adhuc malum recens est, & præcipuè in ruptura & erosione vasorum, antequam phlegmone accedat, ut *prognest. 5. dictum.* In vasorum autem apertorum conclusionem procuranda quædam pro causarum diuersitate occurrit varietas. Si enim *sinusidus*, astringentibus utendum, sanguisque si sit tenuior, crasso victu emendandus, modò non adsit inflammatio, ut in pleuritide, vbi astringentibus abstinentum, & potius recreatus promouendus. *Astringentibus*, & rupturam curandi ratio ferè eadem est. Adhibenda nimirum astringentia, emplastica & glutinantia medicamenta. Astringentia hæc utilia sunt portulaca, quæ quocunque modo sumpta apertionem vasorum pulmonis & spurū sanguinis inde proveniens curat; succus tamè eius efficacior est, *plamago*, *polygon. millefol. germina*, & *fructus rubi*, *cynasbat. nigri*, *tenera quercus folia*, *rosa*, *rad. symphit. maior. sumach. cortic. granat. balauisia*, *lapid. hamatis. corallia*, *crocus marris.*

Emplastica sūt *bolus Armenus*, *terrafigillata*, *sanguis draconis*, *gummi Arabic. tragacanth. ibus*, *massich. amylinum.*

Glutinant hæc *millefol. symphitum maius*, *lysimachia*. Et quia medicamenta pleraque plurimis prædicta sunt facultatibus, ita ut quædam astringant, condensent, congluti-

nent, etiam Medico modò ad hanc modò ad illam classèm ea referunt. Et cùm talia medicamenta non facilè penetrant, sed sibi ipsis potius viam quasi præcludant, admiscendum aliquid medicamentorum quæ calore & tenuitate partium prædicta solvant, ac distributionem cæterorum medicamentorum adiuuant. In quem vsum commodissima sunt & vehiculè vicem præstant mel & saccharum.

Ex his varia sunt medicamenta, atque in vsum potissimum sunt trochisc. de terra sigillata, de carabe cum & sine opio, troch. ramich. spec. diatrag. frigid. syrup. de portulaca, de succ. plantaginis, de rosis sicc. de papavere, myrrin. loch. de portulaca, consern. rosar. rubra. antiq. de sol. quercus, syrup. de corall. vt & opiata, quam descripsit Fernelius, consern. 21.

℞. Boli Armeni, aqu. rosar. lot. 3. ii. sem. portulac. lactuc. an. 3. B. gummi tragacanth. Arab. an. 3. ii. amyli, sem. nasturt. torrefact. an. 3. B. rosar. rubr. 3. ii. sacch. cand. rosar. tabul. an. 3. i. Cum syrup. myrristor. Formentur trochisci qui in ore detineantur.

Vel ℞. Consern. rosar. antiq. 3. iii. boli Armeni, terra sigillat. an. 3. ii. Cum syrupo de portulaca. F. Electuatiu. Vel ℞. Consern. rosar. rubr. antiq. symphyt. maior. an. 3. i. B. boli Armeni, terra sigill. an. 3. i. lapid. hamatit. 3. iv. cum syrup. de portulaca. F. electuarius.

Vel ℞. Tragacanth. gummi Arabici, sanguin. dracon. boli Armeni, amyli, spod. an. 3. i. lapid. hamatit. sem. papaver. hypocist. an. 3. iii. Cum syrup. de succ. plantagin. & rosarum. F. electuarius sentim de-

glutendum.

Vel ℞. Syr. de portulac. 3. i. iunibin. 3. B. boli Armeni, aqu. rosar. prepar. syr. myrrini q. s. F. lambilet Forestus in rupta vena tale præscribit decoctum. lib. 16. p. 25.

℞. Rad. consolid. maj. 3. i. burf. pastor. portulac. sanicul. pylosellæ, polygon. an. M. i. Sem. endiu. acetos. portulaca, urtic. an. 3. i. F. decoctio vt artis est in aqu. communi. pro lb. i. Colaturæ addendo 3. iv. syrup. myrris. Clarificentur. Pulvis, qui Iulio Cæsari Scaligero & medicis Parisiensibus in vsum fuit, sed & Serapione cap. 25. tract. 2. desumptus est.

℞. Spod. rosar. rub. boli Armeni, terra sigillat. hamatit. an. 3. B. gummi Arabici, tragacanth. an. 3. ii. sem. papaver. portulac. rosar. rubra. amogloss. c. c. vlti. amylistorrefact. an. 3. iii. F. pulvis.

Descriptio pulveris huius non nihil apud Hollerium exercet. Valerius in caput 27. talis habetur.

℞. Spody, ros. rubr. bol. Armeni, terr. sigill. hamatit. an. 3. v. corall. rubr. carab. margaritar. non perforat. an. 3. ii. B. gummi Arabici, tragacanth. an. 3. ii. sem. papav. portulaca, ros. rubr. amogloss. cornu. ceruicombusti, an. 3. iii. acacia. succi barba hircine. glycyrrh. an. 3. ii. amyli torrefacti, 3. iii. Terantur, miscantur, F. pulvis, cuius dosis sint 3. iii. Datur cum aqua pluuiali.

Vel ℞. Syr. myrrin. de portulac. de rosis siccis, an. 3. i. boli Armeni, lapid. hamatit. c. c. an. 3. ii. ag. portulac. plant. burse pastoris, an. 3. iii. F. potus pro duabus vel tribus dosibus.

Vel ℞. Spec. diatrag. frigid. 3. i. consern.

conferu. resar. antiq. 3. j. b. scb. ber-
beris. 3. b. pilul. de cynogloss. 3. ij.
syr. de port. q. s. F. lambile. Vel 2.
Syr. myrt. de portulaca, an. 3. i. b.
conferu. resar. rubrar. antiq. sol. quer-
tus, an. 3. vi. tragacanth. an. 3. i. an.
3. ii. rad. symphyt. tera sigillat. a. bo-
li Armeni, lap. hamasti. an. 3. i. F.
eclegma.

Interim & post sanguinis auersiones
(ante has enim topica apponere
tutū non est, ne ab astringentibus san-
guis intro compellatur, & venæ, quæ
in alto sunt, repleantur, ut & si ab
externi aeris frigore vehementi san-
guis intro ad pulmones pulsus sit)
nec topica committantur, pectusque
inungatur oleo myrthino, mastichi-
no, rosarum, quibus addi possunt
pulueres astringentes. Vel F. talca-
ta-plasma.

2. Sol. plantagin. portulac. polygon.
an. m. i. rad. symphyt. maior. 3. i. cor-
tic. granator. farin. bord. an. 3. b. cy-
don. siccor. 3. iii. Coqu. in vino astringe-
nte ad mollitiem. Contusis adde
Thuris, mastich. boli Armeni, an. 3.
iii. corallor. rubr. 3. i. ol. rosar. & myr-
tin. an. q. s. F. Cataplasma.

Si refrigeratio rupturæ vasorum
pulmonis occasionem præbuit, Ga-
nus, 5. meth. med. cap. 13. calefaciens
ceratum ex thapsia pectori adhibet
ad tollendam eam intemperiem. Sed
si adhibendum est, diu tamen ibi non
relinquendum, ne multum calefaciat,
malum augeat, ipsamque mortem
inferat cum magna Medici ignomi-
nia, qualem historiam recenset Fo-
restus, lib. 26. obs. 16. in febribus.

Possent forsan etiam; ut in hæ-
morrhagiis periapta, ut iaspis, vim-
bilibus marinus, & similia vsur-
pant.

Si vulnere pectoris in pulmones

vsq; penetrante sit facta apertio va-
sorum, velius curandum & con-
conglutinandum, ut cap. sequenti
dicitur.

Erosio autem vasorum pulmonis
difficilis curatur, ut supra dictum.
Statim autem initio (ut & in ana-
stomosi ex sanguine bilioso) etiam
bilis purganda, nec purgatio procras-
tinanda, ne dum studemus acrimo-
niam humoris corrigere, ille acrimo-
nia sua maius malum inducat.
Neque hic concoctionem expecta-
re opus est; cum humor non sit
putridus, seu crudus, & præterea
tenuis, qui ductum medicamenti
purgantis facile sequitur. Validiora
tamen & calidiora purgantia vitan-
da, ne humorem magis agitent &
acriorem reddant, ut & aloë, ut po-
te quæ venarū orificia aperire solet.

Peculiaris autem hic offertur in-
dicatio regenerandi partem erosionem
deperditam. Id quod præstant ali-
menta boni succi, ut pisana, lac &
quæ ex lacte conficiuntur, iuscula
gallinæ & carnes, & medicamenta
carnem gignentia, qualia sunt thus,
mastiche.

Si verò catarrhus adhuc adsit, qui
de capite ad pulmones defluit, is pri-
mum cohibendus. Id quod triplici
medicamentorum genere effectum
dedit Galenus. 1. purgatione peccan-
ti humori conueniente. 2. medica-
mento diaspermato, quod somnum
conciliat, sensum doloris tollit, tussim
sedat, & siccandi vim habet, cuius
loco uti possumus theriacale recen-
te, pilulis de cynoglossa, & simili-
bus. 3. cerato ex thapsia, vel sterco-
re columbino capiti imposito, ut
catarrhi defluentis impetus prohibe-
atur, quod & alia huius generis
medicamenta & cauteria præstare

Catarrhi
cum spu-
to sangui-
nis curag-
tio.

possunt. Postea ægrum reficit cibis boni succi, frictione, in ambulatione, balneo. Imprimis verò lac exhibet, quo neglecto malum vix sanatur. Neque interim sanguinis missionem negligit, sed eam vel statim, si abundet, vel si paucior sit & prauus, vbi ægrum cibis boni succi refecit, eam instituit.

Curacionem hanc Galeni reprehendit quidem Trallianus, *lib. 7. cap. 1.* verùm quid de ea sentiendum sit, supra *lib. 1. cap. de casaribus* dictum.

Inter medicamenta autem, quæ vas erosum claudunt, Trallianus, *allegato loco*, commendat lapidem hæmatitem, in subtilissimum pulverem tritum, quem \mathfrak{D} . iv. ponderis circa principium si magna sit sanguinis reiectio: in succo mali punici, vel succo polygoni, sin minor, cum sola aqua tepida exhibet.

Vel suspendatur lapis hæmatites tritus in linteolo in aqua, & nodulus exprimitur, vt aqua rubescat, addaturque syrup. de portul. vel myrtinus. Exsiccat enim vlcus & prohibet ne pus generetur. Vtilis etiam est bol. Armenius & terra Lemnia. Vt

\mathfrak{L} . *Boli Armeni* \mathfrak{z} . ii. *spec. diatræg. frig.* \mathfrak{z} . i. *sacch. in aq. port. diss.* \mathfrak{z} . iii. *F. rotulæ*, de quibus per intervalla sumantur sex vel plures. Vel \mathfrak{L} . *Conserv. rosar. rub.* \mathfrak{z} . ii. *rad. consolid. maior. coctar. vel conf. eorum* \mathfrak{z} . i. *bol. Arm. mastich. ibur. an.* \mathfrak{z} i. *hypocist.* \mathfrak{z} . ii. *Cum syrupo de portulac. F. electuarium.*

Diata.

Diata.

Aët sit temperatus, aut moderatè ad siccum & frigidum declinet.

Calidus verò vt alia incommoda habet, de quo postea in quæstione dicetur, ita etiam sanguinis profusiones inuehit. Victus sit tenuis primis diebus, & vim astringendi habeat vel emplastica. Vnde conveniunt sorbitiones ex prîsana, pulcélique ex oryza, auena, farina hordei, tritici & amylo cum lacte coctæ, quibus si libet, addi potest conf. ros. antiqua. A nonnullis commendatur caro suilla vt glutinosa. Et recitat Suidas historiam Damini Philolophi, qui cum sanguinis ipso laboraret, oraculum de medicamento consuluit, à quo responsum accepit vt carne suilla vesceretur, quam quoties comedebat, sanguinem non reiciebat, vbi abstinebat ægum. is fluo redibat. Lac etiam hic optimum alimentum est, refertque Trallianus, se solius lactis vsu plures curasse. Nec inutilis est caseus recens, non salus. Ex oleribus conveniunt lactuca, acetosa & præcipuè portulaca, mala aurantia, granata. Abstinentum verò à cibis flatulentis, salsis, acerbis, & aromatibus. Aceti quoque vsus præsertim acris non convenit.

Potum quod atinet exhibetur aqua hordei cum melle vel saccharo, vbi abstergendum, vbi verò glutinandum, aqua hordei chalybeata. Vel bibatur cerevisia tenuior, aut lac amygdal. dulcium, vt & lac acidum ebutyratum. A vino verò abstinentum. Ager non moveatur, sed quiescat, non clamet, non excandescat, & quantum fieri potest, dormiat. In obesionibus tamen somnus sit interruptus, ne sanguis nimis in thorace collectus dormientem suffocet. Videatur Hippocrates, *lib. de intern. affect.* mox ab initio.

QVÆSTIO.

Qualis aër in aperiōne vasorum pulmonis aëre frigido proueniat.

Qualis aër in aperiōne vasorum pulmonis ab aëre frigido conueniant.

Equidem principium est in metho-
do mēlendi, contraria contrariis cu-
rari; ac proinde etiam rationi con-
sentaneum videretur, vbi ab aëre fri-
gido vas aliquod in pulmone ruptū
est, aërem calidum adhibere. Con-
tra, quia calidos aër dilatat, non tu-
tum esse videtur, vase aliquo aperto
eum adhibere.

Vetumenim verò et si plura in rup-
tura vasorum pulmonis sint indicantia:
tamen quod maxime vrget, est
sanguinis fluxus; qui non solum si-
næ vitæ detrimento largius effluere
non potest, sed & dum fluit, facit
vt vas claudi non possit, & quò di-
utius fluit, eò magis vas dilatat. Qua-
propter æger potius in aëre frigido
quam calido, qui laxat, detineri de-
bet. Et si enim adhuc addit aliqua in-
temperies frigida, quæ rusciculam
aliquam excitare possit: tamen spi-
ritus retentione facile sedari potest.
Et ipse aër frigidus, in quo æger do-
mi conclusus degit, non est tam fri-
gidus, vt ad rupturam vasis aliquid
facere possit. Et ipse, vt suprà di-
ctum, aër frigidus vasa non rumpit,
modo plenitudo sanguinis dempta
sit, & æger ab omni motu violento
cesset, nullum ab eo periculum est.
Aër tamen ille moderatè sit frigidus.
Et quod in ruptura vasorum pulmo-
nis in principio calida non conue-
niant; etiam vbi aër frigido est ru-
ptura, exemplo etiam docuit Gal. 5.
meth. med. c. 13. in iuvene, qui ex re-
frigerato pectore sanguinem expue-
bat; cui intus nihil calidi adhibuit.

CAPVT VII.

*De grandine, calculo & ver-
mibus in pulmone
genitis.*

Res planè alienas quandòque
in pulmone generari observa-
tum est, grandines, calculos, imò
ossa & vermes, quæ non solum an-
gustiam vasorum pulmonum pare-
re possunt, sed & aliis modis præter
naturam sunt, & à plerisque ad mor-
bos numeri referuntur, de quo iam
non disputamus, cum ea de re di-
ctum sit in *institucion.*

Galenus, vt 4. de loc. affect. cap. 8.
refert, quendam vidit, qui grandines
erui magnitudine è pulmone e-
iecit. Ipse idem in quodam viro do-
ctò & olim Professore huius Aca-
demix obseruauit, qui grandines co-
lore albo & duros è pulmone eiecit,
tandem phthisi correptus ac mor-
tuus est. Si materia illa sit copio-
sior, & in maiorem molem con-
crescat, calculi inde fiunt, id quod
Trallianus, lib. 5. cap. 4. Paulus
Ægineta, lib. 5. cap. 81. & alij autho-
res annotarunt, quos allegauit In-
stituit. lib. 2. part. 2. cap. 9.

Ossa pulmonibus impacta vidit
Columbus, vt annotauit, lib. 15.
Anatomia.

Carunculas etiam & vesiculas pis-
cium vesicis similes interdum è pul-
monibus eiici obseruatum, vt eius
rei historias collegit Schenckius,
lib. 2. obs. 50.

Tandem quoque vermiculos; &
quidem non vnus figuræ, è pulmo-
nibus eiectos obseruatum à Medicis;

ut apud eundem Schenckium, lib. 2.
obs. videre est.

Causa.

Causa.

Galenus, loco allegato, ex lento humore, qui antea tussis reiciebatur, retento, siccato, induratoque grandines generari statuit. Et reuera humor crassus & vilcidus calculorum in pulmonibus est materia, facitque ad concretionem etiam exsiccatio & pulmonum caliditas. Vnde Fernelius, lib. 5. de part. morb. & sympe. cap. 10. inuenit in dissecis grandines albos veteris casei consistentia incipientes, alios gypseæ pituitæ duritie. Verum etiam interna vis ad coagulandum tendens, quæ in aliarum partium calculis generâdis concurrir, & hic admittenda est de quo alibi diximus.

Vermium quoque causa, quæ in aliarum partium vermibus concurre, ut in Institut. diximus, etiam hic locum habet.

Signa diagnostica.

Signa.

Calculus & vermes in pulmonibus hærentes; difficulter omnino cognosci, diximus capite præcedente, & vix certò cognoscuntur, nisi tussis reiciantur. Præcedit tamen plerumque hæc mala tussis durior, quæ nullis, etiam efficacissimis, remediis tollitur.

Prognosticum.

Prognosticum.

Rarò autem hæc mali, correpti conualescunt, sed plerumque pulmones à calculis & vermibus, tum à conatu in tussis, quæ ad ea reicienda requiritur, læduntur; unde phthisis & tandem mors sequitur, ut ex historijs antea allegatis videre est.

Curatio.

Res istæ cum sint toto genere

præter naturam, à corpore emotionem indicant, quod quomodo fieri debeat, porro videndum. Quomodo enim qui grandines & calculos è pulmone reiciant, curandi sint, Galenus & Alexand. Trallianus dissentiunt. Galenus, 4. de loc. affect. cap. 8. medicamentum in potu dedit, quod asthmaticis exhibetur, unde æger minorem quidem grandinem expulit, atque in longiore, quàm antea, intervallo post plures tandem annos mortuus est. Trallianus verò, loco allegato. Galenum reprehendit, quod refrigerantia neglexerit, & calida adhibuerit, Mithridatium, Athanasiam, theriacam, & similia acria & extenuantia medicamenta. Verum in eo quidem fallitur Trallianus, quod scribit, Galen. Mithridat. Athanasiam, & theriacam illis, qui grandines reiecerint, exhibuisse, cum ad vlcus pulmonis ea adhibuerit, ad grandines verò ea quæ asthmaticis conueniunt. Rem tamen ipsam quod attinet, ea, quæ simpliciter calefaciunt, non adeò conueniunt videtur in grandine & calculo iam facto in pulmonibus cum exsiccano duriorē efficerent; nisi peculiarem vim calculum frangendi habeant, præsertim si adhuc materia in iis contineatur, quæ calefacientium & exsiccantium vsu potius indurari possit. Sed solum conueniunt materię grandinem & calculos faciturę, modò non iam conerescere incipiat. Dodonæus, v. obser. med. ca. 43. docet, feliciter vsus est syrupo hoc modo parato.

Curatio grandinæ & calculorum pulmonis.

℞. Adianti veri, adianti albi, id est, rui. m. rar. an. ʒ. i. b. Glycerb. ʒ. rad. iusei, asparag. an. ʒ. i. sem. melon. ʒ. ii. aq. pur. lb. iv. Coqu. ad

remanentiam lib. ii. Colat. adde Sacchari ℥. xii. mell. aq. hyssop. au. ℥. iv. Coq. ad syrupi consistentiam.

Si carunculae & vesiculae pulmonibus reiciantur, exhibeatur lochanum & expert. de pulmon. vulpis cum flore vel lacte Sulphuris.

Ad vermes in pulmonibus genitos utilis est succus martubij cum melle mixtus, quem aeger saepius lambat.

Morbipulmonis in numero deficiente.

Aliquando unus pulmo deest, idque vel ab ortu, ut observavit Columbus, lib. 15. anat. vel ubi post abscessus & vulnera corrumpitur. Verum mala haec incurabilia sunt.

modum adaucta est, exclusis in totum spiritus viis, agrum interimunt; alia quae suppurantur, de quibus praecipue, allegato modo loco Hipp. agit.

Generantur autem ista dupliciter: vel per affluxionem materiae, vel per congestionem: & per congestionem rursus dupliciter, dum materia in vna aliqua parte solùm, sed & sine vesicula conclusa colligitur, aut materia in cistis peculiariter efformata coaceruatur. Materiam verò tuberculorum in pulmone Hippocrates duplicem statuit, bilem & pituitam, id est, humores calidos & frigidos. Proveniunt verò praecipue ab externa aliqua violentia, ut Hippocrates, lib. de subtilis diata docet his verbis: Quibuscumque autem dolores sunt ex visceribus, siue ex exercitiis, siue ex aliquo alio labore, his quiescere conducit cibis abstinentes: potatione autem variantur, quae quàm paucissima in corpus assumpta plurimum urina ducit, quo vena visceribus insita non distendantur repleta. Ex salibus enim tubercula oriuntur et febres. Haec Hippocrates. Etenim siue ex causa interna siue externa vena violenter distendantur, progeminant, & simul materiam loco distento subministrant, seu sanguinem naturalem seu humores vitiosos, è quibus formantur tubercula.

Absurdum tamen non videtur, etiam sine externa violentia à causa interna talia tubercula fieri posse. Si enim tumores alij maiores, in quibuscumque corporis partibus, nulla externa violentia concurrente, excitari possunt, cur non etiam tubercula haec eodem modo generari possunt,

Suppurata.

Causae.

CAPUT VIII.

De tuberculis Pulmonis.

PRAETER inflammationem pulmonis, de qua supra dictum, quae fit ex materia in pulmonis substantiam imbibita, & in totum viscus dispersa, etiam tubercula in pulmone generantur ex materia collecta in vna parte, & inde extuberante, de quibus agit Hippocrat. lib. 1. de morb. & hoc loco agendum videtur. Sunt autem illa tubercula alia cruda, quorum cap. 4. etiam mentio facta est, quae ex materia, quae nunquam suppuratur, generantur, quorum meminit Hippocrat. lib. 3. de arit. text. 9. & Galenus, in comment. & 4. de lac. affect. cap. ult. in historia Antipatri, & 6. aphor. 45. quae nunquam ad suppurationem deducta & nulla febre coequantur tota magnitudine, cum ad-

Tubercula pulmonis.

Cruda.

Signa Diagnostica.

Signa

Tubercula hæc cognita sunt difficilia. Sic affecti tamen subliundo ferè sunt faciei colore, iisque lingua lentore quodam est oppleta, maximè cum longè à cibo absumt, & corporis agitatione, aut potu cibove calidiore vrina facile tingitur, & pulsus citatur, citra tamen vllam spirandi difficultatem. Interdum verò post concitatiorem corporis motu pilule parvæ & globuli instar pisi exigui redduntur è pulmone membranula inclusi, qui contriti digitis pus reddunt interdum foetidissimum. Aliàs tubercula cruda, & quæ non suppurantur, cognitione difficilia sunt, & non nisi, cum ad tantum incrementum peruenerint, ut spirationem lædant, cognoscuntur. Reliqua quod attinet, si hæc tubercula sint in arteriis læuibus, vel in parte arterias læues comprimente, mutantur pulsus in ordine, & inæquales in magnitudine, celeritate & frequentia fiunt; quæ inæqualitas, indies proportionè augmenti tuberculi augetur, ut quandoque pulsus intermittentes intercідat. Si fiant in pulmonum substantia, tussim siccam & leuem quandam spirandi difficultatem excitant, quæ prout tuberculum augetur, & ipsa augetur. Si in arteriis asperis tuberculum tale generetur, statim tussis molesta & spirandi difficultas excitatur, ac pro morbi incremento tussis fit grauior & spirandi difficultas sæpe tanta, ut æger erecta ceruice respirare cogatur, & suffocatio impendeat, tandèmq; æger suffocetur.

Præterea si tubercula sint vel in asperis arteriis, vel in externa pul-

monum superficie protuberantia, dolor quidam læuis ægros continuò affligit, & imprimis, vbi vehementius & concitato motu mouentur, vbi & spirandi difficultas simul innalescit.

Si autem tuberculi sint vel in arteriis læuibus, vel in pulmonis substantia, nullus dolor percipitur.

Si verò res iam eò redeat, ut suppuratio expectanda sit, febris accedit, nisi materia tuberculi proprio folliculo sit inclusa: tum enim putridi vapores ad cor exhalare, & febrem accendere nequeunt. Inualecente iam putredine, omnia accidentia fiunt maiora, dolores maiores, tussis vehementior, quæ non amplius sicca, sed humida, resudante aliqua materiz particula. Et quidem dolores sint vel antè vel retrò, prout tuberculum vel anteriorem, vel ad posteriorem partem vergit. Nam dum tubercula ista fiunt, & suppurari incipiunt, in membro sensum non habente dolorem non pariunt: dum verò suppuratiōe facta extrà prominent, & membranam pulmonis distendunt, dolorum excitant.

Pertinet huc & locus Hippocratis, lib. 2. de morbis. Si tuberculum, inquit, in pulmone exortum fuerit, tussis decimet, spirandi que difficultas, quæ non nisi erecta ceruice obtinet, dolor acutus pectus & latera occupat, & ad decimum quartum diem ita afficitur. Plerique enim tot diebus inflammationem concipit, sed & caput, & palpebras dolor vexat, videre nequit, corpus subsuluum euadit, & pusillus velut ex igne rubentibus completur.

Tubercula autem, quæ folliculo suo includuntur, cognoscere difficile est: quia febris hic nulla exci-

tatur; cùm materia in folliculo suo conclusa ad cor vapores mittere non possit. Quo pertinet aphorismus Hippocrat. 41. sect. 6. *Quibus suppuratio in corpore abdita non innotescit, ob crassitudinem vel puris vellocis non prodit.* Hinc interdum nonnulli, qui nulla febre laborarunt, disrupto tali tuberculo, vel sanie uaserunt, pure salubriter reiecto, vel à pute erumpente statim suffocati sunt.

Prognostica.

Prognostica.

1. Ut æger ex hoc malo conualecat, quinque conditiones requirit Hippocrates, loco allegato, 1. est, vt suppuratio citò fiat, vt facta suppuratio pus citò erumpat, 3. vt non ad inferiora, sed ad superiora erumpat, & per tussim reiciatur, 4. vt totum pus euacuetur, 5. vt venter, id est, cavitatis illa, in qua pus continebatur, perfectè agglutinetur.

2. Si verò aliqua ex hisce conditionibus desit, æger non conualescit. Si enim pus non erumpat, æger tandem præcedentibus doloribus vehementibus, inedia, tussi, febre vt plurimum interit. Si verò tardè erumpat, ægrique viribus iam deficientibus, inde de causis æger moritur. Si verò pus non per tussim reiciatur, sed ad inferiora conuertatur, morbus sic vel difficilis vel lethalis. Dum enim tuberculo rupto pus in pulmonem & supra septum transversum effunditur, si à natura id euacuetur integrè, & locus, in quo in pulmone pus continebatur integrè coalescat, euadunt quidem ægri, sed cum difficultate. Si verò pus non statim euacuetur, vel ægrum suffocat, vel

dum supra septum transversum moram agit, id prava qualitate inficit, & tandem corrumpit atque exulcerat, vnde mors sequitur. De quo Hippocrat. 7. aphor. 8. *à tuberculis intus eruptione exclusis, vomitus & animi defectio fit.* Si enim tuberculum subito rumpatur, vapores ex pure subito ad cor penetrant, vnde fit leue animi deliquium, & hinc vomitus vel syncope. Vomitus quidem, si pus extra prorumpit & excernitur (per vomitum enim intelligit omnem per os subito factam euacuationem) syncope autem, si ad interiora pus vergat, & ad ea corruat. Si verò pulmo non exactè sanetur & cavitatis, in qua pus continebatur, non agglutinetur, vlcus paulatim inde generatur, & tandem fit phthisis.

Curatio.

Cùm spes salutis vnica in hoc morbo sita sit in puris cità & perfectè euacuatione & pulmonis agglutinatione: id partim fit à natura, partim ab arte. Suppuratio & puris per tussim reiectio quidem à natura insituitur; vt autem pus totum & perfectè expurgetur, naturæ ars succurrere potest. Ita etiam si agglutinatio pulmonis naturæ opus sit: tamen & hinc ars naturam adiuvare potest, & quidem iis medicamentis, quæ postea de *ulcere pulmonis* proponuntur. Vt autem pus sursum vel deorsum erumpat, id provenit ex situ tuberculi, quâ in re ars naturam nihil iuvare potest.

Hydatides pulmonis.

CAPVT IX.

De hydropo & hydatidibus pulmonis.

Hydrops pulmonis.

Nonnunquam, & forsan sepius quam vulgò putatur, aqua in pulmone colligitur, quod nialum hydrops pulmonis appellatur, quod deficiisse putatur Hippócrat. 2. de morb. his verbis: Febris & insais tenet, & acernaiim respitat, & pedes tucent, & ungues contrahantur, & patiuntur talia, qualia is, qui suppuratus est, sed debilius & diuturnius. Et si quia insudat, aut solum, aut solum adhibeat, pus non sequitur, atque ex hoc sanè cognoveris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore ante ad latera adhibebat audire tentaveris, bullit intus veluti acetum, & hoc quidò aliquando patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse videtur ac à morbo liberatus. Verum progressu temporis alvus incenditur eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt, ventre seroto & facie. In quo loco hoc notandum, etsi in editionibus omnibus legatur ita, olet, & ita etiam Foësius hunc locum verterit: quia tamen odor aures non percipitur, re- Qd vertit Ian. Cornarius, bullit intus, & legendum procul dubio Xim. Verum pulmo vix solus hydropem patitur, sed hydrops pulmonis & thoracis ferè concurrunt, atque hic ipse locus Hipp. quem pro hydropo pulmonis allegat, potius de hydropo pectoris loqui videtur. Ideoq; mali huius hoc loco saltè mentionē facere volumus. Postea verò de hydropo pectoris seu thoracis plura hac de re dicetur.

Cognatum hydropi malum sunt hydatides pulmonis, vesicae cili- Hydatides pulmonis.
cet aqua plerz, quæ externam eius superficiem occupant, quæque oriuntur ex seroto & tenui humore, qui ratam pulmonis substantiam pertransit, & sub membrana eius, quæ densior est, hæret & subsistit. De quo Hippocr. l. de intern. affict. Fit enim hydrops, si tubercula in pulmone fuerint, enata repleta & in pectore rupta. Quod autem fiat à tuberculis hydrops, testimonium habet in boue & in cane & in sue. In his quadrupedibus maxime sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent. Si enim disseceris, citò cognosces. Nam sunt aqua. Hæc Hippocr.

CAPVT X.

De Pulmonum cum latere coalitu.

Nonnunquam etiam pulmones cum membrana costarum succingente coalescunt. Hipp. vel quicumque author fuerit, pulmonis ad latus prolapsum appellat, & de malo hoc agit, lib. 2. de morb.

Causa.

Ortum habet hoc vitium à causa vel interna vel externa. A causa interna interdum à primo ortu & mala conformatione hoc accidit: interdum postea membranz thoracem invadenti pulmo agglutinatur, cum pituita aliqua viscida & tenax inter pulmonis lobos & thoracis membranz inhaeret partesque has duas insuaciens splicit, ac veluti colligat. A causa verò externa malum ortum habet cum confosso aut vulne-

Pulmo-
num cum
latere
coalitus.

Interna:

Externa:

vulnerato thorace, aut epyemate per sectionem curato, pulmo membrana huic agglutinatur. Quod etiam post pleuritidē fieri impossibile non est. Ut enim alie partes vulneratæ, vel exulceratæ, si non rectè tractentur coalescere possunt; ita & pulmo membrana thoracem inuestienti agglutinari potest. Hippocrates, *de locis in homine* addit exsiccationem à siti, dum scribit: *Lateralis morbus sicut citra fluxionem oritur, cum ex vehementi siti pulmo admodum resiccatus fuerit, gracilis enadit & impotens redditur, & latus pra impotentia inclinatur, ipsumque constringit, eoque contacto cum humido existat, ei adhaerescit, & morbum lateralem facit.*

Signa Diagnostica.

Signa.

Si, vt Hippocrates habet, *pulmo ad latus prolapsus sit, cussitones, & erecta cervice spiratio.* (nam pulmo non integer, sed ex altera tantum parte liberè moveri potest) & *salina tussi reicitur alba* (nam pituita peccat, iisque humor solum ad asperas arterias residet) & *dolor ad pectus aut dorsum emergit, & incumbens pulmo impellit, & grane quid in pectore incumbere videtur, & dolores acuti pungunt* (nam ex pulmionis motu ea parte, qua pulmo membranae coheret, dolor percipitur, & membrana reliqua huic membranae consentit, dolorque is propter membranam affectam est pungitius) & *sanguis frides velut pellis, & spirationem prohibet.* (sanguis nimirum in valis thoracis existens commotus edit sibilum illum, quem lora emollita & aqua macerata excitant, sanguisque ad intra ex difficili respiratione commotus, & in angustias redactus, sibilum quen-

dum edere videtur, qui tamen non nisi ab ipso ægro percipitur.) *Et ad effectum quidem latus decubitus summes, non autem ad sanum, verum veluti grane quiddam ipsi de latere dependere videtur, & per pectus se transpirare putat.* Etenim dum æger in latere affecto decumbit, pars affecta in proprio loco quiescit, dum autem in oppositum se conuertit, quasi pars affecta distrahitur, & pulmo à latere, cui coheret, quasi auellitur, unde veluti pondus quoddam ex eo latere dependere videtur.

Prognostica.

1. Malum hoc est lethale non Progno-
sit; tamen molestiam & dolorem stica
non paruum exhibet.
2. Si à primo ortu sit, incurabile est.
3. Coalitus ex siccitate periculosus non est. Intra septimum diem enim coalescit. Hippocrates, *de loc. in homine.*

Curatio.

In hoc affectu curando, si malum ab interna causa, pituita scilicet, ortum habeat, ea præparanda & euacuanda, vt cap. 4. dictum. Reliquam curationem quod attinet, Hippocrates, *loco allegoria* instituit. 1. est, vt materia concoquatur & leniatur, qua de causa bis de die calida multa lauare iubet. 2. Pituitam & materiam, quæ pulmones cum costis connectit, exsiccet & absumat, in quem finem à balneo vinum album modico melle admixto, & dauci & centaurei minor. feminibus tritis additis exhibet. 3. Vt pulmo coherens lateri laxetur, & à membranis thoracis separetur, vesicam bubulam aqua tepida semiplenam lateri apponit & alligat. Quia tamen idem Hippocrates, 6. *epidem. sect. 8. text. 48.* eum qui apex he-

Curatio
mali à
causa in-
terna.

patis complicatus erat, concussione corpori sanauit: eadem & hic, ut pulmo à latere separaretur, vsurpati potest. Alimenti verò loco pituitæ succum tepidum & vinum aquosum suprabibendum præbet.

Si verò à causa externa hoc malum proveniat, aut cum quis purulentus factus fuerit. Hippocrates mox duplici auxilio vitur. Primum inter os vulneris immittit vesicam fistulæ alligatam, quæ per flatum immisum possint prædictæ partes separari: Deinde penicillum stanneum indit, ac ulterius propellit quod pulmo à coherente membrana separatur.

An verò vas an potius substantia pulmonis sit vulnerata, etiam signis quibusdam cognoscitur. Vasorum vulneratorum signa sunt sanguis spumofus, interdum niger, rubicundus, interdum effluens, perpetua tussis, sicca vel humida, nisi virium imbecillitas aut pulmonum oppressio, à sanguine adsit, aut nisi superficialium ac leue sit vulnus.

Cum caro pulmonum vulnerata est, nec cruenta expuitio, nec tussis vlla vrget, quia sanguis in cauum thoracis destillat: sed respiratio est difficilis, vicissitudo caloris & frigoris propter halitus à corde, qui statim discutiuntur, crebra faciei characteris mutatio.

Post signa hæc meritò recenseo historiam sequentem, quæ de viis etiam, quibus materia è pectore euacuatur, cogitandi ansam præbet. Studiosus quidam anno 1623. mense Iulio noctu vulnus accepit in pectore, gladio non lato in dextra parte circa costam tertiam propè alam in pectus adacto, & è regione propè spinam exeunte, ut de læso pulmone nihil dubitatum fuerit, cum & spiritus cum sono magno è vulnere exierit, & maxima sanguinis copia è vulnere effusa fuerit. Conquebatur simul de dolore, summo & contra contractione abdominis, quæ procul dubio à conuulsione partium membranarum abdominis erat, orta à consensu membranarum thoracis cum membranis abdominis, & procul dubio à tendinibus musculi thoracis quarti læsis. Accedebat & hoc, quod inter musculos & cutem, præcipuè circa diaphragma, magna sanguinis copia colligebatur, imò collum etiam occupabat, ut manifestè intumescere,

Signa vasorum pulmonis vulneratorum.

Signa carnis pulmonum vulnerata.

Historia vulnerati pulmonis.

CAPVT XI.

De Pulmonis vulneribus.

Pulmonis vulnera.

SI thorax, de cuius vulneribus postea dicetur, à re aliqua secante vel proferente vulneretur, ita ut vulnus ad interiora penetret, sæpe pulmo simul cum suis vasibus vulneratur.

Signa diagnostica.

Signa.

Vulnerati autem pulmonis signa, ut Celsus lib. 5. cap. 26. & Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 88. docent, sunt, si cum penetrante thoracis vulnere adsit respirationis difficultas, tussis assidua, & spumans ex ore sanguinis cum tussi reiectio, & ex pectore rubens spumansque sanguis sine dolore effluat. Ceuicis venæ turgidæ sunt, linguæ color mutatur, facies modò rubicunda, modò pallida apparet, & si profundum sit vulnus, tandem pallida remanet.

ret. Primo die sanguis satis copiosus è vulnere effluxit, postea verò nullus: post octo dies tamen è vulnere dorso pus satis copiosum effluxit aliquot diebus. Tussit verò nihil, neque sanguinem per tussim alicuius momenti eiecit: per dies tamen aliquot sputum album satis copiosum, cum scretu potius, quàm tussi; unde tumor in collo evanuit. Tumor ille, qui ad musculos erat circa diaphragma, vbi humoris sub cute collecti fluctuatio etiam digitis percipiebatur, supra & infra diaphragma cataplasmatibus discutientibus adhibitis evanuit. Primis diebus semel atque iterum etiam aliquid sanguinis per alium deiectum est. Ex quibus apparet, ad humorum translationem non semper viis manifestis opus esse, sed sufficere etiam Hippocratis occultam & operatur.

Prognostica.

Prognostica.

1. Magna pulmonis vulnera, & præcipue si vasa magna & bronchia læsa sunt (cùm tum sanguis vix sisti possit) plerumque lethalia sunt.

2. Parua verò, & vbi insignia vasa non sunt læsa, etsi satis periculosa sint, sæpe tamen curantur, cuius rei observationes passim extant. Et ille Studiosus, cuius modò mentionem feci, integrè ante finem mensis potionibus ex plantis vulnerariis & pectoralibus, aliisque convenientibus medicamentis conualluit, & nunc etiam anno 1629. bene valet.

3. Refert etiam Andr. à Cruce, lib. 4. Chirurgie. sect. 1. capit. 4. etiam pulmonum lobis, qui per thoracis vulnera prominebant, abscessis, ægrum sanatum fuisse.

4. Si pulmonis vulnere accedit inflammatio, exigua spes est de eius

curatione; quia pus, quod generatur, sine tussi expurgari non potest, qua vulneris conglutinatio impeditur.

Indicationes & curatio.

In pulmonis vulneribus danda Indicationes & curatio. opera, vt primùm sanguinis profusio, quæ ob insignia pulmonis vasa accidere solet, sistatur, & inflammatio, cui pulmo obnoxius est, sistatur, tandèque vulnus glutinetur; sanguis verò, qui in cavitatem thoracis effusus est euacuetur. Itaque vt inflammatio præcaueatur, nisi antea nimia sanguinis profusione vires deiectæ sint, vena aperienda. Si vulnus sit angustum, vt sanguini exitus non pateat, scalpello ampliandum. In operatione verò æger spiritum emittat, quo pulmones collabantur.

Deinde medicamenta adstringentia & emplastica adhibenda, quæ & sanguinem sistunt, & inflammationem prohibent & vulnus glutinant.

Sunt autem illa; medicamenta alia topica, quæ in cavitatem thoracis indantur & infunduntur; alia interna quæ ore sumuntur.

Topica autem eligenda talia, quæ minimè mordicant, neque malignam aliquam qualitatem obtinent. Atque ob id metallica ferè omnia & salinas qualitates obtinentia, etsi aliis vulneribus commoda sint, in vulneribus pulmonis omittenda.

Commoda ergo hîc sunt: *bolus Armenus, terra sigillata, ibus, mastiche, balaustra, acacia, tragacantha, gummi Arabicum, & alia*, quæ nullo visceribus internis damnum inferunt.

Fiat ergo pulvis ex thure, mastich. & bolo Armen. part. æqual. qui vulneri, seu per cannulam infletur, seu

vino nigro austero, aut decocto plantag. rosar. rubr. misce, dissolutus immittatur. Postea verò pulvis pulm. vulnerato applicetur, iubendum vt æger spiritum attrahat, quo pulmones inflentur, spiritumque eo usque contineat, quò pulvere vulnus conspersum sit.

Est & hoc in pectoris vulneribus vilissimum:

℞. Rad. consolid. maior. caryophyl. an. ʒ. β. rosar. rubr. M. β. mastich. sol. sing. an. ʒ. ii. myrr. aloë, an. ʒ. i. Coq. in aq. hordei Colaturæ ℞. lb. i. syr. myrtin. de ros. siccis, an. ʒ. j. mellis rosaticolati, ʒ. ii. M.

Interna autem, & per os exhibentur, parantur ex herbis vulnerariis dictis, æque à quibus potiones vulnerariæ parari solent, de quibus in Institut. dictum: è quibus eligantur ea, quæ simul thoraci, pectori & pulmōi parata sunt, aut hæc iis misceantur.

Parantur nimirum ex fragaria, veronica, scabiosa, alchymilla, virga aur. sanicula, & alijs huiusmodi. E. g.

℞. Fragar. sanic. scabios. pulmonar. vtriusque an. M. β. alchymill. flor. rosar. rubr. scabiosæ, an. P. ij. iuinb. N. x. Coq. in f. q. aquæ hord. f. Colaturæ ℞. lb. i. adde iulebi rosar. ʒ. ii. Misce.

Vel ℞. Achilleia, peruinca, veronica, fragar. pulmonar. Gallic. tusilag. an. M. i. fol. labri Veneris, prunell. agrimon. scab. aster. Attic. sanic. arnog. an. M. i. rad. ang. ʒ. i. Concisa infundantur in vini albi aqu. scabios. tusilag. an. ʒ. xxxii. sacch. fini, ʒ. iii. Coq. in vase duplici oris, vi. Colentur. Dosis ʒ. ii. manè & vespere.

Vel hoc, quod etiam in sclopetorum vulneribus commendatur.

℞. Pulmonar. M. iii. artemisia, consolid. acuta, an. M. i. Adde sacch. opt. ʒ. iii. Coq. in vini & aq. lb. β. in vase duplici.

Vel Hordeimundi, M. i. Bulliat. ad crepaturam. Postea adde Herb. tusilag. veronic. scabios. pulmonar. maculosa & querc. an. M. β. angustif. consolid. Saracenic. alchymill. an. P. ii. cinamomi, ʒ. iii. iuinbarum N. vi. pass. vino ablut. ʒ. β. Coq. & colatur.

Commendatur in hunc usum etiam medicamentum, quod diaspermaton appellatur, & Galeno frequenter in usu fuit in vulneribus pectoris, 5. meth. med. cap. 8. & 13. Verùm quale illud fuerit apud Galenum reperire non potui. Etiam si enim apud antiquos quædam diaspermaton descriptiones exuant, tamen huic scopo non planè satisfaciunt. Quia verò Galenus id medicamentum exhibuit, vt somnum conciliaret, & sensum doloris lenuaret, nonnulli eius loco electuario Diacodion vtuntur, vtpote quod, vt Galenus lib. 7. de comp. med. sed. loc. docet, in his, qui somno indigent, & quibus à capite in asperam arteriam fluxiones fiunt, vtile est. Sed quia medicamēti diacodion variz extant descriptiones, hanc huic affectui magis conuenire experientia comprobauit.

℞. Capit. papauer. albi, N. x. nigri, N. v. iuinb. sebest. an. N. v. sem. lact. maln. an. ʒ. i. scariol. ʒ. ii. cydon. ʒ. i. β. Contusa infundantur, in aq. lb. β. vel f. q.

Hinc coq. ad tertiæ partis consumptionem. Colaturæ adde Myrr. croci, hypocist. acacia, an. ʒ. β. Atque iterum coqu. ad tertiæ partis consumptionem. Postea adde Diuragacanth. albi, ʒ. ii.

Tandemque add. vel mellis lb. ſ. & coqu. ad mellis confidentiam ac colentur, fiatque eclegma, vel decocto colato & ad mellis confidentiam cocto add. ſacchari q. ſ. & fiat confectio in rotulis.

Ager in latere affecto decumbat, vt ſanguis, qui in thoracem effuſus eſt, per vulnus effluat commodius.

Si aliqua pars pulmonis è vulnere emineat, & liueſcere ac nigreſcere incipiat, atque ita corruptionis notas exhibeat, ea ferro abſcindenda.

Dietæ.

Dietæ.

Viſtus primò ſit tenuis, vt bona nutritio, etiam in pulmone procurretur. Abſtineat æger ab acidis, acribus, ſaliſis, pinguibus. Utatur cibis boni ſucci, qui mediocrem vim adſtringendi & emplasticam habent, ex ptifana, oryza, amylo, cydoniis, amygdalis. Vinum parum commodum eſt, niſi forſan virium debilitas id requirat. Ager tuſſim, quantum fieri poteſt, præcaueat, nec multum loquatur, nec magna reſpiratione utatur, nec rideat. Etiam ſanatus motum vehementem caueat, & propterea non ſtatim vel curru vel equo vehatur, vitet iram, clamores, Venerem.

CAPVT. XII.

De vlceribus Pulmonum, & phthiſi.

Cum poſt vaſorum pulmonis apertionem, vt & vulnere pulmonis ſæpè vlcus pulmonis ſequatur, reſtat tandem, vt inter morbos pulmonis de eius vlceribus dicatur. Quæ autem de vlceribus pulmonis

dici poſſunt, plerique in capite de phthiſi tradere ſolent; cum vlcera pulmonis phthiſis ſerè ſequi ſoleat. Quapropter & nos hoc capite aliquam phthiſeos mentionem facimus. Eſt enim ipſa phthiſis non pulmonis, ſed totius corporis affectio ſit, cauſa tamen eius à pulmone prouenit.

Phthiſis.

Quam Latini Tabem appellant, vocabulum in genere pro omni totius corporis extenuatione, & imminutione, quacunque de cauſa, & occasione orta accipitur, ita vt ſub ea comprehendatur non ſolùm ea corporis extenuatio, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, ſed & *aliq̃m*, in qua corpus non ſatis nutritur, ob alimenti defectum, & *oſmẽu*, hoc eſt, colliquatio totius corporis, quæ in febris quibuſdam ardentibus, vt & hæticis diuturnis accidit; vt & *muſcipis*, ſeu immodica corporis totius ariditas & conſumptio. Imò Celfus, l. 3. c. 4. ad tabem in genere dictam etiam reſert Cachexiam. Nam eſt in hac corpus vniuerſum laxum & humidum conſpicitur, & propterea non extenuari, ſed potius augeri videtur tamen in ea verum augmentum non eſt, ſed potius muſculoſarum partium ab humore aquoſo & pinitoſo repletio, partes enim ipſæ ſecundum ſuam eſſentiam alimento bono deſtituuntur. Vnde etiam vbi tandem malum in hydropem degenerat, partes ſuperiores extenuantur etſi abdomen aqua repletum tumet.

Verùm vſus obtinuit apud Medicos, vt in ſpecie & frequentiffimè *phthiſis* vocabulum de ea corporis totius extenuatione ſumatur, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, & Græc.

d. finitio.

cis alijs *istis*, & propriè *quibus* vt ex Galeno 7. aphor. 16. & definit. medic. apparet, vt & *omnis* nominatur, vt Aræteus 1. de caus. & sign. diuturn. cap. 8. scribit. Quomodo phthisin definimus, quod sit totius corporis extenuatio & macies, à febre putrida & lenta, qua ab ulcere pulmonis provenit, ortum habens.

Subiectū
phthisis.

Occupat nimirum hoc malum totum, & phthisis totum corpus subiectum est, quomodo à privata quarundam partium extenuatione differt.

Extenuatio autem hæc provenit à febre putrida, lenta & tandem etiam interdum hectica, quæ concoctionem alimenti in toto corpore impedit, & calore illo præternaturali id, quod concoctum & appositum est, absorbit. Febris autem ea ortum habet à putridis vaporibus ex ulcere pulmonis ad cor continuò exhalantibus, caloremque præternaturalem in eo accendentibus, qui per arterias cum sanguine & spiritibus in totum corpus diffusus totum corpus calcfacit. Febris hæc continua est, lenta & putrida, id quod cum alia, cum urinae facit testantur. Accidere tamen potest, vt cum lenta ista febre aliz febres complicantur alijs erraticæ, alijs tertianæ modo invadentes. Nam humores intra venas contenti à calore febrili à pulmonis ulcere excitato accensi, putrescentes sui generis febrem sæpè excitant, vnde etiam deliria ante mortem aliquoties observauimus, & pro cacochymicæ reliquum corpus occupantis ratione, paroxysmis quibusdam interdum ex interuallis, seu certis, seu incertis redeuntibus, phthisicorum febres exacerbantur. Id quod etiam in epidemiis constitutionibus accidere potest, vt ex

Hippocrat. 1. Epid. comm. 1. in fine videre est. Febres enim, quæ tanquam populares ex cæli statu, quem ibi describit ortum habuerunt, tabidos non minus, quàm alios homines corripuerunt. Accidere tamen etiam potest, vt calor ille lentus tandem hecticū sibi adificat & inducat.

Vlcus vero pulmonis, de quo hic agere præcipuè propositum, causæ sunt, quæcunque vel acrimonia vel putredine pulmonis substantiam erodere & corrumpere possunt. Præstantque hoc causæ vel proximæ vel mediæ, internæ vel externæ. Interna & quidem proxima causa est humor acris seu natura sua, scilicet biliosus & serosus: vel ratione acquisitæ putredinis talis, sanguineus nimirum vel humor pituitosus putrescens. Et si enim si pituita sit dulcis & non nimis copiosa, in pulmone facili non putrescit, sed in sputum naturale abit: tamen si maiore copia ad pulmonem defluat, & bronchia pulmonis obstruat, ipsiusque substantiam humidiorum reddat, atque ibi diutius hærens idè non satis ventilari possit, putredinem & acredinem concipit: imprimis si natura iam aliquid acredinis participet.

Materia ista vel in ipso pulmone colligitur & gignitur, vel aliunde influit. In ipso pulmone ortum habet, cum aut in eo humores vitium contrahunt, aut è vase eius seu raptro seu eroso, seu vulnere aperto & omnino post sanguinis sputum sanguis effusus putrescit, vnde Hipp. 7. aph. 17. scribit: à sanguinis sputo, puris sputum malum est: aut à peripneumonia aut pulmonis vomica introsum rupta, aut à variolis vlcus in eo relinquitur.

Vlcus
pulmonū
causæ.

Proxima

Phthisis
causæ.

Lib. puer.
lenta, &
diuturna &
intermittens
hæctica.

febris
puerili
diuturna,
cuius
causæ
sunt
aliz

Interdum verò aliunde in pulmone influit, cum scilicet ex vicinis partibus, inflammatis, pleura, mediastino, diaphragmate, aspera arteria materia eò fertur, vt & dum in empyemate pus pulmonem corrumpit, de quo Hippocrates, 5. aphor. 15. *Qui ex pleuritide empyj fiunt, si à rupture empyematis intra dies quadraginta repurgantur, liberantur, alioquin transeunt in tabem.* Imprimis cum à capite catarrhi frequenter ad pectus defluunt, quorum materia nunc naturâ sua acris est, nunc cum in pulmonibus corrumpitur, acrimoniam acquirit, de quo Hippocrates, 7. aphor. 38. *de stillationes in ventrem superiorem ad suppurationes perueniunt intra dies viginti.*

Pertinet hunc pulmonis à primo ortu vitiosa constitutio, quando pulmonis substantia vitio seminis parentum mollis est, ad corruptionem propensa, vt sensim ætatis decursu flaccescat & spontè corrumpatur. Nam vt liberi parentibus similes sunt quoad externa lineamenta; ita & quoad partes internas. Vnde in quibusdam familiis tanquam morbus hæreditarius grassatur phthisis, nulla etiam humori ad pulmones destillatione aut transmissione accedente. Et Galenus, 4. de loc. affect. cap. vlt. scribit nonnullos citra manifestum pulmonum vlcus phthisicorum more decessisse, qui primum flaua quædam non acria, deinde purulenta, tandem etiam pulmonis particulas expuerant, sine omni cruore, aut hoc admodum exiguo. Hos simili affectu laborasse censet, qualis in externis partibus aliquando conspicitur, vbi cum putrefecisse humore pars cor-

rumpitur & pus aut sanies ab ea emittitur, nullo cruore mixto. Etli enim in talibus neque vas vllum ruptum sit, neque aliunde etiam humor in pulmonem affundatur: tamen ob innatam debilitatem acris humor colligitur in eo, qui tandem pulmonis substantiam corrumpit, & vlceri simile quid inducit, vnde meritò ad phthisin hic effectus refertur. Hos Hippocr. *πνέσμον* & *ἀνθυσις*, appellat 3. epid. sect. 70. de quibus postea dicemus.

Inter causas externas, quæ proximæ & solæ pulmonem corrumpere & in eo vlcus excitare possunt, est primò contagium; vnde rectè ab Aristotele, 7. problem. 4. & à Galeno, 1. de diff. febr. cap. 2. phthisis inter morbos contagiosos refertur, nec tuta satis cum phthisicis conuersatio habetur, cum *μυσμὰ* illa, quæ phthisici exhalant, ab aliis cum aëre in pulmonem attracta similem in eo dispositionem inducant, & hinc vlcus ac phthisin excitare valeant. Deinde lepus marinus, & si quæ sunt alia venena, quæ oeculta proprietate pulmonibus aduersa sunt, eosque exulcerare possunt.

Reliquæ causæ omnes siue int. siue externæ mediatæ & remotiores vlcus pulmonis causæ sunt. Inter mediatas seu antecedentes vlcus pulmonis causas, sunt humores vitiosi in corpore collecti, qui vbi postea vel à capite, vel aliunde ad pulmones conflant, valè in iis aperire pulmonemque exulcerare valent. Pertinent huc & menses suppressi, de quibus Hippocrates, lib. 1. de morbis mulier. *Nonnullas mulier. cum suis menses duorum mensium spatio in vteris exstiterunt,*

Externæ.

Mediata
latens.

ubi intercepti fuerint ad pulmonem feruntur, eademque omnia his consurgunt, quæ in tabe dicta sunt. Quod facit corporis constitutio ad phthisin procliuvis, qualis est illorum, quos Hippocrates, *phthisis & dyspnoia*, appellat 3. *epidem. comm. 3. sect. 70.* qui ut Galenus in *comment. 1. 1. epidem. comm. 1. 1. 18. & 2. de temperam. c. 6.* explicat, adeo angusto sunt pectore ac restricto, ut à tergo in morem alarum prominent opera scoptula. Præsertim si ob substantiæ molliciem & hæreditariam constitutionem viciosam, de qua antea diximus, plurimum in ipsis excrementi colligatur. Sunt etiam ad phthisin procliuves, quibus caput facile impletur, quodque ad spiritus organa multas destillationes denuntiat. Atque hæc duæ causæ si in unam coeant, thoracis scilicet figura & capitis imbecillitas, eò facilis iis, quibus obtigerunt, tabem inducunt.

Externa.

Externæ sunt aer vel nimis calidus, resoluens materiam acrem in capite, ut ad pectus defluat; vel frigidus constingens & exprimens, aut vasa pulmonis densando & angustiora reddendo, ead rupturam aptiora efficiens, aut etiam tussim vehementem, qua vasa pulmonis rumpuntur, excitas. Imptimis verò aer autumnalis, qui sua inæqualitate frigoris & caloris acutas & falsas destillationes movet, & ad phthisin propensius insigniter offendit. Unde Hippocrates, 3. *aph. 10.* scribit: *Autumnus tabidis noxius esse, & ibidem aph. 13. Aestate sicca & aquilonia, autumno pluviosa & australi vehementes capitis dolores in hyemem & tussis & raucitates & grauidines, nonnullis etiam tabes expectanda;*

& 22. autumno astius etiam multos morbos & febres quartanas & erraticas, aquamintercuiem, phthisin fieri. Quod pertinet & regionum constitutiones, quæ frigida & humida, huius effectus germanæ sunt, ut Aretæus, *lib. 1. de sign. & caus. diuturn. cap. 8.* loquitur; sumi metallorum, & mora in specubus subterraneis. Deinde cibi potusque acres & falsi, & qui caput vaporibus eiusmodi replent, & alia omnia, ob quæ excrementa acriam in capite generantur & pulmoni communicantur. Præterea causæ omnes quæ vasa pulmonis rumpere & aperire possunt, thoracis contusio, vocis nimia intensio & similes, thoracis vulnera penetrantia. Unde Hippocrates, *lib. de aere & aquis & loc. tabem etiam frequenter à partu contingere scribit.* Violentiâ enim, rupturis & vulneribus prehendantur.

Pertinent huc aphorismi Hippocratis, 3. *Aphorism. 29. variæ sanguinis exspirationes tabes, febres acutæ, alique morbi, sed præcipue nunc dicti.* Per naturam autem & adolescentes & iuvenes intelligit, ut ipse 5. *aph. 9.* explicat, dum scribit: *Tabes iis maxime ætatis fit, quæ sunt à decimo ætatis ad trigésimum quintum.* Non quidem, ut Galenus, in *comment.* explicat, secundum ætatis naturam, sed ex accidenti ipsius quoque, quia scilicet vel vulneris acceperint, vel contusi sint, vel saltauerint, vel vehementius & contentius vociferati vel refrigerati fuerint, vel humi cubauerint, vel plenitudine nimia aut eiusmodi occasione aliqua in sputum sanguinis inciderint. Ad sanguinis verò sputum tabes consequitur. Quibus & hoc addi potest, quod hac ætate sanguis

gris abundat & à calore funditur, humoresque acres cumulantur, unde sanguis abundans & calidus vasa rumpere, & humores acres à capite in pulmones elapsi eos erodere possunt.

Differentia.

Differentias tabis quod attinet, eas quidem nonnulli plures retinent: verum propriè & in specie distincte tabis, de qua hinc nobis sermo, tales differentiae non sunt, quae omnem corporis contabescentiam, extenuationem & siccitatem, à quacunque causa profectam, comprehendit. Ob curationem tamen non praetereunda videtur differentia, quod phthisis alia ortum habet à catarrho à cerebro ad pulmones defluente, alia ètèra hinc ex vasorum pulmonis ruptione, erosione, vel pulmonis aut pleurae inflammatione suppurrata.

Signa Diagnostica.

Signa & notas huius mali quod attinet, cū vlcus pulmonis & phthisis saltem in principio curationem suscipiat, confirmata verò & inueterata non curetur, & incipientis notas & perfectae ac desparatae phthiseos perspectas habere utile est. Incipientis autem phthisis signa sunt, tussis diuturna & sputum rotundum diutius apparens, quod materiam crassam à calore excedente in pulmone condensari indicat, quae temporis tractu acredine acquisita pulmonem exulcerat, ut ex Galeno, 6. epidem. comm. 3. 1. 36. videre est. Interdum aliquid cruenti reijcitur, & hoc subsistente sordidum & purulentum aliquid. Corpus totum extenuatur, & nullum post cibum sumptum corpori robur accedit, febris adest lenta & continua.

Quae signa omnia confirmantur, si *phthisis*, illa corporis dispositio, de qua supra dictum, adsit, aut familia illa phthisi obnoxia sit, parentesque vel fratres aut sorores phthisi peccierint. Praecesserunt causae, quae pulmonem exulcerare possunt, sputum sanguinis, destillatio acris & salsa diu perseverans, & aliae causae supra propositae.

Perfecta autem Phthisis ex iisdem signis cognoscitur, sed iam evidenterioribus & augmentum sumen-
tibus. Si quis enim vel plebeius hominem videt pallentem, imbecilem, tussientem, macie confectum, hunc vera phthos laborare pronunciat, ut Aretaeus 1. de sign. & causis diuturn. cap. 8. scribit. Cognoscitur nimirum perfecta phthisis ex pulmonum ulcere, febre lenta, continua & hinc sequente totius corporis macie & extenuatione, ac difficili respiratione.

Vlcoris autem pulmonis signum est pus per tussim reiectum. Ulcere enim serpente ac sordescente pus excutitur, ac sputa sordida reijciuntur, quorum ut Aretaeus, loco alleg. loquitur, *insinista propè sunt species, limborum, aerorum, purorum ac sincerarum, aut pallido albique, aut albo & viridi mixtorum, laevorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut rarorum diffusorum, aut odore aeren-
tium aut fœdè olentium.* Quia verò pituita crassa & ipsa puri similis est, imò catarrhi interdum in pectus delapsi, praesertim in iuuenibus, deducuntur ad quandam consistentiam puri similem, unde ob putredinem sunt febres, & corporis macies sequitur; phthisis tamen reuera non est, cū caro aliqua regeneretur: affectus hinc à vera phthi dilata-

Differentia phthisis.

Signa phthisis incipientis.

Signa phthisis perfectae.

Signum vlcetis pulmonis.

febris lenta
& continua

nendus est. Vulgò docetur, pituitam à pure duobus discerni primò, quòd pus vel per se vel certè igni & carbonibus iniectum fœtidum odorem reddat, qui in pituita non deprehendatur. Deinde quòd pus in aquâ tepidam proiectum descendat, quod pituita cruda non facillè faciat; agitarum quoque facillè dissoluatur, quod à pituita è capite delapsa, & in pectore concocta non accidat, quæ ob lentorem non facillè dissoluitur.

Verùm Aretæus, *loc. alleg.* hanc explorationem non ita necessariam esse existat, scribitque, *Quicumque antique, aut aquâ humiditates hinc explorat, ac norat, hume videri bandita multum phibendi dignoscere.* Nam, ut addit, visio quolibet alio sensu certior est, non modò iis, quæ reiiiciuntur, intuendis, sed ægrotantis specie consideranda. Si quis enim, ut antea dictum vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc reuerà phthoe laborare pronunciat. Neque ut in alijs etiam partibus, omne pus fœtidum est, sed in viceribus saltem sordidis. Ideòque Hippocrates non omni phthisi sputum grauiter olens tribuit, sed lethali latèam ac perniciosâ, §. *aphor.* 11. Sunt tamen graueolentiæ quidam gradus. Rarò omnis fœtor à vera phthisi abest, quod vel anhelitus fœtidus testatur, ipsique ægri expuentes ferè grauem odorem percipiunt: maior tamen est graueolentia in lethali phthisi. Febris est continua, lenta, putrida, ut *supra* dictum, quæ tamen noctu exacerbatur & emicat. Totum corpus absorbitur & extenuatur. Quibus accedunt & alia: Tussis est mo-

lesta, quâ qualia memorauimus reiiiciuntur. Respiratio est difficilis, non solum ob facultatis imbecillitatem, sed & quia bronchia pulmonis obstruuntur, tum ob puris copiam, quæ ab vlcere in ea transmittitur, tum ob multa excrementa, quæ in pulmone debilitato colliguntur. Quibus accedit quod ipsum viscus vlcere debilitatum & sæpè magna ex parte consumptum materiam collectam satis reicere non potest. Pulsus inæqualiter sese habent, modò sunt languidi, modò sunt celeres, nunc duri, nunc molles: molles quidem ob mareriam humidam arteriis humectantem, duri autem ubi calor exliccauit. Sæpius etiam subdunt phthisici, ob facultatis naturalis debilitatem, quæ & naturales humores & excrementitios retinere nequit. Malo tandem confirmato inueteratòque pus in dies magis fœtidum redditur, & sæpè puris pulmonum portio, & bronchiorum ac vasorum, pulmonis tamèta aut crustulæ quædam tussii reiciuntur. Fæces, ut Hippocrates, *lib. de intern. affect.* habet, sono implentur & veluti per arundinem sibilum reddunt. Tandem capilli defluunt, ob alimentii corruptionem & penuriam. Vngues incuruantur, ablumpta carne, quæ in summis digitis existerat, vnguè que firmabat. Malæ liuescunt, nisi quod post sumptum cibum sit, vaporibus sursum eleuatis, rubescant. Pediculi copiosè generantur ob alimentii corruptionem. Extrema & pedes calore languescente intumescunt. Superuenit denique has omnibus diarrhœa ex retentis ventriculi & intestinorum imbecillitate, inò & humorum corruptione.

Feb. putr.

Nonnulli etiam ante mortem mente vacillant, sed sine aliqua furoris commotione. Atque ita tandem ob febrem, sudores, alui profluvium, consumpto toto corpore, sputoque ob virium imbecillitatem revento, mors sequitur.

Prognostica.

Prognostica.

1. Omnis Phthisis gravis & periculosus morbus est, tum ob causam, vlcus scilicet pulmonis, quod curatu est difficillimum, tum ob symptomata & quæ id consequuntur, febrem, totiusque corporis consumptionem. Est verò vlcus pulmonis curatu difficile, non tam ob pulmonum motum continuū, quam quòd sanies & pus in molli & spongiosa illa carne hærens citra tussim expurgari nequit, quæ pulmones in dies magis læduntur. Quibus accedit, quod medicamenta integris viribus tanto intervallo ad pulmones non perveniunt. Reddit quoque febris adiuncta & hanc sequens corporis consumptio curationem difficilem. Febris enim & inæcies corporis humectantia requirunt, quæ vlcери nocent: contra vlcus detergentia & siccantia postulat, quæ adiunctæ febri & corporis consumptioni non conveniunt. Hinc Galenus, 5. meth. med. cap. 8. concludit, quòd rupto in pulmone vase, nisi statim, antequam phlegmone accedat, vlcus sanetur, exigua sanationis spes supersit. Licet enim diligentia adhibita vlcus interdum siccetur, & labris eius nimis induratis, & quasi callo obductis spes aliqua affulgere videatur: tamen leui occasione callo decedente malum recrudescit, vt idem 4. de l. aff. cap. 5. docet.

2. Et si verò phthisis, si vlcus sit profundum & diuturnum, planè incurabilis, quæ verò ab vlcere paruo & non diuturno provenit, & ipsa curatu difficilis est: non tamen planè incurabilis est, si maturè ei convenientia remedia adhibeantur, & passim exempla curatorum phthisicorum à medicis annotata reperiuntur, quorum aliqua collegit Ioh. Schenck. l. 2. obseru. 144. 145. 146. de qua re infra in questione dicitur.

3. Est præterea phthisis sæpe malum diuturnum & quod in multos annos protrahitur. Refertque Aui-cennas, lib. 3. serm. 10. tract. 5. cap. 18. se vidisse mulierem phthisicam vixisse circiter viginti-tres annos: & Marth. de Gradibus, in 9. Rhaf. cap. 54. aliam mulierem phthisicam, quæ circa furnum & ignem quotidie occupabatur, plus viginti octo annis vixisse scribit. Cuius rei exempla alia apud alios medicos occurrunt.

4. Phthisis ex vlcere, ex orosione in pulmone facta, ferè insanabilis est. Nam longiore tempore ad hoc vitium corrigendum opus est, vt Galenus, 5. meth. med. cap. 8. & 24. docet. In tempore autem longo alterum duorum fiat necesse est. Vel enim, si vlcus vehementer exsiccare conamur, antequam acrimonia humoris satis obtusa sit, id non consequimur; vel si humoris acrimoniæ corrigere studemus, sordidum interea fiet vlcus & incurabile.

5. Hippocrates, 2. prorrh. sex signa proponit, quæ in conualituro apparere debent. Eum, inquit, qui probè liberari volet, oportet facile sputum per tussim eiecere, idque album & æquale eiusdem coloris

& ~~dehinc~~. Quod verò à capite defluit, oportet ad nares conuertere, (ne scilicet malum ex affluente in pectus humore augeatur.) Febrem autem non inuadere (putridam scilicet noctu) quæ cenam prohibeat; neque sitim faciat. Aluus autem quotidie deiciat, & id, quod egerit, durum sit, (seu consistentia mediocri non fluidum) copia iis, quæ assumentur, respondens. Hominem verò ipsum quàm minimè extenuari conuenit. Pectus autem quadratum & hirsutum, cuiusque cartilago exigua & admodum carnosa est. In quo hæc omnia inueniuntur, maxime superstes erit: Qui verò nihil horum habet, interitui proximus est.

6. Nimirum sputum, quod phthisici expuunt, vel per se, vel carbonibus inectum grauius olet, & capilli defluunt, periculosum signum est, *5. aphr. 11.* quod magnam corruptionem in substantia pulmonis, & alimentis penuriam vel corruptionem significat. Superueniente autem alui fluxione tabidi moriuntur, & in propinquo mors est, *ibid. aph. 11.* quam & facies Hippocratica dicta, *1. progn.* descripta denotat.

Quod idem docetur, *lib. 2. de morbis.* Siquidem, inquit, autumno, iam capilli ex capite huius defluunt, caputque velut ex morbo nudatur, & super prunas expuens sputum grauius olet, hunc intra breue tempus periturum asseruit, & ex alui profusio periculum. Vbi enim iam pus circa cor computruit, id prunis impositum nidorem exhalat, & una incallescens cerebrum falsiginem emittit, quæ aliam ciēt; cuius rei indicium est, quod capilli à capite defluunt. Hanc, cum ita habuerim, non curato, Cui loco Author fluxus alui phthisicis superuenientis vnicui

causam ponit humorem falsuginosum à capite defluentem; Verum frequentior huius symptomatis causa est vitium naturalium summa imbecillitas, & interdum etiam acris sanies à pulmonibus vlceratis resultans.

7. A puris sputis phthisis & fluxio: cum verò sputum retentum fuerit, moriuntur, *7. aph. 16.* Tandem enim, vt Galenus, *in comm.* addit, phthisici viuunt, quamdiu extussire, & per sputa pulmonem expurgare possunt. Vbi verò intus ipsa remanent, respirationis obruentur viæ & ægri suffocantur.

Indicationes.

Indicationes.

Cum ergo phthisis malum tam periculosum sit, maturè ei occurrendum. Et quamuis incurabilis pleuribusque videatur, tamen ægri sine auxilio non sunt relinquendi: cum non solum, quod Auerroës dixit, quandoque monstra in Medicina fiant, & qui desperati videbantur, sanitati restitutos fuisse, sed etiam nonnullos, licet non planè conuauerint, adhibitis idoneis medicamentis, vitam diu protraxisse, historiarum medicarum passim annotatæ testentur.

A tribus autem hic Indicationes sumuntur, ab vlcere pulmonis, à febre, quæ coniungitur, & à corporis totius macie & consumptione. Indicatio autem præcipua in phthisi ab vlcere pulmonis, vt fonte & causa huius mali, petitur, quo sanato & febris euancescit, & corpus iterum incrementum sumit. Vlcus autem abstergendum, substantia pulmonis regeneranda, tandemque vlcus consolidandum. Febris refrigerantia & humectantia indicat. Corpus tandem exsiccatum

& extenuatum humectandum & nutritione instaurandum. Quæ indicationes cum sint contrariæ, ita moderandæ, ne dum vni attendimus, alterum negligamus. Et quidem si spes sanandi vlcis adhuc superfit, cura præcipuè ad vlcus dirigenda. Quod si res iam planè explorata & nulla spes vlcis curandi amplius superfit, humectantibus solui, refrigerantibus & nutritiuis corpus extenuatum reficiendum. Sic enim vita aliquandiu protrahitur. Quo in casu etiam medicamenta, quæ vlceri conveniunt, & corpori extenuato profunt, ita misceri & temperari possunt, vt medicamenta vna parte vlcus purgent, abstergant & siccent, altera verò corpus reficiant.

Curatio.

Curatio.

Primo ergò vlcis curatione quod attinet, etsi plerumque hunc scopum, vt difficiliorem minus accuratè persequuntur: tamen cum reliqua curatio, febris putà & corporis extenuati instauratio, fieri non possit, nisi vlcus sanatum fuerit, omnino de vlcis curatione diligenter dispiendum. Etsi autem vlcis consolidatio naturæ opus sit: tamen Medicum removere oportet impedimenta, quæ naturam in opere suo remorari possint.

Primo nimirum humores siue in toto corpore, siue in capite consistentes & ad pectus affluentes, sunt euacuandi, & corpus à cacoehymia liberandum. Si enim cacoehymia in toto adsit, & humores affluentes malum augeant, & foueant, febrémque ipsam grauiorem reddant, tabesque ipsa nondum confirmata sit, lenia purgantia, quæ simul thoraci & vlcis prodesse, & fluxi-

onem humorum auertere possint, exhibenda. Tale medicamentum est Rhabarbarum cum infusione rosarum & sero caprino datum. Item rhabarbarum cum passulis maioribus sputum, aut confectus ros. cum rhabarb. data: syrup. item ros. solutius galli antiqui, in quo manna dissoluit. Potest, & cassia vsurpari.

Ius galli antiqui sic paratur:

℞. Gallum antiquum, & in ven- Ius Galli.
tre eius ponantur sequentia.

℞. Passul. mandat. part. xx. iuniu. sebesten. an. N. x. medalla sem. carthami, ℥. vi. Coq. in aqu. lib. vi. ad consumptionem tertiæ partis. Vtatur manè in sculo. Potest & manna ℥. i. vel ℥. ii. addi.

Vel ℞. Decocti scabios. tussilag. sem. melonum, trium, fl. cordialisum, an. ℥. iv. In quibus dissolue, manne, ℥. i. β. syr. viol. ℥. i. Misce. Vel ℞. Flor. cassia, ℥. j. pulu. glycyrrh. ℥. i. Cum saccharo Fiat bolus.

Viles sunt & Clysteres linientes, qui excrementa non solum euacuare possunt, sed & corporis caliditatem, & siccitatem emendare. Validioribus verò purgantibus medicamentis hic nullus locus est, vt & sanguinis missione: cum corpus extenuatum & consummatum, viresque deiectæ eam non admittant. Et licet Hippocrat. 1. epidem. & Galen. 6. epidem. comm. 3. t. 29. tabidis seu extenuatis venam cum commodo aperuerint: phibisi tamen ii non fuerunt, sed graciles & extenuati, vel ob calorem sanguinis nimium, vel ob eiusdem euacuationem suppressam. Et licet etiam nonnulli purgantibus fortioribus, vt pilulis coctiis & similibus vtantur: id tamen potius imminente, & præsertim ob catarrhum, phibisi,

Curatio
malæ
catarrho.

quam iam præsentem locum habet. Imprimis verò videndum an malum adhuc à catharro à capite destillante foveatur. Tum enim danda opera, ut is quamprimum sitatur & à pectore auertatur. Nam frustra in curatione vlcis pulmonis tempus teritur, nisi fluxio prius cohibita vel alio conuersa fuerit. Quia ratione autem hoc præstandum sit, ex doctrina de catarrho patet. Et si fluxio sit diuturna, nullo tutiore inter initia remedio materia aliò auertitur, quam fonticulo in altero vel utroque brachio aperto. In morbi verò progressu eger iam imbecillior frustra cauteris vel fonticulis cruciatur.

Ipsius
vlcis
pulmonis
curatio.

Deinde ipsum vlcus pulmonis quod attinet ad eius curationem duo medicamentorum genera requiruntur, abstergentia & consolidantia. Primo ergo adhibeantur ea, quæ vlcis deterfioni inferuiunt, & quod deterfium est, tussis & sputo leniter educere valent (expectorantia vocant) ne sordes in pulmone subsistant cumque amplius corrumpant. Huic vltui inferuiunt *aqu. saccharata* & *aqu. mulsa*. Nam mel crudum valde abstergit. Fortiora sunt, *succus caulium*, *insusilago*, *capill. verner.*, *hyssopus*, *scabiosa*, *marrubium*, *agrimonia*, *radix iridis*, *aristolochia*, *belenij*, *terebinthina* & ex his parata medicamenta.

Vt *℞. Marrubij m. j. hyssopi. scabiosæ an. m. ss. Coq. in aqu. tb. iii. ad tertiam partis consumptionem, adde mellis, tb. ss. Iterum ebulliant & despumetur.*

Vel *℞. Butyri recent. ss. sale ʒ ii. terebinthina abietis pellucida ʒ i. mel. el. ʒ. iv. M. F. bolus.*

Postquam vlcus deterfium est,

glutinationi incumbendum. Inter glutinantia autem medicamenta facillè primas obtinent *rosa. belu. Armenus*, *terra sigillata*. Quibus addi possunt *lapis benianis*, *radix symphytis mai.*, *consolida media*, *plantago*, *scabiosa*, *pulmonaria*, *Gallia tenuifolia* *Tabernæ Moniani*, nonnullis herba *costa dicta*, quæ species *hieracij* est, *veronica*, *hederaceæ*, *restis*, *borrys*, *ros Solis*, *sanc. flores hypseis*; è quibus varia medicamenta parantur, quibus etiam *Pulmo vulpis*, & alia peculiariter pulmoni dicata admeantur. *Auicennas*, *lib. 3. femio. tr. 3. c. 6.* miris modis commendat *conseruam rosarum*, refertque mulierem quandam phthiticam & morti destinatam eius vltui ita curatam fuisse, ut non solum sana, sed & pinguis redderetur. Idem *Melicæus*, *c. de phthisi*, & alij medici testantur. Vis enim abstergenti & consolidandi rosis inest, saccharumque etiam abstergit, simulque nutrit. Sunt tamen quædam conditiones in vltui conseruæ rosarum obseruandæ. *Prima* est, ut *Mel. loc. alleg.* monet, ut abstergentia & mundificantia præmittantur, ac proinde initio conserua ros. recens, quæ plus succi, & proinde vim abstergerendi maiorem habet adhibeatur. *Secunda*, ut magna quantitate exhibeatur, & quotidie, imò cum pane & cibo à potu sumatur. *Tertia*, ut si ob eius vltui sputum retineatur, & difficilis respiratio reddatur, syrupus de hyssopo vel alia expectorantia per interualla exhibeantur. Vtilis est & conserua pilosellæ.

Conseruæ rosarum & alia enumerata medicamenta commodè miscetur, ut *terra sigillat. bolus Armenus*, *syrupus vel pulvis symphytis maj.*

Galenus, 3. *meth. med. cap. 6*: ad sputum sanguinis ex erosione, ut materia purulenta in ulcere absumatur, vlcusque claudatur *passillis Pasionis, Andron. Polyide* vtitur. Dioscorides sulphur vinum exhibet. Hinc Chymici commendant contra phthisin è sulphure parata medicamenta, ut sulphuris flores, balsamum, & lac. E. gr.

℞. *Lætis sulphur. 3. B. magister. corallor. perl. an. 3. B. c. muls. sem. melon. cum aq. iussilag. vel veronic. facta, 3. ii. inlebr. rosar. 3. vi. aq. cinamom. iuanus. Cbri. perl. an. 3. ii. m.*

Non solum autem ad exsiccationem viceris glutinationem interna medicamenta faciunt, sed & externa vilia sunt, si scilicet eorum vapor & halitus per os, vel per nares inspiratione attrahitur. Quod vel aër docet, de quo infra in dicta dicitur. Per os vt attrahantur, medicamenta idonea in vino vel liquore conueniente coqui, & eorum vapor excipi atque attrahi potest, vel pulvis conueniens exibere, *massiche, ressi, myrrha, benzoe carbonibus*, aut ferro candenti inspergi, idemque fumus spiritu attrahi potest. Dioscorides etiam *suffium sulphuris* vtitur.

Per nares quæ attrahuntur sunt suaueolentia, quorumque vapor inspiratione attractus vlcus exsiccare potest. Talia describit Aëtius, *scrab. 4. serm. 4. c. 113. 114. & 115.* ad quorum imitationem & alia componere licet ex *thur. myrrha, ressi, ladan, benzoe, santalis, cinam.* Recetiores commendant suffitum ex *romana, sentabab, bo.* Habentque hæc, quæ cum aëre attracto misceantur, suffumigia & odoramenta præ reliquis hanc prærogatiuam, quod vl-

cus siccant, reliquum tamen corpus non ita afficiunt. Aëtius, *tetrab. 1. serm. 4. c. 67.* etiam topica applicat in phthisi. Initiò quidem, dum materia præparatur ad educationem per tussim, cataplasma ex *alibea & sem. lini contusis & cum decoctione malu. & sanigræci, & cum oleo & melle mixtis.* Dum tussis expurgandum est, epichema ex *scorbinthia, oleo irino, butyro, medulla cerui, adipis tauri, farina iridis, aspio, parvis aqualibus mixtis.* Dum cicatrix inducenda est, oleo *rosar. mirris cum acacia, malicorio, hypocistide, aluminis scissili, gallis, sumach, additis,* postulante vsu, quoque alis, sicut apud ipsum videre licet. In concoquentibus tamen & tussis expurgantibus ea cautio adhibeatur, ne in tempestiuo illorum vsu exulceratus pulmo magis offendantur. Tutius *rosarum & isidurum* suo tempore vtmur.

Corporis extenuationem & maciem ad febrem quod attinet, illi per ea, quæ ad corpus nostrum instaurandum faciunt, succurrendum; hæc per refrigerantia & humectantia tollenda. Ad corpus instaurandum faciunt, quæ alimentum bene & multi succi præbent, quæ ex pulpis carniū gallinarum, caponis, phasianorum, perdicum, cancorum, faniatilisum vel nostrorum gammiarum sumuntur, de quibus postea in dicta dicitur. Et commodissima hinc sunt iura instaurantia seu consummatadicta. Vtiles sunt & alij cibi, ut & medicamenta; quæ parantur ex *bordeo, amygdalis dulc. pinis, pistaciis, seminibus 4. frig. maj. excoriscatis, amylo, tragacantha, gummi Arab. saccharo. penid.* Hinc exhiberi potest cremor bordei vel auenæ

cum emulsione amygdal. dale. cui aliquid pulueris Hali, de quo postea, cum conseru. rosar. addi potest.

Commendissima autem hic sunt medicamenta, quæ omnibus scopis satisfaciunt, vlcus nimirum consolidant, corpus emaciaturum instaurant, caloremque febrilem mitigant. Inter quæ primas facillè lætenter, & quo, vt Galen. 3. de med. facul. cap. 16. de cibis boni & mali succi cap. 4. 5. meth. med. cap. 16. 7. 2. meth. med. c. 6. docet, curandis phthisicis vix quid præstantius datur, vt postea de dicta dicitur. Et vt efficacius sit lac, virèsq; medicamento-fas, quæ expetuntur, acquirat, potest animal, cuius lac expetitur, in conuenientibus pascuis nutrir, qualem ad pascua locum describit Galenus, 5. meth. med. cap. 12. & 10. meth. med. cap. 11. vel capris plantæ phthisicis conuenientes loco pabuli præberi possunt. Vtile est hoc.

℞ Oxygala, seu lactis, à quo butyrum sis separatum, lb. β. Stet nocte vna sub dio, & postea fortiter agitetur, & spuma detrahatur. Postea adde Conseru. rosar. 3. β. Boli Armeni, 3. j. M.

Commendatur à plurimis etiam puluis Haly Abbatis, lib. 6. præf. c. 11. descriptus,

℞. Papau. alb. 3. x. gummi Arab. amyli, an. 3. iii. sem. port. malua. alibeg. an. 3. v. cucurb. cucum. citrull. cydonior. an. 3. vii. spody. glycyrrh. tragac. an. 3. iii. F. puluis.

Valescus de Taranta addit sacchari penidij ad pondus omnium. Atque isto puluere & sequente electuario Valescus de Tarant. monachum phthisicum iam deploratum se curasse refert.

℞. Corall. rubr. carabe, jey, ter-

ra figill. bypocistid. amyli, spody, glycyrrhiz. & succi eius, sem. 4. frigid. mai. min. gumm. Arabic. tragacanth. rosar. rubrar. an. 3. j. pinear. mundat. pistaci. amygd. dul. an. 3. ii. Torrefiendâ torrefiant & F. puluis. Pulueris huius ℞. 3. i. β. sacch. q. s. conseru. capill. veneris, symphyt. testudin. an. 3. β. Misce. F. electuarium.

Rondeletius puluerem istum hoc modo præstantiorem fore scribit.

℞. Sem. papau. albi, 3. β. gummi tragacanth. farinæ orobi, an. 3. i. β. sem. althæa, portulaca, cucumer. melon. citrul. bombac. an. 3. iii. β. cineris cancrorum fluuiatilisum, corall. alb. præp. succ. glyc. an. 3. i. β. sacch. rose. tabul. ad pondus omnium. F. puluis.

Dentur 3. ii. cum syrupo de papanere, vel iunibino. Est & sequens vtile.

℞. Nuc. Indic. pistaci. sem. 4. frigid. maior. amygd. dale. an. 3. i. sacch. penid. 3. β. gummi Arabici, 3. ii. sem. malu. lactuc. an. 3. ii. tragac. sem. cydonior. macis, caryophyll. an. 3. β. anis. 3. i. glycyrrhizæ rase, 3. i. β. cinam. 3. ii. carnis testudinis vel pulpa phasiani aut caponis, 3. vi. sacch. op. lb. iii. aq. ros. opt. q. s.

F. morsuli vel panis Martius. Plinius etiam lib. 28. cap. 17. medicamenta quædam ad phthisin habet.

Nonnulli etiam balnea aquæ dulcis tepida adhibent ad corpus humectandum. Verum id potius hæcticis simpliciter, quàm phthisicis conuenit. Et in phthisicis, etsi ad hæcticam declinent, non habet locum, nisi vlcus ab omnibus sordibus repurgatum & consolidatum sit, corpusque siccaturum balneo ad alimentum rectius suscipiendum præparandum sit.

Diaia.

Phthisici omnem aëris in calore &

frigore excessum nimium, subitaneque eius mutationes, ut & aërem pluviosum virent. Sicus verò aërad vlcera pulmonis sananda vtilissimus est, siue naturâ talis, siue arte comparatus. Antiqui hâc de causâ suos phthisicos ad Tabios mittebant, monticulum inter Surrentû & Neapolim, locum nonnihil calidum, & præciue siccum ob Vesuvij montis, instar Æthiæ perpetuò flammam euomentis, vicinitatem, quem describit Galenus, 5. *metb. med. cap. 12.* Commodum quoque est hac de causâ loca piccis & similibus arboribus abundantia incolere. De quo Plinius, *lib. 24. cap. 6. constar.* inquit, *illum calidâ aëre plus ita quàm navigationem Ægyptiam proficere, plus quàm lacis herbidas per montium æstivas potus.*

Possent ergo etiam ligna hæc resinosa in conclavi haberi vel incendi. Et quantum aër siccus in phthisi curanda possit, testatur trita illa mulieris historia, quæ cùm annis aliquot ad furnum artem pistoriæ exercens versaretur, sicco aëre inspiratione attracto, & vlcere ita exsiccato vitam diu protraxit.

Quod tamen intelligendum est, ubi ipse aliqua sanitatis recuperanda superest. Si enim de vlcere curatione desperatur, ægërque ad extremam maciem iam sit deductus, aër talis vlcus non sanabit, ægro verò mortem accelerabit. Celsus hac de causâ navigationes longas præcipit: iis quidem, qui tam robusti adhuc sunt, ut peregrinationem suscipere possint, cùm, ut Aretæus, de *curat. morb. diu. urn. lib. 1. cap. 8.* scribit, *pulmonis vlcerebus quidam secum marina salsedo committet.* Eadem de causâ ex Italia in Ægyptum

nauigare suadebant. Aliis ægër ab omnibus animi & corporis motibus vehementibus sibi temperet.

Cibi sint boni succi faciles cocti Cibus & multi nutrimenti, cuiusmodi parantur ex hordeo, auena, amygdalis, ut & alica, amylo & oryza. Et quidem in principio cibi abstergendi vim habeant, hinc glutinandi & consolidandi. Parètur igitur in principio ex hordeo hinc alica, amylo, & oryza. De alica tamen, amylo, oryza & eiusmodi cibis notandum, quod etsi mali succi non sunt, succum tamen præbent lentum & crassum, idè quæ sola & sine præparatione non sunt exhibenda, sed aliis coctis facilibus admixtis, & quidem in forma orbili, & propterea cum iusculis bonarum carnum præparanda. Quomodo & reliquis cibis vim meliùs nutriendi imprimunt, & à calore debili faciliùs coneequuntur. Id quod Galenus, 7. *metb. med. cap. 6.* docet, dum scribit. *Nec tamen, quod maxime nutriat, optimum est iis corporibus, quæ resici magis egent, vixque quibus concoquendi facultas non est, neque etiam quod facillimum concoctû est, cum scilicet ipsum nequeat esse maxime nutriendum.* Cùm igitur hæc duæ indicationes ex aduerso pugnent, committendum non est, ut dum alteri nimium sis inueniatur, alterius omninò obliuiscaris, sed utriusque memor, quoad liceat, vitamque misceas.

Et quia phthisici multo nutrimento indigent, ob caloris verò natui debilitatem multum cibum vñâ vice concoquere non possunt, idè sæpè cibos, sed eius parùm vñâ vice præbendum.

Inter alimenta autem præciue, ut supra etiam dictum, primum locum lac obtinet. Optimè enim corpus

nutrit, sanguini bonam materiam præbet, acrimoniam vitiosorum humorum temperat, parte serosa vlcus abstergit, caseosa consolidationi inservit, butyracea humectat & corporis exsiccationi resistit. Imprimis autem laudatur lac muliebre, quod naturæ corporis nostri maximè cognatū est. A sinuū est tenuius & serosius & ad vlcus abstergendū cōmodius. Inter hæc mediū locū habent caprinum & vaccinum. Ne autem lac in ventriculo coaguletur, aliquid sacchari vel mellis admisceatur. Dandum etiam vacuo ventriculo & mundato ventre: alioquin facilè accescit & corrumpitur. Ea etiam quantitate dandum, ut à ventriculo bene ferri, & concoqui possit. Ideoque à minori quantitate ad maiorem ascendendum & primò quotidie semel, deinde bis de die dandum. Post hæc sumptum æger non statim dormiat, nec alium cibum, præsertim vinum capiat, nec lac in ventriculo corrumpatur. Si tamen adsit febris manifestè affligens, dolor capitis, vasorum obstructions, & flatūs, à lacte abstinendum. Potest lac etiam hoc modo præparari.

℞. Lactis caprini vel vaccini mensur. iiii. Adde aquæ fontan. puræ mensur. facch. alb. ℥. 6. Coq. lento igne ad aquæ consumptionem.

Lac hoc modo præparatum vel potandum datur, vel panialbotrito affundatur, & comedatur.

A plerisque maximè commendatur caro cancrorum & cochlearum, quæ scilicet propter substantiæ cassitatem vlcus consolidare possit. Verum enim verò hæc de re dubitatur; cum hæc animalia sint crassa & terrea substantiæ, & proinde non nisi grassum, terreum, & vitiosum suc-

cum generent, difficillimè coquantur & maximè excrementosa sint. Ideoque non nisi parce alius cibus admiscenda, ut reliqui cibi cum iis permixti solidius alimentum præbeant. Aut potius ius eorum, quàm substantia, præbendum, & pars quædam in limacibus, quàm murena, id est, papaver, Aristoteles, 4. de hist. animal. cap. 4. nominat, quæ non difficulter coquitur. Ideoque nonnulli caneros & cochleas in lacte coquunt, & postea ius saccharo condunt, vel etiam farinam hordei & lac amygdal. dulc. addunt. Vide infra quæst. 2. Vel hoc modo præparetur.

℞. Cochleas, quæ separatim excrementis omnibus incidantur, & in vase vitreo optimè clauso coq. in balneo. Liquorem per setaceum trahice, trajectum lento igni expone, ut omnis pars aquosa resoluatur, & remaneant partes solidiores, sed in liquorem redactæ. Hic liquor pro cibo dari poterit, qui si alteretur cichoraceis vel similibus, euadit medicamentosus & refrigerabit & humectabit.

Potus, ubi abstergendum, sit aqua mulsa bene diluta vel aqua hordei cum paucis melle. Cum glucinandum, aqua hordei, in qua saccharum rosar. dissolutum sit. Vino tamen etiam locus est, sed sit illud debile ac modica quantitate exhibeatur. Commodum etiam potum præbent cereuisia bordaceæ & triticea.

Peculiaris pulmonis vlcera, sphaecelus, & cancer.

Facienda sub finem huius capitis & aliorum vlcum, quæ phthisin tamen non introduxerunt, & sphaeceli ac cancri pulmonis mentio.

Interdum enim apostemata in pul-

Peculiaris pulmonis vlcera.

monibus reperiuntur, quæ nullam febrem coniunctam habent, nec tussim. Ita refert Nicolaus Massa, in *Introdu. Joris anat. f. 57.* se anno 1533. quandam secuisse, & in substantia pulmonis in parte sinistra vlcus magnum concavum & putridum ad quantitatem multo maiorem, quam sit dimidia pars corticis vnius oui gallinæ cum sua profunditate, in qua cavitatem fuit sanies multa & prava, deprehendisse, cum tamen iste, quem bene nouerat Massa, nunquam conquestus sit de aliquo dolore, neque tussiverit. Sed procul dubio iste tuberculum habuit, quod tandem in pus mutatum est.

Post sanguinis sputum pulmonis partem quandam nigricantem & sphaelo correptam, & in ea profundum sinum, sine vilo pure & sanie inuentam fuisse refert Dodonæus, *obs. c. 24.*

Refert etiam Iacotius; *comm. 1. in lib. 5. sect. 2, apb. 67. Cosc. Hippocr.* interdum partem superiorem pulmonis in cancerum abire, atque ad iuguli partem superiorem trahi, ut sub alis lateat, unde compressa aspera arteria stertor quidam obauditur, non à puris multitudine, aut alterius humoris, sed ab angustia & interceptione meatus, in quo refractus & agitatus humor aliquis in gutture fuerit.

Q V Æ S T I O. I.

An vlcera pulmonis sint sanabilia.

Vlcera pulmonis satis periculosa esse, & paucissimos, quibus pulmones exulcerati fuerint, euadere, ipsa experientia testatur. Imò nonnulli in ea sententia sint, nullos planè

pulmonis vlceribus euadere, ea de causa, quòd pulmo in perpetuo motu sit, atque ita labra vlcis, ut & vulneris, coalescere non possint. Quam rationem celsi Galenus, *s. meth. med. cap. 8.* reprehendit, & reuera motus ille pulmonis naturalis in respirationem tam vehemens non sit, ut sanationem impediatur, & vulnera pulmonis sanari posse experientia testatur: tamen aliam de causam, *loco allegato.* Galenus affert, mirum tussim. Cum enim vlcus nullum possit sanari; nisi à pure prius mundatum fuerit: pus verò è pulmone sine tussi euacuari non possit; facile hinc patet, motu illo, qui in tussi est vehementior, vlcis labia iterum lacerari. Quibus accedit & hoc, quod idonea vlcis sanando medicamenta adhiberi non possint, Nam illud, quod rectè in pulmones ex ore destillat: exiguum est: quod verò in ventriculum descendit, non nisi per longas ambages & alacrum atque imminutum ad pulmonem peruenit. Hinc & Galenus, *s. meth. med. c. 12.* omnes illos, qui sanguinem è pulmonibus expuentes primo die se curandos ei tradiderunt, quosdà etiam post duos aut tres dies se sanasse prædicat. Quorquor autem phlegmone sic occupauit, ut iam febricitarent, horum nullum in totum per sanatum esse scribit.

Alij contrà vlcera pulmonis sanabilia esse statuunt, adducuntque primò authoritatem Hippocratis, qui *6. apb. 8.* vixitè quidem, cerebri, cordis, diaphragmatis, intestinorum tenuiorum, ventriculi, hepatis vulnera mortem afferre docet pulmonum verò vulnerum non meminit. Franciscus Arcæus, *defebribus c. 8.* à vulneribus arguentum peti, &

Sphace-
tus pul-
monis.

Cancer
pulmo-
nis.

An vlcera
pulmonis
sint sana-
bilia.

cum pulmones transfolli, quod sæpe fit, feliciter curentur, etiam vlcera pulmonis sanari posse putat, idque se felicissimè præstitisse affirmat, & quidem vsu decocti ligni guaiaci: quod & Philippus Ingrassius & Thomas Erastus se factitasse scribunt. Cõserua etiam seu saccharo rosarum phthisicos curatos referunt Auicennas, lib. 3. senio. tract. 5. cap. 5. Mesues, capite de phthisi, Valescus de Taranis, lib. 3. cap. 2. Valeriosa, lib. 5. obs. 5. Crato, in consil. Mont. 152. P. Forest. lib. 16. obs. 58.

Et omninò cum experientia rem definiat: disputatione multa opus non est. Rarò tamen hoc accidit, non quidem ob naturalem illum pulmonis motum, sed ob saniam, quæ pulmones corrumpit, & non nisi tussi, & vix tutò effici potest, vnde pulmones lacerantur, & quod medicamenta ad pulmones viribus integra vix perueniunt, vnde si quid præstare debent, continuanda & in magna copia medicamenta talia vsturpanda sunt, sicut Montanus recituit, phthisicum quendam Venetiis nihil ferè aliud comedisse, quàm saccharum rosarum, vt pharmacopolæ Veneti id amplius ipsi vendere nollent.

Notandum tamen hîc, etsi suo modo sanabilia pulmonis vlcera dici possint: suo modo tamè etiã rectè dicuntur insanabilia dū insanabile sumitur pro eo, quod ad pristinũ statũ reduci nequit. Etsi enim callus quidam obducatur: tamen perfecta ea latio non est. De quo Galenus, 5. meth. med. c. 14. Sed qui postea, inquit, si per omnia præsidia ruit transferunt, vt siccaretur vlcus, si tantum saltem lucrescerent, vt illud nec vlcera pro-

grederetur, nec mansuïeret, sed scissuram ac callo duratur longiore vita frui hominem liceret. Et 4. de loc. aff. cap. 5. Quæ vtrò in pulmone iam permanserunt, quamuis aliquando curentur: relinquitur tamen in eos res quædam callosa fistulosæque, quæ tractu temporis à leni occasione excoriantur.

Deinde & hoc ij monendi sunt, qui sæpius se vlcera pulmonis & phthisicos sanasse dicunt, vt attendant, ne decipiantur, & pulmonem exulceratum putent, cum tamen thorax saltem laborauerit: aut catarrhus & pituita in pulmonibus in similem puri substantiam illæsis pulmonibus mutatus sit.

QVÆSTIO II.

An in phthisi cocheæ viles sint.

Antiquiores equidem, qui denatura & facultatibus limacum scripserunt, Dioscorides, Galenus, Aëtius, P. Ægineta, Orbasius, non meminerunt, quod phthisicis prosint: Recentiores tamen, & superiorum sæculorum Medici eas phthisicis & hecticis commendarunt, adducti procul dubio autoritate Galeni, qui 3. de alim. facult. cap. 3. limacum carnem potentissimè nutrire affirmat.

Verumenimverò, cum, vt ibidem Galenus & res ipsa docet, caro cochlearum sit difficilis coctionis, & succum non adè bonum præbeat, facile hinc patet, cochlearum carnes phthisicis pro cibo non conuenire. Cum enim phthisici febre lenta putrida laborent, & propterea vis naturalis in ventriculo, hepate, in toto corpore sit debilis, cibum difficilis coctionis rectè concoquere non potest, atque hinc multa excrementa cum alibi, cum in pulmonibus

An cochleæ phthisicis viles sint.

Quomodo vlcera pulmonis insanabilia dici possint.

Feb. longa
puriora
laborem
phthisici

etiam colligi necesse est; imprimis eum ex se succum bonum non præbeant. Ideoque, quod in vulneribus accidit, quod nimirum, si ægri cibis mali succi utantur, copiosior sanies generatur: idem in pulmonis ulceribus euenire credibile. Cum verò ob pus imprimis phthisici periclitentur, limacum etiam vsum is potius nocere, quam prodesse vero consentaneum est. Et quanquam iuscula ex iis parata, & parsilla, quam Aristoteles, lib. 4. de histor. animal. cap. 4. præcipit, id est, papauer appellauit, dentibus statim cedens, & caseosæ substantiæ paulo magis duratæ, siue factæ nuper è fapis ceræ non ab similibus facilius concoquatur: tamen saltem respectu aliarum cochleæ partium est facilioris coctionis: absolute verò & simpliciter facilis coctionis non est; succi verò, quam aliz cochlearum partes, est melioris, & crassum ac melancholicum nutrimentum præbens.

inquietudo suisque inexhausta commiratur. Respiratio est frequens & celeris, & in thorace maximum incendium, vnde calidum spiritum efflant ægri, & frigidi æris inspirationem desiderant. Dolor est exiguus, & saltem molestia quædam in inspirando ad stethum percipitur. Et si enim locus affectus sit pars membranosa, tamen dolor non est pungens, ut in pleuritide, quoniam non ut pleura ita in costis firmatur, sed in laxa parte thoracis consistit: ad stethum saltem dolor quidam percipitur, quoniam ibi alligatur hæc membrana. Tussis in principio in quibusdam est sicca, post humida, & rubra quædam ac flaua reiciuntur, plurima tamen flauæ coloris, paucissima rubri, verum non ad modum copiosa, quia inter duplicem quasi membranam materia colligitur, vnde non facile nisi ea erosa euacuatur. Pulsus qualis pleuritico- rum, durus & inæqualis, non tamen æquè manifesta inæqualitate, sed aliquanto maiore.

Si in pericardio affectio fuerit, aderit æstus, & phlogosis maior, ad syncopen laborans faciliè & frequentè accedit. L. Mercat. lib. 2. de morb. int. c. 6. p. 158.

Tregnestum.

Plerique hoc malo correpti moriuntur. Estque hic morbus, quam pleuritis vehementior, cum locus affectus cordi sit vicinior. Et si protrahatur, ægri phthisi correpti tandem moriuntur.

Curatio.

Curandi ratio eadem ferè est, quæ inflammationis pulmonis & pleuræ. Sanguis nimirum & humores ad mediastinum fluentes euacuandi, reuellendi, repellendi, & per spu-

C A P V T XIII.

De Mediastini inflammatione.

Inflam-
matio
Mediasti-
ni.
Causæ.

Mediastinum seu septum, quod pulmonis lobos disiungit, & ipsam inflammationem interdum patitur, oriturque ea præcipuè à sanguine, eoque plerumque bilioso. Ideoque causæ, quæ peripneumoniam & inflammationem pulmonum excitare solent, & hic locum habent.

Signa diagnostica.

Febriis adest continua & ardens, cum cor ob inflammationem vicinam valde incalescat, quam magna

Prognosis
sicum.

Curatio

tum euacuandi. Ideo quæ statim in principio vena aperienda, & sanguis satis copiosè euacuandus & venæ sectio, si vires ferant, vel eadem vel sequenti die repetenda, cum venæ sectio non saltem euacuet, sed & reuellat & refrigeret.

Venæ sectione autem adhibita, cā pectori applicanda, quæ feruorem humoris mitigant, sanguinemque aliquo modo reprimunt, medicamenta scilicet, quæ frigida quidem potentiā sunt, sed astrictione carent, ut facilius penetrare possint. Quem in vsum commodissimè adhibetur oleum violaceum, quo tepido torum pectus inunctum, vel panni eo imbuti pectori imponantur.

Si tempus æstiuum sit, & inflammatio erysipelatodes, etiam actu frigidum adhiberi potest. Et si enim frigida aliā thoraci sint inimica, & in pleuritide frigida actu non adhibeantur: tamen quia hic incendium magnum est, & inflammatio est in penitioribus thoracis partibus, frigida non facile ad locum affectum penetrant. Oleo violaceo admisce-ri potest lac recens & aqua endiuivæ, vel paretur cataplasma ex farina hordei, cum succo endiuivæ, & la-duc. & oleo violarum.

Vbi incendium non nihil remisit, ol. chamæmel. admisceatur, ut & mucilagines, sem. althææ, malu. fœnig. & similes.

Interim etiam propinentur ad materiam alterandam & expectorandam aqua vel decoctum hordei, violar. de iuiub. de glycyrrhiz. de ruffilag. Syrupi tamen in minore quantitate admisceantur, cum saccharum faciliè bilescat.

Tandem etiam ad reliquias materiz ducitendas extra applicetur ca-

taplasma, ex rad. albæ, violar. scabiosæ, caricis. Quibus coctis & contusis addatur, farina sem. lini. sanguic. pulv. flor. chamæmel. & cum oleo chamæmalino & amygdal. dulc. F. cataplasma.

Quod si materia hoc modo euacuari vel absorbi non posset, non pianè incommodum esset, perforato sterno materiam purulentam extrahere, quod etiam Columbus, lib. 11. anat. cap. 3. monuit.

Dixit ratio sit eadem, quæ in peripneumonia & pleuritide.

CAPVT XIV.

De Diaphragmatis tumoribus,
& primò de inflammatione.

Diaphragma etiam interdum tumoribus corripitur, & quidem nunc calidis & inflammatoriis, nunc frigidis & diuturnis.

Diaphrag-
matis in-
flamma-
tio.

Inflammationem diaphragmatis attinet sit ea à sanguine calido & bilioso eo modo & iis de causis, ut aliarum partium inflammationes. Crassior enim in membranam densam sese non facile penetrat.

Signa diagnostica.

Coniungitur autem cum hac inflammatione febris continua & acuta non solidum ratione humoris calidi, qui tumorem hunc excitat, sed ob vicinam cordis & connexionem cum eo per arteriam magnam. Adest dolor & respirandi difficultas, ac respiratio est parua & frequens, antequam delirium accedit, ut & pulsus, ut docet Galenus, libr. 3.

signa.

de loc. affect. cap. 3. Præcordia tendantur nullo tumore in hypochondriis apparente, ad locum diaphragmatis apparet interdum quædam palpitatio vel saltus quasi, ut docet Hippocrates, 3. *prognost. c. 91.* Galenus *comm. & 1. epid. comm. 3. c. 18.* Procedende malo, quia cerebrum à diaphragmate, quod membranosum est, in consensum trahitur, delirium continuum excitatur, quæ de causa veteres etiam diaphragma *ephras*, appellarunt, quod eius inflammatio mentem turbet, & delirium excitet. Respiratio est inæqualis, modò parva, modò magna, modò frequens, modò rara. Solent etiam nonnunquam accedere convulsiones, ut Gal. 4. *de pulsibus, de pulsu inflammatorio* docet. Et tum pulsus sit durus, parvus, creber.

Prognosticum.

Prognosticum.

Inflammatio hæc pleuritide adhuc periculosior est, & plerumque ægrum ad mortem deducit, ob connexionem & consensum, quem hæc pars habet cum corde, cerebro & hepate. Unde acutissimus hic morbus est, & ægrum citò in summum vitæ discrimen adducit, curationemque reddit difficiliorem, quòd ægri delirant, nec faciliè Medicis in fumendis medicamentis obtemperant.

Curatio.

Curatio

Communes inflammationes curandi leges & hic locum habent, & scè eadem huius inflammationis curandæ est ratio, quæ peripneumoniz & mediastini inflammationis. Itaque statim in principio aluo clyster emolliens & refrigerans iniicitur, & hinc vena brachii dexteri aperitur, ac si vires tollerent, vel eodem, vel sequenti die, venesectio repetatur.

Externa.

Externa thoraci ad locum diaphragmatis apponantur ea, quæ fervorem humoris mitigare, sanguinemque effluentem repellere possunt, potentia sunt frigida, actu verò subcalida. Igitur inungatur locus oleo rosaceo; vel fiant epithemata ex decocto herbarum refrigerantium, violend. lactuc. & similibus. In progressu morbi addatur oleo ros. chamæm. & epithem. malv. alch. chamæm. melil. sem. lini, scæn. Ob delirium lotiones extremorum ex refrigerantibus herbis instituantur, quæ actuali caliditate revellere à capite & potentiali frigiditate humores demulcere possunt. Syncipiti, temporibus & fronti etiam ea applicentur, quæ somnum conciliandi vim habent, ex suprà l. 1. p. 1. *propos.* De tumoribus diaphragmatis frigidis.

Generantur hi tumores à materia cruda & tenui. Crassa enim & viscida non possunt in diaphragma ob eius densitatem penetrare. Dantque occasionem materię collectioni percussio vel compressio diaphragmatis, qualis etiam fieri potest, si quis inter scribendum vel legedum mensæ sæpe pectore innitatur.

Tumores diaphragmatis frigidi.

Signa Diagnostica.

Si tumor sit frigidus in diaphragmate, malum est diuturnius, adest tensio hypochondriorum, nullo apparente in his tumore ad tactum, & spitandi difficultas, pulsus est durus & parvus, dolor adest, sed non ita magnus, adest febris, aut si febris accidit, non est acuta, delirium etiam adest, & non nisi morte instante interdum accidit.

Prognostica.

Prognostica.

Prognostica.

1. Si morbus sit recens & adhuc in fieri, ægri interdum sanari possunt.
2. Si verò malum sit diuturnius, ægrum ad tabem deducit.

Curatio.

Curatio.

Principio ne maior materiæ fiat affluxio, materia affluens debito modo præparanda & euacuanda, ut cum materia ista sit pituita aquosa & serosa, medicamentis, quæ pituitosum & serosum humorem euacuant, agarico, mechoacanna, turbiti & similibus utendum. Et si quæ causa addit, ob quam talis materia in visceribus generetur, ea tollenda, & viscerum debilitas, vel obstructio corrigenda.

Vniuersali corporis euacuatione præmissa materiam discutientia simulque emollientia, (nam sensibilibus eam euacuentia hic locum non habent) usurpanda, ut butyrum recens, pinguedo gallinæ, anseris, medulla vitulina, ceruina omnes recentes. Progressu autem temporis validiora discutientia adhibenda, ut oleum chamæmel. anethin. vel sem. lini, fœnigræci, quibus aliquid terebinth. vel ammoniac. addi potest. Utile est & emplastrum de meliloto. Vel ℞. *Malug. alibæ. betonic. organ. ana. M. j. sem. anisi, fœnicul. carui, an. 3. j. flor. chamæmel. verbasci, ana M. ss. f. sacculi duo ex linteo albo, qui coquantur in vino, & expressi ac calidi alternatim pectori imponantur.*

Intrò exhiberi possunt digentia & discutientia ex rad. tussilag. helen. capillo. ♀, marrubio, hyssopo,

po, scabiola, sem. vitiæ & simil. Vel exhubeatur decoctum farisæ parillæ cum pectoralibus. Non tamen nimis tarde, ubi humor iam induratus cœperit. Ita enim tenue discutietur, crassum verò magis induraretur. Sensibilis verò euacuatio, ut dictum, hic sperari non potest: cum diaphragma à parte superiore pleuræ à parte inferiore peritonæo cingatur & inuestiatur. Nisi forsan abcessu rupto in cavitatem thoracis effundatur, & inde per tussim exiciatur. Quod si fiat, malum reliquum ut pyemæ curandum est.

Dietæ:

Victus ratio sit attenuans, non tenuis; cum morbus sit diuturnus. Cibus sit boni succi, facilis coctionis: alius sit laxa, ac si subsistat, sæpe clysteres iniciantur.

CAPVT XV.

De vulneribus Diaphragmatis.

Vulnera diaphragmatis.

Cum diaphragma vulneratum est, potest sensus eo loco molestus est, tussis & dolor eò loci percipitur, ut sæpe delirium accedat. Ritus adest cum perturbacione; illa sursum conuelluntur ad eò, ut respirandi vehementia contingat: Aliquando ventriculus & intestina per vulnus in thoracis cavitatem rapi solent. Cuius rei historias duas recenset Ambrosius Paræus, lib. 9. chirurg. cap. 30. Memorabile & singulare huius rei exemplum etiam Historia annotauit Dominus D. Andreas Schato p. m. Socer meus, quondam academici huius Professor.

Historia diaphragmatis vulnerati.

Est autem tale. Anno 1582. die 20. Septembris Studiosus quidam Henricus Buscherovius, Riualensis

Liunus, cum melancholia variisque tentationibus vexatus esset, ante portam oppidi huius proprio gladio se confodit, vulnere intra quartam costam in thorace adacto, & sub nona costa in tergo gladio penetrante: quod vulnus tamen intra duos menses sanatum fuit, ut æger satis bene sibi habere videretur. Verum accidit, ut post menses aliquot iterum absconditis cogitationibus vexaretur, & postea 28. Aprilis, Anno 1583. male habere inciperet, & seqq. diebus mense Maio nigra quater, eaque magnâ copiâ vomitui reijceret, cum sudoribus frigidis & lipothymia, tandemque post vltimum vomitum expiraret. Corpore aperto deprehensum est vulnus per diaphragma & pulmones penetrasse, & quidem diaphragma transfossum fuit in ipso nervo circulo. Pulmonis ferè nihil repertum est in sinistro latere confosso, cum proculdubio is correptus cum pure feiectus fuerit. Exigua saltem particula aderat costis aduata. Venter totus ascenderat in sinistram thoracis latus, & cor cum capsula sua depulerat in dextrum latus, ubi & viuis ille post acceptum vulnus iubeat observare pulsus cordis. Cor aridum & tabefactum erat, copiosa autem aqua in capsula cordis. Omentum & pancreas eorum & ferè circa ventriculum computruerat.

Habentur autem diaphragmatis vulnera sanabilia, si saltem pars carnosâ diaphragmatis sauciata & perfossa fuit, et si conglutinatio sit difficilis ob perpetuum motum diaphragmatis. Si verò in nervosâ eius parte vulnus sit, insalubre habetur. Verum Galenus, 6. aphorism. 18. docet etiam nervosarum partium

vulnera, si non sint magna, quâdoque sanari posse, & proinde & diaphragmatis vulnus in parte nervosâ, si magnum non sit, consolidari aliquando potest.

Exemplum talis vulneris est apud Hippocratem. 5. epid. Cum enim Tychon in oppugnatione circa Datum catapulta vulnus in pectus accepisset, paulò post parvus risus ei aderat cum perturbatione. Videbatur autem Medicus, cum lignum eximeret, circa septum transversum hastilis partem aliquam reliquisse. Primam noctem implacide egit, sub diluculum melius habere visus est. Prædictum est, convulsione accedente celeriter peritum. Posteriore die implacidus insomnis egit, & sub tertij diei exortum convulsione tentatus tum temporis mortuus est.

Ratio curandi eadè est, quæ pulmonis & mediastini vulnerati.

CAPVT XVI.

De Plenritide, seu inflammatione pleuræ & musculorum thoracis.

INflammatum sæpè & pleura seu Pleuritis membrana costas succingens, musculique intercostales; quod malum Græcis pleuriticis dicitur, & pleuriticis, qui inflammatione pleuræ laborant. *Bassii*, etiam antiquis dicuntur, qui ex lateris aut pulmonis inflammatione, repente difficultate spirandi suffocati latera liquida habent, tanquam plagâ percussis aut siderati. Hippocrates, 1. de ratione victus in acutis aphorism. 35. & in Coacis vulnera dimidium. In

Diaphragmatis
vulnera
quomodo
sint sanabilia.

pleuriticis enim, si subito difficultate spirandi suffocentur, ut in peripneumoniacis sanguine inflammationis in cutem diffuso liuor fit, totumque latus, in quo fuit inflammatio, post mortem liuescit, eodem modo sicuti in apoplecticis & epilepticis idem interdum accidere videmus.

Est videlicet pleuritis, eaque vera & exquisita (nam dari & notam infra de dolore lateris dicitur) inflammatio membranae costas succingentis, quae quandoque pulmوني communicatur, ex affluxu sanguinis per ramos seu venae cauae ascendentes, seu ἀνατομίας, eo impulsu ortum habens, cum febre continuā acuta, dolore lateris pungente, tussi, pulsu duro, celeri ac frequenti & difficultate spirandi. An verò pleuritidis etiam fieri possit, sine notabili & manifesta inflammatione pleurae, dicitur infra *quaestione 1.* Sub pleuritide rectè etiam comprehenditur inflammatio musculorum *μυοπleuritis*, praesertim interiorum, ob pleurae ex vicinia consensum.

Datur deinde & notha pleuritis alia quaedam, quodammodo talis sed & ipsa vera inflammatio, ratione situs, & partis affectae saltem notha, quando sanguis, per ramos venae axillaris in extrema thoracis sparsus, in musculos illos externos, qui costis & musculis *μυοπleuritis*, extra incumbunt, illabitur, quae ob communitatem propaginum venarum externarum & internarum, (cùm interiorum venarum extrema foras emergant, & externarum ora intrò subeant) saepe in pleuritidem veram permutatur.

Quaeritur autem pars in pleuritide afficiatur, an sola scilicet pleura,

an verò etiam pulmo, & antiqui & recentiores dubitarunt, diciturque de eo infra, *quaestione secunda*. Ut rem hic breuibus complectamur statuimus, non quidem in omni pleuritide necessarium pulmonem affici semper tamen ferè hoc accidere, ubi superior pleurae pars afficitur. Est enim pleurae cum membrana pulmonis communio, & praecipue versus collum, & circa exortum asperae arteriae per fibras multas cùm pleura pulmo cohaeret, Imò, ut supra *cap. 10.* dictum, scribit Nicolaus Massa, in sua *introductione anatomiae cap. 29.* se ferè semper inuenisse adhaerentiam pulmonis cum pleura, & non sine difficultate partes superiores pulmonis à pleura separari. Itaque faciliè fieri potest, ut si sanguis in pleuram praeter naturam influat etiam simul in pulmonem effundatur. Atque cum sanguis & sputum, quod tussi reicitur, non tam à pleura, quàm à pulmone simul affecto provenit. Si verò inferiores pleurae partes afficiantur, non necessarium est, pulmones simul affici, cùm ibi nulla pleurae & pulmonum sit communio.

Causa.

Causa proxima.

Est autem inflammationis pleurae, ut omnium aliarum inflammationum, causa proxima sanguis, siue sincerus & purus sit, siue humores alios admixtos habeat, quidè vasis thoracis loca haec nutrientibus, ex fureculis scilicet & ramis venae cauae ascendentes, per ramum subalarem, venasque mamarias, quibus nutriuntur costae quatuor superiores, vel ex ἀνατομίας ramis, quibus reliquae octo costae inferiores nu-

Quaeritur
afficiatur
in pleuri-
tide.

triantur, et effunditur. Refert tamen Vesalius, *lib. 3. cap. 7. de fabrica corp. humani*, se in quibusdam corporibus talem constitutionem venarum reperisse, ut omnes thoracis costæ ab eius ramis nutrimentum accipere potuerint. Sed & pleuritidem nonnunquam à sanguine ex arteriis (quibus membranam hanc destitui non rectè sentit Mercatus) quæ venas hæc comitantur, in membranas effuso excitari posse à vero alienum non videtur. Frequentius tamen humores calidi, tenues, biliosi & acres sanguini permixti, pleuritidem pariunt, aut aliorum humorum sunt vehiculum; cum vasa quæ membranam hanc pertingunt, sint parua ipsaque membrana densa. A sola verò bile, pituita vel melancholia pleuritis non generatur.

Bilis, pituita vel melancholia sola pleuritidem non generat.

Est enim pleuritis inflammatio cuius causa proxima est sanguis, & proinde sine sanguine reliqui humores pleuritidem non excitant, etsi sanguini pleuritidem parienti admisceri possunt, ut ita sanguis inflammationem producat modò purus sit, modò bilem, vel pituitam, vel melancholiam admixtam habeat. Quamquam verò Galen. 3. *aph. 33.* scribit, pleuritidem aliam cum flauis & tussis sputis esse, eamque ex biliosis humoribus ortum habere; aliam cum spumeis, eamque ex pituitosis provenire; aliam cum nigris, eamque ex melancholia, aliam cum cruentis, eamque ex sanguine: tamen id saltem accipiendum est de humore vicioso sanguini permixto, cuius signa ex sputo deprehenduntur. Postquam enim ubi pleuritis coqui incipit, non sanguis crudus, sed alteratus & in substantiam al-

bam redactus reiiicitur: Si sanguis is laudabilis sit, copiamque potius quàm qualitate peccet, in principio quidem sputum tenæ rubrum reiiicitur, paulò post verò album. Si verò alius humor admixtus sit, quem natura ut mox dicitur, præcipuè expellere nititur, non planè album, sed flauum vel alterius coloris, pro humoris peccantis ratione.

Causas remotas quod attinet, *Causa remota.* aliarum materiam suppeditant, aliarum eam vomunt, ut ad pectus fluant, faciunt. Antecedens causa materiam suppeditans est cacochymia, vel plethora seu in toto, seu in parte aliqua.

Et quidem frequenter pleuritis generatur, cum viciosi humores in venis febres continuas accendunt, quorum pars ad thoracem effusa pleuritidem facit. Natura enim animalis salutem intentionem non solum perfectæ coctione humores viciosos à corpore expellit, & perfectas crises instituit, sed quandoque etiam vel copia, vel prauitate humorum stimulatà initio tales humores aggreditur.

Et quidem rectissime agit, dum tales humores planè eiicit atque exterminat. Si tamen quacunque de causa id præstare nequeat, à conatu suo non statim desistit, sed ut vasa communia & cordi vicina, regionem quasi corporis sedem & vias publicas, ab humoribus viciosis repurget, ad minores venas & partes priuatas ac remotiores eos depellit: quæ si sint ignobiliores, ut glandulæ sub cute & ipsa cutis, ea suum finem assequitur, & id in ægri commodum cedit. Si verò quacunque de causa in partem aliquam nobiliorem, aut quæ nobilem in con-

sensum trehere possit, materiam detradat, sine suo frustratur, & febris inde non leuior, sed grauior ac periculosior redditur. Quia de re insignis est locus apud Hippocratem, lib. 4. de morbis. *Quicquid, inquit, in morbo copiosè abundat, dum turbatio in principijs contingit, ad locum fertur, in quo plurimum superat. In turbatione autem amplam capacitatem naturæ secretum voluit, & corpus calefacit, aut in aliqua corporis parte adhaerescens, unde cum alio humore, qui in alio loco est dolorem & calorem exhibet. Quod verò incalcescit, reliquum etiam corpus calefacit, ex eoque febris contingit, serèque ex bile, pituita & sanguine oritur, quæ calidissima existunt. Et si quid horum in aliquam corporis partem incubuerit, plerumque inde morbus nominatur, & appellationem habet.*

Febres
pleuritico-
rum
quales.

Itaque etsi antiqui febres, quæ pleuritidem, vt & anginam, peripneumoniam & similes partium internarum inflammationes coniungas habent, pro symptomatibus agnouerint, vt symptomatum more inflammationi, vt morbo primario, succrescere crediderint, aded quidem, vt referent, 4. aph. 73. eos, qui propter lateris aut pulmonis, aut alterius eiusmodi partis inflammationem febricitarent, iam non febricitantes appellauerint, sed pleuriticos aut peripneumonicos, aut similibus aliis nominibus nuncupauerint; tamen si quis rem diligenter perpendat, animaduertet, non febres ab hisce inflammationibus, sed potius inflammationes istas à febribus eo, quod dictum modo suam originem habere. Experientia enim testatur, quod pleuritis & eiusmodi alie inflammationes non præcedant febre, sed febris inflammationem,

aut certè febris simul cum inflammatione incipit, animaduertimusque materiam, inflammationis causam, non in parte inflammata fixam consistere & caloremp. u. à se diffundendo febrem accendere, sed sæpè vegam & quasiurgentem hinc inde vagari: id quod ex morborum, qui febres hæc comitantur, commutationibus patet, quod ex pleuritide & peripneumonia angina sit, ex peripneumonia phrenitis, materia ex vna parte in aliam translata, vt ex 5. aph. 10. & 7. aph. 11. & 12. videre est. Atque hinc sæpè accidit: vt inflammationes tales aliarum febrium acutarum more per vniuersales euacuationes & crises soluantur, & coctionis humorum signa in vrina conspiciantur.

Et tales pleuritides sunt plerumque ex, quæ aliorum epidemiorum morborum more plurimos corripiunt, & cum malignitate coniunguntur sunt, & quæ à causis communibus & malignis ac contagio ortum habent. Vt enim venena alia aliis partibus infesta sunt: ita materia maligna, quæ morbos epidemios parit, nunc huic nunc illi parti magis infesta est, & nunc pleuritidè, nunc anginà, nunc phrenitidè, nunc dysenteria, nunc alios morbos gignit.

Ad pleuritidem autem excitandam, facere possunt omnes causæ, quæ ad plethoram & cacochymiam generandam faciunt, vt suppressæ sanguinis consuetæ euacuationes per nares, menses, hæmorrh. item humorum vitiosorum qui ad articulos depelli vel per vlcera inueterata euacuari solebant, retentio & alui fluxus intempestiua detentio, sicut ex dysenteria intempestiue suppressæ pleuritidem excitatam fuisse sæ-

pius obseruatum est. Et in summa sex rerum non naturalium usus immo-deratus, qui plethoram & cacochymiam excitare valet, huc pertinet.

Vt autem seu sanguis abundans, seu vitiosi humores ad pectus fluant, & actu ad pleuritidem excitent, facit pectoris debilitas ad materiam alyuē facile suscipiendam apta, vel à primo ortu, vel à morbo aliquo contracta; calor aut dolor attrahens. Huc faciunt quæ sanguinis ad latum affluxum concitare valent, ictus, casus, contusio pectoris, vehemens exercitium, æstus humores fundens, frigus exprimens, vini meracioris ingurgitatio, potus frigidae precipue post excrecitiā, flatūs Aquilonij post Austinos, 3. *aph.* 5. corporis post sudorem in aëre frigido denudatio.

Differentia.

Diff. ren. ue. Pleuritidis differentia à nonnullis plures recensentur, præcipue, & quæ ad curationem aliquid faciunt, sunt, quæ sumuntur à loco affecto & causis. A loco affecto & doloris situ ex 2. *de rat. vi&us in acut.* r. 10. & 11. diuiditur pleuritis in ascendentem, cum dolor ad superiora & iugulum versus hypochondria vergit. Nonnunquam etiam versus dorsum magistendit, cuius mentionem facit Hipp. *lib.* 3. *de morb.* nunc magis versus anteriora.

Ratione causæ secundum sanguinis inflammationem patientis varietatem est differentia. Sanguis enim modò purus est, modò ei bilis, quod plerumque accidit; modò pituita, modò melancholia admiscetur.

Est tamen illa differentia notatu digna, quod pleuritis alia dicitur sicca, in qua nihil, vel parum omnino & nullius momenti exspuitur, non solum in morbi principio, sed

etiam in eius progressu; quod vel ob humoris cruditatem, vel eiusdem crassitiem & visciditatem, vel facultatis imbecillitatem, vel doloris vehemenciam, vel propter bronchiorum obstructionem accidere potest: alia verò humida, in qua sputum mox circa principium apparere ineipit, 1. *de vi&it. rat. in acut.* 21. & 23.

Signa diagnostica.

Signa pathognomonica, quæ in signa omni pleuritide animaduertuntur, ipsiusque ideam complectuntur, & à Gal. 5. *de loc. aff.* r. 8. 1. *aph.* 12. & *de constit. art. med.* l. 15. recensentur, sunt 1. dolor lateris acutus, qualis membranæ fieri solet, à sanguine in eam effuso ortus, qui & vicinas partes nunc versus iugulum, nunc versus hypochondria extenditur, quod membrana hæc totam thoracis cavitatem inuestiat. Atque doloris ratione peripneumonia à pleuritide discernitur, & peripneumonia sola lateris dolor est exiguus vel nullus; quod tamen tunc solum verum esse putat Platerus, cum pulmonis interna magis quam externa inflammantur. Si enim ad externa usque extendatur inflammatio, non solum fibris, quibus succingenti membranae annectuntur pulmones, contractis, sed & inflammatione succingenti membranae communita dolores in latere excitari existimat.

2. Febris continua acuta, ex phlegmone in loco cordi vicino accensa, sæpè verò ex natura sua talis & ante phlegmonem orta, quæ tamen accedente pleuritide & inflammatione rursum ab ea incrementum sumit atque augetur. Atque febris

hæc plerumque tertia typum obferuat, quod frequentiffimè pleuritides à fanguine biliofo ortum habeant.

3. Respiratio difficilis, frequens, parua, quia ob inflammationem & dolorem inftrumenta respirandi fatifcisci nequeunt. Itaque cùm vfu magnitudine fatifcisci nec poffit, defectum in magnitudine per celeritatem & frequentiam natura compenfare ftudet. Et ob dolorem natura cogitur, vt ad fecundam refpirationem ftatim pergat, cùm primâ, vt pote nimis parua, vfu fatifciftum non fit. Nam velocitas non ita dolorem parit, ficut dilatationis magnitudo; cùm hæc motus vehementia partem dolentem diftendat, illa breui tempore motum efficiens ad quietem felinet.

4. Pulsus eft durus, paruus & frequens, ob tensionem arteriæ & quia membrana dura & denfa, inflammata non permittit arterias ita diftendi, quemadmodum calor & vfu id requirit. Ideoque pulfus fit celerior & frequentior, atque ea pulfus differentia oritur, quæ à Medicis ferrina nominatur, eo quòd, dum pulfus tangitur, ferræ dentes repræfentat, cùm alia pars attolli, alia non attolli videatur.

5. Tuffis ægro valde molefta eft: quæ accidit tum ob tumorem, membranam, quæ costas fuccingit, occupantem, qui cùm minus liberum fpatium, in quod diftendantur, fpirandi organis permittat, natura ad expellendum id, quod impedimento eft, infurgit; tum quia portio aliqua materiæ pulmoni communicatur, quæ cum fputo per tuffim excernitur. Et quia initio à loco inflammatio parum exit, plerumque initio

tuffis ficca eft, poftea humida, materia copiofiore penetrante, fputumque coloratum & cruentum apparet. Quando autem pulmones fimul inflammantur magna materiæ pars à pulmone prouenit. Quod autem fputum à pleura in afperam arteriam proueniat, & hinc per tuffim excernatur, de eo dicitur infra, *queft. 3.*

Atque qui hæc figna pathognomonica diligenter in confpectu habet, facile veram pleuritidem ab aliis affectibus omnibus, qui cum ea fimilitudinem habere videntur, difcernet. Neque enim vllio alio morbo omnia hæc fimul reperiuntur. In notha quidem pleuritide, quæ fit ab inflammatione mufculorum intercoftalium & externæ partis thoracis, febris vel nulla adefit, vel non adeo acuta tuffis, nifi forfan aliquid à capite deftillet, eft nulla, & nil, præfertim cruenti, excernitur. Pulsus non percipitur adeo tensus & durus: dolor eft mitior, ifque pulfans, non pungens, & neque ad iugulum, neque ad inferiora extenditur, locufque manu preffus dolet; nonnunquam & dolor foris apparet, qui fuppuratus per cutem erumpit, teftè Galeno, *5. de lor. affect. cap. 3.* Quandoque tamen accidit, vt in verâ pleuritide phlegmone verfus externos mufculos ob magnitudinem tendat, ac dolor etiam extrâ percipiat, atque ita pleuritidis nothæ fpeciem præ fe ferat: cùm tamen internæ inflammationis faltem incrementum fit. Itaque ad alia figna, ne faliamur, fimul refpiciendum.

Si dolor à ftatibus inter mufculos intercoftales & membranam concludus ortum habet, & fi aliquis fen-

Veræ & nothæ pleuritidis differentia.

sus punctationis adsit, nulla tamen adest febris, nulla tussis, nulla ferè respirandi difficultas, dolorque ferè est vagus, neque perpetuus, sed per intervalla recurrens, sæpe de vna parte in aliam transit.

Pleuriti-
dis & pe-
ripneu-
monix
differe-
ntia.

Inflammatiō verò pulmonis, seu peripneumonia valdè similis est pleuritidi nullus tamen, si solus pulmo inflammatur; dolor in eo percipitur, vel exiguus, & nullo modo pungens, isque non in lateribus, sed in medio potiùs thoracis; pulsus etiam non est durus, sed laxus & vndosus; difficultas spirandi maior, ut ægri sæpe rectâ cervice spirare cogantur.

Inflam-
mationis
diaphra-
gmatis &
pleuriti-
dis diffe-
rentia.

Ab inflammatione diaphragmatis differt, quod dolor in latere non vrgit, sed extrema costarum ad finem sterni dolent, ventrisque pars, vbi diaphragma est, turgit, deliriumque adest.

In mediastini inflammatione dolor non ita in lateribus percipitur, neque est extensus.

Hepatis
inflama-
tionis à
pleuriti-
dis diffe-
rentia.

Inflammatiō hepatis, quæ etiam habet quandam cum pleuritide similitudinem, ita ut Siculus Medicus, ut refert Galenus, *5. de loc. affect. cap. 3.* dum eam experiretur, pleuriticum se factum existimaret, à pleuritide differt loco doloris, qui perpetuò est in dextro latere, & circa dextrum hypochondrium collectus, neque is pungens est, sed grauius, tumorque infra costas nothas percipitur; pulsus est vndosus, non tentus, tussis est minor & sicca, respirandi difficultas quoque minor; vrina est citrina, alui excrementa languinolenta.

Signa hu-
morum
pleuritidis
patientium.

Quis autem humor pleuritidem pariat, tum ex signis humorum vniuersalibus, tum ex iis, quæ pleuritidem comitantur, & præcipuè sputo

cognoscitur, cum quo tussis reicitur pars eius humoris, qui inflammationem excitat. Si videlicet sanguis purus pleuritidem pariat, adest repletio & tensio venarum, maximè circa tempora & frontem, cum sensu grauitatis circa oculorum cauitates, & capitis anteriora, rubor faciei, sputum est rubrum & malum mitius. Si bilis adsit, sputum est subflauum, dolor admodum pungens, febris est acuta & ardens quæ ferè typum tertianæ feruat, sitis est vehemèntior, pulsus durior & velocior, vigilie & anxietudo maior, oris amaritudo, vrina citrina tenuior. Si pituita admisceatur, sputum albeat, viscidum & glutinosum est, febris est mitior & nimis acuta, quæ ferè typum quotidianæ obseruat & circa vespèram exacerbat. Si melancholicus, sputum ad nigrum & limidum tendit, nisi insignis corruptionis & pleuritidis lethalis sit iudicium, quod accidit, si præcessit sputum rubicundum, & postea nigrum sequitur.

Si malignus humor sputum plerumque è malo coloratum, adest magna virium deiectio, pulsus est languidus, & alia febrium malignarum symptomata apparent.

Tempora morbi huius ex sputo præcipuè cognoscuntur, ut docet Galenus, *lib. de cris. cap. 18.* Si enim sputum sit nullum, vel paucum, vel crudum, & cum difficultate reiciatur, morbus adhuc in principio est. Postea vbi sputum copiosius nonnihil & post tenue crassius exspuitur, idque facilius incrementum est. Quod si sputum iam coctum, id est, album, læue, æquale, consistentiæ mediocris, & quod facile reicitur, apparet, idque copiosius exspuitur, status est. Declinatio tandem, vbi

Tempora
pleuritidis.

post

post copiosius sputum paucius reicitur, & febris dolor, & omnia symptomata remittunt. Cum verò febris, quæ pleuritidi coniuncta est, non raro sit primaria, non symptomatice, coctioneni humorum etiam ex viris animaduertere licebit.

Differencia ratio-
ne lub.
iecti.

Ex delectus etiam, capite altero de pleuritide, signa, quæ ratione pleuritidis ratione lubiecti differat, proponit, quæ lectori perpendenda relinquimus. Pleuritidis, inquit, duplex est; altera quæ extenditur per partem interiorem omnium costarum. Altera verò quæ costam undique inuestit, tanquam periosum costarum, & in utraque membrana sit inflammatio. Distinguitur autem species ex decubitu. Nam si ager in partem affectam decumbere possit, & non in oppositam argumento est, affectum esse in membrana extensa, quæ hypochondria dicitur & hoc fit, quia cum in oppositam partem decumbit ager, pondere materia collectæ illa memorata diffenditur in agis, & dieluitur à costis. Illa autem, quæ fit in periosio, contrariò modo se habet. Nam in oppositam partem dormire possunt, in affectam verò minime. Sed quia hæc nota communis est pleuritidis vera & non vera, ob id aliam notam adiungere oportet ad distinctionem harum. Nam, si affectus, fit in musculis externis, si digito prematur, dolorem sentiunt. Quod non accidit his, qui inflammationem in periosio habent, nisi supra modum comprimatur costa. Fit etiam pleuritidis in musculis intercostalibus, quæ species pulsatione deprehenditur. In multa enim inflammatione costarum arteria comprimuntur, præterquam in inflammatione musculorum intercostalium. Hæc nota certissima deprehenditur, & in utrumque latus dormire possunt. Conveniunt omnes in

dolore punctoso, impulsu duro, in difficultate anhelandi, febre verò & sputo distinguuntur. Nam omnes inflammationes interna febrem habent, sed dolor lateris sine febre, à materia frigida vel flatulenta excitari solet. Nulla scilicet, nulla exspitio sequitur, quia materia in parte externa continetur. Omnibus aliis difficultas spirandi est maior, & dolor magis pungens, sputio magis sanguinolenta, vel flava, vel spumosa. In inflammatione membrana interna semper adest parva, aut multa in morbi processu. Nam in salubribus tantum mox apparet sputum. Verum in inflammatione musculorum intercostalium minor fit resudatio, ob id exspitio minor. In ea parte, quæ est in periosio, sæpe nulla apparet, & resoluitur per insensibilem transpirationem & sudorem modo misis sanguinis prohibueris incrementum. Nam talis inflammatio à pancamateria fit.

Pronostica.

1. Euentus pleuritidis triplex est: vel enim ad salutem, vel ad mortem terminatur, vel in alium morbum commutatur. Vt autem, quis euentus futurus sit sciamus, vires naturæ & morbi componere conuenit. Vires corporis ex actionibus corporis vitalibus, naturalibus & animalibus cognoscuntur. Quo enim ipse actiones rectius sese habent, eò maius naturæ robur significatur. Morbi conditiones autem etsi plurima signa ostendant; tamen inter ea in pleuritide signa coctionis & cruditatis sputi primas obtinent.

Prono-
stica.

2. Hinc crudæ pleuritides morbi diuturnitatem vel mortem; coctæ breuitatem & salutem ostendunt. Salutem quidem ostendit coctio, quatenus coctio; breuitatem verò, quatenus hoc vel illo tempore ap-

paret. Nimirum in omni pleuritide salubri sputum maturè coctionem recipere, & in calore ac substantia sese bene habere, ac faciliè & promptè excerni debet: & quò meliora coctionis signa adsunt, & quò citius sputa apparent, eò citius morbus terminabitur. De quo Hippocr. 1. ap. b. 12. *In pleuritide si sputum statim appareat in initio in tertium diem, breuem morbum indicat: sin verò posterius, longum.*

3. Periculosissima verò pleuritis est, in qua nihil exspuitur: (nisi tamen ita levis sit, vt insensibiliter vel per sudorem discuti possit.) Secundum locum obtinet, atque ita leuior est, in qua ichores tenues saltem exspuuntur: tertio loco est, in qua crassiora apparent; quarto, in qua sputum perfectè coctum apparet. Quod si circa tertium vel quartum diem contingat, morbus vltra septimum non extendetur.

4. De sputi conditione passim extant aphorismi apud Hippocratem. Flauam bilem sputo admodum permixtam apparere intra initia, bonum est; si mulo post apparet, malum: quia naturam nihil aduersus morbum rebellem tentare significat, 2. *progn. l. 44. & 45.*

5. Sputum flauum sincerum, aquositati multæ permixtum periculosum est; album verò, glutinosum ac rotundum inutile, 2. *prognost. aph. 46. Et 1. de rat. vietus in acut. l. 37.* Sputum glutinosum *αἰσθητός*, pleuridis signum habetur; cùm ex igneo calore materiam adurentem lentor & visciditas contrahatur: idque propterea alibi *αἰσθητός* *αἰσθητός*, *αἰσθητός*, nominat, id est, admodum glutinosum sine coctione. Quod enim coquatur, modicè glutinosum euadit. Hoc verò saltem ab adustio-

ne lentorem contrahit.

6. Malum quoque est *χρῆσις*, id est, æruginosum, vel admodum viride, & quod spumosum excernitur, 2. *progn. 47.*

7. Sputum nigrum sincerum pessimum est, *progn. 48.* Indicat enim & humoris prauitatem, & caloris natui extinctionem.

8. Nimirum quo humor mitior est, à quo pleuritis provenit, eò & ipsa mitior est. Mitior est, quæ à sanguine cum bile mixto excitatur. Contumax & diuturna est, quæ à pituitoso humore. Pessima, quæ ab humore melancholico & maligno provenit.

9. In pleuritide, vbi excretio dolorem, tussim ac spirandi difficultatem non sedat, malum. Copia enim vel malignitas materię, vel expultricis debilitas significatur.

10. Qui pleuritide laborant, nisi intra 14. dies supernè per sputum re-purgentur, iis in empyema sit transmutatio, 5. *aphorism. 8.* Aretæus tamen hic interdum vigesimum diem terminum constituit: & Galen- in *comm.* non solum empyema, sed quolibet in pus mutationē intelligit.

11. Materiam autem ad suppurationem tendere dignoscitur ex eo, quod sputum parcius eicitur, nec expectorandi finis est intra decimum quartum. Et cùm sit suppuratio, omnia symptona ingrauescunt, dolor, febris, linguæ siccitas, difficultas respirandi, sæpe etiam accedunt deliria.

12. Qui verò ex pleuritide empy- ci sunt, si in 40. diebus repurgentur à die, quo ruptio facta est, liberantur: alioquin in tabe transeunt, 5. *aph. 12.*

13. Pleuritis max n à ex parte die decimoquarto terminatur, aut si non hoc, saltem vigesimo & quide

si quarto die expuat æger album, læ-
ue, xquale, idque ter vel quater tuf-
fende, in septimo terminabitur. Si
in septimo tale sputum primùm ap-
pareat concurrentibus aliis bonis si-
gnis, morbus ultra vndecimum &
decimum quartum diem non exten-
detur.

14. Si tardius æger spueri cœperit,
tardior etiã morbi solutio erit. Con-
trã quo citius signa mala apparent &
ingrauescunt, eo citius æger moritur.

15. Præterea sunt & alia signa, quæ
ad euentum huius morbi significan-
dam faciunt. Maximum indicium ex-
timalis pleuritidis est, si pulsus sumo-
perè durus sit, & præterea etiam pa-
ruus, atque ob calorem frequentissi-
mus. Pleuriticus enim cum tali pulsu
nullus sanatus fuit, vt Galenus, 4. *de*
præfag. ex pulsa, cap. 5. scribit.

16. Quicunque dolor circa thoracẽ
& pulmonis sedem affligens neque
spuiti expurgatione, nequealui deie-
ctione, neque sanguinis missione, ne-
que medicamentis, neque victus ra-
tione desinit, cum in empyema con-
ueriti sciendum est, 2. *prognost.* 52. si
tamen nulla signa lethalia, aparent;
aliàs mors expectanda.

17. Ad salutem enim terminatur
pleuritis vel materiæ *expiræ*, atque
excretionem per sputum, quæ ratio fre-
quentissima est & tutissima, vel *dia-*
phræ atque discussione, cõpertum
que est, pleuritidẽ biliolam septimo
die indicatam fuisse per icterum, vel
euacuatione materiæ per hæmorrha-
giam narium, vrinam, aluum, sudo-
rem: vel permutationẽ in empyema;
vel, quod rarissimum est, per *puru-
len* materiæ ad articulos & glandulas
vel parotidas, *apb.* 38. *f.* 2. l. 5. *Concar.*

18. Hinc fluxus sanguinis è naribus
signum bonum est in pleuritide, vt &

hæmorrhoidum & mensium fluxus.

Et præcipuè si fluxus sanguinis in die
critico fiat, & post signa coctionis
accidat, bonũ præfagit, nec inhiben-
dus, nisi vires ad extremum deiceret.
Si verò in principio cõtingat ex mul-
titudine materiæ à natura gubernatæ
& anhelit° difficultas inde minuatur,
& febris vehemẽtia cesset, visilis quo-
que est. Si contrarium verò eueniat,
& symptomata non alleuientur, con-
tingit plerumq; ægrũ mori in quarto

19. Diarthram quidem, quando
superuenit pleuritidi vel peripneu-
moniz, malum esse, 6. *apb.* 16. scribit
Hippocr. sed hoc intelligendum de
pleuritide, in qua inflammatio tanta
est, vt hepate & ventriculo in cõsen-
sum tracto, nutrimentum non bene
concoquatur. Si verò pleuritis non
adeo gravis sit, nec hepar, nec ventri-
culus in cõsensum trahatur ob mali
grauitatem, aliquando bonum signũ
est, materia per aluum euacuata; ma-
ximè si coctionis signa adsint, nec
fluxus ab alia causa existat, cuius rei
historia habetur apud Valleriolam,
lib. 1. *observ.* 4.

20. Pleuridi si peripneumonia su-
perueniat, malum, 7. *apb.* 11. Fit enim
translatio materiæ ad membrũ no-
bile. Pulmonis tamen inflammatio-
nes, quæ ex morbo laterali permuta-
tionem accipiunt, iis, quæ ab initio
sunt, securiores esse, in *Codex conm.*
1. lib. 5. *sect.* 2. *apb.* 43. *apud Hollerium*
scribitur. Quod cur fiat, parum con-
stare scribit Hollerius. Desiderius la-
cotius verò locum hunc corruptum
& pro *peripneumonia*, legendum esse *peripneu-*
monia, putat. Forsan verò loco Hip-
pocrates non instruit collatio-
nem pleuritidis cum peripneumonia,
sed peripneumoniz, quæ per
se incipit, cum ea quæ pleuritidi

succedit. Et si enim bonum non sit, pulmonem inflammari sanguine à latere ad eum delato: tamen adhuc periculosus est, si ita *ἀρχῇ*, & per se peripneumonia incipiat. Tum enim toto impetu materia ad solos pulmones ruit. Si verò materia prius ad pectus feratur, in plures partes diffunditur, nec tanta inflammatio inde excitatur. Quando verò transit pleuritis in peripneumonia, dolor lateris cessat.

21. Si pleuriticus dolor ex sputis biliosis absq; ratione euauerit, & agri in delirium incidunt, *3. prover. c. 5.* Humor enim biliosus sursum in caput trahitur, & tum urina tenuis atque alba redditur.

22. Quando pleuritis accedit prægnantibus, periculosum est, sicut & senibus, cum in his ob virum imbecillitatem & caloris naturalis inopiam materia non concoquatur: utriusque verò phlebotomiani & victum tenuem, quæ in pleuritide maximè necessaria sunt, non faciliè ferant.

23. Pleuritis post alium morbum diuturnumque plerumque lethalis est. Periculosa, quæ in corpore cachecticum incidit.

24. Densa & exercitationi dedita corpora citius ex morbo laterali & pulmonis inflammatione intereunt, quàm quæ sine exercitatione degunt. *in coactis.*

25. Quibus in morbo laterali plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculisque aurigine suffusus & caligine obdusus, in his mors expectanda. *ibidem.*

26. Quibus in morbo laterali lingua circa initia biliosa est, hi, intra septimum indicantur: quibus verò tertio, aut quarto die, circa nonum.

27. Et ut signa reliqua etiam, quæ pleuritidi cum aliis morbis communia sunt, coniungamus, & quid de euentu pleuritidis sperandum sit, in summam quasi contrahamus, egrum conualitutum hæc significant. Leuiter & moderatè morbum perferre, corpus esse æqualiter calidum, ac molle, urinas & alui deiectiones, somnūque rectè sese habere, sitim esse moderatam, faciliè respirare, dolorem esse sedatum, sputum faciliè ac maturè excerni, idque in substantia & colore sese bene habere.

28. Contra mortem significant, Signa mortis. grauitate ac cum anxietate morbum perferre, corpus inæqualiter affici, ut si thorax & venter vratur, extrema frigeant, alui deiectiones, sudores non bene sese habere, non dormire, siti ardere, dolorem non sedari, nihil aut paucum & cum maximo conatu excerni. Delirium si accedat, cum septo affecto hoc contingere solcat, mortale est signum. Si urina tenuis & subtilis fuerit, nec habens aliam malitiam, indicat materiam raptam esse ad locum inflammatum, & plerumque mortem notat. Propria tamen signa maioris momenti sunt, & plus ad mortem significandam vnum proprium, quàm ad salutem plurima communia faciunt.

Indicationes.

Cum pleuritis si inflammatio, quæ Indicationes. ex affluxu sanguinis sit, ex quas inflammatio suppediat, indicationes & hic dantur. Humores videlicet affluxuri & affluentes reuelliendi; fluentes intercipiendi, repellendi, deriuandi; quod denique affluxit, & in parte inflammata habet, discutendum, aut quoquo modo è parte tollendum. Repellentibus tamen hæc & intercipientibus locus

Signa salutis.

non datur; cùm per ea materia ad interiora repelli & inflammatio augeri possit. Ideoque in pleuritide materia saltem affluxura & affluens reuellenda: & quæ quidem influxit, in venis tamen partis adhuc fluctuat nondùmque impacta est, deriuanda, & quod influxit discutiendum, aut si fieri non potest, maturandum concoquendum, & curandum, vt quàm primum tussis ac sputo reiciatur atque euacuetur.

Deinde dolor, si magnus sit, & ad sanguinis missionem non leniatur, mitigantia indicat.

Tertio cùm febris, quæ pleuritidi coniungitur, sæpe sit primaria, ea nõ negligenda, sed ei necessaria remedia adhibenda. Tandem quod in omni morbo fieri debet, virium habenda est ratio, & conueniens victus præscribendus. Quæ omnia quomodo expedienda sint, iam dicendum.

Curatio.

Curatio.

Atque à quo auxiliorum genere curatio inchoanda sit, an à fomentis discutiendis, an à purgatione, an à venæ sectione, inter auctores non conuenit. Hippocr. quidem, 1. de rat. viñtus in acut. 2. 1. scribit: *Lateris dolorem, si is per exordia fuerit, siue postea ortus sit, tentare medicamentis dissolvere, non absurdum est.* Aliis tamen hoc tutum non videtur; cùm eiusmodi calefacientibus auxiliis facile maior humorum affluxus concitari, atque ita inflammatio augeri possit. Verumeninverb non loquitur Hippocrates eò loci de pleuritide, seu inflammatione pleuræ in specie, sed in genere de lateris dolore, qui ab aliis etiam causis, & quæ fomentis discuti possunt, non solum ab inflammatione pleuræ ortum habere potest, vt infra, *part. 3. cap. 6. di-*

cetur. Ideoque in vera pleuritide venæ sectio, si vires eam ferant, deferenda, & fomenta præmittenda sunt. Nisi forsitan planè, vt Galen. 6. *epid. comm. 3. text. ult.* scribit, pleuritidis exigua & levis sit, neque à magno humorum affluxu oriatur, & fomenta ad humorem discutiendum sufficere videantur. Tum enim leuia fomenta adhibere conuenit, præsertim si à causa externa, vt à ære frigido pectus lædente, dolor excietur, absque sanguinis in reliquo corpore abundantia.

Fomenta.

Non fomenta duo commoda habent, & per ea materię parseuacuat, parq; affecta propter eam mindis distenta mitius dolet. Ita Galenus, *locomodo allegato*, euidem pleuritide laboranti venam non aperuit. Atque his fomentis si dolor mitiget, signum est, nullam adesse plethoram, aut pleuritidem potius notham esse, quæ à flatibus ortum habuerit. Itaque audacius tunc fomentis vt iacebit, quibus hoc, quod inflammatio nem aut dolorem parit, discutitur. In fomentis tamen illis adhibendis cauendum, non nimis calida & discutiencia sint, sed planè lenia adhibenda. Vnde etiam Hippocrates aquam calidam & milium applicat. Et ap- plicamus ista, vt & lac commodissimè in vesica, quæ pondere latus nõ grauat, vt vasa ænea. Videndum etiam, ne quæ calida admoventur, refrigescant: vnde linteis calidis fouenda. Si verò dolor augeatur atque acerbior euadat, indicio est, plethoram subesse, quam ad se trahant partes calefactæ, aut omnino, si signa ad sint certi sanguinis affluxus; tunc statim à fomentis desistendum, vel etiam fomenta planè omittenda, & aliqua euacuatio instituenda.

Fomentorum duplex, 66 modum.

Vtra autem præmittenda sit ve-

Veni præ-
mittenda
fit in
pleuriti-
de, venæ
sectio, an
purgatio.

Quæ præcipue orta est ex loco Hip-
pocrat. 2. de rat. viſtus in acut. 1. 10.
& 11. ubi ita ſcribit: Si dolor ad clavi-
culam perſeueret, aut moleſta ſit vel bra-
chii, vel manûs, vel partibus ſepto trãſ-
uerſo ſuperioribus grauias, internam
cubiti venam ſecare expedit. Si vero
ear, quæ ſub ſepto tranſuerſo ſunt, partes
dolor infeſtat, nullam ad claviculam
ſignum fecerit, ventrem vel nigro ve-
ratro vel poplii molliore oportet. Præte-
rea, vt alibi etiam dictum, pleuriti-
dis & talium inflammationum cauſa
principalis eſt plerumque cacochy-
mia, quam natura in principio fe-
brium talium è corpore depellit, aut
certo ad exteriora protrudere cona-
tur.

Verum Galeno, in comment. cui &
Paulus Aegineta, lib. 3. cap. 33. Rha-
ſes & alij Medici aſſentiuntur, tutius
videtur in vtroque caſu ſanguinem
priùs mittere. Eſt enim pleuritis
inflammatio cum febre acuta, in qua
ſecundùm Hippocr. 1. aph. 24. raro
purgandum, & quidem in initio &
cum ingenti præmeditatione; cum
ſine omni periculo ſanguinem mit-
tere liceat. Et ſic, vt in pleuritide
etiam purgatione opus ſit; venæ ſec-
tio tamen præmittenda, vt Hip-
pocrates, 4. de rat. viſtus in acutis,
1. 21. & Galenus, 6. epidem. comm. 1. 1.
6. docet. Venæ ſectione verb peten-
dà tutius medicamentum purgans
exhiberi poteſt, ſi cacochymia ma-
gna ſit, & illa præſertim in prima
corporis regione contineatur, aut eò
vergat, quod ex vomitu, alui excre-
mentis liquidis, anxietate & circa
ventriculum grauitate cognoſcitur.
Et Hip. loc. cit. non loqui videtur de
pleuritide propriè dicta, ſed vt modò
dictum, de dolore lateris in genere,
qui non ſolùm ab inflammatione

pleuræ, ſed & ab aliis cauſis ortum
habet, quod etiam Rondeletius,
lib. 2. cap. 15. animaduertit. Etenim
dolor, qui ſub ſepto tranſuerſo eſt,
non eſt in pleura, & intelligit pro-
culdubid Hippocrat. alium dolo-
rem, qui proſeuit ab affectu aliquo
in ventre inferiore eius partis, quæ
cum inteſtinis cõſenſum habet. Qua
de cauſa etiam purgantia exhibet.
Et Hippocratem de flatulento aliquo
affectu potiùs loqui, quàm de vera
pleuritide, patet ex eo, quod dau-
cum, ſeſeli, cuminum & aniſum ve-
ratro nigro, & poplio addit.

Tutiſſimum ergo & maximè ne-
ceſſarium pleuritidis auxilium eſt
venæ ſectio, quæ etiam ſummum
ægro commodum aſſert: modò ſan-
guis per venas affluat. Maximas
enim, vt etiam Heurnius exiſt mat,
pleuritides etiam naſci ſanguine ex
arteria aorta afluente verb conſen-
taneum eſt. Et cum non ſatis iuuat
venæ ſectio. Virium tamen habenda
eſt ratio, & an illæ venæ ſectionem
ferant, videndum. Et cum quædam
ſint, quæ vires robuſtas vel debiles
indican, quæri hic ſolet, an pueris
& ſenibus pleuritide laborantibus,
vena aperienda ſit? Item an graui-
dis pleuritide correptis venam aperi-
re liceat? & an mulieri, ſi ſub ipſum
menſium fluxum pleuritide corripia-
tur, ſanguis mittendus ſit.

Et primò pueros quod atinet, etſi
Auerrois referat, quod Auenzoar,
maximi apud Arabes nominis Medi-
cus, filio ſuo primo venam aperuerit,
aliſque idem ſexto anno & octauo
feciſſe legantur; ramen non faciliè id
tentandum, & vix ante annum 14.
vena aperienda, cum vices ea præ-
te debiles ſint, & ob molliem ac
raritatem aliàs inſignem diſſolutio-

Venæ ſec-
tio tutiſſi-
mum
pleuriti-
dis auxi-
lium.

Ante an-
num 14.
venæ vix
aperien-
da.

nem patiat. De qua re etiam in *Instit. lib. 3. part. 2. §. 1. cap. 17.* & de febribus *lib. 2. cap. 5.* dictum. Si tamen morbus valde urgeat, & puer sit pleno corporis habitu, ac sanguine redundet, corpusque non sit nimium molle, circa annum ætatis nonum vel decimum hirudines venis apponere licet. Ægyptiis hodie crurum scarificationem in talibus etiam in pueris in usu esse, in *Instit. lib. 3. 1. §. 1. 2. cap. 7.* ex Prospero Alpino dictum. Senibus autem, si adhuc validi sint, sanguinei, carnosique venam aperire nihil impedit, cum vires non annorum numero, sed robore ac corporis habitu æstimandæ sint.

¶ An verò gravidis & sub ipsum menses fluxum foeminis pleuritide correptis venam aperire fas sit, de eo in *Instit. loc. prius all. dictum.*

Quæ autem vena & quo in latere aperienda sit, non ita planum est ob plurimas & gravissimas hac de re motas controversias. Non enim solum antiqui (puta Græci, & Arabes) non planè inter se consentire videntur, sed superiore etiam sæculo hac de quæstione variè disputatum, atque vt Thaddæus Dunus *lib. 2. de art. ven. cap. 4.* hac de re scribit, acerrimè in hac controversia altercarum; ac doctæ res quique Medici, Itali, Galli, Hispani (adde & Germani) plurimum sunt commoti, ita vt ad magistratum ea res delata fuerit, quo Principis autoritate & gladio tumultuosæ istæ disputationes sedarentur, quæ de infra pluribus *quæst. 4.* dicetur, hæc saltem veriorẽ quam putamus, sententiam proponemus.

In pleuritide, vt in aliis inflammationibus, reuulsionem, quæ sangui-

nem affluxurum, aut etiam, qui iam affluit, à parte inflammata, quantum fieri potest, longissimè auertat, atq; ita incrementum inflammationis prohibeat, necessarium esse, tentandumque eam mox esse in principio, dum fluxio humorum adhuc durat, & inflammationis incrementum metuitur, extra controversiam est. Materiam autem, quæ ad vicinæ inflammationis loca iam influit, aut etiam in partem inflammatam iam influxit nondum tamen in ea impacta est, deriuationem requirere etiam extra dubium est, sicut & illud, reuulsionem ad contraria, deriuationem ad vicina, & vtrâque *quæst. 7. 8.*, seu secundum reuersionem fieri debere. Hoc autem iam in controversia est, an reuulsio, vena in latere affecto aperta, fieri, & an vna & eadem vena aperta, simul reuulsio & deriuatio fieri possit; & an reuulsio saltem secundum latitudinem considerata sit. Nihil horum concedimus, statimque præsentẽ plenitudinem vena in eodem latere aperta sanguinem potius ab partem affectam attrahi, quàm ab eo reuelli, & quod reuulsio, vbi vtroque auxilio opus est tempore præcedere debeat deriuationem, neque vtrâque eadem vena aperta peragi possit, asserimus. Et si hoc non negamus, quod plerumque etiam in eodem latere vena aperta demum, atque ita morbus aliquando præcaueri possit. Veruntamen commodius est, si in latere opposito vena aperiatur, qua & sanguis minuitur, & à loco affecto reuellitur. Statuimus hinc *quæst. 7. 8.*, non solum secundum longitudinem corporis, sed etiam secundum latitudinem considerari posse.

Primum quod attinet, cum focus &

Quæ vena & quo in latere aperienda sit.

font quasi, è quo sanguis affluit ad partem affectam in pleuritide, non sint venæ brachij in latere affecto, sed truncus venæ caux, à quo utriusque brachij venæ originem habent, & plus sanguinis sit inter latera oppositum & locum affectum, quàm inter locum affectum & brachium loco affecto vicinum si in principio, præsentē adhuc plenitudine, vena in eodem & parti affectæ vicino brachio aperiatur, faciliè fieri potest ut sanguis, qui post venæ sectionem ratione vacui ad brachium, in quo vena aperta est, fluere debet ad partem inflāmatam, utpote debilem, dolentem & calentē præ. nat. ruat & trahitur, atque ita inflāmatio augeatur. Præcipuè si fluat sanguis per ramum subclaviū, aut mammarium, aut thoracicū, Tum enim vena in eodem latere secta non conciliatur motus contrarius, sed augetur in-

fluxus.

Sit enim a a. ramus subclavius, b b. vena mammaria, c c. thoracica, d d. cephalica, e e. basilica, f. truncus venæ caux. Secetur eiusdem lateris cephalica vel basilica, manifestum est, motum contrarium hoc modo non conciliari. Ex fonte enim f. seu trunco venæ caux, dum vena d. vel e. aperitur, simul fluit versus a. b. c. Neque etiam, si per intercostalem venam sanguis influat, tunc in eodem latere vena aperitur, cum ut Hipp. *de ossib.* docet, danda sit opera, ut quàm maximè procul à locis, in quibus dolores fieri & sanguis colligi solet, sectiones faciamus.

Contrà verò si in oppositio brachio vena aperiatur, sanguis, qui ad affecti lateris venas & per eas in partem affectam fluxurus erat in contrarium trahitur & sine ullo periculo.



Et licet è venis eiusdem lateris, vtpote quæ parte affecta in pleuritide superiores sunt, sanguis fluat; tamen venæ illæ reuera fons non sunt, è quibus sanguis fluit, cum is ex internis & maioribus venæ caux ramis ad has & per has ad partem affectam mittatur. Et quamvis eadem vicinitas est vtriusque brachij cum venâ caua, tamen, vt dictum, si venæ in latere affecto aperiantur, facile fieri posset, vt cum maiore impetu ad locum vicinum affectum fluat. Et confirmat ipsa experientia, quod rectè fiat, si in opposito brachio venâ aperiatur. Per tot enim annorum sæcula, quibus Arabes & post hos Barbari, vt ob stylum nominantur, Medici in pleuritide in initio morbi in opposita parte venam aperuerunt, nihil incommodi ex eo Medici illi non imperiti perceperunt, nihilque damni ægris ex venæ sectione hoc modo administrata inferri animaduertērūt. Imò Matth. Curt. vt postea in q. 4. dicitur, cum ipse pleuritide corripere-
retur, & à Medecis quos in consilium vocauerat, rogaretur, an secundum suum dogma in brachio lateris affecti, an verò in opposito succundum Arabum doctrinam venam sibi aperiri vellet: in opposito latere venam sibi secari maluit, proculdubio non ignarus, quod alijs etiam eadem sine incommodo, imò cum vtilitate aperta esset.

Neque ex vnâ venâ apertâ simul
reuulsio & deriuatio fieri potest.
Cûtenim reuulsio fiat ad remota &
contraria, deriuatio ad vicina; vna
& eadem pars remota & vicina esse
non potest, atque eodem tempore
vtrâque fieri non posse clare docet

Galenus, de cur. rat. per sang. miffione c. 19. Per summam dicam, inquit, incipientes inflammationes reuulfione curare oportet, quæ verò iam inuestæta sunt, ex ipsis si fieri potest, partibus. Quod si fieri nequeat, falsam ex vicinis. Ideoque cum Hipp. & Gal. in codè latere venam aperire præcipiunt, id non reuulfionis, sed derivationis gratiâ fecerunt, quod vel ex eo apparet, quod eò vsque sang. miffionem continuari voluerit, donec color maturaetur, quæ sanguin. è part. affect. iam affluentis signum est. reuulfio verò è parte affecta non euacuat.

T^a 197^a 1^a, verò & res^titudinem
quod attinet, quamvis in opposito
latere vena aperitur, nihilominus
secundum Hippoc. & Gal. præceptū
sit 197^a 1^a non utriusque, Neque enim
in 197^a 1^a, obseruatur solum secun-
dum longitudinem corporis, sed &
secundum latitudinem; id quod clare
docet Gal. in comm. ad lib. Hipp. de
fract. t. 10. 197^a 1^a, inquit, semper
pro ex directo ponit; aliquando per
longitudinem corporis, aliquando per
latitudinem. Et idem Galenus 2.
ad Glauconem capite 2. vno crure
laborante ex altero sanguinem mittere
iubet. Non enim requiritur,
vt vena, quæ reuulsione gratia aper-
tetur, communionem cum parte af-
fecta habeat, id quod in deriva-
tione est necessarium; sed cum par-
te mittente communicare debet.
Nam cū derivatio ē parte af-
fectā, aut certē vicinis euacuare de-
beat, necesse est, vt per venas,
quæ cum parte affecta communio-
nem habent, fiat & quidam vicinas.
Cū vero derivationis finis sit, san-
guinem ad partē affluxurum, aut iam
affluentem ab ea ad contrariū auc-

Cc

Vna vena
aperta re
uulsiōni &
deriuatio
ni inferui
re non
potest.

tere, necessarium est: ut per eas venas fiat, quæ cum parte mittente communionem habent, à parte verò recipiente seu affecta remotæ sunt. Quod in pleuritide optimè fit in latere opposito. Cum enim è trunco venæ cauz sanguis ad latus affectum effundatur: vena in brachio opposita aperta habet cum venæ cauz trunco, ut pote à quo oritur, communionem remotior verò est à loco affecto, quàm venæ eiusdem lateris.

Quæ cùm ita sese habeant, & medicinæ fundamentis consentanea sint, si Medicus mox in principio ad ægrum vocetur, & plenitudo corporis insignis adsit, & vehemens ad partem affectam affluxus, virisque venæ sectionem ferant, in opposito brachio vena aperienda est, longinquioris reuulsioni gratiâ & ne, corpore adhuc pleno & durante humorum affluxu, secta in eodem latere vena affluens humorum copia ad latus inflammatum moueatur. Postea verò in eodem latere deriuationis gratia vena aperiri potest. Et in primis id fieri debet in iis regionibus & hominibus qui largâ & repetitam sanguinis missionem facillè ferunt.

Neque refert, quod ubi vena in opposito brachio aperitur, euadens auxilium non statim inde percipitur. Enim nemo primo die vel moritur, vel sanatur, & satis est, si postea commodum ex ista venæ sectione percipitur, quod satis magnum est, dum à loco inflammato sanguis, qui inflammationem aucturus erat, auertitur, & ex deriuatione plus postea commodi percipitur, si reuulso præmissa sit.

Si verò, quod sæpè fieri solet, Medicus non statim in primo morbi principio vocetur, & sanguinis, qui morbi vehementia, febrili calore & inedia minui solet, non adeò magna sit abundantia, nec magnus etiam amplius affluxus, aut si pleuritis sit mitior, sanguisque nunc copia magna, nec magnus affluxus, & vires etiam iteratam sanguinis missionem laturæ non sint, statim in loci affecti latere venam aperire licet: Nam si initio pleuritis, in qua magnus humorum affluxus non est, solum fomentis curari potest, cur non etiam in tali miti pleuritide, aut in qua non est amplius magnus humorum affluxus, solum eiusdem lateris venam aperire sufficiat.

Ceterùm & hoc in controuersia est, utrum mulieribus mensium aut hæmorrhoidum suppressionem patiētibus & pleuritide correptis vena in brachio an verò in poplite aut pede aperienda sit. Arabes quidem nonnulli etiam aliàs à vena in pede secta fecerunt initium, & sentiant nonnulli, morbos à menstruorum in fœminis & hæmorrhoidum in viris & fœminis suppressione originem trahentes venarum in crure sectione tantum sanandos esse, id quod in morbis diuturnis, & qui dant inducias, faciendum esse, libenter concedimus. In morbis verò acutis, qualis est pleuritis, non semper in poplite aut pede vena aperienda est sed distinctio adhibenda. Nam si in talibus euacuationibus, quæ statim temporibus fieri solent, repente omninoque suppressis, sanguinis ad superiora motus & in latus affluxus manifestè deprehendatur à venæ poplitæ, vel tali

Mulieribus mensium suppressione laborantibus quænam vena secanda in pleuritide

sectione curatio omnino inchoanda est. Si verò oppressio iam antiqua sit, per quam paulatim plethora vel cacochymia aliqua & humorum abundantia in superioribus partibus cumnata sit, neque etiam tempus mensium insitet, tum à venarum brachij sectione curatio inchoanda. Acutus enim morbus id requirit, nec moram fert, donec rursus vel menses, vel hæmorrhoides prouocentur fierique potest, ut, dum in mensibus vel hæmorrhoidibus prouocandis laboratur, ager vehementià morbi iuguletur. Mensium verò & hæmorrhoidum suppressio moram fert, cuiusque postea, cum acuti morbi periculo ager liberatus est, ratio haberi, & ut sanguis suppressus prouocetur, opera dari potest.

Nec hic prætereundum, cum pleuritis non raro febrem & morbum primarium sequatur, vel comitetur, quæ sæpè malignitatem insignem coniunctam habet, id quod frequenter in pleuritide epidemia accidere solet, diligenter tum malignitatis esse habendam rationem, & an ea venæ sectionem ferat, attendendum esse. Mentionem facit Gesnerus, libro primo epistolarum pagina 19. cuiusdam epidemix malignæ, & contagiosæ pleuritidis, quæ multi perierunt, & in qua venæ sectio in brachio nihil profuit, sectio verò ad malleolos & in principio sudor ab antidoto aliquo plus opus tulit. Et omnino in talibus malignitas expugnanda, & hinc reliqua, quæ opus peragenda.

Tempus quod attinet, cum sanguis vel reuulsioni vel derinationis gratia mittatur, & reuulsio humori fluenti debeat, fluxio au-

tem fiat in principio, sanguis statim reuulsioni gratia in initio morbi quacunque diei hora mittendus, neque venæ sectio hic diu differenda, ut postea deriuatio fieri possit. Veteres, teste Galeno 3. *epid. comin. 3.* non mittebāt sanguinem post quartum diem. Verum certus dierum numerus hic definiri non potest, sed interdum post quartum diem sanguinem mittere nō licet, quandoque & octauo licet. Nam si quarto die iam materia concoqui, & per spūm expelli cœpit, ne natura sua ab hoc suo opere auertatur, post quartum diem venam secare facile non licet. Si tamen corpus sit valdè plethoricum, totius id facere licet, ut natura oneris parte leuata reliquum facilius concoquat. Si verò tale quid non obseruetur, etiam post quartū diem venam secare fas est, quod & Hipp. *l. all.* fecit qui Anaxioni venam aperuit octauo die, vel quod citius non fuerat vocatus, vel quod in pleuritide crudissima, quæ vndecimo die vix coqui cœpit, morbus inducias tulit.

Quantum sanguinis mittendum sit, ex eius copia & virium robore æstimandum est. Ita etiam vires docebunt, utrum confertim & vna vice; an verò partitis vicibus sanguis mittendus sit. Hippocrates 2. *de ratione viæ. in acut. tit. 10.* vacationis modum statuit esse coloris in sanguine mutationem, si scilicet à crudo etiam aquoso rubicundus vel flauus fluat, aut à rubicundo vel flauo liuidus vel niger ob aduersionem. Indicio enim est, sanguinem ex ipsa phlegmone, vel vicinis huic venis, alteratum, & transmutatum iam euacuati, qui ob calorem & aduersionem ibi colorē mutauit. Verum

Quantum
sanguinis
sit mittend-
um.

Quando
secunda
sit vena.

id tantum locum habet, cum in eodem latere derivationis gratia sanguis mittitur, non vero, cum in opposito renulionis gratia.

Neque tamen, cum in eodem latere vena aperitur, illam coloris mutationem semper expectare licet, sed prius cessandum est, cum scilicet aut vires infirmæ sunt, ægerque tribu corporis molli teneroque est, qui facile resoluitur, aut tempus anni admodum calidum, aut inflammatio ita prava, ut de impacto ei sanguine nihil emittatur.

Antiqui etiam ad hypochymiam usque sanguinem mittebant. Verum corpora nostra talem venæ sectionem, præcipue in pleuritide, non facile ferunt, cum propter dolorem, febrem, tussim, viribus opus sit, quæ conitare nequeunt, si initio statim sanguis tam copiose euacuetur.

Cucurbitulæ.

Vicariæ phlebotomiæ in corporibus infirmis & materiæ copia non magna sunt cucurbitulæ cum scarificatione infernis lumbis vel partibus inferioribus appositæ.

Purgatio.

Postquam sanguinis missione impetus eius aliquo modo conquieuit, & pars aliqua humoris inflammationem patientis euacuata est, si ex missi sanguinis colore & aliis signis cacochymiam in corpore subesse, quæ malum foueat, augeatque, Medicus conitit, ad purgationem accedendum est, in primis si eam ad primam capitis regionem vergere ex ventris marmure, vomitu, excrementis alui liquidioribus: anxietate circa ventriculum cognoscatur. Atqui id maturè faciendam. Author quidem, lib. 4. de rat. vitæ, in acut. aphorism. 6. diem quartum simpliciter purgationi determinat. Ve-

rum rectè scribit Galenus, in commun. talia ægro secundum numerum dierum suppliciter ingungi non posse; sed quod Hippocrates statuit, esse sequendum, idèoque statim initio medicandum, vel postea, quando ad maturitatem perducti sunt humores: quam ob causam & prima interdum die, & secunda & quarta, & interdum quinta se purgans medicamentum dedisse scribit. Idèoque humores, qui in communibus ductibus redundant: & facile ad partem affectam confluent, initio, quo tempore auresio maxime desideratur, purgandi; postea verò ubi morbus viget, & humores à natura concoquuntur, melius est quiescere.

Exhibenda vero talia medicamenta, qualia sunt apta ad euacuandum humorem, qui in corpore abundat, & in latus tam fluere cupit, vel saltim ad fluxionem paratus est, modo illa mitia sint & lenia, qualia sint tamarindi, manna, cassia, syrupus rosar. & violar. solut. & rhabbari, mechoacanæ, fol. senæ, agarici, vel fortiorum aliquid addi potest, diaprunum, diacatholicum.

A fortioribus verò purgantibus medicamentis abstinendum ne commoti ab his humores maiori impetu in partem affectam ruant.

E.g. Decossi fl. O fruct. ʒ. iij. in quibus dissolu. mann. el. ʒ. vi. celsæ extr. ʒ. ʒ. diaprun. simpl. ʒ. iij. extr. rhabarb. ʒ. j. spir. vitæ. ʒ. v. M.

Nonnulli quocunque humore redundante exhibent oleum amygdal. dulce. recens, per quod facile sine molestia aluus mouetur. Cui quidam aliquid visci querni vel dentis apri addunt. Conradus Gesnerus laciis allegat, in pleuritide illa epide-

Oleum li.
ni in
pleuritide
epidemia
alium
mouet

nia oleum lini propinatum fuisse, & alium copiosè mouisse scribit.

Alterantia.

Alterantia quoque febris, & humoris peccantis causâ exhibenda, humôrque si nimis calidus, acris, aut contrâ crassus sit, aptis medicamentis alterandus & corrigendus. Quæ tamen etiam commodè cum illis, quæ humorem iam in latere hærentem respiciunt, misceri possunt; vel ex alterantibus ea eligi, quæ simul peculiari proprietate causam morbosicam respiciunt. Etsi, coniciamus: febrem illam quæ pleuritidi coniungitur, esse malignam, qualis ferè semper in pleuritide epidemia, vtile, imò necessarium est, ut statim initio etiam medicamentis sudorifera exhibeantur, qualia aliis febribus malignis dicata sunt; quæ tamen ita parari debent, ut simul peculiari vi hunc morbum respiciant.

Duo medicamentorum genera in pleuritide.

Vniuersalibus euacuationibus hoc modo præmissis, ad ipsam continentem causam, & humorum inflammationem excitantem curatio dirigenda est. Vbi duo imprimis medicamentorum genera requiruntur. Alia proprietate & vi peculiari pleuriticis vtilia; alia expectorantia & expulsiuonem faciliorem reddentia, vel materiam insensibiliter discutientia.

Specifica.

Priora quod attinet, etsi inflammatio morbus notus sit, & propterea medicamenta occultâ vi agentia requirere non videatur; tamè causæ, quæ eam excitant, plerumque peculiaris malignitas inest, quæ propterea etiam medicamenta occultâ qualitate agentia requirunt. Talia sunt, flor. papauer. errat. seu rhizados siue perleumpri, siue illorum succus siue aqua, siue syrupus.

Nonnulli flores istos recentes in succo betulæ, inspersis aliquot guttulis spirit. sulphuris acidî per campanam facti, ad gratam conciliandam acredinem, non secus quam rosas aut violas macerant, atque inde ter aut quater reasuso recentibus floribus diluto cum saccharo serapium rubicundissimi coloris conficiunt, quo postmodum prospero successu in pleuritide suo tempore vtuntur. Nam non solum impetum humoris tenuis affluentis refranat, ardoremque & ebullitionem sanguinis compescit; verum etiam acutæ febris præsens est auxilium. Huc referuntur carduus Mariæ & præcipuè semen, carduus bened. scab. radix lappæ maior. seu bard. rad. aristol. cortex anella. rubrar. oculi cancrorum, vel eorum magisterium, dens apri, castor. lign. visci querni, mandibulæ lucij cum dentibus, oculi item lucij & cruces in capite eius inuentæ, lapis carpiinum, percatum, priapus tauri, cerui, talus leporis, capreoli, spermaceti, corallia rubra, quorum 3. i. vel etiam plus cum aqua conuenienti prodest, millefolij item radix contusa, & cum aceto exhibitæ; succus pimpinellæ Italicæ, seu sanguisorbæ, aqua prunorum syluestrii, sal hyperici, quæ imprimis inuant, si post eorum cum sudor excitetur. Ideoq; Chymici & alia sudorifera exhibent, ut bezoardicum minerale, & diaphoreticum, & spiritum illum uniperi compositum. Peculiariter etiam è nonnullis commendatur ius pauonû pingue.

De horum autem vitibus, & quomodo pleuriticis prosint; alij alter disputant. Nobis probabile videtur, ea imprimis ratione pleuritici;

cosiuuare, quod vim humores dissipandi & discutendi habent, & ex iis etiam quidam malignos humores expellunt, ac cum pectore peculiarē cognitionem habent. Unde pleraque ex iis lapsis & contusis ad sanguinem concretum dissoluedum exhibentur, quidam in malignis febribus vrsantur. Sicut nimirum venena alia aliis partibus nocent: ita & humores vitiosi alii ad alias partes à natura seu protruduntur, seu ruunt, & vt cancer, ecysipelas, similesque tumores non in omnibus eque partibus excitantur, & humor qui dysenteriam excitat, intestinis peculiariter insensu est: Ita & humoris pleuritidem excitantis ea plerumque natura est, vt ad pleuram, non ad alia membra tendat. Hinc etiam sicut dysenteria, ita & pleuritis nonnunquam est epidemia. Medicamenta ergo, quæ peculiari vi pleuritidi profunt, occultam illam humoris vitiosi qualitatem expugnant. Quapropter etiam commodissimè dantur initio, vt scilicet malignum illud, quod naturam stimulat, & huius fluxionis causa est discutatur.

Vt *℞. Fl. pap. err. m. j.* Infunde in *aq. scab. card. Mar.* an. lb. 6. Colentur, & cum *sacch. cand.* dulcorentur. F. iulebus.

℞. ℞. Card. Mar. 3. ii. flor. pap. errat. ocul. percar. an. 3. i. F. puluis qui detur cum aqua endiuix.

Vel, *℞. Ononni, C. C. prepar. margarar. corallior. rub. ocul. cancer. mandibular. lucij. lapid. percar. an. 3. j. F. puluis.* Detur 3. lb. in aqua prunor. syluest.

Vel, *℞. Carduiben. cort. auclanar. rubr. an. 3. ii. ocul. can. mandibul. lucij. cor. alb. an. 3. i. F. puluis,*

Vel *℞. Rafura denis apri. 3. iii. lb. ligni visci quern. rad. bardana. an. 3. i. lb. F. pulu. tenuissimus.*

Vel *℞. Sem. cardui Mar. 3. i. lb. card. ben. 3. lb. Cum aq. card. Mar. 3. iv. card. ben. 3. i. F. emulsio, cui adde syr. viol. pap. errat. an. 3. lb. M.*

Vel *℞. Sem. melon. 3. ii. papau. albi. 3. i. cardui ben. cardui Maria an. 3. i. lb. aq. scabios. cardui ben. an. 3. iii. byssopi, 3. i. F. emulsio in qua dissolu. mandib. luc. visar. rasur. dentis apri an. 3. i. cryst. prap. 3. lb. syr. de alibea, 3. iii. manni Christ. perl. cum aq. rosar. 3. lb. M.*

Vel *℞. Succ. sanguisorb. syr. papau. errat. an. 3. i. aq. card. Maria, 3. ii. vel iii. M.*

Vel *℞. Dent. apr. 3. i. flor. papau. errat. 3. ii. syr. papau. errat. capill. Vener. an. 3. i. Milce.*

Vel *℞. Aq. scabios. xvi. pimpinell. sanguisorb. 3. viii. flor. papau. errat. succ. m. i. sacch. penid. 3. ii. Ebulliant in vase duplici clauso & colentur.*

Vel *℞. Aq. charesol. cardui Maria papau. errat. an. 3. ii. ocul. lucij. 3. lb. matris perlar. prap. succi albi prap. an. 3. xv. extr. enule, 3. v. syr. de byssopi, 3. lb. de succo violar. 3. ii. essent. papau. errat. 3. j. M. de quo die noctūque per quatuor vices tria cochlearia calidè propinentur.*

Vel *℞. Aq. cardui ben. scabiosae an. 3. i. lb. papau. errat. 3. ii. ocul. cancer. prap. C. C. prap. an. 3. i. syr. de succ. violar. de iunib. an. 3. lb. de alibea, 3. ii. spr. sulph. acid. 3. ii. M.*

Quod vero medicamenta, quæ ad materiz per spūcum sensibilem euacuationem faciunt attinet, pro humoris & temporis morbi ratione hæc nonnihil variant. Cum enim humores ad expūendum aptissimi sint, vbi mediocritatem quandā ob-

tinent inter crassum & tenue: medicamenta ita comparata esse debent, vt cum humoribus inducant. Humores enim tenues, & qui pro tenuitate aeris tulli expulsi impetum effugiunt, ad initio in crassantibus ad mediocritatem reducendi, & ad excretionem aptiores reddendi sunt. Crassos vero attenuare, viscidos incidere, adhaerentes abstergere & ablucere, simulque vias expulsiōni aptas reddere conuenit.

Incrassant rad. alibae, flor. violar. buglossi. iuiua, sebest. gummi tragac. amyllum, papauer, syrup. violar. iuinbin. de papau. diacod. drapenid. diatragac. frig. loch. de psyllio, decoctum pectorale, quod ex bordeo, passul. iuinb. glycyrrhiz. ac 4. sem. frigidi maior. conficitur.

E. gr. ℞. Sacch. penid. ℞. i. rotul. diaireos f. diatr. frig. an. ℞. iii. passul. cucul. ℞. b. sem. in alu. ℞. i. papu. ℞. b. Cum l. q. syrup. viol. M. in formam linctus.

Vel ℞. Syr. violar. de iuinbis capillorum Veneris, consersu. violar sacch. candi, amyli, an. ℞. b. M.

Vel ℞. Amygd. dulc. contusae. pinear. in aqu. bordei infus. & cont. an. ℞. i. sem. melon. encurb. exopris. an. ℞. ii. sacch. candi ℞. b. syr. capill. ℞. iuinb. an. q. l. F. lohoh.

In crassa vero materia conueniunt hydrom. oxymel, hyssopus, capillus Veneris, scabiosa, iussilago, syrupus capill. Veneris, de glycyrr. de farfar. de hyssopo, de pralio, de scabiosa, loch. de farfara, de pino, de pralio, de scilla, diatragac. calido, decoctum pectorale ex passul. sebest. iuinbis, daetil. caricis, bords. glycyrrhiz. capill. Veneris hyssopo paratum.

Vt ℞. Syr. capill. Vener. de glycyrrhiz. an. ℞. i. de iussil. oxymel. f.

an. ℞. vi. M.

Vel ℞. Lobuch de penid. de farfar. ℞. b. spec. diaireos. f. ℞. i. Cum syrupo de glycyrrhiz. F. lohoh.

Vel ℞. Ol. amygd. dulc. vellini vel utriusque oxymel. f. ℞. b. sacch. penid. q. f. F. lohoh.

Botonus Medicus Italus, sequentis eclegmate feliciter vsus est.

℞. Ol. amygd. dulc. ℞. ii. oxmel. scillir. sacch. cand an. ℞. i. succi capar. ℞. i. M. de quo saepius cochl. b. propinetur.

Verum medicamenta, quae ad crassos humores temperandos adhibentur, non sine omni distinctione vsurpanda, cum crassum sit varium. Crassum enim aliud naturae suae tale est, aliud ob coctionem. Primum conueniunt incidentia & attenuantia; crasso ex coctione, quae abluunt & abstergunt; adultis ea quae humectant. Si materia sit cruda & contumax, & febre remittente non cedat materia excretioni, validioribus vtendum, vt loch. de caulibus, de farfara, sano & experto & aliis, quae pulmonem a pituita, & pure expurgare possunt. Atque medicamentis reliquis acetosi aliquid interdum addere licet, ad maiorem incisionem, & vt ad tussim aeger non nihil stimuletur. Alias bechicis non vtendum, nisi cum facultas languida est, vt si tussis non expellat, cum ipsa caula naturam satis ipsam tussim irriter.

Antiquis in omni vera pleuritide in magno vsu erat oxymel, sed dilutius, de quo Hippocrates 1. de rat. vicl. in sent. text. 43. & 3. de ration. vicl. text. 4. & seq. videatur. Dictum etiam de eo in Instit. lib. 3. part. 3. f. 3. c. 4.

Atque ex enumeratis hactenus plerumque parantur medicamenta,

Crassum
duplici
modo ac-
cipitur.

que plures fines respiciunt. Nimirum quæ simul habent vim feбри, cuius ferè soboles est pleuritis, vt & malignitati, si quæ adsit, resistenti, materiæ per spūm reiectionem adiuvandi & pleuritidi peculiariter resistendi.

Vt ℞. Lobos de sasar. ʒ. i. spec. diatr. f. ʒ. b. ocul. cancer. ʒ. b. Conser. violar. ʒ. b. Cum syrupo papauer. errat. F. lohoh.

Vel ℞. Rad. semicul. tussilag. an. ʒ. iiii. spec. decoct. pectoral. ʒ. vi. Coq. in suffic. quantis. aqua simpl. Col. ʒ. lb. i. b. Adde syrupo acetos. f. pap. errat. violar. an. ʒ. i. M.

Vel ℞. scabios. P. i. card. Mar. M. b. inuib. ʒ. b. rad. glycyrrb. sem. melonum, cardui Mar. an. ʒ. ii. Coq. in f. q. aqu. bordci, Calaturæ ʒ. ʒ. vii. syrupo papan. errat. ʒ. i. violar. ʒ. vi. M.

Vel ℞. Rad. glycyrrb. ʒ. vi. flor. viol. pap. errat. an. P. ii. inuib. scabios. an. N. vii. passul. ʒ. i. ficinum, N. vi. sem. card. Mar. melon. an. ʒ. ii. Coq. in aq. hordci, Col. ʒ. lb. ii. dulcosectur sacch. cando.

Vel ℞. Fol. farsang. M. ii. fragor. violar. an. M. i. rad. belen. ʒ. ii. glycyrrb. ʒ. i. sem. faniul. ʒ. i. caruar. N. iv. passul. ʒ. ii. Coq. in aq. hordci mensur. in ad certā part. consumptionem. D. turmanē & vesperi haustus,

Vel ℞. sem. sanig. ʒ. i. lini, ʒ. b. inuib. N. vii. dactyl. ficinum, an. N. iv. passul. exacti, ʒ. b. rad. glycyrrb. ʒ. iij. Coq. in aq. hordci f. pro ʒ. viii. Quibus adde puln. rad. bardane, ʒ. i. spec. diatr. frigid. ʒ. b. liquor. visci, quern. ʒ. xij. sal. carduiben. ʒ. i. syr. de inuib. de althaa, ʒ. b. M.

Ad dolorem mitigandum, mate-

riam evacuantum, inflammationem resoluendam, sudorem eliciendum, vt admirabile presidium aq. è flor. chamæmeli destillata commendatur, cuius ʒ. iv. cum sacchar. ʒ. b. vei ʒ. i. exhibetur.

Neque solum interna medicamenta post vniuersalia illa præmissa necessaria sunt, sed & externa quædam medicamenta adhibentur, quæ materiam insensibiliter resoluunt, simulque dolorem leniunt, ad materiæ concoctionem faciunt, peccūsque vt ægri facilius expuere queant, dilatare possunt. Quorum alia sunt mitiora, vt spongia, vel linteam madefactum in aqua dulci tepida, vel lacte, aut vesica his repleta: Item ol. dulc. viol. amygdal. dulc. mucilag. sem. alth. cydon. adopsuillus, gallin. butyr. omnia recentia, vnguen. dialth. Alia mediocria, quæ vim aliquam discutienti & aperiendi habent, vt chamæmel. anethum, hyssopus, origan. mellilot. sem. lini, furnigr. flor. cheiri, & olea ex his composita. Alia fortiora, vt sal dictam. Cretic. ruta, galbanum, lepidium, sinapi. Et quidem mitiora in corporibus mollioribus, vt pueris & feminis, locum habent, & initio morbi sufficiunt, vt dolorem leniant quo sedato influxus sistatur. Validiora viris & robustioribus admoventur, sicut & thorace à materia per expectorantia maximè ex parte expurgato ad fortiora ascendendū. Atque ex his variæ medicamentorū focinæ componuntur; fomenta, inunctiones, cataplasmata, emplastra, sacculi; sed sicca & arida ve. & pleuritidi minus quàm nothæ conueniunt. Atque in maiore dolore mollioribus; vt fomentis & illu. ionibus vtendum. Vbi veid. dolor non est adeo vehemens

Externa.

Mitiora.

Fortiora.

vehemens, caplasinata, cerata, em-
plastra adhibere licet.

Vt *℞. Mucilag. sem. althæ, psyl-
lij, cydon. an. ʒ. iii. ol. viol. amygd.
dule. an. ʒ. ʒ. cera parum. F. vnguen-
tum.*

Vel *℞. Ol. amygd. dule. cbamam.
libor. albor. vnguent. dialth. an. ʒ. iii.
pingued. gallin. butyri recent. non salis-
si, an. ʒ. i. ʒ. cera parum. F. Lini-
mentum.* Vel *℞. Vnguent. dialth.
ʒ. ʒ. pulu. rad. iveros, ʒ. ʒ. ol. amygd.
dul. medull. crur. vituli an. q. s. F.
Lin. Vel ʒ. Rad. alth. ad molliti.
coctar. & per setac. transm. lb. ʒ. fa-
rin. fabar. sem. lin. fenig. an. ʒ. ʒ. ʒ.
pulu. fl. cbamem. ʒ. iii. pingued. gall.
anserim. an. ʒ. ʒ. ʒ. vitell. ouor. duor.
croci ʒ. i. M. F. Cataplasma.*

Vel *℞. Rad. libor. al. alth. an. ʒ.
i. malu. violar. flor. hyperici, consolid.
regal. an. m. i. Coq. ad molliem,
& per setaceum traiciantur, deinde
adde farin. sem. lini. fenigrac. pulg.
flor. cbamem. an. ʒ. i. ol. amygd. dule.
vel butyri recentis sine sale q. s. F.
Cataplasma.*

Acutus *tetrab. 2. ferm. 4. cap. 68.*
post septimum diem, si dolor persi-
stat cucurbitam lateri affigere & cu-
tim scarificare iubet, manifestis-
simamque in pleuriticis utilitatem
ex cucurbitulæ appositione percipit
scribit. Vulgusculis verò scarificati
loci saltem aut nitrum inspergere, si
sustinere queant, in aliis linteolum
oleo madefactum, ac sale consper-
sum imponere præcipit; sequenti
deinde à scarificatione die rursum
cucurbitam affigere iubet, quâ san-
guis saniosus ex vulnusculis extraha-
tur. Paul. Ægineta *lib. 3. cap. 33.* post
quartum etiam diem vitur cucurbi-
tulis. Commendat Trallianus, *lib.
6. cap. 1.* hoc auxilium, vt quod cum

admiratione dolorem licet vehemē-
tissimum leniat, vt neque fomentis,
neque alio auxilio opus sit. Verum-
enim: èò validum hoc est auxilium,
& quod vel insignie commodum vel
damnum asserre, & à paucis tolera-
ri potest, præsertim si ad Aëtij præ-
scriptum adhibeatur. Quapropter
vsurpandum cautè & cauendum, ne
vel nimij dolores, vel noua fluxio
concitetur, tum scilicet cùm affe-
ctus diuturnior causæ potius parti
impactæ contumaciam, quàm mul-
titudinem præ se fert, & cùm venæ
sectione & purgatione adhibitâ do-
lor eodem modo intensus non ad se-
ptimum solum diem, sed ad vnde-
cimum etiam & decimum quartum
perseuerat, & neque manifestè eua-
cuantibus, neque resoluentibus ce-
dit; nulla tamen plenitudinis & ca-
cochymiz in corpore reliquæ suspici-
o reliqua est.

Vigiliæ si vergeant, hisce subue-
nitur illis, quæ affectui quoque con-
uenite possunt, vt lacte amygd. cum
emulsionem sem. papauer. & croco-
dato, vel syrupo de papauere, &c.
Tandem si materia non reicitur, nec
vilo modo à parte amoueri potest,
sed phlegmone in pus mutatur, cu-
randum, vt quamprimum mature-
tur, & abscessus rumpeatur. Ad ma-
turationem tale habet emplastrum
Bened. Fauentinus, quod & Fote-
stus commendat. *lib. 16. obseruat.
40. pag. 60.*

*℞. Fol. malu. cum radice violar. Mund.
an. M. ii. rad. alth. mund ʒ. ii. libor. rancia.
alb. ʒ. i. emula, ʒ. ʒ. ʒ. flor. cbamam.
meliloi, an. m. i. Bulliant omnia in
s. q. aq. ad mediet. Colat. adde
farin. fenigrac. frum. an. an. P. i. fer-
menti ʒ. ii. pingued. porci, butyri. aa.
ʒ. ʒ. ol. amygd. dule. cominus, aa.*

q. f. ad impinguandum emplastrum, cuius adde *erici* ʒ. ʒ.

Ruptio
abscessus.

Ut verò abscessus rumpatur, x. ger voce intensa loquatur, de latere in latus voluatur, tussi aut cum conatu. Rumpitur etiam abscessus, si vomitus aut sternutatio excite-
tur. Ad quod etiam faciunt bechica adhibita, commendanturque scabiosa, prasilium, carduus bened. & aquæ ac syrapi ex his compo-
siti.

Vel ʒ. Radic. alb. beleny, an. ʒ. j. ianibar. sebesten. an. N. xv. glycyrrh. passul. an. ʒ. i. ʒ. dactylo-
rum, sic. an. N. vi. Coq. in aq. lb. ii. ad tertiam partis consumptionem.

Colat. adde sacch. q. f. Fiat Iulebus. Vel ʒ. Ferment. tritici quant. vol. Et Fiat puls cum decocto sicum, & edatur.

Vel panis bene fermentatus in aqua mullâ maceretur.

Extrâ cataplasmati adiciatur aliquid stercoris columbi, & galbani.

ʒ. Radic. lilior. alb. contusar. ʒ. iv. ficum N. x. fimi columbini, ʒ. ii. fermenti ʒ. iii. axungia porci, by-
rryri an. ʒ. ii. F. Cataplasma.

Quæ si non prosint, nonnulli partis apertionem suadent. Sed rarè tumor extrâ vergit.

Abscessus ruptus detergendus hydromelice, decocto pectorali. Ad consolidandum, utilis est conferua rosar. medice atatis, thus, bulus, terra sigillata, Omnes verò intentiones complet lac chalybeatum, nisi febris eius vsum prohibeat.

Secdio.

Cum verò abscessus ad interiora ruptio in pleuritide periculum faciat, & suffocatio vel phtisis ex eo immineat, suadent nonnulli, ut extrâ aperiatur abscessus. Neque

abs re hoc fore videtur, modò loci cuius, in quo vomica contineatur, certò & exactè cognosci possit. Neque enim eo loci, quo in empyemate & pure iam in thoracis cavitate collecto sectio fieri solet, de quo postea dicitur, sectio tum instituenda, sed ex pondere, dolore, & calore diligenter locus, in quo vomica hæret, investigandus, atque is intra duas costas aperiendus leniter & paulatim, donec pus exeat, cauendumque ne simul tunica interior perforetur. Verùm nisi planè ac exactè locus perspectus habeatur, sed is incertus sit, aut vires debiles eam non ferant, sectio non instituenda.

Iacobus Fontanus med. pract. lib. 2. cap. 3. refert, interdum malignas & vulgares pleuritides grassari; qualem Anno 1598. vidit, quæ generabatur ex humore tenui virescente, & omnibus qui ea corripiebantur, ferè lethalis erat. In cadaueribus dissectis sub nammis reperiebatur vomica plena virescente liquido humore. Huic pleuritidi in sectione est vnicum remedium. Cum enim in humore pravo nulla sit coctionis & mitigationis spes, materia sectione ut extrahatur, necesse est.

Si materia ad vias vrinæ vergat, Diuretica exhibeantur. ca.

Ut ʒ. Radic. aperientium in vino maceratar. an. ʒ. i. glycyrrh. ʒ. i. sem. 4. frig. maior. an. ʒ. ʒ. ʒ. A-
disanthi m. i. cyper. rubr. m. ʒ. Coq. in f. q. aq. puræ, ad dimidiam partis consumptionem. Colatura saccharo dulcoretur.

Si ad intestina vergat, clysteres Clysteres. abstergentes & abluentes exhibeantur, & nè dysenteria excite-

tur etiam syrupi nonnihil astringentes propinentur.

• *Dieta.*

Cum pleuritis ex acutorum morborum numero sit, victus rationem accuratam & qualis acutis convenit, requirit; de qua pluribus Hippocrates 1. *de rat. vict. in acut.* ubi pleuritidem exempli loco tractat, & Galen. *in comm.* Itaque in principio ad dies 4. si ægri vires ferant tenuissimum victum utendum. Veteres tensem victum præscribebant ex melicrato primum, postea ex cremore ptisanæ hordeaceæ usque ad septimum vel nonum diem ubi integram ptisanam aut ova aut carnis aliquid exhibere licebat. Et omnino accurati erant antiqui in præscribendo pleuritidis victu; habeturque, *ibid.* t. 32. & 33. dolorem in pleuritidis augeti, si ægro ptisana detur alio retenta & non prius aperta; imò ægrum ad mortem præcipitem agi, si dolore non remittente sputoque retento ptisana præbeatur, non præmissa evacuatione corporis, siue per venæ sectionem, siue per alui subductionem.

Nostri tamen homines tenuissimæ illi victus rationi non ita assueti sunt. Itaque ægris præberi possunt sobriationes ex cremore ptisanæ primum sponde colato, postea expresso. Ptisanæ enim hordeaceæ cremor in pleuritide præstantissimum alimentum est. Nam eius viscositas levis, continua, iucunda, lubrica, & mediocriter humida sitim minimè infert. Et si quid abluvi vel excerni debet, probe abluvi, ut Hippocr. habet, 1. *de rat. vict. in acut.* t. 28. pituitam dissolvit & abstergit, atque per superiora, quæcumque duci possunt,

absque dolore educit, aluumque facilem reddit, ad deglutendum facilis est, dolore & calore mitigat, maturat & omnia emollit. Vtilis & emulsio amygd. dulc. cum aq. hordei facta, addito saccharo. Licet quoque amygdalas cremori ptisanæ miscere; biliosis tamen cremor ptisanæ commodius solus exhibetur. Addi etiam possunt ad refrigerationem sem. 4. frig. maiora. Morbo cedente panatella dari potest ex iure gallinæ cum oui luteo & iura carniū tenuia: Cibi item ex amygd. & pineis parati. Tandem ad ova, carnes coctas & assas pullorum ac gallinarum & pisces bonos transeundum.

Potus sit aq. hordei cum pauxillo cinamomi & passul. item glycyrrh. item oxymel aquosius vel decoctum pectorale ex iuiubis, passul. glycyrr. & hordeo.

Vel *℞. Aq. colt. lb. ii. mellis, acetri, an. ʒ. ss. sacchari ʒ. ii. M.*

Vino abstinendum, & quanquam æger avidissimè id appetat; tamen ei non est concedendum; cum ante morbi declinationem pleuritidis instat veneni sit. Ideo ante 14. diem raro vinum concedi potest. Potus, qui assumitur, non sit actu frigidus, ne sputum, & quod insensibiliter transpirare debet, retineatur. Vitentur in cibo & potu omnia acida, salfa, fauces exasperantia & astringentia. Compertum enim, nonnullos pleuriticos à lenticularū cum aceto ac rassamentorum & piscium usu, ut & à frigida liberali potu extinctos fuisse. Aër temperatus sit. Motus animi & corporis vehementer caneantur, ipsa ut æger quoque parum loquatur. Alijs lenientibus clysteribus aperta servetur.

QVÆSTIO I.

An in omni pleuritide detur inflammatio pleurae

An in
omni
pleuritide
detur in-
flamma-
tio pleu-
rae.

Vt hic dubitare quis possit, ansem præbuit Heurnius, qui *capite proprio* scribit hanc membranam amertiam & dyscrasiam oculis non semper in cadaveribus secdis patere: se secuisse pleuriticum immani delirio abreptum, cui nihil in meninge, nihil in cerebro, nihil in toto corpore *mpa* *667*, notari potuit.

Verum distinguendum est inter pleuriticam seu inflammationem pleurae, & dolor lateris seu pleuræ. Neque enim, ut infra dicitur, omnis dolor lateris est ab inflammatione pleurae, sed etiam ab aliis causis ortum habere potest. Et meminimus, in morbillis infantes quandoque acutissimos lateris dolores passos esse, antequam morbilli erumperent, à materia maligna & acuti pleuram vellicante. Dolorque hic, ut rectè Heurnius, *ibid.* ait, à materia mole sæpè non magnâ ortum habere potest. Ac proinde ille, quem mortuum secuit Heurnius, non fuit propriè pleuriticus sed febre acutâ maligna laboravit, in qua pars materiz malignæ & febris ad pleuram effusa dolorem ibi excitavit: pars in caput celata delirium procreavit.

Atque talis proculdubio fuit ille dolor pectoris, cuius Quercetanus meminit, quamquam falsò pro pleuritide eum habuit, qui à vermibus & malignis vaporibus ex iis ascendentibus ortum habuit, & tales dolores scabiosis etiam sæpè accidisse animaduerti. Talis est etiam, qui scorbuticis accidit, & proinde pleuritis

vera non est. Si tamen talis dolor diutius duret, & affluxus humorum causa sit, pleuritis inde & quidem notha, sed vera excitari potest.

QVÆSTIO II.

An in pleuritide sola pleura, an verò simul pulmo inflammetur.

De loco in pleuritide affecto & antiqui & recentiores dubitarunt, an scilicet in pleuritide sola pleura, aut musculi intercostales, an verò simul etiam pulmones afficiantur? Membranam equidem costas succingentem inflammari in pleuritide, utpote quæ à parte affecta nomen habet, dubium nullum est. Cùm enim dolor sit adeo vehemens, ut ægri quasi terebrâ latus perforari conquerantur, neque costis, quæ omni sensu destituuntur, neque earum membranae, quæ ob nimiam tenuitatem ac venarum paruitatem, atque exilitatem tantam inflammationem suscipere non potest, neque ipsi musculis, qui sensum adeò exquisitum non habent, nequa soli pulmonibus, qui ipse non sentit, nisi parum ratione membranae ambientis, is competere potest, sed in membrana costas succingente eum consistere necesse est. Hoc tamen negandum non est, interdum musculos intercostales simul in consensum trahi, cùm membrana costas succingens, & hi musculi adeò connexi sunt, ut vnum sine altero affici vix possit.

An sola
pleura in
pleuritide
inflammetur.

De hoc verò quæstio maxima est, an solum membrana costas succingens, an verò simul pulmones in pleuritide afficiantur. Nostro sæcu-

Io Felix Platerus, vit in re medica pericissimus, semper simul pulmones inflammari, ex sectione, pleuritide mortuorum se deprehendisse, scribit, Idem Ioh. Zechius, in *consult. Medic.* cons. 26. in appendice, sentit; dum scribit, semper se fuisse in ea sententia, quod lateris dolor magna ex parte ad pulmones pertingat, raro autem ad membranam costas succingentem, cum in pluribus corporibus post mortem dissectis agrotantium, qui communiter ac certe pleuritide periisse iudicabantur, non membranam affectam fuisse, sed pulmones observavit cum sua membrana laceratos & corrosos. Deinde & experientiam & rationes pro sua statuenda sententia adducit Platerus. Neque enim sanguinem, quem tam cito excreant, ab unica succingente membrana inflammata, tam subito praesertim, ad pulmones pervenire, cuiusque vasa ad exspirationem permeare, nec suppuratione facta pus ex eo loco transitum sibi per pulmones, illis non laevis & exulceratis, facere, & sic ad excretionem usque pervenire minime posse, sed potius, si inde emanaret, in thoracis cavitatem defluxuram materiam, & inde empyema facturam existimat. Et licet concedat, succingentem tunicam quandoque solam inflammari: tamen talem pleuritidem inde fieri non concedit, in qua cruenta & purulenta exspuuntur; cum succingens membrana sese eo exonerare non possit; sed si inflammatio suppuratur, extrinsecus potius quam intrinsecus vergat, vel si intro rumpatur, pus in cavitatem pectoris potius, quam in pulmones effundatur.

Verum tamen utro equidem negandum non est, saepe cum pleura pul-

mones etiam inflammari, & vero valde consentaneum videtur, tandem copiam sputi ac materiae, quae à pleuriticis saepe tussi rejicitur, pulmonis salvis vix eiici posse. Atque id accidit, cum superior pars pleurae afficitur. Cum enim illa cum membrana costas succingente communione habeat, & circa partem superiorem pulmones cum pleura connectantur, dum sanguis praeter naturam in pleuram influit, facile etiam simul in pulmones illabi potest. Contra tamen etiam negandum non videtur, solam membranam costas succingentem aliquando inflammari, & veram pleuritidem, quae propterea à pleura nomen habet, inde generari posse; cum membrana haec inflammationis capax sit, utpote quae duplex est, interior & exterior, inter quas venae arteriaeque praeterlabuntur, ac sanguine praeter naturam affluente ipsa adeo in tumorem nonnunquam attollitur, excrescitque ut decuplo crassior, quam cum sana est, evadat, ut ipsemet Platerus observavit, & lib. 2. de corp. hum. firmiora pag. 168. annotavit. Atque id accidit, cum inferior pars pleurae inflammatur, quae cum pulmonibus non connectitur. Neque planè impossibile est, sanguinem & pus è membrana succingente per superiora eiici: quamvis facile concedam, id in tanta copia non exsui, ac cum pulmones simul sunt affecti. Et si enim antiqua dubitatio sit, ut ex 1. de loc. affect. cap. 5. videre est, quomodo sanguis & pus è thoracis partibus in pulmonem cuiusque asperas arterias penetrare, & tandem tussi rejici possit: tamen id fieri posse, plurima experimenta ostendunt. Si enim aqua mulsæ in cavitate thora-

cis, in vulneribus & ulceribus eo usque penetrantibus, infundantur, tussiendo reicitur, & æger aquæ malsæ saporem deprehendit. Conglutinatis quoque extrâ vulneribus, antequam intus perfectè sanantur, cruoris & sanici è vulnere in cavitatem thoracis effluentis notæ in sputo apparent. Et empyicos pus tussii reicere notissimum est. Quandoque tamen suppuratam inflammationem pleuræ empyema sequitur, ut ex Hippocrat. 5. aph. 8. & 1. de morb. p. 9. in codice Fœsij videre est. De qua re mox etiam, in quæst. 3. dicetur.

QVÆSTIO III.

Per quas vias materia in pleuritide ad asperam arteriam perveniat, & inde tussii eiciatur.

Per quas vias materia in pleuritide ad asperam arteriam perveniat & inde tussii eiciatur.

Per quas vias sputum in pleuriticis in asperam arteriam perveniat, & inde tussii eiciatur, & excernatur, non ita planum est. Si pulmones simul afficiantur, res manifesta est. Si autem sola pleura afficiatur, res dubia est & obscura, de qua prolixè agit & contra Erasistratum disputat Galenus, 5. de loc. affect. cap. 3. qui hac de re videatur. Galenura plerique Medici sequuntur, & statuunt, per pleuram materiam transsudare, aut ea pertusa, erosa, vel quovis modo rarefacta in thoracis cavitatem pervenire, atque inde, tussii thorace compresso & pulmone dilatato, in asperas arterias, quarum orificia in pulmonis ambitum tenui tunica obducta desinunt, cogi, primò quidem in minores, hinc in maiores, donec tandem per canalem amplissimum

tracheæ & faucibus tussii eiciantur.

Verumenimverò eisi non negandum sit, tenuius quid, quale mulsæ est, quam exempli loco affert Galenus ad probandum, humores in cavitatem thoracis contentos in pulmonem penetrare, & si quid tenuius è pleura transsudat, & illud à pulmone imbibiri posse: tamen non credibile est, materiz tantam copiam, qualis sæpe à pleuriticis per tussim reicitur, per pleuram transsudare (neque enim in principio vel augmento pertusa esse potest,) & quidem eam tam crassam sæpe per angustos illos meatus è thoracis cavitatem in pulmonis substantiam penetrare posse. Neque etiam credibile est, mox in principio sanguinem purum, qualis sæpe à pleuriticis tussii eicitur, è pleura in thoracis cavitatem effundi; cum id in aliis inflammationibus fieri non videamus, neque densitas membranarum id facile admittat. Atque hoc modo etiam omnes pleuritici fierent empyici. Ideoque ubi sputum magna copiâ tussii reiciatur, pulmonem simul affici, credibile est. Et præcipuè verò non est consentaneum, sanguinem, qui in principio pleuritidis purus planè reicitur, per pleuram transsudare in cavitatem thoracis, & à pulmonibus imbibitum fuisse, nullam tamen in iis alterationem accepisse: sed vero magis consentaneum est, è vasibus, quæ asperæ arteriæ nutrimentum advehunt, quæque parte superiore pulmones lateri amectunt, nutriri, hiantibus ob copiam sanguinis in pleuram vicinam ruentis, effundi.

QVÆSTIO IV.

Quæ venam pleuritidis principio
aperienda sit.

Quæ venam
in pleuri-
tidis prin-
cipio ape-
rienda.
Diversæ
Authorum
opinio-
nes.
Hippo-
crates.
Archige-
nes.

De vena in pleuritidis principio aperienda magna verborum contentione superiore sæculo pugnatum est, aliquæ Græcos, alij Arabes sententi sunt; alij suas peculiare opiniones proposuerunt. Ideoque etiam hanc quæstionem plenius explicare, & totam huius certaminis historiam & præceptorum Medicorum sententiam, secundum ordinem temporis, quo vixerunt, proponere libet. Hippocrates, 2. de rat. vietus in acut. 1. 10. in pleuritide aperire iubet cubiti venam, verum non addit, in vtro brachio: Id verò 4. de tract. vieti. in acut. 1. 13. declarat: vbi eo in latere venam aperire præcipit, quo æger laborat.

Archigenes, vt ex Aëtio, terrab. 2. ferm. 4. cap. 68. videre est, ex opposito brachio sanguinem mittit: In his, inquit ex Archigene Aëtius, qui acuto morbo infestantur, siquidem circa thymum aut claviculam hæret dolor venam incidere oportet in brachio, non eo, quod vel à ab inflammato latere procedit, sed opposito.

Galenus cum Hippocrate consentit, scribitque, lib. de curand. rat. per sang. miss. cap. 16. Pleuritidis, quæ è directo lateris laborantis adhibita suis sanguinis missio, clarissimam sepe utilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino eleniam, aut post temporis intervallum.

Galeno assentitur Orribasius, dum, lib. 1. synops. cap. 10. & lib. 7. collect. cap. 5. Galeni modò allegata verba recitat. Aëtius etiam, sect. ab. 1. sect. 3. cap. 12. in pleuritide venam è directo

lateris affecti secare iubet.

Cælius Aurelianus ex alio latere, Cælius quod fuerit dolenti lateri contrarium, sanguinem mittere iubet. Aurelianus. Celsus.

Celsus, lib. 2. cap. 30. vsu se docuisse scribit, ex lingua & opposita sanguinem mittendum esse.

Si ad Arabes veniamus, Serapion, qui antiquissimus inter eos habetur eos habetur, tract. 2. cap. 21. secat primò & materia fluente basilicam oppositi lateris, tum si adhuc materia fluat, in loco contrario ei ex dorso ad longitudinem, id est, saphenam eiusdem lateris, vt plerique interpretantur: quod si malum confirmatum est, & non amplius materia fluit, venam in brachio eiusdem lateris.

Rhases non idem sentire videtur. Nam, 9. ad Almanf. cap. 57. si dolor vsque ad claviculam perueniat, sanguinem ex axillari lateri dolentis mittere iubet, ni forsitan sanguis in toto abundet. Tum enim in opposito brachio venam aperire iubet. In opposito verò latere lib. dimf. cap. 54. venam aperire præcipit, postea tertio die ex latere dolente. 5. autem contr. initio ex brachio lateris oppositi, tum ex saphena lateris affecti, tandem ex brachio lateris dolentis sanguinem detrahit.

Auenzoar etiam primò venam basilicam oppositi lateris aperuit. Auenzoar. Haly Abbas.

Hali Abbas, qui cum Isaac idem Author confectur præf. lib. 6. cap. 13. primò lateris oppositi basilicam, at si malum processerit, eiusdem lateris venam secare præcipit. Idem facit Alzaharaius.

Auicennas, lib. 1. sen 10. 11. 5. c. 1. præcipit primò sectionem saphenæ oppositæ secundum longitudinem, id est eius lateris, non, vt

Alzaharaius.
Auicennas.

Capiuaccius interpretatur, oppositi; deinde nigram, id est, medianam oppositi brachij, aut hac non apparente cephalicam; tandem & post aliquot dies venam brachij in latere opposito aperit.

Auenrois, 7. collect. venam in parte opposita aperit.

Auenrois.
Mesues.

Mesues idem facit. Si tamen magna sit plethora, saphenam lateris oppositi, exempli gratia, saphenam pedis sinistri, si dextrum latus afficiatur, primum aperit.

Cum verò postea ab Arabibus ad Gallos & Italos cum aliis artibus, Medicina perueniret, & iis sæculis Græcorum de Medicina libri penè omnes in tenebris delitescerent, aut, quos habebant, ex Græco in Arabicum versos legerent, & hinc Latinos redderent, Medicinamque præcipuè ex Arabum libris discerent & docerent; Medici illi, qui post Arabes in Italia & Gallia de Medicina Latine, seu potius Latino-barbare scripserunt, plerique etiam Arabum opiniones secuti sunt. Atque ita post Arabum tempora ferè ad annum Christi M. D. Medici omnes, Gentilis, Arnold. de Villa noua, Gordonius & ipse Gallus, & apud Monspelienfes Medicinæ Professor, Valescus de Taranta, Petrus Aponensis cognomento Conciliator dictus, Nicolaus Florentinus, Matthæus de gradibus Mediolanensis, Antonius Guainerius & Gattinaria, Ticinenses Medici, Alexand. Benedictus Veronensis, Iohan. Arculanus & plurimi alij, omnes initio pleuritidis aut saphenam aut basilicam oppositi lateris aperuerunt. Nemo autem inter omnes repertus, qui initio morbi in afectione lateris brachio venâ aperire auderet. In morbi verò pro-

gressu venam eiusdem lateris aperuerunt.

Circa tamen annum Christi 1500. de vena initio pleuritidis secunda factio quædam inter hos ipsos medicos extitit, dum Veneti initio pleuritidis saphenam aperirent, Medici verò Bononianfes ac Florentini basilicam oppositi lateris. Circa illa tempora bonæ literæ renasci cœperunt, & Græcorum libri vel Græci, vel in Latinum melius conuersi in manus Medicorum peruenierunt, vnde nonnulla Arabum dogmata, quos antea vnanimiter secuti fuerant Medici, à nonnullis in dubium vocata sunt. Atque inter ea etiam sententia de venæ sectione in pleuritide.

Ita Matthæus Curtius, Ticinensis Medic. Professor, in pleuritidis initio venam cubiti eiusdem lateris aperiendam statuit. Ipse tamen pleuriticus factus contrarium in se fieri voluit, maluitque vitam sibi seruare, quàm libri sui. quem de venæ sectione in pleuritide scripserat, fidem.

Matth.
Curtius.

Eandem opinionem secutus est Petrus Brissotus, Medicus Parisiensis. Eandem sententiam in Germania defendit Leonhardus Fuchsius, etsi non semper eodem modo. Petri Brissoti, vt inigstri sui, sententiam secutus est Martinus Acakias. Matthæi Curtio & P. Brissoto sese opposuit Andreas Thurius, Piscienfis, Medicus inter eos nobilis, qui tum temporis Arabum dogmata sequebatur epistola ad Brissotum anni 1526. & peculiari libello de cur. pleur. per sanguinis missionem scripto. Leonhardus Iacchinus, Emporicensis, etsi Medicinam Græcorum sectaretur, & tum temporis Græcorum scriptis additus

Petrus
Brissotus.
Leonhardus
Fuchsius,
Martinus
Acakias.
Andreas
Thurius.
Leonhardus
Iacchinus.

Iohannes
Maasius
Benedi-
ctus Fa-
uentinus.

addictus esset, hic tamen Arabibus assentiri voluit, & initio morbi, lapheam, hinc lateri affecti venam aperire voluit. Ioh. Manardus an. 1531. Curtij aduersus Thurinum patrocinium suscepit. Benedictus Fauentinus, edito hac de re libro anno 1534. venæ sectionem in pleuritidis initio in eodem latere defendit. Arabum contrā sententiā & eorum, qui in opposito latere venam aperire in initio iussissent, defendit Iulius Cæsar Scaliger, in comment. in lib. Hippocratis, de insom. an. 1539. edito. Idem fecit Victor Trincavella, qui peculiari scripto Curtium ac Brissotum refutat, edito Venetijs anno 1539.

Iulius Cæ-
sar Scali-
ger.

Vesalius.

Andreas Vesalius, vir rei anatomice peritissimus, peculiarem hac de re opinionem defendit. Is enim, in epist. ad Nicolaum Florentiē scripta, siue dextrum siue sinistrum latus afficiatur, semper in dextro latere venam aperiendam censet, nisi constet res superiores sinistri lateris afficiantur. Tum enim in sinistro latere venam aperiendam censet, qui hoc modo *ἡ δὲ* Hippocratis, & præterea etiam fibrarum reëctitudinem obseruari statuit, idque adeo quod vena *ἡ δὲ*, à caua exorta prope cor per latus dextrum excurrere; & dextri & sinistri lateris octo costas inferiores nutrit, ita ut etiam si sinistrum latus laboret, vena in dextro brachio, ad quod magis pertinet vena *ἡ δὲ*, aperta sanguis commodissime trahi possit. Si tamen sinistri lateris costæ superiores inflammantur, cum ex non à ramis venæ *ἡ δὲ*, sed à ramis, qui à caua statim exoniuntur, nutrantur, etiam in brachio sinistro venam aperiendam esse statuit atque ita Græco-

rum doctrinam sequi voluit. Hanc tamen suam sententiam non constanter defendit, dum lib. 3. cap. 5. & 7. & lib. 5. cap. 9. nihil interesse scribit, dextre an sinistri cubiti vena secetur in laterali morbo.

Iohannes Fernelius, lib. 2. the-
rapeut. cap. 5. reuulsionem esse tra-
ctum in contrariam concedit, non
tamen dextra sinistris, sinistra dex-
tris aut alio modo opposita contra-
ria esse statuit, sed fibrarum hic du-
ctum præcipue attendendum exis-
timat, quarum recto cursu hic opus
sit. Ideoque et si, cum vnum crus
laborat, in altera venam, commo-
dè aperiri posse statuit, quia com-
munis & directæ sit venarum ob fi-
bras societas: tamen idem in pleu-
ritide non fieri posse putat, quòd
hæc fibrarum communio & venarum
societas desit.

Fernelius.

Iohann. Baptista Montanus ob-
scure satis hac de re loquitur; ut ex
Commentario in sen. 4. Canonis Au-
cennæ. edito Venetijs anno 1556. pag.
247. & comment. in apborism. 21.
lib. 1. Hippocratis ibidem anno 1555.
edito patet. Diuidit enim phlebo-
tomiam diuersam vniuersalem in
simplicem & compositam. Simpli-
cem vocat, quam solum in petus
nobis indicat; compositam, quan-
do simul cum impetu plethora con-
sideratur. In diuersione simplici
considerandos esse duos terminos
docet, ad quem, seu locum af-
fectum, & terminum à quo,
seu fontem, vnde materia trans-
mittitur. Terminum à quo esse
nunc totum corpus, seu totum ve-
nosum genus, nunc partem ali-
quam corporis determinatam. Si
igitur in dextram succingentem
materia communicetur à capite,

Iohann.
Baptista
Montanus.
Diuersa
duplex.

ratione vnius diametri sanguis deorsum tuens sursum trahendus esset. Verum quia supra caput nihil, & ita altera diameter, quæ scilicet inferna superioribus respondent, deest, mittendū censet sanguinem ab opposito latere; quia saltem habemus vnam diametrum, quæ est inter dextrum & sinistrum. Ita si ab hepate communicetur materia, venam non in brachio aperiendam censet, (ita n. traheretur ad partē affectam) sed potius saphenam aperiendam, vt sanguis ad inferiora reuclatur. Si vero membrum mandans seu fons sit totus ambūsus venarum, tantū de termino ad quem sollicitum esse iubet, quia fluit à singulis materia, seruandūque debitum spatium & rectitudinem, non tantū respectu viarum, sed & quia sanguis commodè potest progredi; vnde tunc venam aperiendam in eodem, v. g. dextro latere. Nam hic quanto magis seruamus ductum rectæ lineæ, tantō commodius sanguis euacuatur; quia in angulis sequitur impedimentum sanguinis. Si v. diuersio sit composita, i. e. cum impetu simul consideretur plenitudo, tunc temper ab opposito latere ducendus; quia si in eodem latere vena aperiretur, & quidem copiosè sanguis efflueret, & vsque ad lyncopen, homo moreretur, vel fieret peripneumonia; si parum, æger suffocaretur. Vnde Auicennas primò aperit saphenam ad euacuandā multitudinem, deinde in opposito brachio, vltimò eodem latere.

Marcus
Antonius
Montis-
ianus.

Marcus Antonius Montisianus Germanensis conclusionēs de sanguinis missione in morbo laterali conscripsit, & Florentiæ an. 1556. edidit, in quibus Curium & Thuri-um ambos sibi familiares, vt &

Manardum & Brissotum hinc inde perstringit. Statuit autem incipientem in regione costarum phlegmonem, quam appellamus pleuriticam, reuulsu primò curandam esse, nisi nos interpellet plenitudo, illa scilicet, quæ vasa respicit, 2. Reuulsionem nihil aliud esse, quàm humorum in partem aliquam influentiam ad sibi oppositam maximèque distantem retractionem. 3. Opposita in corpore humano tria esse, superius scilicet, & inferius, dextrum & sinistrum, antè & retrò, siue intus & extrà. 4. Omnem reuulsionem fieri aut à superioribus ad inferiora, aut contra fluentem (hoc est, vt ipse postea explicat, à sinistris ad dexteras secundum modū dictas oppositiones) materiam reuocando. 5. Licet longitudinis, latitudinis & altitudinis extrema reuulsionem respiciant, non pari tamen vtilitate in hac passione reuellere.

Vnde Auicennam quidem non damnat, quod incipiente phlegmone in opposito latere venam tecuit: vt gere enim rationes: quia sinistro, nihil aliud opponitur, quàm dextrum, & contrà. Pari ratione non arguendum esse Galenum & Hippocratem, si in eodem latere venam secuerunt. Nam si materia superiora petit, ad inferna esse trahendam, quod optimè fiat secta vena in eodem brachio: maximèperè verò approbandam & præferendam hanc illi, quæ est in opposito latere; quia prior manifestum auxilium & statim affert, altera non nisi post interuallum. Quia igitur conueniant cum Græcis Arabes in oppositorum ratione, in reuulsione, & in exalta ferè lateris morbi curatione, so-

la in oppositione altera dissidentes, non inludandum esse putat, inter Galenum & Auicennam hancitem componere, vt Thurinus voluisse visus est. Irritum enim esse laborem, inter illos concordiam meditari, qui consulto volunt esse discordes.

Hollerius.

Hollerius ex basilica eiusdem lateris sanguinem mittendum statuit, nisi suppressa sit aliqua, quæ per partes inferiores fieri solet, euacuatio, vel adsit insignis plenitudo, vel materia maligna, aut ea statim ad caput rapiatur. Tum enim in cruribus venam aperiendam esse censet.

Rondeletius.

Rondeletius basilicam vel medianam eiusdem lateris aperit, & inde sanguinem vsque ad eius mutationem & doloris mitigationem extrahit, aut si dolor non remittat, venæ sectionem iterat, idque ideo facit, non quod fibratum seu villorum rectitudinem obseruandam putet, sed quia naturam incitandam censet, quæ solet facere suas excretionis secundam rectitudinem.

Thaddæus Dugunius.

Thaddæus Dunus, Medicus Tigurinus *libris 4. de arte reuelliendi simpliciterque euacuandi per venæ sectionem scriptis, & epistolica cum Leonhardo Fuchsio concertatione*, ferè Vesalii sententiam sequitur, & in omni pleuritide, vt *lib. 3. cap. 7.* scribit, & laborantibus costis seu dextri, seu sinistri lateris, semper internam cubiti dextri venam aperiendam censet. Cum enim à vena sine pari tam dextri quàm sinistri lateris partes nutritimam accipiant, exceptis tribus costis superioribus: vena verò sine pari cum dextri cubiti venis maiorem consensum habeat: etiam in dextro cubito venam aperiendam. Venarum verò re-

ctitudinem & consensum ideo spectandum esse docet, quod per rectas fibras, quæ in venis sunt, sanguis ab vna parte in aliam celeriter & copiosè trahatur, si venarum fibræ conuexionem habeant, & ea vena, quæ secatur, & quæ membrum alit, fibræ conueniant. Si tamen contingat id quod tamen vel raro, vel nunquam fieri statuit: vt tres costæ superiores primaria affectione teneantur, sinistram axillare secare concedit. Cum enim à vena sine pari non nutriantur, sed ab alio ramo paulò suprà illius exortum enato ex sinistro magnæ venæ latere, cum axillari sinistra fibræ suis multò magis proculdubio consentire, quàm cum dextera, imò cum hac nullum prorsus habere consensum statuit.

Atque hæc sunt præcipuæ præceptorum medicorum de venæ sectione in pleuritidis initio sententiæ, quas postea alij Medici recentiores etiam secuti sunt, & omnino omnes sententiæ ad tres classes redigi possè videntur.

Omnes hæc sententiæ ad tres classes redigendæ.

Alij enim Græcorum opinionem sequuntur, qui *πρὸς τὴν*, venam secandam, atque in eodem latere aperiendam censuerunt. Nonnulla hic tamen inter eos occurrit differentia, quòd alij simpliciter *πρὸς τὴν*, seu *ἐν τῇ*, & rectitudinem, alij etiam fibrarum rectitudinem obseruandam censent. Et Mercurius hic statuit, aliud esse in aliarum partium inflammatione sanguinem mittere reuulsionis gratia aliud in pleuritide & membrorum principalium inflammatione. Nam aliarum partium affectibus ob partium naturam & securitatem fieri possè reuulsionem ad partem oppositam citra vitæ periculum aut aliud

Prima classis.

damnum statuit; pleuritidem verò periculofam eſſe, atque illud omninò, quod in parte affecta colligitur, eſſi paucum ſit, tantum tamen periculi minari, vt ſubitum auxilium poſtulet. Ideòque pleuritidis grauitatem omninò requirere, vt à parte affecta hæc ſanguinis euacuatio, per quam à parte affecta & reuulſio & deriuatio fieri poſſit. Idem ſerè Platerus ſentit, qui in pleuritide, quia latus dolet, à brachio euſdem lateris ſanguinem deſtrahere, quàm ex oppoſito vtilius cenſet, non tam rectitudinis vaſorum occaſione, ſed quod in pleuritide ob dolorem dolentis lateris venæ magis, quàm ſani lateris venæ impleantur. Quo nomine ſi in dextro latere dolor ſit, in dextro brachio venam aperire multas vtilitates afferre ſcribit, ſi in ſiniſtro, propter affluxum ſanguinis à dolore concitatum ab ea parte ſanguinem reuellere conuenientius putat. Nonnulli tamen ex iis, qui in eodem latere venam aperiendam cenſent, aliquos caſus excipiunt: vt ſi ſuppreſſa ſit aliqua per inferiores euacuatio; ſi adſit inſignis plenitudo; ſi materia ſit maligna, vel ad caput tendat.

Secunda
clafſis.

Alij Arabes ſequuntur, & quidem nonnulli primò ſaphenam, alij verò ſtatim venam oppoſiti brachij reuulſionis gratia aperiendam cenſent, poſtea ad deriuationem euſdem lateris.

Tertia
clafſis.

Alij tandem Veſalius ſecuti ſunt, & ſemper in dextro latere in pleuritide venam ſecandam cenſent; eùm ſi fibrarum rectitudo ſpectetur, longè maior ſit inter dextram axillarem, regionemque coſtarum quamcunque conſenſus, quàm in-

ter euſdem ſlocum affectam] & ſiniſtram axillarem. Cùm enim vena ſine pari à dextro cauæ latere enaſcatur, & axillaris dextræ ſimiliter huius & illius fibræ quam plures, quæ ſecundùm longitudinem corporis ipſarum ſunt porrectæ, inuicem conſentiunt, rectòque tramite mutud ſe reſpiciunt.

Verùm ſi iſta omnia diligenter perpendamus, & fundamēta ſupra propoſita, vbi de venæ ſeſtione egimus, diligenter attendamus, non ita diſciculter ex hac obſcura & tot aurorum ſeculis agitata controuerſia nos expedire poterimus. Primò rationes omnes eorum, qui ſtatim venam in brachio lateris affecti ſecare iubent, ſiue id fiat ob fibrarum communionem ſiue ſaltem ob *diuſionem* & rectitudinem, quam natura in ſuis euacuationibus obſeruare ſolet, ſiue ob dolorem, qui valdè vrget, eò tendunt, vt monſtrent commodius per venam, è directo lateris aperta à loco affecto materiam euacuari, quàm ex oppoſito brachio. Verùm cùm venæ ſectio in pleuritide reuulſionis gratia inſtituatur: in reuulſione autem non requiratur è parte affecta euacuatio, ſed deriuationis hoc ſit: Reuulſio ſaltem prohibet, ne pars affecta amplius ſanguine repleatur, & id agit, vt ſanguinem eò vnde fluit, retrahat, eſque contrarium ei, qui eſt ad partem affectam, motum verſus fontem, à quo fluit, conciliet. Atque ideò commodiſſimè in latere oppoſito in principio venam aperiri cenſemus, vtpote quæ contrarium motum ſanguini conciliat, & cum à parte affecta auerit, quod vena è directo lateris affecti aperta præ-

Deciſio
contro-
uerſiæ.

stare non potest. Et id rectè fieri primò experientia confirmat, cum per aliquot annorum secula, quibus Arabum secta floruit, vena semper in opposito brachio aperta est; & si aliquid incommodi ex eo accidisset, id Medicos illos aliàs diligentes non latuisset. Ipse etiam Iulius Cæsar Scaliger, hac de re suas obseruationes annotauit, vt ex eius commentario in librum Hippocratis de insaniis videre est. Finem, inquit, in quæp intendimus, hunc esse par est, prohibere sanguinis copiam, ne ad malè affectum conueniat locum. Ergo ab opposita parte sanguis detrahendus. Nam si dolor in latere sinistro: aperta iudicem vena plus trahit à dextro in sinistrum, quàm dextra incisa in sinistrum. Plus enim humoris est inter circumferentiam dextram, & doloris locum, quàm inter eundem locum & circumferentiam sinistram. Vnum habent, quò profugiant, non prædesse, quoniam nulla sit, vt appellant; colligentia. At nos dicimus non nunc agere, vt quod fluxit, detrahamus: neque enim magni momenti est: neque quisquam prima statim die mortuus est, sed post multam affluxionem, quam tollit vena contraria remota: vena autem eiusdem lateris non solum non tollit, sed etiam trahit ad locum malè affectum. Itaque toto post facto fluxu, ex eadem parte nos quoque detrahimus. At de ratione quidem hæc, de experientia quid dicamus, facile in promptu est. Iam duodeniginti annos, non nisi vnum vidimus, ex eadem parte incisa vena euasisse. Et sanè corpus erat athleticum, vt etiam magis miraremur. Verùm scimus multos etiam sine phlebotomia sanos factos. At plus ob-

gina redeimus in commentarium quinto abhinc anno, qui omnes eo curandi genere fiat extincti: cum plus quingentis his duodecim annis euasisset, quibus in aduerso cubito vena aperta fuerat. Hæc Scaliger, Et in se Galenus, lib. de cur. rat. per sanguin. mission. cap. 16. nullam in pleuriticis ex vena in latere opposito secta detrimendum, sed vilitatem provenire statuit, etsi obsecram & post temporis intervallum.

Deinde rationes satis firmæ idem suadent. Nam licet etiam venter sectio simpliciter euacuationis gratiâ institui possit: tamen ea quacunque etiam vena aperta fieri potest. Neque de vena euacuationis gratiâ aperienda hic tantum quæstio est, sed de vena ad reuellendum & derigandum apta. Nam præter euacuationis scopum duobus de causis præterea, vt etiam in aliis inflammationibus sanguis in pleuritide mittitur, reuulsionis scilicet & deriuationis gratiâ. Illa debet sanguini ad locum affectum affluentem vel affluxuro; hæc sanguini, qui in venis parti affectæ vicinis continetur. Vtraque autem hæc euacuatio, reuulsio scilicet & deriuatio, ita institui debet, vt partium consensus obseruetur, vt vena vnius partis secta, altera & quæ cum illa consensum habet, euacuetur, & consequenter humor vel reuellatur, vel deriuatur.

Aliiter verò omnino se habet hic consensus in reuulsione, alter in deriuatione. In reuulsione enim cum id agatur, vt sanguis, qui ad partem affluit, vel affluxus est, ad fluxionis initium & fontem reuocetur, vena, quæ reuulsionis gratiâ aperitur, cum fonte, vnde fluxionis initium, si vena eò loci aperti

Causa
missionis
sanguinis
in pleuriti-
de.

non possit, cum venis initio fluxionis vicinis consensum habere debet, ita vt vena hac aperta sanguis, qui ad partem affectam fluere coepit, iam amplius eò fluere desinat, & in contrarium trahitur. In deriuatione verò ea vena aperiri debet, quæ cum parte affecta consensum habet, & ab ea vel locis vicinis euacuare possit. Igitur quò propius fontis & initio fluxionis vena aperitur, eò rectius & propriè magis reuelli dicitur; quò verò magis à fonte fluxionis recedimus, & vena affectæ parti propinquior aperitur, eò minus propriè reuelli dicitur.

Notandum tamen hic, quod non nulli turbauit, & eò adduxit, vt statuerent, non semper ad originem fluxionis esse reuellendum, per originem fluxionis non intelligendam esse causam fluxionis procatarticam, puta calorem & dolorem, quæ sæpè ex parte affectâ, sed fontem & locum, à quo sanguis ad partem affectam fluit. Ad eum enim sanguis, quantum fieri potest, retrahendus. Interim non incommodum est, vt causa illa fluxionem irritans & sanguinem attrahens in parte affecta mitigetur vel tollatur. Locus verò, quo instituitur venæ sectio reuulsionis causâ, nunquam vicinus esse potest, sed remotus sic necesse est. Docet hoc clarè Galenus, 4. meth. med. cap. 6. Si, inquit, perpetuum est quod ab eo didicimus, incipientem fluxionem ad contraria trahendam esse, verò iam in laborante particulâ vacuandam esse, vel ab ipsâ particula, quæ affligitur, vel à maximè vicina, in promptu nobis de sanguinis detractione colligere est, quod in principio hæc à longinquo, postea ab ipsâ laborantibus partibus sit

instituenda. Quod & alibi passim docuit.

Itaque cum in pleuritide fons & principium fluxionis non sint pedes, vel caput, vel brachia, vel venosum genus, seu venæ caue rami maiores, naturâque hoc obseruare soleat, vt partes principes, quantum fieri potest, tueatur, & publicam corporis regionem à prauis humoribus liberare, eosque propterea ad extremas partes protrudere soleat, at verò in principio pleuriticidis non deriuare, sed reuelli animus sit: facile hinc apparet, non venam loco affecto vicinam eligendam esse, cum facile fieri possit, vt in loco vicino venâ apertâ sanguis maiore cum impetu ad partem dolentem & calentem ruat, sed quæ à loco affecto remota sit, & cum parte mittente consensum habeat, sanguinisque ad partem affectam ruentis impetum sistere, cumque ad contrarium reuocare possit, quod sit commodissimè venâ in brachio oppositâ apertâ. Neque enim datur vlla vena, quæ à parte affectâ remotior sit, cum parte tamen mittente, seu hepate & venâ cauâ, maiorem consensum habeat. Neque est, vt quis cum Matth. Curcio, Marnardo & aliis ad imaginariam quandam oppositionem confugiat, quæ etiâ in brachio eiusdem lateris fieri possit, quando scribunt, dum inciditur vena eiusdem partis, primum adesse oppositionem intus ad extra, quatenus sanguis extrâ emittitur deinde oppositionem à dextra ad sinistram pro vario brachij situs sum oppositionem in longitudine; quatenus humor sursum trahitur, qui deorsum vergebat. Non enim sufficit hæc imaginaria oppositio,

sed talis requiritur, quæ ad fontem, unde fluit sanguis, quantum fieri potest, eum retrahat. Hoc optimè præstat vena in latere opposito aperta, etsi id videre non potuerit Argenterius. Hæc enim vena ex axillari sanguinem primò euocat, hinc ex vena caua, atque ita sanguis non amplius tam copiosè confluit. Arabes quidem nonnulli, ut supra dictum, ut planè ad remota reuellerent, venam in pede primò aperuerunt, sed locus iste ab hepate nimis remotus est, neque facillè motus sanguinis, qui per venæ sectionem in pede concitatur, usque ad sanguinem, ad latus affectum fluentè perungere potest, quod vena in brachio aperta optimè fieri potest. Etsi verò mensibus & hæmorrhoidibus suppressis plethoræ vel cacochymia cumulata sit; tamen si suppressio antiqua sit, nō sperandum vniuersa ista venæ saphenæ sectione eos reuocari posse. Interim morbus acutus non fert moram, sed subitum auxilium requirit. Atque in hac sanguinis missione, quæ sit in brachio opposito, non opus est caloris mutationem expectare. Neque enim eum euacuare animus est, qui iam in parte affecta mutationem accepit, sed eum, qui ad locum affectum affluit.

Vesalij tandem opinionem, quia peculiaris est, ut seorsim perpendamus, si reuulsionis gratia in dextro brachio, sinistro latere affecto instituitur, commodū ad sanè est. Verum si dextrum latus laborat, in eo reuulsionis gratia vena aperiri non potest; cum facillè hac occasione maior ad partem affectam affluxus fieri possit. Si verò, quod sentire videtur, deriuationis aut euacuationis gratia ex parte affecta venæ sectio-

nem instituit, via illa nimis longa esset, si è latere præcipuè sinistro, sanguis in venam sine pari refluere atque in cauam venam & dextrum brachium retrahi deberet. Imò sunt qui nullo modo ex vena sine pari, ad venam cauam sanguinem refluere posse statuunt. Scribitque Hollerius, *libr. 1. de morb. intern. caput. 27. in schol.* venam sine pari sanguinem, quemà vena caua accepit, non amplius ad eam remittere posse; valvulas enim habere, sicut vesicam & cor idque eo probat, quod si quis venam cauam in parte superiore seceret, & fistula immittat in inferiorem partem, sufflet, totam ipsam venam cauam in parte inferiøre secemus, immittatque fistula ore ventum sursum impellamus, venam cauam non inflari, quod aer in vena sine pari contentus exire non possit; Unde concludit, si aer à vena sine pari ad cauam non penetrat, multò minùs sanguis refluere poterit. Eadem penè omnia proponit Amatus Lusitanus, *centur. 2. curatio, § 2. in schol.*

Verum istam de valvulis venæ sine pari doctrinam Gabriel Fallopius, in *obs. anat.* irridet, & Thaddæus Dunus risu & sibilis potiùs explodendum, quàm refutandum censet; cum nemo periculis morum etiam anatomicorum eas inuenire poterit. Et quod experimentum illud de inflatione venæ causæ attinet, id ita refutat Thaddæus Dunus. Venam cauem, inquit, prius secat, ut ex ea *ἀέριον* inflaret; postea *ἀέριον*, quoque secat, ut inflaret cauam. Mirum autem non est, cauam non potuisse intumescere, siquidem distincta erat. Neque enim spiritus non penetravit ad eam; sed non continebatur ea reclusa. Vanculū igitur

Vesalij
opinio
examina-
tur.

iniiciendum erat venæ cauz.

Atque hæc de valvulis venæ æquæ controuersia ab Anatomicis variè agitata est, necdum tamen satis discussa, dum alij dari aiunt, alij negant, etsi eas diligentissime inquisuerint. Et qui eas dari affirmant, inter quos Riolanus in *synonymographia* non tamen eodem modo quo Hollerius & Amatus Lusitanus dari statuant, sed ita, sitas esse, non vt recurrenti sanguini obsterent, sed potius, vt impetum affluentis sanguinis sustinerent. Neque vlla valvula est in venis, quæ totam ciuitatem occludit, sed ferè saltem dimidiam partem occupat, vbiunque sunt, eoque sine factæ sunt, vt sanguinis fluxum & motum moderarentur.

Sint ergo valvulae, vel non sint in venâ sine pari, & si sint tales, vt sanguinis recursum impedire non possint: tamen non ideo venâ dextri brachij semper aperienda est, deriuationis & euacuationis ex parte affectâ gratiâ. Via enim hæc nimis longa esset, & datur breuior, si venâ lateris affecti aperiatur, vt iam dicitur.

Etsi ergo initio pleuritidis venâ in brachio lateris oppositi commodissimè reuulsionis gratiâ aperiatur; tamen cùm postea etiam deriuatio è loco vicino requiratur, post reuulsionem in latere opposito factâ, venâ etiam in latere eodem aperienda est; quod etiam faciendum, si tardius Medicus ad ægrum vocetur, morbusque iam progressus sit, & tempus reuellendi, sanguine iam in loco inflammationis maximâ ex parte recepto, præterierit.

Etsi verò quod præcipuè Vascularium mouit, saltem superiores tres

costæ ramis è venâ axillari enatis nutriantur, reliquæ costæ inferiores ramis venæ æquæ: tamen venâ in brachio lateris affecti aperta sanguis è latere inflammato vbiunque etiam inflammatio consistat, satis commodè euacuari potest. Et de costis quidem superioribus tribus nullum dubium est. Annotauit tamen Gabriel Fallopius & alij etiam Anatomici diligentiores, consensum axillaris cum venâ sine pari, docentque ab axillari prodire venam, cuius tres, vel ad summum quatuor rami aliquando iungantur cum tribus aut quatuor propaginibus venæ sine pari, videlicet inter tertiam & quartam, quartam & quintam, quintam & sextam, & inter sextam & septimam. Imò interdum etiam in sinistro latere truncus inuenitur. Et Columbus annotauit, peculiarem ramum qui à dextro truncò, dum reflecti incipit, exit, ascendensque ramos mittit superioribus intervallis supremarum costarum alendis dicatos, neque solum in dextris, sed etiam in sinistris.

Montani sententiam quod attinet, rectè ille quidem monet ad fontem respiciendum esse, vt ad sanguinis copiam, ne si sanguis sit valdè copiosus in latere affecto venam secemus, metu maioris affluxus ad partem affectam. At in eo fallitur, quod vbi venosum genus (quod vt plurimum si non semper accidit) fons est, ex eodem brachio detrahit. Nam in opposito latere seruatur recta linea respectu venæ cauz. Est enim eadem latitudo. Si verò rectitudinem respectu partis affectæ intelligit, confundit deriuationem, seu euacuationem potius & reuulsionem.

Montani
sententia
examina-
tur.

Marci
Anton.
Monti-
siani opi-
nio exa-
minatur.

errore est; dum per venam in eodem latere reuulsione instituit; cum mera sit euacuatio, vt supra dictum. Magis adhuc errat, quod sectâ venâ in eodem brachio ad inferna trahi scribit.

Atque hæc euacuatio, cum etiam à loco affecto sit nonnihil remota, à Galeno quandoque etiam reuulsio appellatur, sed minus propriè, vt ex 2. de rat. vult. in acut. c. 10. & præcipuè 6. epidem. com. 2. c. 32. patet, vbi diuersionem, quæ ab oculis ad palatum fit, reuulsione appellat.

Atque vt hæc tandem concludamus, hanc venam secandi rationem in pleuritide obseruarunt, vt dictum, Hippocrat. & Galen. Quamquam enim de mente Hippocr. & Galen. nonnulli variè disputent, & iis quæ lib. de rat. vult. in acut. habentur, vni in eodem latere venam secare iubent, alia ex Galen. loca opponunt, vbi in principio inflammationum in parte opposita venam aperire præcipit: tamen, quod Mercato & aliis etiam placere diximus, Hippocrates & Galenus in aliis quidem inflammationibus, in quibus in mora nullo periculum, in opposito primò latere venam aperiunt; in pleuritide verò, vbi dolor valde vrget, statim in directo lateris affectu venam aperiunt, ac vnicam venæ sectionem instituunt; quod & nos, si tardiùs, & post morbi principium ad ægrum vocemur, imitari possumus. Sanguinem autem largius, & ad coloris mutationem miserunt; & vnâ venæ sectione tantum sanguinis detraxerunt, quantum Arabes geminâ. Verùm cum non solum tutius sit sanguinem bis euacuare, quàm semel copiosa sanguinis missione vires deiciere, sed etiam alix quæ

suprà proposuimus, rationes suadeant, commodissimum esse in principio sanguinem in loco à parte affecta remoto euacuare, rectissimè primò in brachio opposito instituitur venæ sectio: ita tamen, vt post etiam in eodem brachio deriuationis gratiâ vena aperiatur.

Qui de difficili hac intricata questione plura scire cupiet, legat Petri Brissii Doctores Medici Parisiensis præstantissimi, discrepationem apologeticam, in qua docetur per quæ loca sanguis mitti debeat in viscerum inflammationibus, præsertim in pleuritide; vnâ cum dialectica de missione sanguinis in plenitide, vbi demonstratur ex qua corporis parte detractus ille fuerit à duobus annorum millibus, ex omnium penè Medicorum Græcorum, Latinorum, Arabum, Barbarorum exacta enumeratione, inxta temporum quibus florere seriem instituta, quam edidit & superiori Brissii apologiæ subiunxit vir eruditissimus M. Renatus Moreau, Doctor Medicus Parisiensis, anno 1622.

QVÆSTIO V.

Per quas vias è thorace materia ad alium & vesicam peruenire, & hinc euacuari possit.

Sanguinem, vt & pus, non solum per cullum, sed & per vesicam cum vrina ex thorace quandoque excerni, Galen. 6. de loc. affect. c. 4. docet. & se vidisse testatur, quod & alij Medici plures, Græci, Arabes & Latini obseruauerunt. Scripsit etiam nuper ad me amicus quidam, quendam in sinistro latere thoracis vulneratum fuisse gladio, super costas no-

Per quas vias è thorace materia ad alium & vesicam peruenire & hinc euacuari possit.

thas sursum adacto, ita ut vulnus v-
nius & dimidij digiti longitudinem
æquaret. Vulneratus etsi de dolore
nullo conquereretur, tussis non affli-
geretur, nihilque sanguinis expue-
ret, ut inde colligi potuerit, tantum
externos thoracis musculos fuisse
vulneratos: tamen accidit, ut se-
quenti nocte difficultate metendi
corriperetur, post quadriiduum ve-
rò copiosum sanguinem emingeret,
partim grumolum, partim floridum,
quæ sanguinis mictio ad duas septi-
manas durauit, donec æger conual-
uit.

Per quam autem viam istæ eua-
cuationes fiant, non ita planum est.
Et cum materia in thoracis locis cõ-
sistere possit in pulmone, in lateri-
bus seu musculis thoracis, & in ca-
uitate thoracis, de singulis seorsim
inquirendum, & per quas vias ma-
teria è pulmone, è lateribus, è caui-
tate thoracis cum per urinam, tum
per alium euacuari possit, explican-
dum. Pulmones primò quod atti-
net, *Galen. 6. meth. med. cap. 4.*
leuem arteriam pulmonis, quantum
puris ex ruptâ vomicâ suscepit, id ad
sinistrum cordis sinum deferre sta-
tuit, quod inde in magnam ipsius
arteriam incidens per renes transeat
ad vesicam. Verùm viam hanc alij
reliiciunt, & inter eos *Andreas Mat-
thiol. qui lib. 1. 1. Epistol. ad Iulian.*
Alexand. scribit, credibile non esse,
ut pus, quod fœdus & corruptus
sanguis est, non solum transeat per
arterias, in quibus vitales spiritus
continentur, sed & sinistrum ven-
triculum cordis ubi vita humana &
sanguis ille purissimus cum spiritu
vitali continetur, qui in grauissima
symptomata adeoq; ipsam mortem
inferat; quod pluribus ibi probat.

Ipse verò putat, transmitti pus ad
venam sine pari, vel ad alias fortas-
se, quæ circa pulmones vel thora-
cem habentur, & inde in cauam, in
renes & vesicam.

*Iulius Alexandrinus in epistol. res-
pons.* Galenum tueri conatus, scri-
bitque aliud longè esse, si quid natu-
raliter sit, atque quod præternatu-
raliter; cum à facultate quadam,
atque cum ab affectu; cum pars va-
let atque imbecillis est; cum expel-
litur noxa, atque cum recipitur.
Ideoque licet in syncope, tremore
cordis, pestilente aëre attracto cor
valde afficiatur: tamen si valida ex-
pultrice facultate utatur; longè ve-
nientem noxam repellere. Idque
tum etiam facere naturam, cum pul-
monis abscessus ruptus est. Tum
temporis enim robore suo constat
cor, spiritibusque prædium validis
cum aliis vnâ insurgere ad reno-
uix celerrimam quandam expulsi-
onem. Deinde *Matthioli* sententiam
improbat, statuitque longè facilio-
rem è pulmonibus esse materiam tran-
sire in asperas, leuësque arterias,
quàm ut primùm in pectoris caui-
tatem è pulmone effundatur, & hinc
venæ sine pari exiguis osculis sese in-
sinuet, quod omnino fieri debet, si
materia è pulmone à vena sine pari
recipi debet.

Verumenimverò sit sanè cor va-
lidum, & quamprimùm affluentem,
à pulmone materiam à se repellere
conatur, tamen id sine grauibz
symptomatibus, palpitatione cor-
dis, lipothymia & similibz fieri
non posset, cum videamus saltem
flatus ex hypochondriis ascendentes
talia symptomata excitare, licet cor
aliàs saluum, & validum sit. Nisi
forsan quis hoc pus non confertim,

sed sensim ad cor deferri, neque id adeo malignum, sed à natura satis elaboratum esse statuat. Ideoq; non quidem planè nego per hanc viam naturam pns quandoque euacuare: cum constet, eam interdum mitas vias querere, & Nicol. Massa anno 1513, *vt in introductione. f. 56. & 57.* refert, obseruauit abscessum in cuiusdam dextro ventriculo cordis & auriculam sinistram ulceratam totam cum sanie manifestam, qui tamen sanus visus fuit, & Benuen. *lib. 89.* reperit abscessum in sinistro cordis ventriculo pituita redundantem in quodam, qui egregius fur fuerat: Veruntamen non puto naturam facile viam hanc affectare; cum tutiores habeat, vt mox dicitur.

Nonnulli ad vias quidem nobis occultas & ignotas, naturæ tamen congenitas, & illam Hippocr. *in l. de alimentis. lib. 1. & 2.* confugiunt. Verùm non est opus ad occultas vias confugere, cum manifestæ dentur.

Viam autem manifestam vt dictum Machiol. & alij statuerunt esse per venam *æzozæ*. Verùm non videtur de nihilo quod Machiolo obicit Iul. Alexandrinus, difficilem satis esse transitum, si nam etia primùm è pulmone in pectoris cavitatem deberet effundi, atque ibi empyema efficere, deinde demum sese exiguis venæ sine pari ramis insinuate, & quidem per membranam adeo densam, quæ thoracem intus hincingit.

Itaque alie manifestæ viæ querendæ, per quas etiam ex pns pulmonibus materia ad renes & vesicam peruenire possit. Viarum autem istarum prima est arteria venosa v. Bauhinus, *l. 2. thea 12. Anat. 1. 26.* ducet, quæ per pulmonem distribuitur, si per

eam: ad ventriculi sinistri principium, non verò in ipsum sinistram ventriculû cordis deferatur, & deinde per eius ramum peculiarem & insignem quem c. 22. describit ad emulgentes, indeque ad renes, & vesicam deferatur. Altera via in quibusdam est venâ pulmonaria, quæ à venæ cauz truncò non procul ab exortu veniarû diaphragmaticarum ad pulmonem in nonnullis corporibus mittitur. Obseruauit hanc venâ superioribus annis Nicolaus Sanmichelius Nouocomensis, vir suo tempore in dissectandis corporibus exercitatusissimus, qui in cadaueribus quibusdâ venam magnam, vbi diaphragma excessisset priusquam in cor se insinuat, ramulum quendam rectâ ad pulmones misisse obseruauit, vt refert Iohan. Costæus, *in annot. in Anat. l. 3. sen 10. t. 4.*

Si autem in latere continuatur materia, quod in pleuritide accidere solet, viæ manifestæ ad renes sunt, primò venâ *æzozæ*, per quam sanguis, vel pus in venam cauz effunditur & hinc in renes ac vesicam porrò transmittitur. & cum vrina euacuatur, obseruatumque est à recentioribus Anatomicis, à sinistro ramo venæ *æzozæ*, interdum ramulum ad venam emulgentem rectâ ferri. Deinde materia è thorace peruenire potest ad renes & vesicam ex intercostalibus arteriis ad arteriâ magnam deducta, & hinc ad renes transmissa. Tertio etiam materia per phrenicum venæ cauz & dictum arteriæ à Bauhino descriptum ad venæ vias peruenire potest. Atque per has vias materia cum è pulm. me, tum è lateribus cum vrina euacuari potest.

Per alium autem puris euacuationem quod attinet, plerumque hæc ad occultas vias, quas àb natura querit

Obseruatio Nicolai Sanmichelij de ramulo venæ cauz.

confugiunt: sed & hic manifestantur. Et primò quidem vias è pulmone ad aluum quod attinet, potest è pulmone materia euacuari per aluum, primò per ramum illum arteriz venosæ, modò dictum, & à Bauhino descriptum, siue delata in arteriz magnæ ramum cœliacum, qui in ventriculum effunditur, & ab hoc in intestina, siue feratur per arteriz magnæ ramum alterum mesentericum dictum, qui supra emulgentes ad mesenterium & intestina mittitur.

Alij volunt, quòd materia per venam arteriosam in dextrum ventriculum cordis, & ex hoc in truncum venæ cavae, & inde per hepar ad ramos venæ portæ transmittatur, tandèmq; per ramum mesentericum in intestina perueniat. Verùm etsi per hanc viam euacuationem fieri non impossibile sit, longa tamen est, & per ambages.

Tertiò si vena illa pulmonaria à Nicolao Sanmichelio obseruata adsit, per illam etiam è pulmone ad aluum mediante vena portæ peruenire potest.

Purè autem in pleuritide & lateribus affectis per aluum euacuationis via manifesta est, primò per venam sine pari, per quam in venam cauam & hinc in portam transire potest. Deinde per truncum arteriz magnæ transire potest, si scilicet materia ex ramis intercostalibus in aortam, & hinc siue per ramum cœliacum, siue per mesentericum ad intestina mittatur. Neque impossibile per arterias materiam, præcipuè natura id agente, euacuari posse, cum aliàs etiam arteriz in morbis ab humoribus viciosis non semper planè immunes videantur.

Si verò materia in thoracis cauitate contineatur, verisimile est, eam potius in pulmones, quorum membrana rarior est, penetrare, & hinc seu per vrinam, seu per aluum, per vias modò dictas euacuari, quam per membranam densam in latus selesse insinuare. Et obseruatum est, materiam interdum satis crassam è cauitate thoracis in pulmonem receptam & hinc per tussim reiectam fuisse, sicuti historia habetur apud Guilhelm. Fabricium, *cent. 1. obs. 46.* de quodam, qui cum in pectore vulneratus esset, duas turundas, quæ ex incuria per vulnus in cauitatem thoracis illapsæ erant, tussim reiecit.

CAPVT XVII.

De Thoracis vulneribus.

Thoracis vulnera alia sunt non penetrantia, in quibus scilicet membrana succingens adhuc integra est; alia penetrantia, in quibus non solum muscoli thoracis, sed & pleura perforatur: vt ita vulnus in ipsam thoracis cauitatem penetret. Penetrantia rursum sunt vel sine partium in thorace contentarum læsione, vel cum earum læsione, puta pulmonis, mediastini, pericardij, cordis, venæ cavae, arteriz aortæ, asperæ arteriz, gulæ.

Vulnera thoracis non penetrantia.

Si thoracis vulnera sunt simplicia, neque in cauitatem eius penetrant, & nullus alius affectus coniungatur, eandem, quam alia vulnera, indicationem habent. Itaque 1. sanguis sistendus, si opus sit, modo in aliis vulneribus vñtato, vulnusq; fascia ligandum, quæ talis sit, vt tutò contineat,

Thoracis
vulnera.

Vulnera
thoracis
non penetrantia.

nectamen tam alta, vt premendo do-
lorem exciret. Et si vulnus paruum
sit, breui temporis spatio sanari so-
let. Quod si amplius sit, digestiuium
aliquod vnguentum imponendum,
quem in vsum terebinthina clara o-
dorata præcipue utilis est. Partes vi-
cinæ oleo chamæm. ros. inungende.
Tandem vbi in vulnere coctio appa-
ret, emplastrum aliquod conue-
niens, vt barbarum, Basilicon Me-
sue; aut diapalma imponatur.

enim aër egredi non potest, imò
nec specillum vel stylus adigi. Ideo-
que ægrum, dum vulnus explora-
re volumus eo situ collocari debe-
mus, quo erat cùm vulnus accipe-
ret. Ex instrumento quoque, quo
vulnus inscriptum est, aliquo modo
profunditas vulneris agnosci potest.
Angustiora enim instrumenta pene-
trationis suspicionem præbent, præ-
sertim si vulnus extrâ nonnihil la-
tum sit. In penetrantibus quoque
& amplis thoracis vulneribus res-
piratio interdum læditur, & voce
æger priuatur patente vulnere; vul-
nere verò clauso respiratio & vox
redit. Postea & alia signa accedunt,
dum sanguis aut pus in pectore cu-
mulantur. Tussis est molesta, spu-
tum sit cruentum vel purulentum,
lateris dolor grauitas ac pondus cit-
ca costas nothas percipitur. Febris
sæpè accidit, & vbi æger se in æ-
grom latus conuertit, fluctuatur in
thorace percipitur, si sanies eo con-
tinetur.

De pulmonis & mediastini vulne-
ribus iam dictum; de cordis & cæso-
phagi vulneribus suo loco dicetur.

Si vena cava in thorace vulnera-
ta sit, magna sanguinis crassi copia
effluit, viresque valide deiciuntur,
facies pallor, & paulò post mors se-
quitur.

Si arteria magna vulnerata sit, san-
guis clarus & tenuis, copiosus ac
cum saltu exit, si ei via pateat. Pul-
sus tremulus adest, vires collabun-
tur, syncope accedit, & paulò post
mors.

Si aspera arteria sit vulnerata, parû
sanguinis effluit, dolor in dorso per-
cipitur, vox sit rauca, & tussis acris.

Prognostica.

1. Vulnere hæc, quàm non pene-
trantia

F f iij

Vulnera
penetrantia.

Vulnera penetrantia.

Signa Diagnostica.

Signa.

Vbi verò vulnus profundius est,
primò diligenter inquirendum, an
penetret vsque ad cauitatem thora-
cis, an non. Cognoscitur autem hoc
visu in magnis vulneribus; in aliis
tactu, specillo scilicet, seu stylo ex-
ploratorio, vel candela cereâ immis-
sa, item auditu, dum aër per vulnus
cum strepitu exit. Aëris tamen per
vulnus exitus, qui penetrationis si-
gnum est, aliis etiam modis explora-
ri potest: Si nimirum penna, vel la-
na floccus vulnere imponatur, vel
candela accensa admoueatur & re-
tentu aëre inspirato atque ore & na-
ribus clausis æger efflare conetur.
Tunc enim exeunte aëre lana mou-
eri, & flamma ventilari ac mou-
eri solet: Hæc autem per aërem e-
gredientem exploratio fallere po-
test, si vulnus obliquum aut tortuo-
sum sit, aut costa aliqua fracta vel
depressa, aut muscoli intercostales
siti hominis ab eo, quem habebat,
dum vulnus acciperet, euariant,
vulnusque tegant, vel pars exter-
na vulneris, quod turunda non im-
missa sit, conglutinata sit. Tum

Prognostica

trantia, longè sunt periculosiora; etiam ubi viscera interna non sunt læsa, quia aer externus per vulnus non aliteratur ingreditur, internasque partes offendit, & aëre interno & calore expirante virtus debilitatur. Et cum vulnus penetrare non possit; nisi pleura perforetur, illa verò densa, sensu exquisito prædicta sit: ac reliquis thoracis partibus communis, dolores, tussis inflammationes; febres hinc excitantur.

2. Præterea nisi vulnera hæc diligenter curantur, facile in empyema & fistulas degenerant. Quod ubi accidit, sæpè pus foetidum redditur, tandemque agro mors atteritur.

3. Interdum accidit, ut licet externum vulnus conglutinetur & consolidetur, in sputo tamen adhuc nota sanguinis appareant, quod accidit, quia partes internæ non sunt consolidatæ, è quibus cruoris aliquid & sanies in cavitate thoracis emanat, unde empyema generari potest.

4. Si simul quidem tum interna tum externa parte sanescat, cicatrix autem intus debilis, aspera & livida existat, quandoque reseratur, eoque madidus purulentus evadit. Iterum verò etiam exulceratur, si quis plus iusto laboravit & extenuatus fuerit, pituitæque & bilis ad cicatricem affigatur, & si morbo alio deventus extenuatus fuerit. Hippocrates, *lib. 1. de morbo.*

5. Vulnera hæc in dorso periculosiora sunt, quàm in parte anteriore, quia ibi plures & maiores nervi ac tendines sunt, ibi præterea venæ cava, arteria magna, aspera arteria, gula, & omnia spiritualia

organa dorso alligantur. Cautem venæ & aortæ arteriæ vulnera lethalia sunt, ex sanguinis, qui vitæ thesaurus est, profusione, quod loci sibi non potest solent, sine varia prava symptomata supervenire.

6. Si autem prava symptomata non superveniant, sanationis recuperandæ spes est. Unde de thoracis vulneribus Albucasis scripsit; Si prætereat dies tria vulneris, & non accedat infirmo spasmus vel tremor cordis malus, vel structura anhelitus, & vides eius dispositiones bonas, tunc scias vulnus esse sanum, & virtutem fortem, cui nihil impossibile.

Curatio.

Indicationes quidem vulneris, Curatio. quatenus tale, eadem sunt, quæ vulneris non penetrantis: quia verò sanguis in cavitate thoracis effunditur, & humores viriosi è corpore reliqui ad vulnus affluere danda opera ut sanguis sistatur, humorum ad vulnus affluxus prohibeatur & sanguis, qui in thoracem effusus est, saniesque, qui ibi colligitur, evacuetur.

Itaque 1. ut sanguis sistatur, turunda oui albumine & aliis medicamentis sanguinem sistentibus illita immittenda. Quod si non efficiat, etiam per os medicamenta sanguinem sistentia exhibenda, ut consuetudine rosarum, bolus armenus, terra sigillata; succus portulacæ, trochisci de carabe, terra sigillata & similia: de quibus in sputo sanguinis dicitur.

Deinde si gravia symptomata metuenda sunt, & sanguis non valde affluerit, sanguis è latere opposito vacuandus, aut corpus si cacochymicum evacuandum.

Tertio, ubi magna vasa non sunt

vulnerata, sanguisque in pectus non multus effusus, vulnus statim consolidandū, ne ab aëre externo in vulnus sese insinuante, pulmones lædantur. Alijs etiam obseruandum, vt vulnus quoties opus est, celeriter obligetur, ne aër per vulnus patens in thoracem trāseat. Si verò de sanguine in thoracem copiosè effuso suspicio sit (quod cognoscitur, si Medicus anatomiz peritus ex loco vulneris perspiciat, an magnæ vel parvæ venæ vel arteriæ vulneratæ sint) vulnus turunda apertum seroandum, dandāq; opera vt sanguis quamprimum effluat, ne intus corrumpatur. Vbi notandum, vt turundæ filo alligentur satis longo, ne in cauitatem thoracis decendant, sicut in obseruat. Guill. Fabricij, *cent. 1. obs. 46.* habetur, quidam duas turundas in pectus delapsas; ac post tres menses tussii reiectas fuisse. Est & adhuc obseruandum, ne turundæ nimis sint longæ, ne pulmones lædant. Vt etiam facilius sanguis effluat, iaceat æger super latere vulneraro. Et si sanguis in thoracem effusus non spontè effluat, extrahendus instrumento, quod Græci *σφραγίς* nominant. Et si vulnus nimis angustum sit, aut obliquum, paululum dilatandum cute scissâ, aut si æger sectionem admittere nolit, turunda ampliandum. Si accepto vulnere nullus sanguis effluat, sique in pectore detineatur, æger granum vniui molchi sub lingua teneat. Ita enim statim sanguis fluere incipit, quod nonnulli pro secreto habent.

Si etiam ob materiæ copiam in thorace contentam æger malè habeat, vt materia continuò effluat, nec ibi patrelcens, febrem, anhelitum difficultatem & tussim excitet, cānulam plumbeam vel argenteam plumbus

in locis perforatam, extra verò alis munitam, immittere decet quæ digestiuo medicamento prius illincta est.

Si sanguis sit concretus, vt exire nō possit, atteruandus & incidendus liquore conueniente in cauitatem pectoris infuso. In quem vltimū cōmodum est melicratum, quod ex vna parte mellis & duabus partibus aque ad tertiz partis consumptionem coctis, vel mulium, vel mel rosatum, in aqua hordei aut consolidæ, aut veronicæ vel agrimoniz dissolutum. Et si materia sit viscida & tenax, aliquid oxymelitis addere vtile est. Liqueor autem hic tepidus iniiciendus; vt & topica omnia medicamenta, hic calida vsurpanda, cūm frigus sit pectoris inimicum.

Extra verò applicentur medicamenta vulneri idonea, exsiccandi vi prædita; humectantia verò & oleosa vitanda. Valde in huius vulneribus commendatur sequens vnguentum.

℞. Resina pini rec. claræ & odor. ʒ. xii. ol. lauri puri, res. ebull. an. ʒ. iii. gummi elemi puri, ʒ. iii.

Resina & gummi super igne liquefiant, deinde addantur olea & terebinthina, parum bulliant, donec vnguenti crassitiem acquirant, tandem coentur.

Et ne partes vicinæ in consensum trahantur, & odore afficiantur, loca vicina æstate oleo rosaceo, hyeme chamæmelino inungenda sunt. Interina etiam medicamenta vsurguntur thoracidecata, quæ materiam exsiccāt, eius corruptionem prohibent, & si ad pulmones quid perueniat, quæ ad eius exspirationem profunt, vt syrupus de iunibz, scaph. Veneris, ac glycyrrh. scab. cum aqua scab. tussilag. veronic. capill. V. ucr.

Tandem etiam medicamenta, quæ intus conglutinationem adiuvant, usurpanda, ut syrupus myrtinus, conserua rosarum, mel rosarum, consolida, plantago, bolus Armenus & similia. In tota vero curatione omnia metallica huc omittenda, cum valdè noceant.

Sæpè verò accidit, ut vulnus extra conglutinetur, antequam intus planè exsiccatum & consolidatum sit. De quo Hippocrates, in *Coac. lib. 6. sect. 2. comm. 1. aphorism. 5. secundum Hollerii distinct.* Quicumque vulnerati in thorace externa vulneris partes sanati, interna verò non periclitantur, ne empyici fiant; ac quibus interna parte infirma cicatrix obducta, vulnus ea parte reficiatur, rupta cicatrice. Ideo quod supra etiam dictum, danda opera ut vulnus probè mundetur, & intus insuper consolidetur, antequam extra fiat consolidatio. Si verò tale quid accidat, ægri ut empyici curantur. Si per urinas materia & pus euacuetur, adiuvanda urinam moventibus.

Dieta.

Dixit.

Aër sit temperatus & potius ad calidum, quàm frigidum declinet. Victus sit initio tenuis: donec inflammationis terminus præterjerit. Cibi in principio astringentes vitentur, ne sanguis concretus in cavitatē thoracis detineatur. Conveniunt in cibis, amygdalæ, passulæ, hordeum. Æger quiescat, nec moveatur, vel multum loquatur; caueat quoque iram, & alios affectus nimios.

CAPVT XVIII.

De Fistulis thoracis.

Nonnunquam post tumores Fistula aut vulnera thoracis malè cū thoracis; rata fistulæ in pectore excitari solent, quæ difficilis sunt curationis, præsertim si ossa, sternum, spina dorſi, aut costæ simul afficiantur.

Differentia.

Sunt autem fistulæ, aliæ penetrantes, aliæ non penetrantes.

Differentia.

Signa diagnostica.

Cognoscuntur facillè, & oculis signarent, & si penetrent, stylo vel aëris egressu cognoscuntur.

Prognostica.

1. Fistulæ hæc curatu sunt difficiles; cum partes hæc non solum perpetuò moveantur, sed etiam, præcipuè si penetrant, multæ superfluitates in iis colligi soleant.

Prognostica.

2. Quæ in dorſo sunt fistulæ, periculosiores sunt, ob maiorem nervorum copiam & spinalem medullam vicinam, ac ratò curantur. Quæ in musculis sunt circa magna vasa, non satis turè curantur.

Curatio.

Ideoque Medicus certus sit, quæ Curatio vasa circa fistulam ducantur; ne curatione venas, arterias, nervos lædat, ægròque noceat. Ac proinde ubi dilatatio fistulæ requiritur, turundis illa tutius, quàm ferro peragitur.

Cæterum medicamenta quod attinet externa, quæ in fistulam iniiciuntur, parantur ex hydromelite, vel mulso, decocto. *rad. caryophyllat. geniane. ireas, aristolochia, veronica, valeriana, salina, millefolii hyperici:*

Externa.

hypericiflor. cauda equina, pilosel. Que in vino coquantur & colaturæ mel clarum addatur. Potest & thus ac myrrha addi.

Vt *℞. Hyperic. flor. rosar. rubr. cauda equina. centaur. min. an. M. j. rad. caryophyllata, aristoloch. ireos, an. ℥. i. Coq. in vino. Colaturæ ℞. lb. j. mell. opi. ℥. iii. Dissolve iburis, myrrh. an. ℥. i. lb.*

Decoctum hoc vel simile toties in vlcus iniiciatur, donec mundum fuerit.

Post iniectiones tales, tale vel simile medicamentum cum turunda immittere potest.

℞. Terebinth. ℥. j. sarin, lupinor. ℥. lb. fabar. ℥. ii. succi apij, agrimon. plantag. an. ℥. j. mellis ℥. j. lb. myrrh. mastich. iburis, ana ℥. ii. Misce super igne. F. vnguentum.

Vlcere mundato, iniectiones & ynguenta exsiccatia & conglutinantia, vt in aliis vlcenibus, adhibenda ex rosis, radicibus consolidæ, balaustis, sumach, myrrha, thure, mastiche, aloë, radice ireos, terebinthina & similibus.

Interna.

Dum verò externa adhibentur, intus etiam vsurpentur medicamenta ex ijs, è quibus potiones vulnerariæ parari solent, nimirum ex *agrimonia, plantagine, veronica, scabiosa, hyperico, betonica, sanguisorba, hedera terrestri, salvia, rosis.* Vt *℞. Fol. scabios. M. ij. agrimon. caryophyllata, sanicula, veronica, ana M. i. tussilag. pulmonar. lingæ cernine, ana M. lb. rad. caryophyllata, ℥. j. vincetoxici, ℥. lb. Coqu. in vini albi & aqu. fontanæ, an. lb. i. in vase duplici. Colatura saccharo dulcoretur.*

CAPVT XIX.

De Empyemate.

Pleuritidem, peripneumoniam, & alios thoracis affectus non raro sequi solet malum, quod Græcis *ἰσχύμα*, appellatur, quo qui laborant, *ἰσχυος*, & *ἰσχυρί*, suppurati & purulenti, dicuntur: Et si enim, si nominis proprietatem spectes *ἰσχύμα*, omnem suppuracionem & puris collectionem significat: vltus tamen obtinuit, vt in specie id suppuracioni seu purulentæ in thorace tribuatur.

Est ergo *ἰσχύμα*, puris in cavitate thoracis collectio. Solent quidem nonnulli empyema appellare, cum non solum in cavitate pectoris, verum etiam inter pleuram vel costas, aut in pulmone pus colligitur: verum magis propriè & specialissimè solet empyema nominari, cum tantum in cavitate thoracis sit puris collectio.

Causa.

Colligitur autem pus in cavitate thoracis ex præcedentē aliqua, & in abscessum mutata ac rupta partium vicinarum inflammatione, vt pleuridie, peripneumonia, angina interdum & rupto tuberculo ad spinæ partem anteriorem. De quo Hippo. *s. aphor. 10. Quibus ex angina in pulmonem mali sit conuersio, ij intra septē dies moriuntur. Si verò hos effugiant, purulenti sunt.*

Nonnunquam etiam sine inflammatione pus in pectore colligitur, quod fit, quando sanguis è vasis suis in cavitatem thoracis effusus, ibique detentus putrescit, & in pus

mutatur. Et quidem si post venam in pulmone ruptam vlcus sequatur, quod continuo saniem in thoracem effundat, verum sit empyema. Si verò sanguis copiosus effusus in loco alieno corrumpitur, materia illa pus minus propriè dicitur. Plerique addunt destillationem è capite, de qua Hippocrates, 7. aphorism. 38. *Destillatio in ventrem superiorem ad supurationem peruenit intra dies viginti.* Nonnulli tamen pituitam in pectore immutatam minus propriè pus appellari censent. Est enim hæc purulenta materia non merum pus. Nam hæc est ex humore excrementitio; cum merum pus ex nutrititia materia fiat.

Omnes autem modos, quibus pus in thoracem effundi potest, prolixa oratione descripsit Hippocrates, lib. 1. de morb. qui hæc de re videatur. Cuius summa hæc esse potest: Empyema verum esse, quando in ipsa thoracis cauitate pus continetur, idque quatuor modis fieri. 1. Ex pleuritide non satis expurgata. 2. A pituita ad cauitatem thoracis à pectore defluente. 3. Ex vena in thorace rupta. 4. Ex vena in pectore aperta. Non verum autem empyema esse, cum non in cauitate pectoris, sed in pulmone materia hæreat, idque etiam quatuor modis fieri. 1. In peripneumonia suppurata & non expurgata. 2. ex pituita è capite descendente & in pulmone putrescente. 3. ex vena rupta in pulmone. 4. ex varice in pulmone generato & rupto.

Differentia.

Differen-
tia.

1. Pus interdum totam thoracis cauitatem occupat, interdum eius alteram partem, dextram vel sinistra.

2. Ex differentia materię datur empyematis differentia, quæ nunc

benigna est, nunc acris & fœtida.

Signa Diagnostica.

Signa quod attinet, quæ inflammationem aliquam in thorace in abscessum, è quo post empyema futurum est: mutari significant, si pleuritis & peripneumonia, vel alia in pectore inflammatio, remediis idoneis adhibitis non cessat, ac præterea rigores & febres subsequuntur & grauitas: morbum in empyema mutari indicio est. Si enim materia intra dies quatuordecim non expurgatur, in pus mutatur. Rumpitur vero vomica circa diem vigesimum, interdum trigessimum aut quadragessimum. Hippocrates, 2. prognost. aphorism. 48. Rigor verò fit, dum à pure genito vicina membranosa corpora velliscantur. Ponderis verò & grauitatis sensus in thorace pro dolore percipitur, quod humor, qui ante in partem inflamatam dispersus erat, in vnum locum iam totus colligitur.

Signa verò iam facti ex vomica rupta empyematis proponit Hippocrates, 2. prognost. 60. & 61. Et quidem recentis ac nuper facti empyematis signa sunt eadem, quæ inflammationis suppuratæ modò esse diximus, quibus difficilior respiratio accedit. Quamvis enim rupto abscessu dolor sedetur, & hinc diaphragma & musculi thoracis librius moueri possint: tamen quia pulmo à circumfuso pure grauatur, ut liberè moueri non possit, & præterea aliqua puris pars à rara pulmonis substantia imbibitur, & hinc pulmo humidior & grauior redditur, bronchiæque eius à pure imbibito obstruuntur, respiratio redditur difficilior. Galenus, 4. de loc.

affect. cap. 9. addit fluctuationem. Nam, inquit, ubi quis subito à decubitu transmutatur, idque maxime si ab vno latere in aliud se conuertens defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri haud dubia coniectura est. Quin etiam in his fluctuatio saepenumero haud obicure auditur. Nisi forsàn puris crassities aut copia, quæ omnem penè thoracis capacitatem semper, impediatur fluctuationem illam audire.

Diuturnioris autem empyematis signa sunt, quod febris quidem mitior redditur, sed lenè, partim putrida, partim hectica perpetuòque infestat, quæ de die quidem mitior, sed circa vespèram exasperatur, & noctu vehementior est. Tussis est perpetua, spùtumque tandem fit purulentum, adest anxietas & cibi fastidium ex vapore putrido orta, sudores multi superueniunt, sed inutilis & non copiosi, sed frequentes ob virium imbecillitatem. Ex enim debiles alimentum etiam non in nimia quantitate sumptum superare & rectè apponere non valent. Tandem oculi fiunt caui, maxillæ ruborem contrahunt, ob vapores puris acres calidòsque faciem ipsam calefacientes, pustulæ circa pectus erumpunt, subliore ac aciore puris parte ad extremam cutem penetrante pedes intumescunt.

Signa differentiarum quod attinet primò locum, in quo pus continetur, ita nosse docet Hippocrates, 2. *prognost. aphorism. 50.* Si empyema in altera parte tantum existat, hos conuertere & discernere oportet, doceantur in latere, & an alterum altero calidius sit, atque cubantem supra latus sanum interrogare,

an sibi videatur onus aliquod desuper suspendi. Si enim ita est, in quodcumque latus pondus insit, in altero suppuratio existit. Quemadmodum si utrinque calor & pondus sentiat, in tota thoracis cauitate pus continetur. Avicennas, hoc, quod habet ex Hippocrate, *lib. 3. de morbis*, addit: Applicetur, inquit, linteam madidum thoraci secundum utramque partem dextram & sinistram: citius enim exsiccat illud, quod supra partem pus continentem appositum est.

Puris verò conditio, si reiciatur ex fœtore & aliis qualitatibus cognoscitur.

Prognostica.

Prognostica empyematis recensuit Hippocrat. 2. *prognost. 63.* Prognostica

1. Si cum abscessus ruptus est, febris eadem die dimiserit (id est, ita mitis reddita fuerit, ut si præcedenti vehementiæ conferatur, prope modum pro nulla habeatur. nam planè non cessat) æger cibum appetat, siti careat, (nam vapores hæctidi ac terri à thorace ascendentis ad linguam ac palatum ob communem tunicam simul orificium ventriculi afficiunt, & hinc appetitus deiicitur, sitisque excitatur. Quapropter si breui tempore post eruptionem hæc symptomata remittant, puris ex qua quantitas, idque benignius significatur. Si verò hæc symptomata non remittant, puris ingentem copiam & prauitatem significant) venter exigua & consistencia deiiciat, pus leue, album sit & æquale, & pituita vacans, absque dolore, & valida trissi expurgetur, ægrum euasurum spes est.

2. Si verò contrarium accidat, & horrores post puris eruptiones

maneat, febris non desinat, aut cum videatur desinere, recrudescat, ægerque sitiatur, nec cibum appetat, aliis sit humida, sputum sit prave substantiæ, ut & coloris mali, flauum, viride, nigrum, fœtidum, pituitosum, inæqualis substantiæ pereunt, quibus hæc omnia adsunt. At quibus alia adsunt, alia non, horum quidam moriuntur, quidam in multo tempore euadunt.

3. Plerumque verò epyema in phthisin transit, & tum collum ac tempora valde extenuantur, pedes intumescunt, vngues curuantur. etenim qui seruatur, ubi pleuritis vel peripneumonia in empyema transit, intra dies quadraginta pus per sputum eiici debet, quod si non fiat in phthisin transit, 5. aphorism. 15. Non quidem opus est, ut quadragesimo die æger planè ab omni pure liberatus sit, sed sufficit, si eo tempore tanta eius copia reiecta sit, ut reliquæ exiguæ, quæ supersunt, facile postea euacuari possint, cuius euacuationis non ita certus terminus definiri potest. Nam ultra diem quadragesimum mollis & rara pulmonis substantia, pus sine damno vix sustinere potest. Ideoque opus est, ut intra eum terminum maxima eius pars reiciatur.

4. Quibus in magna puris copia intra thoracem & pulmonem collecta totus thorax in respiratione attollitur, celesterrimè suffocantur, Galenus, de loc. affect. cap. 7.

5. Malum periculosus est, si pus totam cavitatem thoracis occupet, quàm si in altero solum latere contineatur.

6. Empyema tamen, quod vnum saltem latus occupat, periculosius est, si sinistrum latus occupat, quàm

quod dextrum; quia sinister cordis ventriculus, ut nobilior, tum magis afficitur.

7. Quicumque empyi vruntur aut secantur, si album pus effluat, euadunt, si verò subcrentum & fœtidum, pereunt, 7. aph. 44.

8. Quandocunque empyi vruntur aut secantur, si pus aut aqua vniuersum effluerit, certò moriuntur. Hippocrat. 6. aphor. 27.

9. Purulentos moderatius habentes si sputa graueolentia consequuntur, recidua interimit. in Coacis.

10. Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, ij ferè moriuntur. in Coacis.

11. Ex suppurationibus, quas pulmonum morbi excitarunt, ferè senes moriuntur, ex cæteris verò iuuenes, ibid.

12. Inflammatio lateris aut pulmonis in suppurationē versa, quandoque sursum rumpitur, id quod periculosius est. Si enim pus quàm citissimè per sputum non reiciatur, tabidi fiunt. Quandoque verò per aluum & vesicam euacuatur id, quod cum minore periculo coniunctum est, Paulus Aegineta & Aëtius. Cùm enim ut æger citò à pure liberetur euacuatio per tussim ac sputum non sufficiat; siquidem per eam sensim & lentè pus euacuatur, & interea temporis à pure in thorace & pulmone moram trahente substantia pulmonis faciliè corrumpatur, commodior est, & minore cum periculo coniuncta, per aluum vel urinam puris euacuatio.

Curatio.

Si prohiberi à Medico nequit Cuiusmodi suppuratio, adiuvatur moderatè calidis & humidis cataplasmatibus & emplastris impostis, de quibus in

pleuritide dictum. Maturato ab-
cessu ut maturè rumpatur, opera-
danda, ne pus partem ampliùs cor-
rumpat, forti locutione, sternuta-
tione irritata.

Rupto abscessu, ut is abstergatur
& consolidetur, materia verò eua-
cuetur, danda opera. Euacuatur
autem materia vel sensibiliter, vel
insensibiliter. Sensibiliter rectius &
commodius euacuatur, & quidē fre-
quentius ac tutius per sputum vel
thoracis perforationem, vel per
aluum, vel per urinam. Itaque con-
siderandum, quò materia vergat.

Si tussis urgeat, ut per sputum ex-
purgetur, detergant aqua sacchara-
ta, hordei, hydromel & ptisana cum
melle, quæ ut alimentum medica-
mentosum, & medicamentum. fa-
miliare in omni empyematis genere
ac quouis tempore conveniunt. Radix
indis cum mulla, hyssopus, deco-
ctum glycyrrh. syrup de prass. cap-
pill. ♀. Imprimis efficax est aqua
mulla, in qua loca sit terebinthina,
vel cremor terebinthinæ. Vel ℥.
Succi hederæ terrestris ℥. iv. prassy ℥.
ii. thuris. myrrh. an. ℥. i. diapem. ℥.
ss. F. Lohoh. Vel ℥. Ruberrima re-
centis brassica folia confusa. Coqu.
in Balneo vase clauso. Liquor sac-
charo dulcoretur, & manè ac ves-
peri bibatur.

Medica-
mentori-
delectus

Materiæ tamen expectorandæ in
delectu medicamentorum habeatur
ratio. Si enim pus fuerit biliosum,
acre & erodens, eligenda & vñ-
panda, quæ acrimoniam eius mi-
gant & leniunt, ut bordenum, musba,
passulle, sebest. glycyrrh. amygdal.
dulc. pinæ, violar. capillus ♀, semen
malva syrup. violar. capillorum ♀.
rotula asyraganti. frigid. draveos
simpl. Si verò pus non acre, sed cras-

sius sit, attenuantia, incidentia &
abstergentia vsurpanda, *vi. hyssopus,
tusilago, radix belea. semen cartha-
mi, anisi, feniculi, carica, syrup. de
hyssop. de glycyrrh. de tusilag. loh. sa-
num & expertum.*

Si verò pus nimium crassum sit &
pituosum, validius incidentia &
attenuantia vsurpanda, sed mode-
ratè & cum arteriacis ac thoracis
lenientibus miscenda; quo modo &
pus crassum inciditur & attenua-
bitur, & humectatione diluatur, &
ad exspuitionem aptius reddetur.

Si verò ad vias urinæ vergat, ea,
quæ extergendo urinæ meatus pur-
gant, vel quæ serosam humiditatem
suppeditant, medicamenta exhibe-
antur, ut decoct. ex rad. aperientibus,
gran. Alkekengi, ciceribus,
rubris, capill. Veneris, sem. 4. frig.
maior. Ut ℥. Radic. aperientium
maceratarum in vino albo, glycyrrh.
an. ℥. i. sem. 4. frigid. maj. ana ℥. i.
ss. adiant. M. i. cicurum rubrore
M. ss.

Coq. ad dimidias. Aromatizentur
cum radic. ireos ℥. ii. & dulcorentur
saccharo.

Si verò ad intestina feratur exhi-
beatur ius galli decrepiti, decoct.
betæ, caulium graminis, prass. cas-
siæ, quæ thoracem lenire & aluum
movere possunt, ut & terebinthi-
na: vel clysteres abstergentes ini-
ciantur. Tandem syrupus aliquis
abstergens & adstringens nonnihil
adhibeatur, quæ intestinorum exul-
cerationem prohibeat, ut syrup. de
rosis simpl. de rosis siccis cum de-
cocto plantaginis. Vel etiam ad
prohibendam intestinorum exulce-
rationem clysteres ex lacte, fur-
furibus & semine psyllij mician-
tur.

Si verò tanta puris copia in thorace collecta sit, ut neque tussi, neque per alium aut urinam expurgari possit, vel etiam natura eas evacuationes non tentet, aut suffocationis periculum immincat, ut maxima adsit difficultas respirandi, thorax aperiendus. Id quod fit non solum sectione, sed & vitione, ut ex Hippocrate, 6. aphor. 27. patet. Per vitionem autem hic ab Hippocrate non talem intelligi putat Mercatus, quæ ad pus usque penetret, sed solum efficiat exterius vlcuscula manantia, per quæ pus sensim expiret. Verum aliud ipse textus Hippocratis docet, qui ita habet. *Quicumque empyici aut hydropici vntur aut secantur, si pus aut aqua universim effluerit, omnino moriuntur.* Si enim vitione saltem talia vlcuscula parari deberent, per quæ pus sensim exspiraret, nullo modo semel confertim euacuari & inde mortis periculum attrahi posset. Accusatur verò hic Rondeletius, lib. 1. cap. 15. timiditatem Medicorum assistentium & ægrotorum, scribitque, se vitione liberasse iuuenem, qui per annum pus in thorace collectum post pleuritici gestaret, & multos alios, quorum nomina suppressit. Verum sectio non solum tutior est, sed & minore cum dolore & ægri conseruatione coniuncta.

Cautio in
sectione
instituenda.

Verum in hac re cautione opus est, ut primò attendatur, an vires ægri istam operationem sustinere possint; deinde an aliquod commodum æger ex sectione illa percepturus sit. Etenim si pulmo respiratoriisque organa ita corrupta sint, ut nulla conualescentiæ spes adsit, frustra æger sectione cruciatur. Itaque maturè & ante diem 40. &

priusquam pulmones à pure corumpantur, sectio instituenda. Quæ ratione autem ea fieri debeat, dictum in Instit. lib. 5. part. 1. f. 2. cap. 7. de sectione thoracis, & dicitur etiam de eo in fine huius capitis, quæst. 1.

Columbus, lib. 11. c. 3. etiam inter mediastinum, id est, duplicem pleuram, thoracem in duo secantem materiam aliquam colligi posse statuit, quæ perforato sterno tunc satis extrahi possit, à diligenti chirurgo, resque Anatomicæ periculosissimo.

Thorace aperto pus non confertim, sed sensim euacuandum; cum si confertim euacuetur, æger moriatur, ut modò ex Hippocrate dictum. Et si sufficit, si primò lb. i. ß. extrahatur, postea singulis diebus paulò minus.

Pus sensim euacuandū.

Si denique neque per tussim, neque per urinam, neque per alium materia euacuetur; neque etiam æger sectionem admittat, vel tolerare possit vix euadet, sed phtisi morietur. Nonnulli tamen suadent, ut materia insensibiliter discutatur & absumat decocto ligni guaiaci, sarsaparillæ, chinæ & similium, extra verò impositis emplastris & fomentis discutientibus: Et tentari potest illa curatio, sed vix ægrum liberabit. Si tamen experiri liceat, potest fieri tale fomentum.

Insensibiliter discutientia.

℞. Rad. aristol. rotund. ircoi, an. 3. i. acori veri, althea, an. 3. vi. byssop. origan. præf. scabios. an. M. i. flor. meli. chanam, an. M. 6. agarie, 3. ii. Coqu. & decocto spongia imbuatur & thoraci imponatur. Post fomentationem pectoris regio inungatur oleo nardino, irino, anethino: Vel imponatur hoc emplastrum.

℞. Empl. diachyl. magni de melilot. an. 3. i. 6. ol. irini, 3. vi. pulv. rad.

ireos, spic. puleg. an. \mathfrak{z} . i. *cera q. l. F.*
emplastrum. Vel \mathfrak{z} . *Cortic. radic.*
ulmi; radic. lilii, albor. an. \mathfrak{z} . iii.
malu. violar. hyperici, chamamelian.
M. i. Coq. & contundantur. Adde
fermenti ex aëre pane \mathfrak{z} . iii. *farin. sem.*
lini, fenigræci, an. \mathfrak{z} . i. *l. ol. amygd.*
dulc. vel buirys s. sale, et violar. an.
 \mathfrak{z} . ii. F. Cataplasma.

Dieta.

Dieta.

Curationem non parùm diæta ad-
iuuat. Sit nimirum victus ratio sic-
cans, attenuas, & abstergens.
Ideoque cibi condiendi hyssopo,
forniculo. Viles sunt amygdalæ,
pinæ: optima est pitana cum mel-
le, si ad alium vergat materia: Vti-
lis est & beta & brassica cum bu-
tyro cocta. Si ad renes, ius cicerum
cum petroselino. Abstineat æger à
leguminibus, fructibus. Potus con-
ueniens est hydromel, præcipuè
hyssopo conditum. Vinum oligo-
phorum etiã concedi potest, nisi
febris sit magna.

Q V Æ S T I O I.

*Qualisnam sit febris, quæ empye-
mati coniungitur.*

Qualis
nam sit
febris
quæ em-
pyemati
coniun-
gitur.

Febrem empyemati coniungi cer-
tum est. Vapores enim putridi ex
pure cordi vicino communicantur,
quod inde incalescit, calorémque
p. n. in totum corpus diffundit. Ve-
rùm qualisnam sit febris illa, non
eamdem videtur esse omnium senten-
tia. Nos suprà diximus esse illam
lentam putridam, quæ interdium mi-
tior est, circa vespèram exaspera-
tur, & noctu est acerbior, tandè-
que hæcticam inducere potest; quod
iam porro explicandum.

Nonnulli quidem febrem istam
saltem hæcticam planè esse putant.
Verùm putridæ notæ satis adsunt,

& inter reliquas etiã circa noctem
exacerbatio. Galenus equidem, 1.
diff. febr. cap. 9. empyicoium fe-
brem etiã ad hæcticas refert; quod
verò interdium minus, noctu magis
infestat, ad alimentum assumptum
& vaporem ex eo ad solida mem-
bra ælentia distributum refert, 2.
prognost. l. 60. Verùm etsi non ne-
gemus, si febris empyicorum hæcti-
cam tandem cibi adsciscat, post
sumptum cibum ob causam modò
dictam exacerbari posse, tamen si
illud hac saltem de causa fieret, non
solum vespèri post cœnam, sed etiã
de die post prandium, & ita bis, non
verò præcipuè sub noctem, exacer-
bari debet.

Alij hæc fieri dicunt, quia pus
propius ad sanguinem pituitosum
(pituita autem circa vespèram mo-
uetur) quam alium quemvis humo-
rem accedat. Verùm pus ad nati-
ram pituitæ non accedit, sed potiùs
à colore p. n. fiat, & in thorace de-
centum incalescit. Ideoque aliqui
id ob humores adfustos & melan-
cholicos accidere existimant, qui
cùm vespèri & noctu moveri so-
leant, non mirum esse putant etiã
febris empyicorum exacerbatio-
nem vespèri incipere & noctu dura-
re. Quod cuiuslibet perpendendum
relinquimus; cùm & alij morbi,
qui non sunt melancholici, noctu
exacerbari soleant, scribitque Hip-
pocrates, lib. 3. de morbis: *In omnibus
lateris morbis dolores ferè interdium,
quàm noctu, leuiores sunt.* Cuius rei
causa, salvo cuiusque iudicio, & hæc
esse posse videtur, quòd nocturno
tempore pus magis elaboratur, se-
cundum Hippocr. 2. aph. 47. *Dum
pus sit, dolores ac febres magis fiunt,
quàm confecto.* Cùm enim nocturno

tempore calor & spiritus ad interiora vergant, natura eā tempore ad concoquendam materiam magis apta videtur. Etsi verò in empyemate pus iam confectum sit; tamen quia natura nunquam est otiosa, ea materiam perulentam, quamdiu in corpore hæret, magis magisque elaborare nititur.

QVÆSTIO II.

Quo in loco sectio thoracis in empyemate instituenda sit?

Quo in loco sectio thoracis instituta.

Quo in loco sectio thoracis in hoc morbo sit instituenda, non omnes idem docent. In Instit. l. 1. p. 1. sect. 2. cap. 7. inter 5. & 6. costam sectionem faciendam esse diximus, fecimusque id auctoritate Pauli Æginetæ, lib. 6. cap. 4. & Hieron. Fabric. ab Aquapend. de operationibus chirurgicis, cap. de thoracis sectionibus, qui pluribus ibi hac de re agit, & consuli potest. Alij tamen aliud sentire videntur, Hippocrates, 2. de morbis, de suppuratione ex pempneumonia agens, si utroque in latere pus sit, sinistrum latus eligit, quod eo loci minus lethalis sit operatio, propterea procul dubio, quod hepar gibba sui parte diaphragma fursum eleuat, & ut locus magis tumidus est & dolet, sectionem instituit, sed locum determinatum seu costam ibi non definit. Alibi verò, in lib. de interfectionibus, cutem & carnem usque ad tertiam costam ab ultima secant, & postea terebrā cauā costam perforat.

Guido de Cauliaco, Chirurg. sua doct. 2. cap. 5. apertionem thoracis fieri iubet inter 3. & 4. costam; securus tamen inter 4. & 5. Amatus Lusitanus, cent. 5. curat. 61. etiam

inter 3. & 4. costam sectionem feliciter institui docet, idque in Anatomia Ferrariæ se deprehendisse scribit. Imò etiam si intra 2. & 3. costam sectio instituat, id sine læsione septi transuersi fieri posse, aliisque, qui loco altiore sectionem instituant, reprehendit Henricus Semetius Miscellau. lib. 7. p. 355. & lib. 10. p. 533. sectionem inter 10. & 11. costam notam, seu proximè & contiguè vndecimæ, hoc est, inter penultimam & ante penultimam costam à iugulo deorsum numerando, seu inter secundam & tertiam fursum ab ultima costa notam numerando sectionem feliciter, & cum ægri commodo ac salute instituisse refert.

Ex hoc dubio ut nos expediamus, sciendum, duo in loci electione attendenda esse: primum ut operatio tuto instituat, id est, nihil in thorace, unde ægro aliquod periculum imminere possit, violeatur, pericardium scilicet, pulmones, diaphragma, venæ item & arteriæ insignes ac nervi: secundò, ut per locum, in quo sectio instituitur, pus commodè euacuari possit. Ne ergo pericardium violeatur, thorax neque in anteriore, neque in posteriore parte perforandus est, sed in latere. Ne autem violeatur diaphragma, sectio in loco non nimis humili peragenda est, ne diaphragma, quod pleuræ annectitur, & quod in respirando eleuatur, vulneretur. De quibus prolixius agit Hieronymus Fabricius, loc. cit. Vt autem pus commodè effluere possit, sectio loco non nimis alto instituenda, è quo pus non facile effluere possit.

Ex quibus decisio huius quæstionis facile patet. Ij enim qui inter 5.

Duo in loci electione obseruanda.

Decisio quæstionis.

&

& 6. costam, aut certe inter 4. & 5. sectionem instituunt, tutissimum locum eligunt. Aliàs enim si loco humiliori instituaturs sectio, metus est, ne simul diaphragma lædatur, quod non sit sine periculo, cum pars sit nervuosa. Quod ipsum etiam præcaueri iussit Hippocrates, 3. de morbis: Quod si, inquit, præ crassitudine humor non fluctuet, vix spiritum frequenter trahat, & pedes unum fiant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant hæc, sed thoracem pure plenum esse probè noris, proinde in terra Erythræde liquida, vel strita ac tepida lintum tenue tingito, eoque thoracem circum circa integito, & quâ parte primum ressecatum fueris, eâ secato aut rursus quàm proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne hoc ipsum ladas. Qui verò inter 3. & 4. inter 2. & 3. costam sectionem instituunt, locum ad puris euacuationem commodissimum eligunt. Quo enim foramen propius est diaphragmati pus facilius effluit, sicut videmus, ex dolioli quore omni facilius effluere, si versus fundum proximè foramen fiat. Itaque ut hæc concludamus, consultissimum est, Hippocratis consilium, in 3. de morbis, sequi, & explorare, quo loco pus maximè hæreat, & in eo sectionem instituere, quàm proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne id lædatur. Et credibile est diaphragma à puris copia deprimi, ut non tantum eleuetur, quantum in homine sano; & proinde loco etiam humiliori sectio sine periculo & læsione diaphragmatis institui possit. Si verò de hoc dubitetur, & proinde quis tutò omnino agere velit, & Paulum Æginetam ac Fabricium ab Aqua-

pendente sequi, is ægrum postea ita locare debet, ut pus commodè effluere possit.

De thoracis etiam in empyemate sectione videatur Vesalius, in opusculo hac de re edito, quod allegat Schenckius lib. 2. obs. 131.

CAPVT XX.

De Hydropse Pectoris.

Empyemati cognatus affectus est, quem *typhus* & hydropem pulmonis ac pectoris nominant. Ut enim in empyemate pus in thoracis cauitate colligitur: ita in hydropse pectoris aqua & serosi humores in cauitate thoracis colliguntur; quibus & ipse pulmo sæpè repletur. De quo Hippocrates, 2. de morbis, quem locum supra, cap. 9. adscripsimus. Et aliquot morbi huius historias ex varijs authoribus collegit Schenckius, lib. 2. obseru. 52. & seqq. Vnum etiam exemplum habet Dn. D. Gregor. Horstius, in epist. Medic. sect. 11. p. 44. annotauitque etiam similem obseruatione Dn. D. Doringius, lib. 2. de febr. 7. 12.

Cum autem affectus hic, etsi forsân satis frequens; cognitu sæpè facis sit difficilis, ac plerumque malè causa in obstructa pulmonis vasa solum referatur, vnam atque alteram eius historiam à Carolo Pisonis, lib. de morb. ex illius serosa, addere libet. Primò refert nobilem virum annos octoginta iam excedentem sensim graui difficultate spirandi opprimi cœpisse, & ea quidem, quæ de nocte potissimum ei negotium exhiberet sub primum somnum. Tum enim suffocationis

periculum subito somnum interrumpisse, ut de lecto surgere & ad fenestras liberiorē aërem capere cogeretur, & spiritum altum traheret, nullibiq; se locorum consistere placide posset: Quæ angustia sensim die proueniente remittebat, & sub noctem iterum urgebat. In mortui cadauere repertus pulmo & præcordia in plurima aqua septs thoracis interclusa innatantia.

Alius nobilis cum inueterata orthopnœa multis annis ac febre laborasset, morbi vi tandem subito iugulatus est. In eius cadauere, præter inflammatorum in hepate tumore, repertus hydrops thoracis, sed in vno dumtaxat latere, & pulmo vasis humore consistente, lentoque, ac pellucido instar albuminis oui prægnantibus refertus.

Causa.

Causæ.

Statuunt quidem nonnulli, etiam à cerebro per asperam arteriam ferrosam illam materiam descendere. Verum probabile non est, tantam copiam à cerebro destillare; & si id fieret, in pulmones destillaret, & diuturna tussis præcessisset, de qua tamen, qui hoc malum incurrunt, sæpè conqueri non solent. Credibile magis est, humorem serosum vel colligi primario pulmonis vitio, dum is frigidus est & debilis; & alimentum suum non bene concoquit, sed in aquosum humorem mutat, vel in toto corpore, vel, ac præcipue circa hepar & lienem in abdomine colligi, atque inde aut cum ipso sanguine ad pulmonem mitteri, aut abdominis cavitatem ex eis ductibus in thoracem penetrare, quod in hydropicis sæpè animaduertitur. Hinc accidit ut malum quandoque in thorace initium sumat,

& tandem in hydropem degeneret: & contra sæpè euenit, ut in hydropicis humor serosus ex abdomine in cavitatem pectoris penetraret. Per quas vias autem humor serosus in cavitatem thoracis penetraret, non adeo planum, & potest id forsitan varijs modis accidere. Nam vel vaporis specie humor in cavitatem thoracis penetrare potest, ibique rursus condensari; quod facile fieri potest, cum membrana thoracem intus succingens satis densa sit: vel etiam serum sub propria forma de vasis thoracis, in quibus abundat; ut in ventre inferiore in abdomen: & ut Hippocrates, 6. epid. loquitur, ἀνωπία, quæ aut inuτῇ τὰς σπλῆνι καὶ τῇ διαφραγμῇ, Innuit natura esse sine ratione sibi ipsi vias.

Et plerumque in ventre inferiore causa mali hæret, ac nutritionis viscera scirrhusa, aut vesicis aqua plenis referta deprehenduntur: unde etiam pedes intumescunt, facies pallet, & cachexiæ signa adsunt. Accidit autem hoc malum præcipue iis, quibus thorax, ac pulmo vel à primo ortu, vel ab occasione aliqua debilis est, & ad recipiendos superfluos humores aptus. An verò etiam à corde vel pericardio humor hic prouenire possit, considerandum lectori relinquo. Semper enim humor aliquis in pericardio reperitur, qui præter naturam etiam augeri potest, cum sanguis arteriosus admodum serosus sit, & huic ad thoracem penetrare. Videatur etiam Columbus, lib. 5. anatom. de hydropica, in qua hepar & lien salus inuentus fuit, abscessus vero & putredo in corde. Et Dodonæus in anatomiacapite trigesimo quibuslibet. Veniunt.

*Differentia.*Differen-
tia.

Differentia præcipua est, quòd aliquando aqua in toto thorace continetur, aliquando in altera saltem eius parte.

Signa Diagnostica.

Signa.

Percepitur in thorace dolor gravis ob materiæ aquosæ abundantiam, & plerumque sonitus aquæ fluctuantis, dum æger corpus movet,prehenditur. Tussis est sicca. Et si enim materia multa in pectore abundat: tamen natura eam nec coquere, nec ob tenuitatem expellere potest. Respiratio est difficilis, frequens & parva, ægerque quasi suffocari videtur, ob organorum respirationis angustiam, & diaphragmatis à materia incumbente compressionem; & in primis illa in respirandis difficultas, & crebritas somni primo tempore ægrum subitò inuadit. Sitis est molesta ob pulmonem exsiccatum. Et si enim aqua in thorace abundat, ea tamen salsa est. Appetitus deiicitur: accidunt interdum animi deliquia & palpitatio cordis, color faciei pallidus est, & palpebræ ac pedes intumescunt: latera intrinsecus acetum olet, non tamen semper, si scilicet materia in thorace moram trahat & corumpatur. Accedit interdum etiâ febris, cuius quoque Hippocrates, *alleg. loc.* meminit. Materia enim ista serosa in thorace morantia, habens acrimoniam acquirit, tandèmq; putrescit & febrem accendit.

*Prognosticum.*Prognos-
ticum.

Malum est curatu difficile, & raro sanatur. Vt hydrops ex caloribus natiui viscerumque debilitate provenit, ita & hic ex eadem causa ortum habet. Et licet quandoque morbus spontè solui videtur, erum-

pente ad alium aquâ: tamen paulò post malum, & quidem gravius, recrudescit, & incrementum paulatim sumit, tandèmq; in hydropem vertitur, ægerque suffocatur.

*Indicationes & Curatio.*Indica-
tiones, &
curatio.

Materia aquosa pectus & pulmones replens euacuanda, eiusque generatio, vndeunque etiam proveniat, præcauenda. Et quia humor hic coctionem nullam recipit, eam etiam expectare opus non est, sed statim eum euacuare conuenit iis medicamentis, quæ aquas è corpore educere solent. Vt viz tamen, per quas effluere debet, aperiantur, commodum fuerit. Hinc etiam Author libri, *de morbis, loco supra cap. 9. alleg.* scribit, si materia ad alium erumpit, ægrum statim sanum & à morbo liberatum videri. Et obseruatum, morbum hunc permutatum fuisse in herniam aquosam, simulque per alium effluxisse aquam, & sic euasisse ægrum, & integrè restitutum fuisse. Id quod accidit ubi non ex toto materia ad pectus fertur, nec viscera naturalia, nec pulmones insigniter læsi sunt. Secus enim si res se habeat, temporis progressu alius incenditur, eadèmq; illa, vel adhuc amplius patietur æger, vt idem author ibidem loquitur.

Vtilis autem hic sunt in primis mechoacanna, radix gualapa, gummi gotta, succus radicum sambuchi ad ʒ. j. vel ʒ. j. s. sumptus, succus radicum iereos, elaterium ad ʒ. iij. exhibitum. Educenda est autem materia paulatim & medicamenta purgantia repetenda sunt; Hippoc. & antiqui etiam sectionem thoracis instituebant, de qua capite præcedente dictum. Verù cum ea patientem solùm materiam exhaustam, futuræ

mutatur. Et quidem si post venam in pulmone ruptam vlcus sequatur, quod continuo saniem in thoracem effundat, verum sit empyema. Si verò sanguis copiosus effusus in loco alieno corrumpitur, materia illa pus minus proprie dicitur. Plerique addunt desillationem è capite, de qua Hippocrates, 7. aphorism. 38. *Desillatio in ventrem superiorem ad suppuracionem peruenit intra dies viginti.* Nonnulli tamen pituitam in pectore immutatam minus proprie pus appellari censent. Est enim hæc purulenta materia non merum pus. Nam hæc est ex humore excrementitio; cum merum pus ex nutriticia materia fiat.

Omnes autem modos, quibus pus in thoracem effundi potest, prolixa oratione descripsit Hippocrat. lib. 1. de morb. qui hæc de re videatur. Cuius summa hæc esse potest: Empyema verum esse, quando in ipsa thoracis cavitate pus continetur, idque quatuor modis fieri. 1. Ex pleuritide non satis expurgata. 2. A pituita ad cavitatem thoracis à pectore defluente. 3. Ex vena in thorace rupta. 4. Ex vena in pectore aperta. Non verum autem empyema esse, cum non in cavitate pectoris, sed in pulmone materia hæreat, idque etiam quatuor modis fieri. 1. In peripneumonia suppurata & non expurgata. 2. ex pituita è capite descendente & in pulmone putrescente. 3. ex vena rupta in pulmone. 4. ex varice in pulmone generato & rupto.

Differentia.

Differen-
tia.

1. Pus interdum totam thoracis cavitatem occupat, interdum eius alteram partem, dextram vel sinistra.

2. Ex differentia materię datur empyematis differentia, quæ nunc

benigna est, nunc acris & fœtida.

Signa Diagnostica.

Signa quod attinet, quæ inflammationem aliquam in thorace in abscessum, è quo post empyema futurum est: mutari significant, si pleuritis & peripneumonia, vel alia in pectore inflammatio, remediis idoneis adhibitis non cessat, ac præterea rigores & febres subsequuntur & gravitas: morbum in empyema mutari indicio est. Si enim materia intra dies quatuordecim non expurgatur, in pus mutatur. Rumpitur vero vomica circa diem vigesimum, interdum trigessimum aut quadagesimum. Hippocrates, 2. prognost. aphorism. 48. Rigor verò fit, dum à pure genito vicina membranosa corpora velliscantur. Ponderis verò & gravitatis sensus in thorace pro dolore percipitur, quod humor, qui ante in partem inflammata dispersus erat, in vnum locum iam totus colligitur.

Signa verò iam facti ex vomica rupta empyematis proponit Hippocrates, 2. prognost. 60. & 61. Et quidem recentis ac nuper facti empyematis signa sunt eadem, quæ inflammationis suppuratæ modò esse diximus, quibus difficilius respiratio accedit. Quamvis enim rupto abscessu dolor sedetur, & hinc diaphragma & musculi thoracis liberius moveri possint: tamen quia pulmo à circumfuso pure gravatur, ut liberè moveri non possit, & præterea aliqua puris pars à rara pulmonis substantia imbibitur, & hinc pulmo humidior & gravior redditur, bronchiæque eius à pure imbibito obstruuntur, respiratio redditur difficilior. Galenus, 4. de loc.

Signa

affect. cap. 9. addit fluctuationem. Nam, inquit, ubi quis subito à decubitu transmutatur, idque maxime si ab vno latere in aliud se conuertens defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri haud dubia coniectura est. Quin etiam in his fluctuatione sæpenuerò haud obsecrè auditur. Nisi forsàn puris crassities aut copia, quæ omnem penè thoracis capacitatem semper, impediât fluctuationem illam audire.

Diuturnioris autem empyematis signa sunt, quod febris quidem mitior redditur; sed lenè, partim putrida, partim hectica perpetuòque infestat, quæ de die quidem mitior, sed circa vesperam exasperatur, & noctu vehementior est. Tussis est perpetua, sputumque tandem sit purulentum, adest anxietas & cibi fastidium ex vapore putrido orta, sudores multi superueniunt, sed inutiles & non copiosi, sed frequentes ob virium imbecillitatem. Eæ enim debiles alimentum etiam non in nimia quantitate sumptum superare & rectè apponere non valent. Tandem oculi fiunt caui, maxillæ ruborem contrahunt, ob vapores puris acres calidòsque faciem ipsam calefacientes, pustulæ circa pectus erumpunt, subiliore ac acriore puris parte ad extremam cutem penetrante pedes inruescunt.

Signa differentiarum quod attinet primò locum, in quo pus continetur, ita nosse docet Hippocrates, 2. *prognost. aphorism. 50.* Si empyema in altera parte tantùm existat, hos conuertere & discernere oportet, doleantne in latere, & an alterum altero calidius sit, arque cubantem supra latus sanum interrogare,

an sibi videatur onus aliquod desuper suspendi. Si enim ita est, in quodcumque latus pondus insit, in altero suppuratio existit. Quemadmodum si vtrinq; calor & pondus sentiat, in tota thoracis cavitate pus continetur. Auicennas, hoc, quod habet ex Hippocrate, *lib. 3. de morbis*, addit: Applicetur, inquit, lintheum madidum thoraci secundùm utramque partem dextram & sinistram: citius enim exsiccat illud, quod supra partem pus continentem appositum est.

Puris verò conditio, si reiciatur ex fœtore & aliis qualitatibus cognoscitur.

Prognostica.

Prognostica empyematis recensuit Hippocrates 2. *prognost. 63.* Prognostica

1. Si cùm abscessus ruptus est, febris eadem die dimiserit (id est, ita mitis reddita fuerit, ut si præcedenti vehementiæ conferatur, prope modum pro nulla habeatur: nam planè non cessat) æger cibum appetat, siti careat, (nam vapores fœtidi ac tetri à thorace ascendentes ad linguam ac palatum ob communem tunicam simul orificium ventriculi afficiunt, & hinc appetitus deicitur, siusque excitatur. Quapropter si breui tempore post eruptionem hæc symptomata remittant, puris ex qua quantitas, idque benignius significatur. Si verò hæc symptomata non remittant, puris ingentem copiam & prauitatem significant) venter exigua & consistencia deiciat, pus leue, album sit & æquale, & pituita vacans, absque dolore, & valida tussi expurgetur, ægrum euasurum spes est.

2. Si verò contrarij accidat, & horrores post puris eruptiones

maneat, febris non desinat, aut cum videtur desinere, recrudescat, ægerque sitiat, nec cibum appetat, alius sit humida, sputum sit prauæ substantiæ, vt & coloris mali, flauum, viride, nigrum, fœtidum, pituitosum, inæqualis substantiæ pereunt, quibus hæc omnia adsunt. At quibus alia adsunt, alia non, horum quidam moriuntur, quidam in multo tempore euadunt.

3. Plerumque verò epyema in phthisin transit, & tum collum ac tempora valde extenuantur, pedes intumescunt, vngues curuantur. ætenim qui seruatur, vbi pleuritis vel peripneumonia in empyema transit, intra dies quadraginta pus per sputum eici debet, quod si non fiat in phthisin transit, 5. aphorism. 15. Non quidem opus est, vt quadragesimo die æger planè ab omni pure liberatus sit, sed sufficit, si eo tempore tanta eius copia reiecta sit, vt reliquæ exiguæ, quæ supersunt, faciliè postea euacuari possint, cuius euacuationis non ita certus terminus definiri potest. Nam vltra diem quadragessimum mollis & rara pulmonis substantia, pus sine damno vix sustinere potest. Ideoque opus est, vt intra eum terminum maxima eius pars reiciatur.

4. Quibus in magna puris copia intra thoracem & pulmonem collecta totus thorax in respiratione attollitur, celerrimè suffocantur, Galenus, de loc. affect. cap. 7.

5. Malum periculosius est, si pus totam cavitatem thoracis occupet, quam si in altero solum latere contineatur.

6. Empyema tamen, quod vnum saltem latus occupat, periculosius est, si sinister latus occupat, quam

quod dextrum; quia sinister cordis ventriculus, vt nobilior, tum magis afficitur.

7. Quicumque empyi videntur aut secantur, si album pus effluat, euadunt, si verò subcruentum & fætidum, pereunt, 7. aph. 44.

8. Quandocumque empyi vruntur aut secantur, si pus aut aqua vniuersum effluerit, certò moriuntur. Hippocrat. 6. aphor. 27.

9. Purulentos moderatius habentes si sputa graueolentia consequuntur, recidiua interimit. in Coacis.

10. Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, ij ferè moriuntur. in Coacis.

11. Ex suppurationibus, quas pulmonum morbi excitarunt, ferè senes moriuntur, ex cæteris verò iuuenes. ibid.

12. Inflammatio lateris aut pulmonis in suppuratione versa, quandoque sursum rumpitur, id quod periculosius est. Si enim pus quam citissimè per sputum non reiciatur, tabidi fiunt. Quandoque verò per aluum & vesicam euacuatur id, quod cum minore periculo coniunctum est, Paulus Aegineta & Aëtius. Cum enim vt æger citò à pure liberetur euacuatio per tussim æ sputum non sufficiat; siquidem per eam sensim & lentè pus euacuatur, & iterea temporis à pure in thorace & pulmone moram trahente substantia pulmonis faciliè corrumpatur, commodior est, & minore cum periculo coniuncta, per aluum vel urinam puris euacuatio.

Cura.

Si prohiberi à Medico nequit Cautio, suppuratio, adiuuatur moderatè calidis & humidis cataplasmatibus & emplastris impositis, de quibus in

pleuricidē dictum. Maturato abscessū vt maturē rumpatur, opera danda, ne pus partem amplius corrumpat, forti locutione, sternutatione irritata.

Rupto abscessū, vt is abstergetur & consolidetur, materia verò euacuetur, danda opera. Euacuatur autem materia vel sensibiliter, vel insensibiliter. Sensibiliter rectius & commodius euacuatur, & quidē frequentius ac tutius per sputum vel thoracis perforationem, vel per aluum, vel per vrinam. Itaque considerandum, quō materia vergat.

Si tussis virgeat, vt per sputum expurgetur, detergant aqua saccharata, hordei, hydromel & prāsana cum melle, quæ vt alimentum medicamentoſum, & medicamentum familiare in omni empyematis genere ac quouis tempore conuenit. Radix itidis cum mulsā, hyssopus, decoctum glycyrrh. syrup de prass. capill. ♀. Imprimis efficax est aqua mulsā, in qua loca sit terebinthina, vel cremor terebinthinæ. Vel ℞. *Succus hederæ terrestris* ℥. iv. *prassy* ℥. ii. *thuris. myrrh.* an. ℥. i. *diapemd.* 3. β. F. Lohoh. Vel ℞. *Ruberrimarecentis brasice solæ confusa.* Coquū. In Balneo vase clauso. Liqueor saccharo dulcoretur, & manē ac vespere bibatur.

Materiæ tamen expectorandæ in delecto medicamentorum habeatur ratio. Si enim pus fuerit biliosum, acre & erodens, eligenda & vsurpanda, quæ acrimoniam eius mitigant & leniunt, vt *herdium, sinibæ, passilla, scabst. glycyrrh. amygdal. dulc. pinæ, violar. capillus ♀, semen malua* syrup. *violar. capillorum ♀, roinla diatrageant. frigid. diatraxis simpl.* Si verò pus non acre, sed cras-

sius sit, attenuantia, incidentia & abstergentia vsurpanda, vt *hyssopus, tuſilago, radix belen. semencaribami, anisi, saniculi, carice, syrup. de byssop. de glycyrib, de tuſilag. loh. fanum & expertum.*

Si verò pus nimium crassum sit & pituitosum, validius incidentia & attenuantia vsurpanda, sed moderatē & cum arteriacis ac thoracis lenientibus miscenda; quo modo & pus crassum incidetur & attenuabitur, & humectatione diluetur, & ad expuſionem aptius reddetur.

Si verò ad vias vrinæ vergat, ea, quæ extergendo vrinæ meatus purgant, vel quæ serosam humiditatem suppeditant, medicamenta exhibeantur, vt decoct. ex rad. aperientibus, gran. Alkekengi, ciceribus, rubris, capill. Veneris, sem. 4. frig. maior. Vt ℞. *Radix. aperientium maceratarum in vino albo, glycyrrh.* an. ℥. i. *sem. 4. frigid. maj. ana* 3. i. β. *adiant.* M. i. *cicerum rubrote* M. β.

Coq. ad dimidias. Aromatisentur cum radic. ireos 3. ii. & dulcorentur saccharo.

Si verò ad intestina feratur exhibeat ius galli decrepiti, decoct. betæ, canlium graminis, prass. calsiæ, quæ thoracem lenire & aluum mouere possunt, vt & terebinthina: vel clysteres abstergentes iniiciantur. Tandem syrupus aliquis abstergens & adstringens nonnihil adhibeatur, quæ intestinorum exulcerationem prohibeat, vt syrup. de rosīs simpl. de rosīs siccis cum decocto plantaginis. Vel etiam ad prohibendam intestinorum exulcerationem clysteres ex lacte, furfibus & semine pſyllii iniiciantur.

Si verò tanta puris copia in thora-
ce collecta sit, vt neque tussii, ne-
que per aluum aut vrinam expurga-
ri possit, vel etiam natura eas eua-
cuationes non tentet, aut suffoca-
tionis periculum imminet, vt ma-
xima adit difficultas respirandi,
thorax aperiendus. Id quod fit non
solum sectione, sed & vitione, vt
ex Hippocrate, 6. aphor. 27. patet.
Per vitionem autem hic ab Hippo-
crate non talem intelligi putat Mer-
catus, quæ ad pus vsque penetret,
sed solum efficiat exterius vlcuscu-
la manantia, per quæ pus sensim
expiret. Verum aliud ipse textus
Hippocratis docet, qui ita habet.

*Quicumque empyici aut hydropici vñ-
tur aut secantur, sepius aut aqua vni-
uersum efflauerit, omnino moriuntur.*

Si enim vitione saltem talia vlcus-
cula parari deberent, per quæ pus
sensim expiraret, nullo modo se-
mel confectum euacuari & inde
mortis periculum attrahi posset. Ac-
cusat verò hic Rondelcius, lib. 2.
cap. 15. timiditatem Medicorum
assistentium & agrotorum, scribit-
que, se vitione liberaffe iuuenem,
qui per annum pus in thorace colle-
ctum post pleuritim gestarit, & mul-
tos alios, quorum nomina suppri-
mit. Verum sectio non solum tu-
rior est, sed & minore cum dolore
& ægri consternatione coniuncta.

Cautio in
sectione
instituen-
da.

Verum in hac re cautione opus
est, vt primò attendatur, an vires
ægri istam operationem sustinere
possint; deinde an aliquod commo-
di æger ex sectione illa perceptu-
rus sit. Etenim si pulmo respiratio-
nisque organa ita corrupta sint, vt
nulla conualescentiæ spes adsit,
frustrà æger sectione cruciatur.
Itaque maturè & ante diem 40. &

priusquam pulmones à pure cor-
rumpantur, sectio instituenda. Qua-
ratione autem ea fieri debeat, di-
ctum in Instit. lib. 5. part. 1. §. 2. cap. 7.
de sectione thoracis, & dicitur etiam
de eo in fine huius capituli, *quæst. 2.*

Columbus, lib. 11. c. 3. etiam in-
termediatum, id est, duplicem
pleuram, thoracem in duo secantem
materiam aliquam colligi posse sta-
tuit, quæ perforato sterni tunc facis
extrahi possit, à diligenti chirurgo,
resque Anatomicæ petissimum.

Thorace aperto pus non confer-
tim, sed sensim euacuandum; cum
si confertim euacuetur, æger mori-
atur, vt modò ex Hippocrate di-
ctum. Et si sufficit, si primò lb. i. ß.
extrahatur, postea singulis diebus
paulò minus.

Pus sen-
sim eua-
cuandū.

Si denique neque per tussim, ne-
que per vrinam, neque per aluum
materia euacuetur; neque etiam æ-
ger sectionem admittat, vel tolerare
possit vix euadet, sed phthisi mori-
etur. Nonnulli tamen suadent, vt
materia insensibiliter discutiat &
absorbeat decocto ligni guaiaci,
sarsaparillæ, china & similibus, ex-
tra verò impositis emplastris & fo-
mentis discutientibus: Et tentari
potest illa curatio, sed vix ægrum li-
berabit. Si tamen experiri libeat,
potest fieri tale fomentum.

Insensibi-
liter dis-
cutientia.

*℞. Rad. aristol. rotund. irosi, an.
3. i. acori veri, althææ, an. 3. vi.
byssop. origan. press. scabios. an. M.
i. flor. melil. chamam. an. M. 8. aga-
ric. 3. ii. Coqu. & decocto spongia
imbuatur & thoraci imponatur. Post
fomentationem pectoris regio in-
ungatur oleo nardino, irino, anethi-
no: Vel imponatur hoc emplastrum.*

*℞. Empl. thacbyl. magni de meli-
lor. an. 3. i. ß. ol. irini, 3. vi. pulv. rad.*

ireos, spicq. puleg. an. \mathfrak{z} . i. *cera q. l. F.*
emplastrum. Vcl. \mathfrak{z} . *Cortic. radic.*
ulmi; radic. lilii, albor. an. \mathfrak{z} . iii.
malu. violar. hyperici, chamamelian.
M. i. Coq. & contundantur. Adde
fermenti ex atro pane \mathfrak{z} . iii. *farin. sem.*
lini, sanigrati, an. \mathfrak{z} . i. β . *ol. amygd.*
dulc. vel butyri f. sale, ol. violar. an.
 \mathfrak{z} . ii. F. Cataplasma.

Dietæ.

Dietæ.

Curationem non parùm dietæ ad-
iuuat. Sit nimirum victus ratio sic-
cans, attenuas, & abstergens.
Ideoque cibi condiendi hyssopo,
fœniculo. Vtiles sunt amygdalæ,
pinæ: optima est peisana cum mel-
le, si ad alium vergat materia. Vti-
lis est & beta & brassica cum bu-
tyro cocta. Si ad renes, ius cicerum
cum petroselino. Abstineat æger à
legumibus, fructibus. Potus con-
ueniens est hydromel, præcipuè
hyssopo conditum. Vinum oligo-
phorum etiam concedi potest, nisi
febris sit magna.

QVÆSTIO I.

*Qualisnam sit febris, quæ empye-
mati coniungitur.*

Qualis
nam sit
febris
quæ em-
pyemati
coniun-
gitur.

Febrem empyemati coniungi cer-
tum est. Vapores enim putridi ex
pure cordi vicino communicantur,
quod inde incalescit, calorémque
p. n. in totum corpus diffundit. Ve-
rùm qualisnam sit febris illa, non
eadem videtur esse omnium senten-
tia. Nos suprà diximus esse illam
lentam putridam, quæ interdium mi-
nor est, circa vespèram exaspera-
tur, & noctu est acerbior, tandè-
que hæcticam inducere potest; quod
iam porrò explicandum.

Nonnulli quidem febrem istam
saltem hæcticam planè esse putant.
Verùm putridæ notæ satis adfunt,

& inter reliquas etiam circa noctem
exacerbatio. Galenus equidem, 1.
diffier. febr. cap. 9. empyicorum fe-
brem etiam ad hæticas refert; quod
verò interdium minus, noctu magis
infestat, ad alimentum assumptum
& vaporem ex eo ad solida mem-
bra calèntia distributum refert, 2.
prognost. t. 60. Verùm etsi non ne-
gemus, si febris empyicorum hæti-
cam tandem cibi adfiscat, post
sumptum cibum ob causam modò
dictam exacerbari posse, tamen si
illud hac saltem de causa fieret, non
solum vespèri post cœnam, sed etiã
de die post prandium, & ita bis, non
verò præcipuè sub noctem, exacer-
bari debet.

Alij hæc fieri dicunt, quia pus
propius ad sanguinem pituitosum
(pituita autem circa vespèram mo-
uetur) quam alium quemvis humo-
rem accedat. Verùm pus ad natu-
ram pituitæ non accedit, sed potius
à colore p. n. fiat, & in thorace de-
tentum incalescit. Ideoque aliqui
id ob humores adustus & melan-
cholicos accidere existimant, qui
cùm vespèri & noctu moveri so-
leant, non mirum esse putant etiam
febris empyicorum exacerbatio-
nem vespèri incipere & noctu dura-
re. Quod cuilibet perpendendum
relinquimus; cùm & alij morbi,
qui non sunt melancholici, noctu
exacerbari soleant, scribitque Hip-
pocrates, lib. 3. de morbis: *In omnibus*
læteris morbis dolores sævè interdium,
quàm noctu, leviores sunt. Cuius rei
causa, salvo cuiusque iudicio, & hæc
esse posse videtur, quodd nocturno
tempore pus magis elaboratur, se-
cundùm Hippocr. 2. aph. 47. *Dum*
pus sit, dolores ac febres magis sunt,
quàm confecto. Cùm enim nocturno

tempore calor & spiritus ad interiora vergant, natura eo tempore ad concoquendam materiam magis apta videtur. Et si verò in empyeumate pus iam confectum sit: tamen quia natura nunquam est otiosa, ea materiam perulentam, quamdiu in corpore hæret, magis magisque elaborare nititur.

QVÆSTIO II.

Quo in loco sectio thoracis in empyeumate instituenda sit?

Quo in loco sectio thoracis instituenda.

Quo in loco sectio thoracis in hoc morbo sic instituenda, non omnes idem docent. In Instit. l. 1. p. 1. sect. 2. cap. 7. inter 5. & 6. costam sectionem faciendam esse diximus, fecimusque id autoritate Pauli Æginetæ, lib. 6. cap. 4. & Hieron. Fabric. ab Aquapend. de operationibus chirurgicis, cap. de thoracis sectionibus, qui pluribus ibi hac de re agit, & consuli potest. Alij tamen aliud sentire videntur. Hippocrates, 2. de morbis, de suppuratione ex peripneumonia agens, si utroque in latere pus sit, sinistrum latus eligit, quoddam loci minus lethalis sit operatio, propterea procul dubio, quod hepar gibba sui parte diaphragma sursum eleuat, & ut locus magis tumidus est & dolet, sectionem instituit, sed locum determinatum seu costam ibi non definit. Alibi verò, in lib. de inter. affectionibus, cutem & carnem usque ad tertiam costam ab ultima secar, & postea cerebrâ cauâ costam perforat.

Guido de Cauliaco, Chirurg. sua doct. 2. cap. 5. apertionem thoracis fieri iubet inter 3. & 4. costam; securus tamen inter 4. & 5. Amatus Lusitanus, cent. 5. curat. 61. etiam

inter 3. & 4. costam sectionem feliciter institui docet, idque in Anatomia Ferrariz se deprehendisse scribit. Imò etiam si intra 2. & 3. costam sectio instituat, id sine læsione sepe transuersi fieri posse, alioque, qui loco altiore sectionem instituant, reprehendit Henricus Semctius Miscellau. lib. 7. p. 355. & lib. 10. p. 533. sectionem inter 10. & 11. costam notham, seu proximè & contiguè vndecimâ, hoc est, inter penultimam & ante penultimam costam à iugulo deorsum numerando, seu inter secundam & tertiam sursum ab ultima costâ nothâ namerando sectionem feliciter, & cum ægri commodo ac salute instituisse refert.

Ex hoc dubio ut nos expediamus, sciendum, duo in loci læsione attendenda esse: primum ut operatio tuto instituatur, id est, nihil in thorace, unde ægro aliquod periculum imminere possit, violetur, pericardium scilicet, pulmones, diaphragma, venæ item & arteriæ insignes ac nervi: secundo, ut per locum, in quo sectio instituitur, pus commodè euacuari possit. Ne ergo pericardium violetur, thorax neque in anteriore, neque in posteriore parte perforandus est, sed in latere. Ne autem violetur diaphragma, sectio in loco non nimis humili peragenda est, ne diaphragma, quod pleuræ annectitur, & quod in respirando elenatur, vulneretur. De quibus prolixius agit Hieronymus Fabricius, loc. cit. Vt autem pus commodè effluere possit, sectio loco non nimis alto instituenda, è quo pus non facile effluere possit.

Ex quibus decisio huius quæstionis facile patet. Ij enim qui inter 3.

Duo in loci læsione obseruanda.

Decisio quæstionis.

& 6. costam, aut certe inter 4. & 5. sectionem instituunt, tutissimum locum eligunt. Alijs enim si loco humiliorē instituatur sectio, metus est, ne simul diaphragma lædatur, quod non sit sine periculo, cum pars sit nervosa. Quod ipsum etiam præcaueri iussit Hippocrates, 3. de morbis: Quod si, inquit, præ crassitudine humor non fluctuet, vix spiritum frequenter trabas, & pedes intumescant, & cisticula aliqua adsit, ne te decipiant hæc, sed thoracem pure plenum esse probe noris, proinde in terra Erytriade liquida, vel stria ac tepida linteam tenne tingito, eoque thoracem circum circa integito, & quâ parte primum ressecatum fuerit, eâ secato aut vritio quàm proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne hoc ipsum laedas. Qui verò inter 3. & 4. inter 2. & 3. costam sectionem instituunt, locum ad puris euacuationem commodissimum eligunt. Quo enim foramen propius est diaphragmati pus facilius effluit, sicut videmus, ex dolio liquorem omnem facilius effluere, si versus fundum proximè foramen fiat. Itaque ut hæc concludamus, consultißimum est, Hippocratis consilium, in 3. de morbis, sequi, & explorare, quo loco pus maximè hæreat, & in eo sectionem instituere, quàm proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne id lædatur. Et credibile est diaphragma à puris copia deprimi, ut non tantum eleuetur, quantum in homine sano; & proinde loco etiam humiliorē sectio sine periculo & læsione diaphragmatis institui possit. Si verò de hoc dubitetur, & proinde quis tutò omnino agere velit, & Paulum Æginetam ac Fabricium ab Aqua-

pendente sequi, is ægrum postea ita locare debet, ut pus commodè effluere possit.

De thoracis etiam in empyemate sectione videatur Vesalius, in opusculo hac de re edito, quod allegat Schenckius lib. 2. obs. 131.

CAPVT XX.

De Hydrope Pectoris.

Empyemati cognatus affectus est, quem *idru* & hydropem pulmonis ac pectoris nominant. Ut enim in empyemate pus in thoracis cavitate colligitur: ita in hydrope pectoris aqua & serosi humores in cavitate thoracis colliguntur; quibus & ipse pulmo sæpe repletur. De quo Hippocrates, 2. de morbis, quem locum supra, cap. 9. adscripsimus. Et aliquot morbi huius historias ex varijs authoribus collegit Schenckius, lib. 2. obseru. 52. & seqq. Vnum etiam exemplum habet Dn. D. Gregor. Horstius, in epist. Medic. sect. 11. p. 44. annotauitque etiam similem observationē Dn. D. Doringius, lib. 2. de feb. c. 12.

Cum autem affectus hic, etsi forsân satis frequens; cognitu sæpè satis sit difficilis, ac plerumque malâ causâ in obstructa pulmonis vasa solum referatur, vnam atque alteram eius historiam à Caroli Pisonis, lib. de morb. ex illius serosa, addere libet. Primò refert nobilem virum annos octoginta iam excedentem sensim graui difficultate spirandi opprimi cœpisse, & ea quidem, quæ de nocte potissimum ei negotium exhiberet sub primum somnum. Tum enim suffocationis

periculum subitò somnium interrumpisse, ut è lecto surgere & ad fenestras liberiorè aërem captare cogeretur, & spiritum altum traheret, nullibique locorum consistere placidè posset: Quæ angustia sensim die prodeuniente remittebat, & sub noctem iterum vrgebat. In mortui cadauere repertus pulmo & præcordia in plurima aqua septis thoracis interclusa innatantia.

Alius nobilis cùm inueterata orthopnoëa multis annis ac febre laborasset, morbi vi tandem subitò regulatus est. In eius cadauere, præter inflammatorium in hepate tumore, repertus hydrops thoracis, sed in viro dumtaxat latere, & pulmo vesicis humore consistente, lentòque, ac pellucido instar albuminis oui prægnandibus repletus.

Causa.

Causæ.

Statuunt quidem nonnulli, etiam à cerebro per asperam arteriam serosam illam materiam descendere. Verùm probabile non est, tantam copiam à cerebro destinare; & si id fieret, in pulmones destillaret, & diuturna tussis præcessisset, de qua tamen, qui hoc malum incurrit, sæpe conqueri non solent. Credibile magis est, humorem serosum vel colligi primario pulmonis vitio, dum is frigidus est & debilis; & alimentum suum non bene concoquit, sed in aquosum humorem mutari, vel in toto corpore, vel, ac præcipuè circa hepar & lienem in abdomine colligi, atque inde aut cum ipso sanguine ad pulmonem mitti, aut abdominis cavitare ex cæcis ductibus in thoracem penetrare, quod in hydropicis sæpè animaduersum. Hinc accidit ut malum quandoque in thorace initium sumat,

& tandem in hydropem degeneret: & contra sæpè euenit, ut in hydropicis humor serosus ex abdomine in cavitatem pectoris penetrat. Per quas vias autem humor serosus in cavitatem thoracis penetrat, non adeò planum, & potest id forsitan varijs modis accidere. Nam vel vaporis specie humor in cavitatè thoracis penetrare potest, ibique rursus condensari; quod faciliè fieri potest, cùm membrana thoracem intus succingens satis densa sit: vel etiam serum sub propria forma è vasis thoracis, in quibus abundat; ut in ventre inferiore in abdomen: & ut Hippocrates, 6. epid. loquitur, ἀνωρίστους αὐτὸν ἰατρὴν παρὰ τὸν αἰσιν εἰσάγει, *Inuenit natura etiam sine ratione sibi ipsi vias.*

Et plerumque in ventre inferiore causa mali hæret, ac nutritionis viscera scirrholà, aut vesicæ aqua plenis repleta deprehenduntur: vnde etiam pedes intumescunt, facies pallet, & cachexiæ signa adsunt. Accidit autem hoc malum præcipuè iis, quibus thorax, ac pulmo vel à primo ortu, vel ab occasione aliqua debilis est, & ad recipiendos superfluos humores aptus. An verò etiam à corde vel pericardio humor hic prouenire possit, considerandum lectori relinquo. Semper enim humor aliquis in pericardio reperitur, qui præter naturam etiam augeri potest, cùm sanguis arteriosus admodum serosus sit, & hinc ad thoracem penetrare. Videatur etiam Columbus, lib. 5. anat. de hydropica, in qua hepar & lien saluus inuentus fuit, abscessus verò & putredo in corde. Et Dodonæus in anatomia capite trigésimo quinsio obseruat.

Bemuen.

Differentia.

Differentia.

Differentia præcipua est, quòd aliquando aqua in toto thorace continetur, aliquando in altera saltem eius parte.

Signa Diagnostica.

Signa.

Percipitur in thorace dolor grauians ob materiæ aquosæ abundantiam, & plerumque sonitus aquæ fluctuantis, dum æger corpus mouet, deprehenditur. Tussis est sicca. Et si enim materia multa in pectore abundat: tamen naturæ eam nec coquere, nec ob tenuitatem expellere potest. Respiratio est difficilis, frequens & parua, ægerque quasi suffocari videtur, ob organorum respirationis angustiam, & diaphragmatis à materia incumbente compressionem; & in primis illa in respirandos difficultas, & crebritas somni primo tempore ægrum subinuadit. Sitis est molesta ob pulmonein exsiccatum. Et si enim aqua in thorace abundat, ea tamen falsa est. Appetitus deicitur: accidunt interdum animi deliquia & palpitatio cordis, color faciei pallidus est, & palpebræ ac pedes intumescunt: latus intrinsecus acetum olet, non tamen semper, si scilicet materia in thorace moram trahat & corrumpatur. Accedit interdum etiā febris, cuius quoque Hippocrates, *alleg. loc.* meminit. Materia enim ista serosa in thorace moram trahens acrimoniam acquirit, tandèmq; putrescit & febrem accendit.

Prognosticum.

Prognosticum.

Malum est curatu difficile, & rædò sanatur. Vt hydrops ex caloris natuii viscerumque debilitate prouenit, ita & hic ex eadem causa ortum habet. Et licet quandoque morbus spontè solui videtur, erum-

pente ad aluum aqua: tamen pauld post malum, & quidem grauius, recrudescit, & incrementum paulatim sumit, tandèmq; in hydropem vertitur, ægerque suffocatur.

Indicationes & Curatio.

Indicationes, & curatio.

Materia aquosa pectus & pulmones replens euacuanda, eiusque generatio, vndeunque etiam proueniat, præcauenda. Et quia humor hic coctionem nullam recipit, eam etiam expectare opus non est, sed statim cum euacuare conuenit iis medicamentis, quæ aquas è corpore educere solent. Vt viz tamen, per quas effluere debet, aperiantur, commodum fuerit. Hinc etiam Author libri, *de morbis, loco supra cap. 9. alleg.* scribit, si materia ad aluum erumpit, ægrum statim sanum & à morbo liberatum videri. Et obseruatum, morbum huic permutatum fuisse in herniam aquosam, simulque per aluum effluxisse aquam, & sic euasisse ægrum, & integrè restitutum fuisse. Id quod accidit ubi non ex toto materia ad pectus fertur, nec viscera naturalia, nec pulmones insigniter læsi sunt. Secus enim si res sic habeat, temporis progressu alius incenditur, eadèmq; illa, vel adhuc amplius patietur æger, vt idem author ibidem loquitur.

Vtilis autem hic sunt in primis mechoacanna, radix gialapa, gummi gotta, succus radicum sambuchi ad ʒ. j. vel ʒ. j. s. sumptus, succus radicum ureos, elaterium ad ʒ. iij. exhibitum. Educenda est autem materia paulatim & medicamenta purgantia repetenda sunt; Hippoc. & antiqui etiam sectionem thoracis instituebāt, de quâ capite præcedente dictum. Verù cum ea præsentem solùm materiam exhaumat, succur-

nam regenerationem neutiquam
prohibeat, si pulmones vel viscera
sint corrupta, omninò inutilis est,
& Medico ignominiam parit.

Diuretica
utilia sūt

Potest tamen etiam serum per vrinam euacuari. Atque ab hoc auxilio Cæsar Maximilianus II. plurimum commodi sensit, qui cum pectoris hydropæ cum cordis palpitatione ad annos viginti laborasset, vno interdum die ad sex libras minxit, cūmq; motus ille materiæ impeditus esset, suffocatus est, vt refert ipsius Medicus, Iohan. Crato in epistol. 2. Scotæ collat. epist. 137.

Diuretica autem talia proponuntur de hydropæ.

Aqua D. Est etiam utilis aqua hæc D. Do-
Doringij.

26. Rad. calam. aromat. raphani
marini an. ʒ. iij. rusei, ʒ. j. cortis.
et sem. ebuli, an. ʒ. ʒ. agumon. M. j.
Incisa & commixta cum hepate &
pulmone vituli, infundantur hor. 2. 2.
in aq. apij, centie searide, an. lb. iij.
vini Rhenani lb. ij. Fiat f. a. destil-
latio suspensâ in alembico Corrice, ci-
ters siccor. in modico ligat. ʒ. ʒ.

Curatio. Verum et si modis his omnibus materia quandoque euacuari possit; tamen id semper tentare adeo tuum non est; cum à calore medicamentorum est agitata materia difficilem respirationem, suffocationemque excitare possit. Ideoque tutissimum videtur, vt materia sensibilibiter euacuetur sperto thorace. Et quidem maturè id faciendum secùdùm præceptum Hippocratis, 6. *cord. sect. 7.* *ὁπότε μὲν ἴσῃσι τὸν πνεύμονα,* ne ab aqua pulmones corrumpantur. Materià euacuatà danda opera, vt eius generatio prohibeatur, viscerumque morbi, interemptes, obstructio, scirrhus medicamentis, de quibus in

doctrina de hydropē dicitur, emendatur. Et cum materia serosa facillē rursū generetur, eius purgatio per intervalla repetenda.

Cauteria quoque in cruribus præcipuè, & fongiculi excitandi, per quos semper materię aliquid euacuetur.

Videtur ratio sit, qualis hydropi- Dizia.
cis scribitur.

CAPVT XXI.

*De vertebrarū dorsi luxatione,
& gibbositatē.*

Sпина dorsī ē multis vertebris componitur, quæ peculiari articulatione inter se coherent & connectuntur ut ad inflectendum, in anteriora præsertim, apta sint, in quo motu ne sedibus suis excidant, vertebræ multis & variis ligamentis firmatæ sunt. Quandoque tamen causarum præternaturalium violentia ē sede sua exturbantur, & quidē nunc rotæ, quæ luxatio est, nunc ex parte saltem, quæ subluxatio nominatur.

Et quidem primæ vertebræ caput infidet, è qua tamen quando-
put infidet, è qua tamen quando-
put infidet, è qua tamen quando-

*Prima
vertebræ
luxatio.*

quo fit, vt spinalis medulla com-
primatur, mentúmque ad pectus
flectatur, vnde & eloquendi & spi-
randi potentia tollitur, homóque
subitò iugularur.

Cervicis verò vertebræ & luxan-
tur & subluxantur. Et si integrè
luxantur celeriter homo interit. Et
enim spinalis medulla in prima
origine & nervi ab ea oriundi com-
primuntur, vnde spiritus animales, in

Subluxatio.

membra inferiora influere non possunt, & ipsa respiratio tollitur. Subluxatio verò fit in partē anteriorem, & tum collum distorquetur, caput moveri nequit, facies luet, locus affectus dolet, & spirandi ac loquendi difficultas adest. Malum tamen minus periculosum est, quàm luxatio. Statim verò iis occurrendum. Quod sit, si æger in humili sella sedeat, Chirurghi verò minister toto corpore scapulis & humeris ægri incumbat, Chirurgus autem caput verimeque ad aures comprehensum concutiat, & in omnem partem moueat, donec vertebra suo loco restituatur. Quod ubi factum, dolor statim remittitur, caputque iterum moveri potest.

Gibbositas.

Eius species.

Frequentissimā verò luxatio dorsi est, quæ in genere Gibbositas nominatur, & quæ ea laborant, Gibbi dicuntur. Luxatio autem ista non est eiusdem generis. Luxantur enim vertebræ vel extra vel intrò, vel ad latus alterutrum. Et quidem ad latera id fit frequenter, extra frequentissimè; intrò rarissimè, eā de causa, quia in spinæ parte, quæ cavitatem thoracis spectat, inter vertebras est cartilago mulla, & crassa, quæ prohibet, ne spina facilè versus anteriorem luxari possit, in reliquis verò positionibus nullum adest impedimentum.

Cum versus exteriora vertebræ luxantur, & sedibus suis excidunt tumor in dorso apparet, nullumque hoc propriè Græci *ὀσθησις*, & *ὄσθον* & *ἰσθμὸς*, Latini Gibbositas nominatur. Si verò versus anteriora fiat luxatio, cicatrix in dorso apparet, tumor verò ante & circa sternum, & tum *ὀσθησις* appellatur, quod vertebrae repanditatem, recurvita-

tem & gibbositatem ad interna. Si autem in latus alterutrum fiat luxatio, dicitur *καλινωσις*, obliquatio & tortuositas.

Galenus 3. de artic. text. 2. & 6. arbor. 46. quartum adhuc vitium vertebrarum spinæ dorsi adiungit, quod *ῥάμ*, id est, qualificationem nominat, quando vertebrarum iunctura & compages dimouetur, vertebræ tamen in sede sua manent. Quod malum aut certè huic cognatum, forsitan est illud malū, quod Germani *das Verbeichen* appellant, & quod nonnulli frequenter pati dicuntur. Conqueruntur hoc morbo affecti de dolore dorsi & circa ventriculum, appetitus decedit, nonnulli vomunt, caput dolet, nonnullos etiam & præcipuè infantes calor quasi febrilis corripit, imò sæpè febris satis magna, quæ ob symptomata coniuncta malignam quandoque simulat. Atque hoc sibi accidere dicunt, cum graue onus aliquod sustulerunt, vel alio modo vehementer & inordinatè spinam dorsi mouerunt aut inflexerunt.

Curandi rationem hanc habet. In infantibus candelam ceream accensam vmbilico applicant, & ollulam imponunt, eamque instar cucurbitæ affigunt & adherere permittunt, donec spontè decadat. In adultioribus verò quasi luxationem hoc malum curant, atque alij aliter. Plerique brachia decussatim pectori iniiciunt, manibus interdum reflexis, quas aliàs tergo sedens & genua sua dorso applicans apprehendit, ægrumque hoc modo concutit, donec quidam strepitus audiat. Tum enim vertebrae suam compagem restitutam esse dicunt. Exhibetur etiam cum commodo *unguentum*

Curatio.

ὀσθησις, seu gibbositas. *ὀσθησις*, seu repanditatem.

rubrum potabile, oculi *cancrorum* & similia, quæ lapsis & percussis exhiberi solent medicamenta. Mulierculas etiam sæpè falsò ad hoc malum præcipuè in infantibus recurrere scio, & licèt infantes febribus laborent, id huic malo imputant. Si quid tamen tale seu infantibus, seu adultis reuera accidit, causà est *nūq̃*, seu quassatio vertebrarum ex causà aliqua violenta, & quidem vndecimæ, vel vicinæ alicuius vertebræ, vbi orificium ventriculi dorso alligatur, è cuius membranarum id dorso annectentium extensione præter naturam ista symptomata oriri credibile est.

Nonnulli adhuc quintum genus addunt curuitatem scilicet, quæ decrepitis accidit, quod tamen potius incuruitas, vt dixi, quàm gibbositas nominandum; cum iis, qui corpore sunt proceri, in decrepita ætate corpus in anteriora incuruetur, vertebis quidem non laxatis, sed totà spinâ incuruatâ.

Differentia.

E quibus, quæ luxationis vertebrarum sint differentiz, patet. Ad hoc & hoc, quod aliquando ea accidit in thorace, aliquando sub diaphragmate.

Causa.

Causæ à quibus vertebra loco suo dimouetur, sunt vel externæ, vel interne. Externæ sunt casus, percussio, inflexio nimia & similes causæ violentæ. Quò pertinet etiam nutricum impudentia, quæ infantes facilius nimis ardeat aut inæqualiter constringunt, aut in brachiis gestant, antequam spina tam firmata est, vt erecti sedere possint, aut si, dum infantes è cluius eleuant, dorsum manu alterâ non fulciunt. Huc re-

ferenda est & vestium nimia constrictio, ob quam causam puellæ gibbosæ interdum sunt dum nates, vt eas iuncas reddant, thoracem arctius & violenter constringunt. Consuetudo etiam frequenter corpus in partem anteriorem vel latera flectendi malo huic materiam præbere potest.

Causæ internæ sunt, primò natiua & viziosa in vtero conformatio, vnde etiam sæpè hæreditarium malum est. Deinde humores viziosi, qui ligamenta spinalis medullæ laxiora reddunt, siue aliunde affluunt, sicut id à capite factum esse annotauit Guillelmus Fabricius, *cent. 1. obser. 45.* siue circa spinam à natiua vel adsciticia earum partium inbecillitate colligantur. Quo facit maximè ligamenti neruosi, quo vertebræ connectuntur omnes, debilitas. Id enim cum tenaci & glutinoso humore commoditatem circumfusum sit, ei nonnunquam alius frigidus crassus humor per catarrhos commiscetur, vnde ligamentum hoc & nexus vertebrarum laxior redditur, vel tumor excitatur. Tertiò tumor intus ad spinalem medullam natus, de quo Hippocrates 6. *apbor. 46.* Talia enim tubercula, vt & musculi adiacentes, si intumescant, vertebra loco suo dimouent. Trahuntur autem & dimouentur à talibus tumoribus vertebra nunc intrò, nunc extra, pro situ tumoris. Si enim tumores duo obsideant ligamenta interna duarum aut plurium vertebrarum, inter quas vna, duæ vel plures interiectæ sunt vertebrae nullo tumore occupatæ, tum vertebra à suis ligamentis tumentibus trahuntur, compelluntque vertebrae, quæ sunt intermediæ, à suo loco dimoueri,

Interna.

Curuitas
decrepi-
torum.

Differen-
tiz.

Causa
externa.

Nutrici
incuria
in infan-
tibus fac-
ilis con-
stringen-
dis.

& sic *sternum*, perinde ac ramus vini-
di, si eius duo extrema in se con-
trahantur, in medio curvatur. Si ve-
rò unus, vel duo, vel plures tumo-
res, inter quos nulla interiecta est
vertebra adfint, ligamenta, quæ oc-
cupant, ad se trahunt in partem in-
teriorem; & sic simul vertebra in-
terò trahitur & sic *sternum*.

Signa Diagnostica.

Signa.

Malum hoc visui & tactui patet.
Et quod vertebræ suo loco motæ
sint, quo in loco visu & tactu ex-
plorari potest. An etiam vertebræ
versus interiora, vel exteriora, vel
ad latera luxatæ sint, visu dignosci-
tur. Symptomata tamen etiam pro-
venientia mali eius qualitatem
edocent. In *adultis* vertebrarum
thoracis spiritus difficilis er & cum
sono trahitur, sternum sic *sternum*.
In *infantibus* maxima adest spirandi
difficultas, movendique in parti-
bus inferioribus impotentia. In
senectute plerumque excitatur para-
lysis in parte luxata, & convulsio
in opposita. Quibus spina ad lum-
bos gibba est, renum & vesicæ viti-
a superveniunt, & plerumque
sunt infæcundi. Ad paralyin tamen
partibus inducendam in primis,
nodus luxationis multum potest.
Si enim luxatio fiat repente & sit
magna, compressa spinali medulla
& nervis inde oriundis accidit pa-
ralysis. Si verò sensim vertebræ lu-
xentur, interm spinalis medulla,
quæ mollis est, extendi potest, unde
nihil mali patiuntur. Quæ de re vi-
deatur Galenus, 4. de loc. aff. cap. 3.
Symptomata, quæ ex luxatione
duo um vertebrarum lumborum ex
lapsum ab arbore superveniunt, re-
center Guillelmus Fabricius, *cent.*
5. obs. 65. Post casum, inquit, super-

uenit dolor acerbissimus, qui lon-
gum dolor duravit, cibum indige-
stum euomit, nihilque cibi &
potus per aliquot dies retinere po-
tuit. Febris quoque ardentissima, si-
tis in exhausta, vigilia, inquietudo
ariditas linguæ, tandemque deli-
rium superuenit. Statimque post
calum inferiores partes corporis ab
umbilico paralyti correptæ fuerunt;
quapropter nec excrementa alui,
nec urinam continere potuit. Gib-
bis plerumque anhelitus sæpe;
quia ut Aristoteles docet, thorax est
angustior, quàm ut pulmones satis
dilatari possint, unde humores &
vapores in eo corrumpuntur.

Prognostica.

Prognos-
tica.

1. Morbus hæc est curatu difficilis, præsertim si malum amplius non sit recens, & sæpe est incurabilis.
2. Hæreditaria, & quæ à primo ortu, & conformatione obtingit, gibbositas incurabilis est.
3. Quæ à causa externa sic gibbositas sæpe est sanabilis, & eam ab interna, vix unquam sanatur.
4. Si plures vertebræ ordine sese consequentes simul luxentur, minus periculosum malum est, quàm si vn. saltem luxetur. Vna enim vertebra si saltem luxetur, cum in acutum angulum desinat, spinalem medullam comprimic, & eam valde lædit. Si verò plures vertebræ simul luxentur, & obtusum angulum efficiant, minus spinalem medullam comprimunt.
5. Luxatio integra longè periculiosior est, quàm subluxatio; quia grauiora symptomata infert.
6. Luxatio intorsum facta sæpe habetur pro incurabili ab Hippocrate *lib. de art.* Paulo *Agnetæ, lib. 6. c. 117.* Auenarum *lib. 4. fec. 5. tra. 7.*

2. cap. 21. Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coctionem facere possit? Guillelmus Eabricius tamen *cent. 5. obs. 69.* id non planè pro impossibili habet, & modum curandi ibi proponit, vt infra dicitur; sed videtur difficilis, modò non sit planè impossibilis.

7. Quicumque Gibbi ex asthma- te vel tussi sunt, ante pubertatem moriuntur. Hippocrates, 6. *aphorism. 46.* Calor enim circa annos pubertatis auctior maiorem & liberam respirationem requirit: Ipsa quoque viscera in thoracis cauitate, cor & pulmo augentur. Quia verò tuberculum in maiorem molem excrescit, & ipse thorax non sit amplior, impedita spiratione calor insitus paulatim languescit, tandè- que suffocatur. Et cùm ob ipsam asthmaticam dispositionem diffi- cili fiat respiratio, malum duplicatur, gibbositate accedente, vt non sit mirum, hominem in adolescentia mori.

8. Qui verò Gibbi sunt ex aliis causis, quàm humoribus frigidis, vt tussi, ictu, humorum defluxu non necessàriò tam brevis vitæ sunt, sæpè diu viuunt.

9. Qui verò Gibbi sunt post pubertatem, eò- in iis thorax iam naturalem magnitudinem habeat, non tam citò moriuntur.

10. Quicumque ab infantia statim Gibbosi sunt, iis costæ vel parùm vel nihil latum crescunt, sed foràs antrosum porriguntur, vnde pe- ctori sua latitudo decedit, atque inde sunt asthmatici, pulmonibus compressis. Quin etiam ceruicem ad magnam vertebram in anteriorem partem recuruatam habere cogun- tur, vt & iis caput prouum sit. Id

igitur magnam faucibus angustiam exhibet, cùm intrò vergat.

Curatio.

Indicatio hic vnica est, vertebram sua sede, è qua prolapsa est, resti- tuere, id quod in tenellis corpori- bus fieri potest, in luxatione extor- sum facta, si spina dorsi, quæ ad ex- tra gibba est, quotidie ab axillis ad os sacrum versus leniter manibus intrò comprimatur. Iisdem corpo- ribus adhiberi possunt thoraces, fer- rei, quibus vertebræ ad sua loca in- trò comprimuntur & compellun- tur, qualem depinxit Ambrosius Paræus *lib. 22. cap. 48.* vel saltem lamina ferra thoraci inuitur, & emplastra & inunctiones ex medi- camentis neruos roborantibus & consolidantibus adhibentur, de qua vide Guillelmum Fabricium, *cent. 5. obseruat. 67.*

In adultis verò gibbositas non ni- si Chirurgiæ opera, & plerumque per peculiaria instrumenta, quæ de- pingere faciliùs, describere, curan- tur. Qua de re videatur Hippocra- tes, 3. *de articul.* & Galenus, *in comm.* Ortbas, *de machinis c. 35.* Paulus Ægineta *lib. 6. c. 117.* Cor- nel. Cell. *lib. 8. c. 14.* Paræus *lib. 5. c. 15. & 16.*

Luxatio verò spinæ dorsi ad inte- riora ab omnibus penè habita est pro impossibili. In corporibus tamen te- nellis, si malum sit recens, empla- stra fortiter adhærentia applicati pos- sunt, quibus auulsis spina versus ex- teriora retrahi potest, de quibus dic- tum, *lib. 1. p. 1. cap. de cranijs depres- sione, & etiam cap. seq. dicetur.*

In adultis verò etiam aliquid ten- tandum censet Guillelmus Fabrici- us, *cent. 5. obs. 69.* primò quidem extensione, & spinæ eundem nunc in dextrum,

Curatio

in dextrum, nunc in sinistram latus concussionem, & ventris in altum elevationem, per instrumenta ab Orbasio & Parço, locis allegat. depicta. Deinde dorsi incisione, usque ad vertebram luxatam, & vertebrae, quæ post incisionem tenaculis aptis in appendicem deprehendenda est, in altum elevationem. Verum modus hic tutus vix videtur, & pauci tam anticipi curatione sese subiiciunt.

causa externa, aut sua sponte laboravit, & curum impotentiam facit, ut ne tantum quidem percipiat ager, & ventris & vesicæ, adeo ut primis quidem diebus sterens aut urinam nisi coactè reddatur. Quod si morbus inualuerit, & sterens & urina aegro inscio prodit, tandemque non longo post intervallo perit.

Cùm autem spinalis medulla quasi cerebrum oblongatum sit, eadem etiam medicamenta ei, quæ suprâ, lib. 1. p. 1. cap. 24. de vulner. cereb. proposuimus adhibenda.

CAPVT XXII.

De fractura spine & vulneribus spinalis Medullæ.

CAPVT XXIII.

De tabe Dorsali.

Fractura spine.

Interdum etiam accidit, à causis externis & violentis ut spina & eius vertebrae frangantur, & contundantur. Fractura plerumque lethale malum est, ob spinalis medullæ & nervorum lationem. In contusione hoc vsurpetur cataplasma.

Contusio spine.

℞. Farin. bordei, fabar. an. ʒ. i. semin. sænugræ. ʒ. ʒ. pulu. flor. chamemel. absinib. ramini, an. ʒ. ii. croci ʒ. ʒ. rad. consolid. maior. minoris, an. ʒ. i. ʒ. ʒ.

Radices ad molliem coquantur & per setaceum traiciantur, postea adde reliqua, & fiat s. a. Cataplasma.

Vulnera spinalis medullæ.

Si spinalis medulla vulnerata sit, cùm ex ea partes inferiores nervos accipiant, inferiores partes omnes vel resoluuntur, vel conuellantur, malumque est periculosum, quia cerebrum in consensum trahitur, ac dolor & febris excitatur, raroque ægri, præsertim si vulnus sit magnum, convalescunt. De quo etiam Hippocrates, 2. prædict. Si spinalis medulla aut ex casu, aut alia quapiam

Facit etiam Hippocrates, lib. 2. de morbis, mentionem tabis dorsalis. Dorsalis tabes inquit, ex spinali medulla oritur, præcipue vero recentes sponfos, & libidinosos corripit. Febris sunt expertes, bene comedunt & colliguntur. Quod si ita affectum percontaris, asseret, sibi videri ex superioribus partibus à capite velut formicæ in spinam demitti, cùmque urinam aut sterens reddat, semen geniale copiosum & liquidum ei prodit, neque generatio fit, & inter dormiendum, cum uxore dormiat, nec ne, Veneris ludibria patitur. Cùmque alias tum præcipue per locum arduum iter fecerit aut eum erit, anhelans & imbecillus evadit, caput gravatur, & aures sonant. Hæc temporis progressu vehementibus febribus correptus perit ex lipyria febre.

Tabes dorsalis.

Quatuor autem, ut in commentario addit Petrus Salius Diuersus, tabis dorsalis apud Hippocratem occurrunt differentiz. Prima est ex nimia

Differentia.

Venere; altera, ex sanguine copio-
sior in spinalem medullam irruen-
te; tertia, ex eiusdem resiccatione;
quarta, ex prava destillatione in
eandem incumbente.

Prima.

Primam differentiam quod at-
inet, potest illa confirmari historia
Satyri, 6. epid. sect. 8. text. 42. qui
cognomento Grypalopax vocatus,
annos 25. natus non solum sapius
per somnum genitale semen excre-
vit, sed & per diem illi multoties
promanavit. Cum autem iam an-
num trigessimum attingisset, tabe cor-
reptus mortuus est.

Causa
gignit.

Hippocrates morbi huius causam
proculdubio hanc esse statuit, quod
semen ex cerebro per spinalem me-
dullam ad membra genitalia pro-
ueniat, ut ex lib. de aere, aquis &
locis, lib. de genitura & natura pueri,
videre est, quare de re hic non disputo.
Hoc tamen certum est, & totum corpus
ex nimio seminis profluvio conta-
hescere, & cerebrum insigniter læ-
di, & proculdubio, etiam spina-
lem medullam, quæ cerebrum ob-
longatum quasi est; unde succedit
tanta corporis impotentia, ut ex
omni motu validiore, ut cursu vel
in locum acclivem adscensu diffi-
cultas spirandi sequatur. Etsi ve-
ro in principio nulla adsit febris:
temporis tamen progressu, & fa-
cultatibus omnibus debilitatis fe-
bristandem putrida succedit, quæ
plerumque est à malignarum genere
in quibus interiora vruntur, exte-
riora frigent. Vniuersalibus autem præmi-
ssis Hippocrates lacusinum deinde
bubulum per 40. dies præbet, & po-
stea cibis molibus ipsam reficit.

Secunda.

Secunda tabis dorsalis differen-
tia est. cum calor spinalis medul-
læ intus à copiosiore sanguine ob-

ruitur & ferè extinguitur.

Tertia, cum oclusis meatibus
per quas nutrimentum ad eam de-
fertur, exsiccatur.

Tertia:

Quarta, cum prava destillatio in
eam decumbit, cuius exemplum
habetur apud Guilielmum Fabri-
cium. cent. 1. obs. 45.

Quarta

De ista tabe dorsali pluribus agit
Balduinus Ronsseus, epistol. 32.
quæ etiam tract. de scor. epid. 4.
habetur quam hic opponere libet:

*Morbus, quem Græci λίσσωσι, La-
tini lumbaginem appellant, est Hol-*

Lumba;
go.

landus tum propter rationem victus,
tum loci ipsius qualicetem viginosam,
propterea familiaris plane, ac propin-
dum indigena, quamquam & aliis lo-
cis illos soleat invadere, qui immo-
deratiore vruntur Venere. Nam si-
cuti lib. 2. de morbis, auctor est Hip-
pocrates, corrumpit maximè sponsas, at-
que Veneri deditos, prodique ipsis ge-
nitale semen multum ac liquidum, &
genitura in utero non manet, & in
fœtus semen profundunt, sine dormiant
cum uxore, sine non. Verum hanc
tabis dorsalis speciem, sicuti puto, non
est quod miramur: quando verisimi-
le magis sit, morbum tum originem
traxisse à materia pituitosa, sanguini,
aut flauis, aut melancholica mixta,
per modum catarrhi, capite per venas
in spinalem medullam defluente, si-
quidem cum septem sint catarrhumat-
um, aut defluxionum species, ut au-
thor est, libro de glandulis, Hippo-
crates, quibus cerebrum sese exonerare
soler, per nares dico, per aures, per
oculos, per palatum inguitur acgulam,
ac reliqua per venas in spinalem me-
dullam & sanguinem; necessum est,
locum, in quem defluxio incumbit,
varie affici pro materia ipsius tum

Catarr-
thorum
septem
species.

qualitate, tum quantitate. Nam si excrementa aut sordes, quæ à cerebro in aliam partem desinunt, non prorsus maligna sint, ac quantitate pauca, dolor ipse & affectus talis erit, qui à naturæ facili evinci ac discedi possit: sin excrementa tum qualitate tum quantitate peccant, credendum est, eadem gravissimum symptomatum occasionem præbitura. Ac proinde quoniam reliquis sex omisiss, de ea tantum desfluxionis specie, quæ à capite per venas in spinalem medullam decumbit, nobis sermo est: sciendum est quod quoties frigidi ac lentii humores in spinam desinunt, vicinas partes primum occupare, atque afficere; quæ nisi ita robusta sint, ut conceptam materiam statim evincere, ac dissipare possint, easdem ad subiectas, ac maximè vicinas partes vicissim transmittant, quæ dum nervosum genus discendit, gravissimis doloribus totum hoc corpusculum lancinat, incipiendo à scapulis, & sensim serpendo ad lumbos, atque interdum etiam ad ipsum os extendendum. Atque ita affectus vix progredi, aut sese loco movere possunt, quam affectiionem propriè lumbaginem aut ischiurion vocamus. Si quis tamen Neotericorum guttam dicere malis, quod tanquam gignit à cerebro desinens humor, relictus fecerit, quàm h, qui generaliter ad omnes articulorum dolores gutta nomen accommodare voluerunt. Habet autem hoc cum quartana commune, quod omnibus annis temporibus invadat, æstate tamen fit brevisior, autumno longior, maximèque si hyemem attingat. Catesum si artus finit, & temassit fit humor, qui à cerebro desinit, atque maiore cum impetu feratur, iam non solum in subiectam spinam decumbit, verum etiam in æterabula ossis coxendicis, ac tum demum tabem

dorsalem, aut spinalem, aut ossis facri dicti Hippocrati, consiliat, valumtale, in quo vixiam cum morte cōmutare pro solatio est, quando semper magis ac magis ingruentibus doloribus requies tempus nullam conceditur, siquidem, ut libro de glandulis Hippocrates ait, vixit morbus ex desfluxione capitis per venas in spinalem medullam, inde autem in os sacrum impetum facit, quod medulla ipsa fluxionem producit, & in extendendam æterabula seu iuncturas deponit, & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo coruabescit, & vivere non expetis. Si autem enim scapula dolent, ambobusque pedes & crura consequenter, & semper tandem pereunt multo tempore curati, atque sic deflorescit homo & moritur. Habet præter cætera cum reliquis tabidus commune, quod ætumnus ei magna ex parte exitialis, verum autem ad pharaciam opportunissimum. Porro quod spinalis medulla areseat, atque marcescat, in causa est obstructio officiorum ac venarum, atque vasorum à cerebro ad spinam sanguinem atque spiritum deferentium, quos it, ut curandi methodus in eo consistat, ut referatis poris materia peccans enaceatur. Quod si plethoricum quoque corpus sit, primum evadenda erit vena, aut humeraria brachij dexteri, aut mediæ sinistri, aut etiam si rufus exigat, de poplite, & si fortè sumeant ora illa venarum quas hæmorrhoidas Græci appellant, consultum erit easdem, aut adnotis sanguisugis, aut alio quovis modo adaperire. Solut enim, ut ante diximus, lumbaginis causa esse hæmorrhoidalis, quod quavis crassior esse videatur, quàm ut eodem modo ad spinam transmitti possit: quotidiana tamen experientia fieri posse docet, quando licet hæmo-

baginem in dies superuenire conspiciamus, quemadmodum in sceleritybe nostra annotauimus. Et Galenus commento tertio in primum prorrheticon Hippocratis, idem aperte demonstrat dum dicit, lumbis dolentibus expectandam euacuationem per haemorrhoides, quod propter eandem retentionem non raro dolcant lumbi, magisque si eius temperatura, qui ita afficitur melancholica sit, aut si abscedentes, ut sic loquar, praecedentis morbi reliquia, ad ora illa venarum delata exitum non habeant.

Curatio
Lumbi-
ginis.

Post sanguinis igitur missionem decoctis res tentanda est, quae materiam fluidam reddant, deinde medicamentis purgantibus pro humoris peccantis ratione propinanda erunt, incipiendo à clementioribus, habita semper ratione capitis, tanquam partis primariæ affectæ. Deinde si res exigeret, fortioribus citius utendum erit, in quem usum elaterium suum Hippocrates summè commendatum habet. Ego magis probarem globulos ex agarico, cum turpethi portione aliqua maceratos, idque aut in decocto foliorum sene, cui nonnihil seminis anisi aut fenic. additum sit, aut alio quouis, prout res exigere videbitur. Post purgatum corpus, consultum erit summationibus frictionibus, inunctionibusque, uti, quae simul & euocent materiam, & dolorem mitigent, & robur addant affectæ particulae. Poterit etiam in eundem usum, si locus, tempus & ægri consuetudo admittant, preparari balneum, aut aqua dulcis, aut quod artificiosè confectum sit, ex verbena, rosis, salua, libanotide, chamæmelo, meliloto, atque aliis idgenus aqua incolitis. Quod si per se non satis fluxa sit aluus, suadet Hippocrates, ut eandem, in lacte, eluamus. At si forte humor tenacius imbe-

rit, atque alius, quodam modo impactus fuerit, ac flatus utrinque fuerit participes: non solum iam de his hypothesebus exequendum erit negotium, Verum etiam medicamentosa illas cucurbitulas in usum vocare par erit, ut videlicet humor ille, earundem attractione, foras euocetur, cautione interim habita, ne copiosior sit materia, quam ut commode per easdem educi possit, siquidem alioqui periculum esset, ne noui quidā fomes morbo suppediretetur. Vitiis ratio incidens, atque attenuans, & quæ non omnino tenuis sit iniungenda est. Protenditur enim malum hoc, ut reliqui articulares morbi, ad minimum, in vigesimum diem; ut plurimum in quadragesium: quamquam non raro metas has excedat. Potius sit interitum virum, inuicopos, quod nos nullum dicimus, uel euenisse tennis, diligenter cogita. Somnus sit temperatus, & quiconcoctioni ciborum sufficiat. Nisus enim catarrhis obnoxius reddit cerebrum. Exercitium moderatum esto pro virum robore, ac tolerantia ratione citra desatiationem. Hæc Ronfissus.

CAP. XXIV.

De vermibus dors.

VT vermes in aliis corporis partibus plurib. ita quandoque etiam in dorso generantur in infantibus, nonnunquam etiam in brachiis, imò quandoque & in aliis externis partibus (cùm autem in dorso præcipue nascantur de iis hoc loco agere libet) quos nonnulli Crinones nominant, alii Dracunculos, ob similitudinem cum Dracunculis, qui Aegyptiis & Indis sunt familiares, & ut Aëtius, terrab. 4. ser. 2. c. 8. & Paulus l. 4. c.

Vermea
dors.

Dracunculi.

39. teſtantur, in muſculoſis corpo-
 ribus partibus, brachijs, cruribus, lum-
 briorum formâ ſeſe exerunt; quo-
 rum capita apprehenſa ſi trahantur,
 vehementem dolorem excitant. De
 quo affectu Avicennas, l. 4. p. 3. tr. 3.
 c. 21. & 22. Guido de Cauliaco, Pa-
 ræus l. 7. *chirurg. c. 25.* Scholtzius,
in epiſt. med. epiſt. 27. Reuſnerus
 Vvicius, *in tract. Germ. de Dracuncu-
 culis.* Foreſtus, l. 20. *in ſine obſeru.*

Miſceſſer. *medie.* Germani *Miſceſſer*, nominant,
 quod alimentum infantium abuſu-
 miant, nominant. Qui enim hoc
 morbo laborant infantes, contabel-
 cunt ſerè, & licèt ſatis comedant, &
 aliàs bene valeant, non nutriuntur,
 & pruritus moleſtiſſimus in dor-
 ſo percipiunt.

**Cauſæ
 illorum.**

Generatùr autem hi vermes ex ma-
 teria viſcoſa in venis capillaribus,
 præcipuè in dorſo, concluſâ ſubter
 cutem, & ob cohibitam transpi-
 rationem in hoc vermium genus trans-
 mutata.

Signa.

Cognoscuntur autem hi vermes
 & ſui ſuſpicionem præbent, dum
 infantes quidem comedunt, ſed non
 rectè nutriuntur, & ſerè contabel-
 cunt, & ſunt inquieti, ac pruritus
 ſentiunt moleſtiſſimum, & sæpè
 lancinatione indeſinente admodum
 diuexantur, ac quaſi ſpinularum a-
 culeis punguntur, ita, vt huc illuc
 ſeſe iactantes quieti manere non poſ-
 ſint. Quæ res, vt certius cognosca-
 tur, infantes in balneum & ſudato-
 rium inferendi, & manibus forſiter
 fricandi. (Potèſt etiam panis cum
 melle pro frictione adhiberi.) Ita e-
 nim quaſi capilli quidam cineritij
 aut nigricantes è cute prorumpunt.

Curationo.

Curationem quod attinet, reſert
 Andreas Dudithius, *in epiſtol. med.
 à Scholtasio collect. epiſt. 27.* in Polo-

nia in labrum aquæ calidæ, in quo
 pueri lauant, iniici panis in micæ
 friati manipulum, cineris item pa-
 rum, lotis infantibus aquam perco-
 lati, & panem illum in maſſam comp-
 pingi, quæ vbi in diuerſas partes
 manibus diſtrahitur, magnam ſub-
 tiliffimorum pilorum vim oculis of-
 ferat primo die, poſterioribus die-
 bus pauciores, poſtquam conualeſ-
 cunt infantes, planè nullos.

Noſtris viſitatum eſt, dorſum vt
 & brachia, ſi opus ſit, linimento ex
 farina triticea & melle conſecto
 inungere, & partes illas bene fri-
 care.

Alii *℞. Radic. bryonia ꝯ. ii.*
*Coq. in lixiuo è cineribus quæris pa-
 rato in formam puluiculæ, quâ pue-
 ros illinunt.*

Vbi vermiculi illi capitella ſua in-
 ſtat pilorum vel ſeminis papaueris è
 potis cutis exerunt, nouacula acuta
 ſtatim detruncanda ſunt, ne iterum
 retracta ſeſe abſcondant. Alij ſter-
 cus gallinaceum ſacculo incluſum in
 lixiuo per noctem macerant, & po-
 ſtero die infanſtem vſque ad collum
 eò inmergunt, ac peracta ſudatione
 melle inungunt, tandèmq; noua-
 culam adhibent, infanti ſemen na-
 ſurtij præbent, ter illud repetendo.
 Atque id aliquoties interiectis ali-
 quot diebus repetendum eſt, deinde
 frictione illa niſil amplius eliciatur.
 Mulierculæ certos dies & dierum
 intervallum eligunt, ſed ſuperſtitioſè.

Accidunt & alij morbi interdum
 ſpinæ ac dorſo. Ita Columbus, *lib.
 15. anat.* vertebram primam occipiti
 planè adhærentem obſeruauit. Ex
 abſceſſu in dorſo pediculus erupit
 reſert Foreſtus. Fabro euidam li-
 gnario in abſceſſu quinquaginta oua

*Vertebra
 prima
 capiti
 ad-ata.
 Pediculi
 in dorſo.*

Ous in
dorso.
Cornua.

(seu vesicula) tenuissima membra-
nula obducta , intus limpidissima
aqua plena reperta fuisse , refert ex
relatione Laurentii Scholtzii Schen-
ckius *lib. 5. observatione 46.* Cornua
quoque in dorso innata fuisse obser-
uatum est cuius rei exempla annota-
uit idem Schenckius *loc. all. obs. 50.*

opera nihil præstare potest , sed em-
plastrum aliquod attrahens appo-
nendum , qualia suprà *lib. 1. p. 1. c.*
de crani depressione sunt proposita.
Et talia emplastra non semel , sed
sepius applicanda & auellenda
sunt.

Si inflammatio carnis superiacen-
tis adsit , cataplasma aliquod con-
ueniens imponatur , quale etiam est ,
quod capite præcedente propositum ,
vel Diachylum ireatum. Vide Pa-
razum , *lib. 10. c. 6.*

FRACTURA costarum.

*FRACTURA
costarum.*

Franguntur quoque interdum co-
stæ itidem ex causis violentis , casu ,
vel percussione.

Signa eius rei sunt , quod quædam
inæqualitas & cavitas tum visu , tum
tactu deprehenditur , strepitus quo-
que quidam auditur. Quibus acced-
unt & alia symptomata. Adest dor-
lor grauis , & præcipue si internæ
costæ pars fracta sit , sique pleuriti-
corum dolorem æmulans , respira-
tio est difficilis , tussis molesta , &
nonnunquam etiam sanguinis spu-
tum superuenit , dum ex vasis ruptis
sanguinem effluentem pulmo imbi-
bit. Præcipue verò duo mala fractu-
ram costarum comitari solent. Pri-
mum est carnis superiacentis costæ
inflatio , quæ & tactu & visu depre-
henditur : & si manu locus compri-
matur , aëris cedentis strepitus audi-
tur. Cui nisi succurratur maturè , in-
flammatiō & febris , atque abscessus
succedere solet. Cuius rei causa est
carnis ab ossē separatio , & imbecil-
litas partis ictu indulta , quæ ali-
mentum , quod doloris ratione at-
tractum copiosius affluit , satis con-
coquere nequit , quod partim cru-
dum idè remanet , partim in va-
pores & flatus resolvitur. Malum

C A P V T X X V.

De Luxatione & fractura costarum.

Luxatio.

Costarum
luxatio.

CO S T Æ etiam interdum à
percussione vel lapsu luxantur ,
nunc suprà , nunc infrà , nunc intrò.
Si suprà , vel infrà , vel si in latus lu-
xatio sit costæ , inæqualitas visu
& tactu deprehenditur , & hinc
cavitas , illinc extuberantia apparet.
Si intrò luxata sit saltem cavitas ap-
paret.

Hæc sym-
ptomata.

Sequuntur autem varia luxata co-
stas symptomata , difficultas spiran-
di , thoracem mouendi , & corpus
erigendi dolor pleuritidem referens ,
musculosæ carnis , quæ costæ super-
iacet , inflammatio.

Curatio.

Costa autem ut quamprimum se-
di suæ restituatur danda opera. Si
luxatio sit in latus superius , æger re-
tus suspensus ex ianua vel fenestraz
alicuius parte superiore brachiis sta-
tuatur , & costæ capitulum eminens
comprimatur , donec in locum suum
redeat. Si verò versus inferiora lu-
xata sit costæ , æger pronus incurve-
tur manibus supra genua innixus , &
costa quæ eminet comprimatur , ac
in locum suum compellatur. Si
verò intrò facta sit luxatio , manus

hoc interdum & costarum corruptio sequi solet. Cùm enim caro ab osse abiecit, succedit in locum aër, cuius contactu os offenditur & corrumpitur.

Prognostica.

Prognostica.

1. Equidem per se vacat periculo costarum fractura; verùm quoniam graua, quæ diximus, symptomata contusioni carnis circa costas accidunt, ea de causa periculo non vacat imò quandoque lethalis est.

2. Quò pauciora symptomata praua adlunt, eò malum mitius est, quod fit, vbi costa solum fracta, non verò intrò compressa est. Solet autem costa per callum die vigesimo coalescere & ferruginari.

Curatio.

Curatio.

Costa fracta primò rectè componenda & coniungenda est: secundò eius per callum vnio procuranda: tertio symptomata, & præcipuè carnis inflatio, auertenda.

Primò quidem videndum, an tussi & spiritus retentione, an verò manuum opera fracta costa in locum suum restitui possit. Quod nisi succedat, emplastrum aliquod attrahens & quod adhæret, qualia supra, lib. 1. part. 1. c. 20. sunt propolita, imponendum, & cum impetu auferendum, vt costa in locum suum reducat. Conueniens huic vsui etiam est hoc emplastrum.

℞. Farinæ volutis, ℥. ii. tragac. thuris pulu. an. 3. v. visces querni (glutinis scil.) 3. vi. scythocol. 3. i. b. album. ouorum 3. ij. aq. rosarum f. q. M.

Vel emplastrum ex terebinthina, resina, pice nigra, farina hordei vel fabarum, mastiche, aloë compositum. Et talia emplastra sæpius ap-

plicanda & auellenda sunt, donec æger melius spiret. Et memini me ante aliquot annos viatori, cui in latere dextro à pertica, quam pro dolii vinculo parando flectere volebat, reciprocante, costa fracta & depressa erat, ita vt difficulter respiraret, tussiret nec se erigere valeat, tali emplastro imposito costam in suum locum reduxisse.

Nonnulli quidem cucurbitulis costas fractas in locum suum reducere conantur: verùm improbant id plerique Medici: cùm metus sit, ne plus humoris attrahatur, & aliàs caro supra costas inflari soleat. Si verò fragmentum costæ membranam pungat, atque inde acerbissimi dolores & alia praua symptomata oriantur, atque ipsa mors metuenda sit, pars, qua costa fracta est, incidenda, vt fragmenta pungentia vel eximere, vel præcidere liceat. Si etiam contusio addit, vena secanda, ne inflammatio accedat.

Costis in locum suum reductis natura quidem spontè callum generat: cui, vt subueniatur, emplastrum aliquod ad fracturam ossiū conueniens imponendum, inter quæ & hoc valdè celebratur.

℞. Pulu. myrsill. rosar. rubr. an. 3. i. farin. bordei, orobi, lentium fabarum, mastich. an. 3. ii. cupul. glandium, nucum cupressi, corisc. granat. balauft. an. 3. b. hypossifid. acacia, corisc. thuris sang. draconis, terra Lemnia, aloës, myrrh. an. 3. ii. olei myrr. rosar. ambracini, an. 3. ix. Cera & terebinth. clara, an. lb. b. F. Emplastrum.

Nonnulli in morbi progressu facias aqua rorismarini inbuunt, quam efficacissimam in ossium fractura esse scribunt.

runt imposita nomina. Nam Græci, Xyphoidem appellant, eò quod ensis imaginem referat, vt testatur Galenus, 7. de vfu partium. Alij mucronatam cartilaginem, quod ad gladij mucronis formam accedat, & Iuniores clypealem, gladialem & ensiformem nuncupant. Quidam & malum Punicum, eò quod balustij formam gerere videatur. Et nonnulli epiglottalem, ab imagine operculi laryngis, huic cartilagini specie non admodum ab simili, vocare voluerunt, sed quod ad formam gladij seu ensis, si rem vt est considerare velimus, multa melius ac verius totum pectoris os pugionis Hispani speciem præ se ferre apparet. Nam primum os, seu prima ossis pars, rotundæ pugionis parti respondet, quâ minimus digitus apprehensione tangit, & vulgò dicitur ensis ponum. Secundum vel secunda ossis pars responderet illi parti, quam tota manus complectitur, & capulum seu manubrium nuncupatur. Tertium os, vel tertia ossis pars vnâ cum ipsa cartilagine reliquæ parti pugionis assimilatur, & idèò vniuersam hanc ossium struem nonnulli xyphoidem ab ensis imagine vocarunt. Amatus Lusitanus cent. 3. in febr. cur. 93. refert in dissectione corporum cognouisse cartilaginem hanc à natura perforatam esse, quod tamen alij Anatomici silentio prætereunt.

Cum autem nulla pars sit in homine, quæ non sit ob aliquem vsum à natura facta; aliter enim superuacanea esset, & potius abscindenda, quàm optanda, teste Galeno, lib. 17. de vfu part. c. 11. Idèò exquirendum, quem vsum, quamve actionē habeat in corpore hæc castilago.

Galenus, lib. 6. de vfu part. cap. 3. & lib. 7. cap. 21. ait, hanc cartilaginem esse factam, vt sit propugnaculum oris ventriculi, & partis septi transuersi, quæ illic est, vt & cordis similiter. Quam tamen sententiam Realdus Columbus, lib. anat. c. 21. refellit, eo quod pars hæc in sinistro latere à ventriculi regione plurimò distet. Et ipse existimat hanc membranam esse progenitam, vt cordi præsit, & septum transuersum maniat. Iohannes Valuerda, lib. 1. sua anat. cap. 16. aliam habuit sententiam, hanc videlicet partem esse munimen anterioris partis iecoris, ac ventriculi. Quidam celebris ac doctissimus nostræ ætatis Anatomicus arbitrat, xyphoidem iecori tantum superstitare, & à ventriculi orificio superiore longissimè distare. Vetus alius scribit, hanc cartilaginem subditarum illi partium esse propugnaculum, quæ verò partes ei subiciantur, non explicat. Videre tamen se non posse scribit, cur cartilago hæc à loco suo dimoueri, ac situm mutare non possit. Nam quamuis dura sit, alijs partibus collata, est tamen mollis præ ossibus, ita vt flecti, ac sedem suam valeat mutare, quamuis non sine aliquo labore, vt animaduertit Columbus: Et sicut epiglottis, quæ tota est cartilaginea; curuatur & inflectitur cum esculenta ac potulenta deglutiuntur, & illis cedit in ventriculum demissis: ita huic parti, eam sit eiusdem naturæ ac substantiæ non repugnat, vt ipsa quoque possit flecti, ac deprimi. Imò fuit sententia Nicoli, in ferm. 7. & Piccolomini, hanc cartilaginem à summo rerum omnium opifice in humano corpore factam esse, non solum ad

corporis viuentis. Si priori modo consideretur, hi viri peritissimi vera farentur: Si secundo faciliè hallucinari poterunt. Nam cum partes vita & motu priuatæ concidant, & contrahantur, & illæ præcipuè, quæ in viuente turgere solent, idque eueniat potissimum in hominum cadaveribus, qui vel ex longo morbo extincti sunt, vel post mille tormenta & ærumnas in carceribus toleratas morte violenta perimuntur, ibi non est mirum, si eorum ventriculorum Anatomis videantur valde distare à mucronatæ cartilagine: qui tamen cum in sanis ac viuentibus crassi sint, & cibo ut plurimum repleti turgcant, superius elati adherent, vel propinqui sunt mucronatæ cartilagini. Quare fuit rectè scriptum à præclarissimis illis viris, hanc cartilaginem non solum ob munimen ventriculi, verum etiam ob motum illius procreatam esse, ut scilicet cederet motui ac dilatationi ventriculi ex alimentu copia turgentis. His adde illud: Quo ablato & alterum aufertur, & eo posito alterum existit, illius quidem causam esse fateri debemus: Sed est obseruatum nonnulla symptomata ventriculi, potissimum cum deprimitur ista cartilago, fieri, ac nullo remedium genere posse proligari, & restituta cartilagine quamprimum aboleri: quis ergo negare audeat, horum causam esse huius cartilaginis procidentiam? Addit porro: Neque verò ex imperitia vel auaritia aliquorum hominum statuere debemus, esse hunc morbum fictitium, & inuentum dumtaxat pro extorquendis hominum pecuniis, sed potius horum imperitiam ac auaritiam redarguere, & De v. m. omnium bonorum largi-

tori em laudare, summâque gratiarum actione prosequi, qui dignatus sit, hunc fortasse antiquum, sed cognitum morbum nobis patefacere. Ipse quidem non solum concedit, aliquando accidisse, & accidere etiâ posse, ut ex nequitia, vel imperitia aliquorum; qui violententer, vel quando opus non est, illam partem contrahant, vbi morbi non sunt, morbi fiant, & vbi sunt, augeantur, potissimumque si ab alia causa ortu habeant. Verum etiam hanc rationem ab Excellentissimo quodam viro adductam suam firmare potius opinionem existimat. Nam si hæc cartilago, cum sit sensus experta dolore allici non potest, & ea male ab istis tractata, vel ob vicinitatem iecoris, vel diaphragmatis, aut diaphragma & iecur, vel etiam os ventriculi, consensus ratione afficitur, & varia subsequantur symptomata, cum ea fieri non possint, nisi partes ex vim huic cartilagini factâ recipiant, & illi vicina sint, videre se non posse scribit, cur ab aliqua externa causa, vel interna allata huic parti læsione, ac vi panter earundem partium symptomata varia non subsequantur.

Symptomata ac signa.

Symptomata verò quæ sequuntur prolapsum huius cartilaginis, plura recitat. Primum enim vbi cibis receptus, præsertim durioris substantiæ & non admodum dentibus fractus ad os ventriculi peruenit, ob peruersiõnem cartilaginis angustius factum aliqualem dolorem parit, & ægrè ad ventriculum pertiansit, læpiusque euomi consuevit. Virtus enim expultrix percipiens læsionem cartilaginis irritata insurgit, ut noxium expellat, in quo conatu fre-

Symptomata ac signa.

Error nonnullorum.

quēter alimenti ipsum reiici, deinde laborantes pondus quoddam circa ventriculi regionem percipiunt, potissimum post assumptum cibum. Præterea cum appetentia sit oris ventriculi propria functio, ex Galeno, 2. aphor. comm. 20. & 1. de rat. viſi. in acut. comm. 18. si hæc pars à cartilagine mucronata prematur, ac ledatur, fit, vt appetitus ipse imminuatur vel ferè abolatur: & quoniam cartilago hæc reclinata aliquā etiam viū infert diaphragmati, hinc insurgit aliqua spirandi difficultas, quā ægotantes potissimum laborant, cum mouentur, vel altiora loca vt scalas & montes ascendunt. Quemadmodū etiam septum transversum à ventriculo & iecore, vt etiam liene, cum maximo tumore laborant, premi potest, & difficilem respirationem excitare, vt scriptum reliquit Galenus, lib. 2. de different. respiration. c. 10. ita etiam illo à mucronata cartilagine pressio idem symptoma oriri sine dubio potest, quamvis id non à Galeno nec alio quopiam fuerit animaduersum. Quod si cartilago hæc icetur ipsum comprimat, cum ex hac compressione & coarctatione non possit bilioſus succus ad propria loca transmitti, per vniuersum corpus diffunditur, ac regium morbum excitat: & cum sæpenumero ex nobis morbi fiant, si inappetentia, vomitus & regius morbus diu perseuerauerit, in atrophiam vel cachexiam incidunt, in illam ratione priuationis alimenti, in hæc verò causa vitiosi alimenti. Præter enarrata mala, si laborantes sursum brachia extendant, vel in lectulo supini iaceant, ingenti vel maiore dolore circa præcordia afficiuntur, in reliquis sunt anxij, ac loco

stare nesciunt, vigiliisque valde molestantur. Non est autem necessarium, vt omnia commemorata symptomata in lingulis hisce ægotantibus reperiantur, sed alia in aliis, modo intensiora, modo leuiora, pro maiori vel minori cartilaginis depressione ac læsione illata.

Prognostica.

Cartilago mucronata, sicut & ceteræ cartilagines, si præscindatur, non recrudescit: & si rumpatur nunquam reparatur vel solidescit, auctore Aristotele, lib. 3. hystor. animal. cap. 8. & lib. 2. de partib. animalium cap. 19.

Mulieribus consueuerunt magis hoc morbo laborare, quàm viri; cum in iis in mucronata cartilago sit minus dura, habitūque sint humidior, & excrementis potissimum frigidis abundant.

Hæc cartilago depressa à principio facili negotio ad propriam sedem restituitur: Sin autem depressio negligatur, ac diu perseueret ratione duritiei partis maxima cum difficultate ad situm reduci potest.

Curatio.

Idè operæ pretium est, quamprimum operam dare, vt ad naturalem situm extollatur, quod pluribus rationibus effici poterit. Nam si adesset in corpore humorum abundantia, vel humores ad partem affectam fluere, antequam manus intro adhibeantur, plenitudo auferri vel saltem imminui, & fluxio aliò defecti ac inhiberi debet. Igitur peritus artifex ventrem fascia sursum versus deuinciat, & ab utroque hypochondrio subtus costas inchoando partes illas manibus comprimat, vt impulsu turgentium partium cartilago depressa ad locum

Prognosis
sua.

Curatio.

Varij cartilaginem reponendi modi.

1.

proprium redeat, à qua tamen curatione abstinendum in mulieribus gravidis. Nam sine manifesto abortus discrimine minime adhiberi potest, ut contigit annis elapsis uxori cuiusdam Equisonis prægnanti, quæ cum febre tertiana invadente cum quibusdam ventriculi perturbationibus afficeretur, à quodam pro restituenda cartilagine ad locum suum post habita omni scetus custodia, supra ventrem arctissimè vincta altero die partum abegit, & sequenti nocte ipsa obiit: & ipse accersitus, ut opem huic mulieri ad interitum properanti afferret, audiens ex viri huius audacia & inscitia scutum mortuum excussum esse, & videns miseriam illam feminam iam interemptam esse, non potuit non maxima animi sui molestia hanc dementissimam temeritatem detestari, & simul cogitare & perquirere, an verum esset, cartilaginem hanc præter naturam deorsum prolabi posse, & si procidat, quæ symptomata ac mala excitare posset, & tandem, quænam esset germana ac cura huius procidentia: cura, quam pluribus modis fieri posse postea cognovit, quorum unus iam explicatus.

Cui succedit alter, quem ægrotus ipse propria industria allequi poterit, si videlicet rem aliquam gravem ac ponderosam, quantum ferre valet manibus strenuè capiat, tantumque extollat, ut à terra magis distet, quam capitis ipsius summitas, & sic eam sublinem summa vi tenens se hinc inde aliquantisper, modo ad dextram, modo ad sinistram vertat.

Cum tamen non omnes, & potissimum mulieres, ob viridum imbecillitatem id efficere possint, succe-

dat tertia ratio curandi, & est, ut artifices manibus cartilaginem lapsam leniter contrectando elevent, & ad naturalem sedem reducant, ad quod præstandum inveniuntur plures mulieres peritæ, quam viri: cuius rei hanc esse causam ait excellentissimus Masius, (quem inuenit in tanto Medicorum numero, qui hanc fieri depressionem ac morbum asseruerit) quoniam mulieres celebrius ab hac ægitudine capiuntur, & ob yrecundiam & honestatem libentius mulierum, quam virorum manibus se committunt. Hinc usu evenit, ut mulieres ob magis frequentem operationem & usum peritiores, & magis idoneæ fiant.

Quod si tribus expostis modis cartilago non possit ad naturalem situm restitui, fortasse non erit sine fructu supra regionem huius partis apponere cucurbitulam superius perforatam cum levi tamen flamma. Nam cum ventosa habeat insignem vim sursum trahendi, rationi consonum est, ut hanc delapsam partem sursum eleuet, ac trahat: cum tamen aliquantisper cucurbita manserit, non ut auferatur, sed aperto foramine permittant, ut per se removeatur. Antequam verò ministri huius cartilaginis restitutionem aggrediantur, ut facilius id consequi possint, cum ea pars, ut sæpe dictum, sit duriuscula, regionem totam superioris partis ventriculi illinere solent vel butyro solo, vel butyro & oleo amygdalarum miscium, quibus aliqui parum croci adiciunt, quod faciendum ipse magis probat, cum prolapsus est factus ab aliqua causa externa, quam cum ab interna, in quo casu magis excitatione egemus, quam humecta-

nione. Si tamen id fiat, vt faciliorem aditum manui præbeat, vt videlicet cutis musculi huic cartilagini suppositi à linimento laxati manus contractioni magis cedant, id se non improbare asserit, dum modò parçè fiat. Quod si prolapsus sit antiquus, & qui spatio teinpotis callo ferè obduriit, adhibenda sunt, quæ molliant, laxent, & partem extensioni aptam efficiant, vt est fozus cam decocto malux, althææ, fœnigraeci, atque id genus aliorum, atque siue fiat spongia, siue aliquo instituto molli parum refert.

Cartilagine in propriam sedem repositâ insurgit alia indicatio ipsam firmandi & roborandi, ne amplius prolabatur, sed in sua sede constanter firmiterque consistat, quod facili negotio perficî poterit, si locus affectus aliquibus vicibus foueatur spongia aliave re simili madefacta in vino nigro parum austero, in quo malix, thus, abianthium, balau-

stia, rosæ rubræ, nuces, cupressi, & id genus alia ebullierint, & postea adinoneatur sequens Ceratum.

℞. Mastich. ʒ. ii. ladan. ʒ. i. rad. bislora. nuc. cupressi. medull. interioris tbur. ros. rubr. balsam. an. ʒ. ss. corall. rubr. ʒ. i. Misce, & cum pice nauali ac cerebinib. q. s. f. l. a. Ceratum, quod per 6. vel 8. dies parti adhzereat. Nec laudandos censet illos, qui Cerati vice albumen oui apponant, quoniam nimis refrigerat, quod in parte adeò frigida vitari debet.

Atque ista è Iohan. Baptista Cudrochio proponere libuit, quæ Lectori perpendenda & cum experientia conferenda relinquimus, atque hoc etiam considerandum damus, an non affectus, quem Germani *das Vuerberban* nominant, cuius supra de *luxat. verteb. dorsi*, mentionem fecimus, quandoque etiam ad hanc causam referri possit.





LIBRI SECVNDI
PARS TERTIA

DE

SIMPTOMATIBVS
QVÆ PVLMONIBVS
ET THORACI ACCIDVNT.

Proœmium.

IOSTQVAM præcedente parte huius li-
bri absoluimus morbos, qui pulmones &
thoracem infestare solent; restat, ut iam
symptomata, quæ iisdem accidunt, sub-
iungamus. Et quidem primò actiones le-
sas quod attinet, cum pulmones cum aspera arteria &
thorace respirationis organa sint, simulque voci & ser-
moni in homine formando inseruiant, dicendum, 1. De
respiratione lesa; quò pertinet Asthma, & Suffocatio ac
strangulatio; 2. de vocis & locutionis vitii; 3. de tussi,

item conuulsione diaphragmatis, quæ ad motus sympto-
mata pertinet; 4. de dolore lateris & pectoris qui etiam
insigne est in pectore in sensu tactus symptomata.

Qualitatis mutatae quæ in sensus incurrant, sympto-
mata hîc non dantur. In excretis verò est sputum & pu-
ris ac sanguinis, grandinis, calculorum ac vermiculorum
è pectore eiectio; de quibus ordine dicemus.

CAPVT



CAPVT PRIMVM

DE RESPIRATIONE

in genere.

Respira-
tio lesa
ingene-
re.

RESPIRATIO, Græcis ἀναρρεῖ, motus est pectoris & thoracis, quo aer attrahitur in pulmones & expellitur.

Et quidem pulmones naturali vi, ubi aeris attrahendi vel expellendarum fuliginum necessitas percipitur, dilatantur & contrahuntur: quod ut commodè præstare possint, & locum, in quo moueantur, inueniant, facultas animalis simul cum pulmone thoracem dilatat, & contrahit, pulmonisque & thoracis motus unum finem conspirant. Ideoque etiam hic motus non planè liber est, & voluntarius, sed necessarius, & necessitatibus corporis subiectus, & thoracis motus naturæ vrgenti cedit. Qui enim motus voluntarius & planè liber est, is nullum tempus, nullam mensuram præscriptam habet. Cohibitum autem spiritum ducere iterum cogimur; cum suffocatione vrgat, quam natura reformidat.

Suffoca-
tio terri
barbari.

Peculare enim quiddam fuit, quod de seruo Barbaro refert Galenus, 2. de usu muscul. cap. 6. qui cohibito sponte spiritu scriptum suffoca-

uit; cum alioquin natura superior tandem ad respirandum impellat.

Respiratio autem duobus motibus perficitur, inspirationis scilicet & expirationis. In inspiratione pulmo & pectus dilatur & aer attrahitur. In expiratione pulmo & thorax contrahitur, & aer fuliginosus expellitur. Inter hos duos motus, duæ intercedunt quietes, sicut in pulsu inter systolem & diastolen. Differentia tamen hæc quædam est pulsus & respirationem. Quia enim pulsus planè naturalis est, motus ille est continuus & non interruptus, nisi quod duæ quietes inter systolen & diastolen intercedunt: quia verò ad respirationem etiam facultas animalis concurrens, nonnihil pro arbitrio nostro hic motus regi, & interdum aliquandiu differri potest.

Differen-
tia inter
pulsus
& respira-
tionem.

Tria autem ad respirationem naturalem concurrunt. 1. Facultas mouens. 2. Organa respirationi inservientia, quæ sunt pulmones, diaphragma, thorax variis musculis instructus & agitur, trachea, quæ via est, per quam aer ingreditur & egreditur, quæ pertinent & nares, & os, & fauces, quo ipsi etiam aëri

transitum permittunt. 3. Vfus, qui est calor in corde temperatio, spirituumque generatio. Idem enim fit respiratio, ut cordis calor ventiletur, & in statu naturali conseruetur, cordisque actiones recte perficiantur.

Quibus fortasse quartum addere licet, ipsum aërem, qui inspiratur. Is enim ita dispositus sit necesse est, ut calorem cordis ventilare & refrigerare possit; si verò is sit crassus, fuliginosus, qualis est in quibusdam cauetis, aut si nimis æstuosus, ad refrigerandum ineptus est, & quandoque suffocationem inducit.

Ratione autem organorum respirationis quædam differentia est, & *climaxia* est *abscide*, cuius instrumentum est diaphragma; alia *βίαια*, quæ à musculo sit in lumbis scapulis sita, & ab iurerna intercostalium parte. Sic *αποσπαστήριον* instrumenta sunt musculi circa abdomen; *βίαια* autem externa intercostalium pars. Nervj, qui ad diaphragma pertinent, inter 4. & 5. vertebram cervicis prodeunt, qui ad intercostales musculos & thoracis vertebrae progrediuntur. Atque hæc ad naturalem inspirationem necessaria sunt, quæ si lædantur, respirationem lædi necesse est.

Est nimirum respiratio læsa pulmonis ac thoracis motus à naturali statu deflectens, propter vitium aliquod in facultate mouente, organi respirationis vsu mutato, vel etiam in agere, qui attrahitur, consistens.

Læditur autem respiratio, vel quia planè aufertur, quæ *αποσπαστήριον* dicitur, vel deprauatur, quæ *βίαια* appellatur. Platerus tamen, nec incommode, dyspnoeam omnem ad

respirationis defectum seu diminutionem refert; Depravatam autem solum respirationem appellat; quando non rectè sit respiratio, ut dum est frequens, cita, vel interrupta; quo etiam suspirium refert.

Causæ.

Respiratio læditur. 1. læsa facultate, idque sit, vel cum facultas motrix per se læditur, vel per accidens, ubi eà saluà ac spiritu animali præsentem aliunde in motu impeditur. Cum autem vis mouendi seu respirationem efficiendi & in pulmone & thorace consistat, utriusque facultatis læsio perpendenda.

Pulmonis præcipui respirationis organi motus peculiari eius vi perficitur, qua eius facultas tam diu salua esse dicitur, quamdiu eius temperies & calidum innatum saluum est. Ideoque læsa pulmonis facultas per se tantum dici potest, cum eius temperamentum viciatur, & calidum innatum deficit, id quod in phthisicis & moribundis læpè accidit. Impeditur verò facultas pulmonis motrix, licet salua sit, & ita per accidens læditur, & in operatione sua impeditur, dum spatium, in quo libetè moueatur, non habet; id quod fit in pectoris angustia quacunque de causa profecta, ut in gibbositate, emphyemate, hydrope pectoris, aut dum ab abdomine diaphragma comprimatur, & sursum pellitur.

Thoracis verò motus ab animali facultate pendet, quæ per se equidem lædi propriè dici non potest; per se tamen lædi à Medicis dicitur, cum spiritus animalis, qui ad motum animale necellarius est, deest, & cum spiritus animalis ad thoracis

Causa.

Respiratio quoque modolædatur.

musculos & diaphragma non influit. Fit autem hoc, vel quia non transmittitur, vel quia non recipitur ipsiusque influxus prohibetur. Non transmittitur, vel quia spiritus animalis deficit, ut in moribundis, & in nimis euacuationibus & aliis causis spiritum dissipantibus; vel eius influxus à cerebro non fit, ut in apoplexia & soporosis affectibus. Non verò recipitur influens spiritus animalis propter vitium nervorum spiritum animale ad musculos thoracis & diaphragma deferentium. Et si verò etiam ex sexta & septima coniugatione thorax nervos accipiat: tamen quia septum transversum, cuius motus ad medioerem respirationem sufficit, nervos etiam à dorsali medulla insignes utrinque accipit, raro respiratio sola & seorsim, citra aliarum actionum lationem, nervorum sextæ & septimæ coniugationis vitio læditur, sed dorsali medulla & coniugationibus dictis simul læsis, quod non nisi circa exitum in cerebro fieri potest, ut in apoplexia, respiratio læditur. Nervus autem maiores à dorsali medulla progressi, si seorsim afficiantur, id quod in catarrhis et decumbentibus ut & intemperie frigida, vulneribus, tumoribus fit, respiratio deorsum læditur. Quo etiam referri potest spinalis medullæ ob luxationem vulnera, vel alias causas, vitium.

Per accidens verò læditur facultas & motus thoracis, in primis eius dilatatio, dum facultate integra, & spiritibus præstantibus motus impeditur, vel ob dolorem lateris & diaphragmatis, colli, abdominis, intestinorum, hepatis, ventriculi, aut harum partium vulnera, aut dum ob aquam vel pus, vel sangui-

nem in cavitate thoracis contentum is liberè moveri non potest, & diaphragma comprimitur, ut liberè distendi nequeat; ab hepate vel liene tumente, aut flatibus & vaporibus in intestinis contentis. Vapores etiam vel flatus in abdomine collecti, & circa diaphragma subsistentes illius liberum motum impediunt, & nunc respirationem difficilem, nunc suffocationis metum inducunt, quibus sæpe & cerebri ac cordis alia mala accedunt, ob insignem cum cerebro, & corde diaphragmatis consensum, præsertim si materię magna sit copia. Vapores autem hi à venis melaëricis & hypochondriis, ventriculo, intestinis, interdum & vtero attolli solent. Viscera quoque in abdomine circa septum transversum appensa, si obstruantur valde, vel intumescent, pondere suo diaphragma infra trahendo illud liberè moveri non permittunt, id quod fit in hepatis obstructionibus & tumoribus, quæ difficilis respiratio sæpe diu hydropem præcedere solet. Venterculus quoque cibo repletus eodem modo difficilem respirationem efficere solet; quod & ab ingestorum ciborum qualitate interdum evenit. Quod & in gravidis accidit ab vtero, qui distensus diaphragma comprimit, & difficilem respirationem reddit.

II. Ratione organorum læditur respiratio, dum aliquod in iis est vitium. Organa autem respirationis alia ad motum faciunt, ut pulmo, diaphragma, musculi, thoracis & abdominis, alia aëri ingressum permittunt, ut nares, os, & fauces, larynx, aspera arteria; cuiusque rami per pulmonem dispersi, quique ad pulmonis substantiâ pertinet,

Pulmonis ergo vicio respiratio impeditur, dum pulmonis asperæ arteriæ angustiores, quàm par est, fiunt, nec satis dilatari possunt, dum scilicet obstruuntur à catarrhis eò defluentibus, quasi confertim & *aspirant* ruunt. Suffocativi nominantur, & picuifoso humore in iis collecto, à sanguine in eo effuso, vt & pure, vel in pulmone collecto, vel aliundo effuso, grandinibus item, calculis & vermiculis aut comprimuntur à picuifia in læuibus arteriis & pulmonis substantia, vel tuberculis, vel aqua in pulmone collecta. Connexus etiam pulmonis cum concauo thoracis strictior pulmonis motum liberum impedit, respirationemq; difficilem reddit, quod nonnullis à primo ortu, aliis post casum aut pleuritidem accidit. Si enim pulmo à prima origine sit maior, quàm par est; aliquod respirationi impedimentum affert. Faciunt etià huc pulmonis vulnera & vlcera.

Diaphragmatis verò & muscolum respiratori inſeruientium vicio fit respiratio læſa, dum diaphragma vel inflammatur, vel vulneratur, aut dum catarrhus qui in musculos intercoſtales lapſus eſt ad diaphragma uſque etiam penetrat, aut dum musculi contunduntur, inflammantur, vulnerantur, vel exulcerantur, vt & musculi abdominis, respiratori inſeruientes, aut ſi catarrhus in eoſdem musculos decumbat.

Pertinet huc & coſtatum & vertebrarum viciũ, dum vel franguntur, vel luxantur, ac thoracis motui obſtunt.

Tandem inter thoracis vitia eſt hoc, ſi cartilagineſ thoracis, quæ ad motum faciliorem edendum pectus circumſeruntur conſtituunt, in

oſſeam ſubſtantiam indurantur. Nam & tunc thorax ſatis dilatari nequit.

Partium autem per quas ær tranſire debet, vicio putà narium, oris & faucium vt & tracheæ anguſtia, difficiliſ respiratio, imò ſuffocatio interdum induci poteſt. Quod ſi ſi nares vel à picuifia, vel à tumore aliquo obſtruantur & obſcurentur, ſi tumor aliquis ſit in musculis faucium, laryngis, in tonſillis, vel columella delapſa ſit, vel ſi vertebræ ceruicis luxatæ viam hanc intercludant. In primis verò ſi aſpera arteria, & præcipuè eius caput ſeu laryngis rimula, vel obſtruatur, vel aſtringatur & coarctetur, vel à quacunque cauſa anguſtior reddatur. Quò pertinent & aſperæ arteriæ vulnera.

III. Ob uſum respirationis ſeu ſinem mutatum, atque ita cordis vitio respiratio lædiſ. Si enim ille non vrget, nulla aut quàm exigua ſit respiratio; & quàm diu motus cordis ceſſat, tam diu etiam ceſſat respiratio; quod ſit in ſyncope & ſuffocatione vetricina. Si verò uſus vrget, respiratio ſit magna vel frequet & celer, id quod in febris ardentibus accidit, & plurimæ respirationis læſæ differentie ab uſu & ſine mutato proueniunt.

IV. Tandem etiam ætis, quem ſpirando attrahimus, vicio, respiratio lædi poteſt. Si enim is craſſus, caliginofus, & fuliginofus ſit, qualis eſt in quibuſdam cauernis, qualemque faciunt funi, qui à carbonibus accenſis exhalant, vt & vapores à muſto & cereuiſia ſeruenta, ſui non ſatis ſit, adeò vt etiam à tali ære nonnullos ſuffocatos fuiſſe, compertum ſit. Ita in Cypro è venis calcanthi fumus atrollicur, qui homi-

Respira-
tionis læ-
sæ.
Causa. 1.

nem suffocat, teste Galieno, 9. de
simpl. med. facul. iii. de caltanib.

Has causas omnes vt in numerum
redigamus, sit respiratio lesa.

1. Ab insigni intemperie & pul-
monis corruptione.

2. A pectoris angustia, quacumq;
de causa profecta ob quam pulmo
& diaphragma liberè moueri & di-
latari non potest.

3. Ob defectum Spiritus anima-
lis, in moribundis, in apoplexia, &
frigidis affectibus.

4. Ob neruorum insignium ad
thoracis musculos & diaphragma
tendentium læsionem quamcunque
spiritus animalis influxum prohibe-
re potest.

5. Ob dolorem in musculis tho-
racis & aliis partibus vicinis, que
respirationi quocunque modo inter-
uiont.

6. A diaphragmatis motu impe-
dito, ab aqua, pure, vel sang. in tho-
racis cavitare contento, vel à vapo-
ribus & flatibus ab inferioribus as-
cendentibus, & circa diaphragma
subsistentibus, seu viscerum in ab-
domine obstructione, distensione &
tumore.

7. Pulmonis vitio, dum scilicet
eius arteriæ vel obstruunt quacumq;
de causa, vel comprimuntur, aut
dum pulmo pectori agglutinetur
aut vulneratur.

8. Diaphragmatis vitio, dum il-
lud vulneratur, inflammatur, vel
dum catarrhus in id decumbit.

9. Musculorum thoracem mo-
uentium vitio, dum illi contunden-
tur, inflammantur, exulcerantur,
aut dum catarrhus in eos decubuit.

10. A costarum & vertebrarum
dorsiluxatione & fractura, vt & car-
tilaginum pectoris induratione

11. A musculotum abdominis mor-
bis, ob quos liberè moueri non pos-
sunt.

12. A narium, oris, faucium
angustia.

13. A laryngis & asperæ arteriæ
obstructione, compressione, vulne-
ribus.

14. Ab vsu mutato, qui varius
est.

15. Aëris, quem inspiramus, vitio
si is calori refrigerando & ventilan-
do non sit idoneus.

Atque tot quidem respirationis
læsæ causæ. Verumenimverò plu-
rimæ à morbis, quos iam explicauim-
us, vt & apoplexia, febribus, &
similibus dependent, atque ita de
respirationis læsæ curatione vno, in
loco tractari non potest: Ideoque al-
ios Medicos secuti, hic saltem de ea
respirationis læsæ curatione dicemus,
quæ vulgò Asthma, vel orthopnoea
dicitur, deinde de suffocatione, &
strangulatione, quæ peculiare res-
pirationis læsæ differentie sunt.

CAPVT II.

De Asthmate & Orthopnoea.

Asthma; Latius Anhelatio, Asthma.
etsi interdum in genere & am-
plo vocis significato pro quacunque
respiratione difficili & anhelosa qua-
cunque de causa profecta, sine cum
febre, vel sine febre accipitur: Stri-
ctâ tamen vocis significatione Hip-
pocrati est «*ἀσθμα*», hoc est, frequens,
seu densa & difficilis respiratio sine
febri, qualis est eorum, qui ex cursu
& celeri exercitatione subsistunt, &
quidem cum senio, vt Celsus addit,
à spiritu humorem in pulmone con-

sono, vt Celsus addit, à spiritu humorem in pulmone contentum dissolvente. Quando verò malum eò vsque creuit, vt æger erecto corpore propter suffocationis metum respirare cogatur, *ipthia* appellatur. Imò vt Galenus, 6. aphor. 46. scribit, qui Hippocratem ætate secuti sunt, affectionem quandam diurnam nonnulli asthma simpliciter nonnulli quoque *ipthia* nominant, cum sine febre æger continenter difficilem habet respirationem.

Vnde etiam Asthma definitur læsa respiratio, eaque densa & frequens ferè, vt æger sine anhelatione respirare nequeat, sine febre plerumque ab angustia bronchiorum pulmonis proveniens. Quando malum (differt enim asthma & orthopnea saltem magnitudine) ita incrementum sumpsit, vt æger non nisi erecta ceruice spirare possit, orthopnea nominatur.

Locus affectus est pulmo, & quidem secundum bronchia, id est, apertæ arteriæ cartilaginosa propagines per pulmones dispersas, quæ spiritus via sunt. Quanquam enim thorax & pulmo etiam suo modo satis dilatentur: tamen propter harum vtriusque angustiam satis aeris inspirando attrahi non potest, vnde, vt quod magnitudini & sufficientiæ deest, compensetur frequentia & velocitate, frequens ac velox spiratio oritur.

Causa.

Causæ.

Esti verò, vt dictum, respirationis difficilis plurimæ causæ sint: Asthmatis tamen in specie dicti duas tantum ponit causas Galenus, humores scilicet crassos ac pituitosos, & crudum tuberculum, quibus ta-

men adhuc vna, atque altera addi potest.

Est nimirum proxima asthmatis causa, angustia bronchiorum pulmonis, seu vsus atctus propter angustiam bronchiorum pulmonis. Angustia autem illa oritur, non à quacunque causa, cum, vt dictum, asthma sit respiratio difficilis non quævis, sed anhelosa & diurna ac curatu difficilis sine febris, ab obstructione, vel compressione pertinaci. Vtrumque enim, obstructionem & compressionem scilicet, efficiunt primò humores sæpè crassi & viscosi, nonnunquam & tenues ac serosi, sed copiosi, deinde crudum tuberculum, vel grando & calculi in pulmonibus hærentes. Quibus nonnulli & flatum crassum addunt. Hæc enim siue intus bronchia pulmonum obstruant, siue in substantia pulmonis, venis eius & læuibus arteriis hærentes ea comprimant, angustiam efficiunt, & ita respirationi obsunt, vt postea, *quest. 1.* dicitur,

Materia autem bronchia pulmonum seu obstruens, seu comprimens, nunc in pulmonibus sensum colligitur, ob debilitatem & cachexiam illius visceris, vt docet Auicennas, 3. can. sen 14. tract. 4. cap. 3. & bronchia obstruit, quæ interdum etiam in calculum & grandinam induratur: nunc verò aliunde affluit. Fit hoc interdum à capite, cum catarrhi à capite lapsi in pulmonibus subsistant, id quod vulgò frequentissimè fieri putatur. Verùm

ego id rarius accidere puto, vt postea, *quest. 2.* dicitur, & frequentissimam asthmatis causam esse puto materię per venam arteriosam in pulmones effusionem, dum scilicet circa hepar in venoso genere crudi

Frequentissimæ asthmatis causæ.

humores colliguntur, & per venam arteriosam in pulmones effunduntur & bronchia pulmonis comprimentes respirationis difficilis & asthmatis propriè dicti, mali scilicet diuturni & contumacis illius causa sunt. Etsi enim in hydropicis humor serosus ad thoracem penetrans respirationem difficilem efficere possit: tamen ea respiratio difficilis propriè asthma non est, sed ab hydropse, morbo primario, dependet. Er quidem ille humor, qui è venis per venam arteriosam in pulmones confluit, non semper crassus est, sed sæpè tenuis & serosus, qui in venis & arteriis collectus nunc motu corporis, nunc irâ, sæpè verò ad aëris & tempestatis mutationes, agitatus in pulmones irruit, unde paroxysmus sæpè secundum Lunæ morum & quarto ferè die exacerbatur. Non impossibile tamen videtur, ut humor etiam talis (cum arteriæ multo sero abundant) per arteriam venosam in pulmones infundatur. Eodem modo à crudo tuberculo oriri potest asthma, non solum in asperis arteriis consistente, sed & extra eas constituto, easque comprimente. Et quidem si caudum tale tuberculum constituit solum in aspera arteria, vel circa eam, tantum asthma parit; sin etiam circa læves, cor in consensum trahitur, & pulsus inæqualis efficitur, id quod in Antipatro factum refert Galenus, 4. de loc. affect. cap. ult. Sin utraque pulmonis arterias obideat, & asthma, & inæqualitas pulsus inducitur.

Possunt quidem & alij tumores qui suppurantur, respirationem difficilem efficere, ut non solum Galenus, 4. de loc. affect. c. 8. & Aënius, *trab.* 2. *serm.* 4. cap. 37. do-

cet, sed & res ipsa loquitur; cum etiam bronchia pulmonis comprimantur: tamen si strictè vocabulum asthmatis accipimus, ea læsa respiratio asthma non est, sed cocto ac rupto abscessu ac pure per sputum reiecto cessat; asthma verò propriè dictum, saltem ab humore crasso & crudo tuberculo oriri docet Galenus.

Hiscæ causis nonnulli addunt etiam vapores ex vtero ascendentes & status crassos. Verum etsi negandum non sit, ab hisce causis interdum respirationem planè difficilem fieri: tamen quia illa subito invadit, & citò cessat, asthma propriè dictum non constituit. Ille status potius ad asthma pertinet, qui se materię asthmatis causæ iungit, paroxysmique author est; cum scilicet humor crassus à motu nimio vel alia causa in statum resolvitur.

Quod autem statui tribuitur, sæpius rectius humori seroso, ut modo dictum, tribuendum esset, cum is in ramis venæ causæ maioribus quacumque de causa feruens & motus *adipis* & confertim per dextrum ventriculum cordis in pulmones irruit, & asperas arterias comprimit; quæ non infrequens paroxysmi asthmatici causa est, ob quam æger difficili respiratione, sæpè nulla causa manifesta præcedente, sed imminente aëris aliqua mutatione & tempestate corripitur.

Affinis etiam est asthma illa difficilis respiratio, quæ à siccitate nimia pulmonis provenit, ob quam pulmones satis dilatari ad ætrem hauriendum non possunt; quam siccitatem in primis metallici vapores inducunt, & propterea iis, qui metalla & mineralia tractant, familiaris

est. Ita refert Heurnius, *de morb. cap. 4.* typographo cuidam adeò siccatos fuisse pulmones, ut aridum pomona reculerint.

Differentia.

Differen-
tia.

Asthma aliud est recens, aliud inveteratum, aliud est periodicum, quod per intervalla redit, ubi scilicet materia interiecto quodam temporis intervallo vel confluit *aspire*, id quod potissimum per venas fieri puto, vel paulatim antea in pulmonibus collecta moveri & agirari incipit. Hinc fit, ut præter causas proximas antea enumeratas, etiam remotiores cognoscendæ sint, ut videntur. Tales sunt cibi staculenti, aër crassus aëris caliditas aut frigiditas nimia, corporis & animi motus nimius.

Deinde asthma aliud est gravius, aliud mitius. Si enim æger quidem difficulter respiret & anhelosus sit, simpliciter asthma appellatur. Si verò ita incrementum sumat difficultis respiratio, ut æger non nisi erecta ceruice respirare possit, orthopnoea nominatur, ut antea etiam dictum.

Tertiò asthma aliquando est etiam hereditaria, habentque nonnulli congenitam ad asthma propensionem, quæ sita est in pulmonum laxitate quadam & debilitate ad recipiendum affluentes aliunde humores, vel etiam eos cumulandos apta.

Signa diagnostica.

Signa.

Imminentis asthmatis signa ita tradit Aretæus, *lib. 2. de sign. & caus. morb. diuturnar. c. 11.* Morbi incipientis, seu impendentis notæ sunt huiusmodi: gravitas pectoris, tarditas ad solidum opus, & aliud quod habet agendum, in cursu, & in accliv-

ui itinere difficilis & ægra spiratio, raucescunt & ruscunt, status in præcordiis atque eruptiones præter rationem excitantur, vigilant, noctu parum, & obscure incallescunt, nares acutæ ad spirationem paratas habent.

Malum autem præsens facile signis suis pathognomicis cognoscitur. Ægri nimirum plerumque sine febris, de qua postea, *q. 3.* dicitur, & alia emidente causâ, quæ respiracionem difficilem inducere potest, frequenter, ut ii, qui casu velociore, aut motu aliq. vehementi sunt defatigati, & si malum sic vehemens, etiam credâ ceruice respirare coguntur. Et sic hæc respiratio læsa quandoque cum stertore, & sonitu, quandoque sine eo, idè quod materia quandoque hæret in bronchiis & asperis arteriis, quæ cum spiritu disploditur, sonitus excitatur, aliquandoque extra asperas arterias. Scribit tamen Iohannes Zechius, *consultat. 18.* hoc quidem ut plurimum fieri, se sæpe in quàm plurimis observasse, respiracionem accessionis præsertim tempore, raram & admodum tardam, longèque difficultiorem inspirationem expirationem ipsâ esse. Atque ipse causam huius rei hanc reddit, quod cum duo sint respiracioni inferuentium instrumentorum genera, quorum alia aërem suscipiunt, ut arteria cum pulmone, alia movent. ut ipse etiam pulmo cum thoracis musculis: si accidat, ut non solum bronchia pulmonum, sed & ipsa pulmonis substantia, cum suis venis & leuib. arteriis, afficiatur, facultas quæ thoracem mouendi languida sit, accidere, ut nec pulmones

pulmones humore grauati, nec thorax facile moueri, & distendi possit. Quapropter tunc natura non sine labore & conatu maximo ac longiore temporis interuallo inspirationem moliri potest, unde etiam partes pectoris superne mouentur, quam inspirationem sublimem Hippocrates appellare solet, in qua obseunda, ut vires deiectas interposita quiesce aliqua natura non nihil reparare possit, inspirationem alteram non admodum maturat, & accelerat; & ipsa exspiratio expeditior est inspiratione, quoniam humius operis instrumenta sine multo labore mouentur, & ferè sponte sua concidunt. Idem tamen, *consultat.* 53. addit, respirationem hanc simul magnam esse. Cum enim rara respiratio vsui non satisfaciat, ab urgente postea necessitate coacta natura magnam pro viribus respirationem efficit; ita ut non solum septum transversum cum musculis intercostalibus manifestè moueantur, sed etiam musculi superiores omnes, ita ut sublimis fiat appellata respiratio.

Quomodo autem asthma à difficili respiratione, à virium imbecillitate, & calore magno in corde discernenda sit, docet Galenus. 4. de loc. affect. caput. 7. Subiciamus, inquit, aliquem omnes simul mouere musculos, ut pectus una cum scapulis manifestè subleuetur. In hoc opere ex tribus vnum aliquod conuicere necesse est, aut virium imbecillitatem, aut viarum spirituum angustiam, aut vehementem in corde, & pulmone calorem. Quamuis inter, dum due, ac nonnunquam (licet raro) tres quoque ex iam dictis causis concurrere possint. Igitur ubi vires parua aut fuerint infirma, ad tria mo-

uentium musculorum genera veniunt, easque omnes ad motionem excitare solent: uno genere vehementer pectus mouere nequeunt, & propterea non solum diaphragma, sed vniuersi thoracis musculi mouentur: motum tamen & sensum efficiunt, & propterea neque frequens omnino, neque raro omnino eorum actio existit. At preterea thoracis dilatacio haudquaquam magna erit, nullaque ex ore fiet exsufflatio & spiritus ex solis naribus emitte solent. Quod si per inspirationem narium pinna manifestè trahi videantur, id prostrati roboris efficax indicium erit. Ancto vero in corde & pulmone calore, omnibus quidem thoracis musculus peragitur quoque respiratio, sed magna, velox, frequens, vehemensque percipitur, & praeterea calidus exsufflando spiritus emittitur. Tandem qui ob viarum spirituum angustiam difficultè anbelat, neque respirat, totam quidem thoracem magna ex parte & celeriter & frequenter dilatare, sed neque exsufflare, neque calidum spiritum emittere consueverunt. Id enim acuti caloris est indicium.

Cum verò angustia ista bronchiorum pulmonis, quae proxima est asthmatis causa, à pluribus, ut dictum causis, prouenire possit, & ex discernendae sunt. Ut verò de causis, quae respirationem difficilem in genere excitare valent, nihil dicamus, ut de pure vel sanguine in spiritus vias illapsis, & aliis quae ex suis locis patent, si à crassis humoribus fiat asthma, & iis quidem in pulmone collectis, sensim difficultè respirare incipit aeger, èstque difficultas spirandi continua. Si verò aliunde affluat materia, respiratio difficilis eodem modo continua non est, sed per interualla infestat vel exacerbat. Essentia asthmae, quod ob ma-

Signa causarum.

tenam in pulmone collectam excitatur, obicam, aërem austinum & similes causas exacerbari etiam possunt: tamen in asthma, quod fit à materia aliunde affluente, exacerbatio illa longè manifestior est.

Exacerbatum autem hoc malum magis tempore autumnali, & hyberno & noctu. Cum enim, ut Galenus, 6. epid. sect. 1. text. 15. docet, dies toti anno proportionem respondent, ut matutino tempori ver sit simile; meridiei ætas, vespere autumnus, nocti hyems; pituita verò noctu moveri soleat: non etiam est mirum, asthma, quod est morbus pituitosus, noctu magis exacerbari. Siue enim humor aliunde affluat ad pulmonem, noctu is magis moveri solet, siue in pulmonibus congestus contineatur, nihilominus ibi agitur, & proprias qualitates intendens, vel ad maius spatium sese extendit, vel vapores de se emittit, & omnino evidèntia sui exhibet indicia. Et quidem si materia à cerebro delapsa sit, catarchi signa adsunt: quod si catarchus absit, per venas materiam affluere indicio est, hepatisque affecti signum tandem exhibet tumor pedum, & cachexia. Ac si humor ille crassus obstructiorem efficiat in bronchiis pulmonis, difficilis est respiratio cum sonitu & tussi, malum quandoque etiam cessat, vel remittit pituita excreat; Si verò pituita & humor in venis & pulmone hæreat, abest sonitus & tussis; & raro aliquid excernitur, ac malum pertinacius, & diutius hominem exercet.

Quod si à crudo tuberculo sit Asthma, æger ab initio, dum bene adhuc habere videtur, paulatim incipit difficulter spirare, accrescitque

deinceps quotidie anhelatio circa stertorem ac strepitum. Quod si huiusmodi tuberculum temporis diuturnitate calefactum, & tadem quandam coctionem recipiens in abscessum mutetur, febris accedit, deinde rupto tuberculo pus, vel puri simile quid excreatur, ac pure evacuato, fit respiratio leuior.

Grandinis, & calculorum signa antea sunt proposita.

Si à siccitate pulmonis proveniat asthma, præcesserunt causæ, quæ talem siccitatem inducere potuerunt, sputum deficit, & macies totius corporis adest.

Prognostica.

1. Asthma etiam si morbus diuturnus, tamen paroxysmos habet acutos, ob loci affecti nobilitatem quæ organum respirationis est, quo graviter affecto homo diu vivere nequit, compertumque est, nonnullos in platea ambulantes, hoc malo subito extinctos fuisse.

2. Iuvenes hoc malo difficulter liberantur, senes verò nunquam, sed eos asthma sæpe comitatur usque ad mortem, 2. apb. 40. Infantes autem suffocat, nisi maturis auxiliis sistatur & avertatur.

3. Asthma hæreditarium via vnam curatur.

4. Qui gibbosi ex asthma aut tussi sunt ante pubertatem, ij statim moriuntur, 6. apb. 46. Galenus in comment. causam refert in angustiam pectoris & tubercula spinæ intus adnata, quæ si cruda & cocta difficilia sunt, hominem asthmaticum diu vivere non sinunt. Sin humida, quæ tandem suppurantur, tussi aliquando veratos citò tandem suffocant & interimunt. Et quavis aliàs calor circa pubertatem in-

crementum sumens multos morbos curare solet: tamen calor hic gibbositatem tollere non potest: & quia adhuc pulmones incrementum sumere solent; spina verò in gibbis amplius non crescit, atque ita pulmmoni crescenti in angusto pectore satis loci non datur, is non satis ventilari potest, calorémque natium suffocari necesse est.

5. Periculosum valde est asthma in febris acuta. Nam materia & causa asthmatis à calore febrili valde exsiccatur, & ad eiciendum ineptior redditur. Multà quoque inspiratione in febre ob calorem vehementem opus est, quæ ob angustiam pectoris, quæ est in asthma fieri nequit. Materia præterea calorem febrili agitata asthma gravius reddit, & simul ob eam febris invalescit.

6. Asthma laborantibus cum tussi, si tussis cessat, difficultate respirationis aut perseverante, aut incremente, periculosum est. Contumacia enim materię, & virtutis expultricis debilitatem significat.

7. Ad asthma inueteratam si nova repente accesserit influxio, quæ pulmones obruat, ut in catarrho suffocatio fit, lethale est.

8. Asthmatici ij maximè periclitantur, qui vicibus sunt infirmi. Citò enim suffocantur, & in syncope incidunt; cum autem pulsus inæqualis admodum redditur; agrù mortis vicinum esse indicio est, & multò magis, si intermittat.

9. Postquam etiam asthmatici difficulter respirant, ut omnes musculi intercostales superiores scapularum, & ipsæ scapulæ attollantur, periculosum asthma est. Vinum enim imbecillitas, calor vehemens &

angustia partium respirationi inferuentium adest. Ne tamen in præfugione expulsi & respiratione medicus decipiatur, videndum. Si pilsimè enim, qui bonum pulsum habere videntur, subito moriuntur & suffocantur: & contrà, qui pulsum prævum habent, auxilio aliquo adhibito, aut flatu, vel seroso humore discusso, subito restituntur. Ideoque ad causam morbi, eius magnitudinem, aliàsque functiones attendere decet, non ad solam respirationem, & pulsum respicere.

10. Asthma nonnunquam in peripneumoniam mutatur, idque febre superueniente cognoscitur, nonnunquam in hydropem & cachexiam degenerat.

Indicationes.

Materia, quæ angustię bronchiorum causa est, tollenda; quod fit euacuando eam: idque ut commodius fieri possit, eius crassities, si adsit, attenuanda, visciditas detergenda. Partes etiã materiam in pectus mittentes euacuandæ & roborandæ, & materia ad pectus ruens ab eo auertenda. Elatus si coniungantur, discutiendi: crudum tuberculum attenuantibus & exsiccantibus absumendum, pulmonis siccitas humectantibus emendanda.

Quæ tempore paroxysmi faciendæ?

Et quidem tempore accessionis omnis dauda opera, ut æger à præfenti periculo liberetur, nec suffocari permittatur. Hoc enim maximè urget, & propterea ad hoc maximè respiciendū. Cum verò paroxysmus è tribus causis oriri possit, nimirum vel ex cōmota materia, quæ in pulmone quiescebat, vel ex nova in pulmones affluxione, quam & flatu, & vapor aliunde transmissus,

Indicationes:

Quid tempore paroxysmi faciendum?

tertio augere potest: materiam verò moueat corporis atque animi motus nimius, mora sub radiis Solaribus, ad ignem; suppeditet autem & augeat ebrietas & crapula, vsus ciborum crassorum & flaculëtorum. Initio perpendendum est, à qua causa paroxysmus ortum habeat. Nam si à causa ortum habeat, quæ præsentem antea materiam agitare soleat, non ita opus est frictionibus, ligaturis, cucurbitulis & aliis reuulsionibus, sed quiete potius, & iis, quæ materiam motam discutere possint. Si verò aliunde materia ad thoracem affluat, seu ex toto, seu ex aliqua parte, omni studio laborandum, vt materia à pectore auerti & distrahi possit. Ergo tum æger corpore erecto, vt spiritui via & dilatato pulmoni spatium maius detur, nullo modo supinus, ne confidente ad dorsum thorace angustia augeatur, collocetur pectore nudo, aut certè leuibus saltem vestibus tecto, non verò onerato aut coarctato, in aëre temperato, & ad frigidum declinante collocetur, & inutilem adstantium importuna turba arceatur. Hinc magnæ frictiones, vt & ligaturæ, in partibus inferioribus instituuntur, quæ humores ad superiora ruentes reuellunt, eos verò, qui in pectore sunt, non agitant. Si verò pectus & dorsum etiam fricare libeat, fiat id sanè leniter, vt meatibus saltem dilatatis facilius fiat transpiratio, quæ respirationis defectum aliquo modo compensare possit. Suppositoria quoque hic indantur.

Clysteres.

Clysteres verò non admittit Ludovicus Septalius, cum viribus prostratis, & suffocationis periculo incumbente commodè iuici non possint.

Sint. Sed tamen vires non semper ita prostratæ sunt; vt clysterem non admittant, qui à pectore satis commodè reuellit.

Si sanguis in corpore abundet, *Vena se.* & virtus valida sit, vena basilica secutio. & virtus valida sit, vena basilica secutio. & tantum sanguinis detrahatur, quantum vires & morbus ferunt. Si verò menses, vel hæmorrhoides substerint, saphena aperienda. Possunt & cucurbitolæ, cum & sine scarificatione scapulis & cruribus applicari, reuulsionis & auersionis gratia.

Si humor sit crassus, equidem *Purgantia.* non satis commodè purgantia exhibentur. Verum si humor sit tenuior & mobilis, ad periculum suffocationis vitandum satis commodè purgantia exhibentur, de quo *quæst. 4.* dicitur.

Ad materiam verò discutendam *Topica discutientia.* pectori applicanda Topica laxantia, discutientia, ex oleo amygdalarum dulcium, chamæmelino, liliorum alborum, irino, pinguedine gallinæ & similibus. Vt:

℞. Pulv. rad. albae, iridis, an. ʒ. j. β. farin. sem. lini, fenugrac. an. ʒ. ij. ol. amygd. dulc. irini, chamamel. an. ʒ. β. pinguedin. gallinar. ʒ. β. ammoniaci vino dissoluti ʒ. β. cera q. s. F. Linimentum.

Vel ℞. Mucilag. sem. lini fenug. cydonior. cum aqua scabiosa vel trisul. extrah. an. ʒ. vi. pulv. rad. ireos, hyssopi, an. ʒ. β. oraci, ʒ. j. ol. lilior. alborum, amygdalarum dulcium, amararum, an. ʒ. j. β. Cum cera F. Linimentum.

Si tamen flatus coniungantur, cauendum, ne subito & confertim calefacientia medicamenta extra adhibeantur. Si enim flatus à materia foueantur, metuendum est, ne his

calidis medicamentis ea attenuetur & fundatur, flatulque augeantur, atque ita respiratio difficilior reddatur.

Lenientia
& attenuantia.

Exhibeantur medicamenta inter-
na lenientia, attenuantia, detergen-
tia & expectorantia, qualia sunt,
*amygdal. dulc. & amara, ficus, pas-
sule, scabios. capill. Ven. marrubium,
hyssopus, radix aristoloch. ratunda,
ircos, ari, Helenij, gentiana, scilla,
sperma ceti, crocus, mosch. ammon.
sulphur, benzoë. & medicamenta ex
his parata, vt.*

*℞. Rad. ari. ʒ. β. Coqu. in vino
albo & cum lob de pino vel syrup. de
hyssopo. Misce & Eclegmatis forma
exhibeatur. Vel ℞. Aqu. cina-
mom. ʒ. ii. oxymel. scillitic. ʒ. i. M. a-
liquida sensim sorbeatur. Vel ℞.
Ammoniac. Scrup. β. flor. Sulph. vel
lactis eiusdem, croci an. ʒ. v. Moschi,
ʒ. j. oxymel. f. Drach. ii. vini albi
ʒ. iii. M. Vel ℞. Ammoniac. ʒ. i. β.
addepulu. glycyrrh. & sacch. pensidij q.
s. Formentur Pilul. xxv. quarum 4.
vel 5. exhibeantur.*

Brunnerus, *consil.* 34. vt expertam
& vsu probatam sequentem potius
culam commendat.

*℞. Ammoniac. Drach. i. β. aqu.
hyssop. ʒ. iii. vini Rhenani. ʒ. ii.
Misce.*

Maior tamen videtur Ammoniaci
quantitas, quam quæ pro vna dosi
exhibenda. Theriaca etiam vel mi-
thridatium in ore teneri potest, &
sensim aliquid deglutiri.

Commendatur & pomum exca-
uatum, & ʒ. i. thuris repletum &
assatum.

*Vel ℞. Flor. Sulph. ʒ. i. β. Ben-
zoës ʒ. v. ammon. ʒ. iii. croci ʒ. ii.
margarit. prepar. Scrup. i. moschi
Scrup. β.*

F. Pulvis, cuius quantum cuspidè
cultelli capi potest, cum iure pulli
aut oxymelite aut aqua scabiosæ su-
matur.

Auicennas' cuminum cum aceto,
vel semen sinapis albi cum æquali
portione mellis ad formam Electua-
rij mixtum exhibet.

*Vel ℞. Oxymel. f. ʒ. i. scillitic. aq.
cinam. an. ʒ. β. ammoniaci Scrup. i.
croci ʒ. iii. Misce.*

*Vel ℞. Croci Scrup. i. moschi ʒ. i.
flor. benzoës ʒ. ii. succi oxyini depurati
ʒ. i. vini albi calisfacti ʒ. iii. M.*

Commendatur & tanquam vsu
probata aqua è floribus raporum de-
stillata, & cum croco ac pauxillo
moschi mixta.

Viles etiam sunt, aqua pectorales
dicta (Luffi vnaffer.) Item aqua sal-
uiz, anisi, roris marini.

Aqua pectoralis temperata D.
Andr. Deterri.

*℞. Rad. glycyrrh. ras. polypod. q.
mund. an. ʒ. i. β. tusilag. ʒ. i. helenij
borrag. an. ʒ. ii. dactylor. r. enucl.
cubebæ. rec. exacin. an. ʒ. iii. conser.
viol purp. ʒ. i. β. rojar. incarn. rec. ʒ. β.
nuc. mosch. croci orient. Carioph.
arom. cinamom. elect. an. ʒ. i. β.*

Incidentur & contundantur, po-
stea affundantur, *Sevi lactis caprill.
rec. & puriss. lb. ii. β. aq. scab. lb. i.
veronic. prunell. an. lb. β.*

Relinquantur in infus. in loco ca-
lido vel B. per nouendium, destil-
lentur deinde per organa vitrea.

*Collecti liquoris lb. iii. adde sacch.
candi albissi. ʒ. vi.*

Aliâ aqua pectoralis à me præ scri-
pta.

*℞. Herb. veronic. scabios. an. M.
ii. capill. Vener. hyssopi, salina, mar-
tulij, an. M. i. rad. ircos Florentin.
glycyrrh. caryogij, helenij, sennig. an. ʒ.*

β. *Cinam. opt. granor. iunip* an. ʒ. iiii.

Affund. spir. vini opt. q. s. Scent in infus. dies xliiii. postea destillentur; Destillatum funde super *daſtylos* N. x. *iuiub. sebesten.* an. N. xxx. *ficuum* N. x. *passular. minor. maior. exacinas.* an. ʒ. ii. *croci* ʒ. β. Digerantur & siltrentur. Neque enim è *daſtylis*, *iuiubis*, *sebesten* : *ficubus*, *passulis* multum per alembicum eleuatur.

Commendantur & millepedæ vel aselli, qui sub vasis aquaritis stibulantur, si scilicet panno lineo excepti in vino macerentur & viuum sine expressione propinentur.

Quando paroxysmus ultra quartum diem protrahitur, velicatoria in dorso, è regione pulmonis, applicentur. Nonnulli sinapismos in anteriore parte thoracis applicant, & vesiculas diu apertas seruant.

Victus interea sit tenuissimus, atque vilis est prisana cum croco & saccharo, cibique croco condiantur; cum is vilissimus sit in asthma remedium.

Quomodo extra paroxysmum ager curandus sit.

Quando ager à paroxysmo vehementiore & suffocationis periculo liberatus est, laborandum omnis generis praesidiis, ut malum reuertatur. Ideoque si plenitudinis signa adsunt, & vires permittant, vena aperienda basilica, praesertim vbi vaporum calidiorum copia magna in corde & pulmone vrget. Et vbi à mensium & hæmorrhoidum fluxu suppresso malum originem habet, vel augetur, venæ tali vel malleoli aperiantur. Cucurbitula quoque in eundem finem femoribus & cruribus adhiberi possunt.

Postea præparetur materia & euacuetur. Præparetur autem attenuantibus, incidentibus, & abstergentibus iis, quæ thoraci dicata sunt. Vbi tamen videndum, ne nimis calida & exsiccantia exhibeantur, quæ partes tenues materie absumere, reliquâque incrassare, & ita malum curatu difficilius reddere possunt. Quapropter commodè glycyrrhiza, passula, & similia medicamenta humectantia simul admiscantur.

Vtilia & hæc medicamenta sunt; *hyssopus*, *scabiosa*, *capilli Vener.* *præsum*, *passula*, *calamintha*, *seniculum*, *scilla*, *iuiuba*, *ficus*; & ex his composita, *symp. capill. Vener. de glycyrrhiza*, *de iuiubis*, *de scabiosa*, *de hyssopo*, *de calamintha*, *de prasio*, *oxymel. siml. compos.* & *scillitic.*

Vt ʒ℥. *Capill. vener. hyssopi*, *scabios.* *prasii*, an. M. β. *rad. helen. ireos*, an. ʒ. ii. *sem. anisi*, *senicul.* an. ʒ. i. *passul. glycyrrh. rasa*, an. ʒ. β. *ficuum* N. vi. Coqu. in aqua simpl. Colat.

ʒ℥. ʒ. vi. adde *symp. capill. Vener. hyssopi*, *oxymel. scillit.* ʒ. β. Mis. pro duabus dñibus, an. ʒ. β. & potus hic bis reueretur.

Vel ʒ℥. *Rad. ireos*, *glycyrrhiz. belenii*, *sanicul.* an. ʒ. β. *hyssopi*, *capill. Vener. iussuloz.* *scabios.* *satureia*, *calaminth.* an. M. β. *iuiub. seb.* an. N. x. *earie* N. vi. *passul.* ʒ. β. *sem. anisi*, *saniculi*, *malua*, an. ʒ. i. Coqu. in aqua. Colat. ʒ℥. lb. i. *Oxymel. scillit. syrup. de prasio*, *de glycyrrhiz.* an. ʒ. i. β. *aqu. cinamom.* ʒ. i. M. pro 4. doſibus.

Vel ʒ℥. *Aqua veronica*, *scabiosa*, an. ʒ. iiii. *symp. de prasio*, *capill. Vener.* an. ʒ. i. β. *Sulph. ʒ.* β. M.

Vel ʒ℥. *Syrup. de prasio*, *de hyssopo*,

de glycyrr. an. \mathfrak{z} . i. β . flor. Sulph. \mathfrak{d} . i. succi glycyrrib. insussil. \mathfrak{z} . i. β . vel potius, extract. glycyrr. \mathfrak{z} . β . aqu. ueron. insussil. au. \mathfrak{z} . iii. M.

Sumat xger manè & ante cœnam cochlearia 2. vel. 3.

Purgãtia.

Præparata materia euacuanda est, & primò per purgantia. Etsi enim materia, quæ in thorace continetur, ita facile per aluum euacuari non possit: dum tamen materiam ex vniuerso corpore purgantia euacuant, eadem à pulmone reuellunt. Imò aliquid retrahi posse non impossibile est. Præterea cùm antea dictum sit, & postea, *quest.* 2. dicitur, materiam, quæ paroxysmos asthmaticos concitat, non semper totam in pulmone consistere, sed ex hepate & venis affluere, commodissimè per purgantia ea tollitur.

Antiqui etiam fortioribus purgantibus utebantur, ut ex Aëtio, *reirab. 2. ferm. 4. cap. 37.* Paulo Aegineta, *lib. 3. cap. 39.* Oribas. *lib. 9. cap. 5.* imò ipso Galeno, 7. *de compos. med. sec. loc. cap. 6.* videre est.

Verùm tutius est, à mitioribus inchoare, atque ea sæpè repetere, & ita per *isapauri* materiam euacuare. Cùm enim materia crassa, viscida & contumax sit, & sæpè satiscopiosa, vna vice expurgari non potest; ideoque per intervalla eam præparare & euacuare decet, medicamentis mediocribus, qualia sunt agaricus, mechoacanna, & similia, quibus tamen stimuli loco fortiora quædam in minore quantitate addere vtile est. Quoniam verò purgantia medicamenta diutius continuanda, ne natura iis assuescat, earumque vires ob longam consuetudinem contemnat, ea mutare utile est.

Purgãtia mutanda sunt.

Itaque in decocto præparante supra propositio infundantur, *agaric. trochisc. 3. i. sem. carthami. 3. vi.* Colentur & exhibeantur, \mathfrak{z} . iii. Vel \mathcal{L} . *Pilul. de agaric. 3. ii. assaice reb. cochiar. an. 3. 8. extract. pancbymar. 6. vi. cum oxymel. seillit. F. pilul. Vel 4. Agarie. 3. i. 8. turbib. 3. i. semin. fanicul. zingib. an. 3. i.* Infundantur in oxymel. \mathfrak{z} . i. *vin. albi, aqu. hyssopi, an. 3. ii.* Colat. adde *manu 3. vi.* Iterum colentur. F. Haustus.

\mathcal{L} . *Rad. ieros. 3. ii. insussil. 3. i. 8. pulmonar. M. 8. ligniguiaci. 3. i. rad. belenii, hellebor. nigri, an. 3. i. 8. fol. sen. 3. ii. zingib. galanga, an. 3. i. Coq. inf. q. decocto per 3. oralis.* In colat. infundantur *agar. troch. 3. 8. rhubarb. 3. i. cinam. 3. 8. cum f. q. sacch. F. syrupus liquidior, cuius 3. iii. mane exhibeantur.*

Nonnulli frequenter ad purgandum in asthmate trochiscis de violis vtuntur, à Meisue, *cap. de asthmate* descriptis, quos tamen reuicè Alexander Massariæ, quod compositio minus sit artificiosa, & diagrydium non benè correctum. Verùm diagrydium facilè correctius reddi potest.

Vel \mathcal{L} . *Polypod. q. 3. 8. mechoacanna. opt. 3. i. agaric. albus f. 3. 8. glycyrr. 3. 8. fol. sen. 3. vi. zinziber. galanga, an. 3. ii. passular. 3. i. sem. anisi, fanicul. an. 3. ii. fol. insussil. capillor. 9. an. M. i.* Infundantur in *vin. mensura vna*, detur manè haustus.

Oxymel de Nicotiana purgans anhelosis vtile descripsit Quercetanus, *pharmatop. capite. 19.* & Syrup. de Nicotiana, *ibidem capite 12.*

Imprimis vulgò commendatur ius galli decrepiti purgans, quod tamen à Ludou. Septalio planè reuicetur.

Ius galli decrepi.

vt postea, *quæst. 5.* dicitur. Paratur autem hoc modo.

*℞. Gallinæ decrepitæ cuiuscera-
tum, ventri quæque eius sequenti pulvere
reple.*

*℞. Pulmon: vulpis. ℥. i. passular.
ficum, an. ℥. i. b. glycyrrh. ℥. i. hyssop.
saturia, thym., an. ℥. b. semin.
fenicul. ℥. i. caribam. ℥. b. turbit.
elect. ℥. ii. agaric. trochisc. ℥. b. xini-
xib. ℥. i. Postea coq. in aqua pura.*

De iure detur manæ haultus, qui si non facis purget, dissoluatur in eo aliquid manæ.

Oxymel
hellebo-
ratorum
Gelsæni.

Vix verò quicquam commodius est ad pulmones expurgandos quam oxymel cum agarico. Efficax quoque est oxymel helleboratorum Gelsæni. Sed omiti potest helleborus albus & augeri pondus agarici.

Corpore toto euacuato danda opera, vt causa continens seu proxima è pulmonibus tollatur, idque medicamentis internis, tum externis effectum dandum. Ad crassum & viscidam materiam attenuantia, incidentia & detergentia adhibenda, citra tamen insignem caliditatem, ne humores exsiccati magis crassi & lenti reddantur. Hinc Auicennas etiam diuretica fortiora improbat, quod subtile extrahant crassiore relicto. Ideoque vile est attenuantibus & inculentibus humectantia permiscere, vt glycyrrhiz. passulas, caricas, pineas, mel, saccharum, maluanum, althæam. Atque talia medicamenta suprà inter præparantia propòsita sunt. Valde etiam laudatur terebinthina, quæ non solum pulmones abstergit, sed & hepar, lienem, renes, simulque aluum citra noxam soluit.

Attenu-
tia, inci-
dentia &
deterge-
ntia.

Hume-
ctantia.

E supra enumeratis varia compo-
nuntur medicamenta. In vulgari usu

sunt, *Lorh. de canibus, de iussil. de
pino, de passulis, de pulmone vulpis,
scilla, & quod ad asthma dicitur, spe-
cies diureos s. diureos: Salomon, dia-
tragacanth. calid. diapenid. dihyssop.
diaprasii, conditum, rad. belenij, ex-
tract. belenij, iureos, el. anisi, feniculi,
oxymel. scillit. flores Sulphuris, lac &
balsamum eiusdem, flores benzoes.*
Galenus, 7. de comp. med. sec. loc. in
fine cap. 6. ex veterum scriptis ali-
qua recenset, inter quæ & hæc.

*℞. Succus scillæ crudæ, mellis part.
æqu. Coqu. lento igne. Dosis ℥. ii.
circa, ante & longè post ci-
bum.*

Vel *℞. Sulphur. vini, sem. ruta
sylv. an. ℥. i. aristoloch. absinth. cina-
mom. abrotan. an. ℥. b. Terantur
cum aceto & F. Trochisci, magni-
tudine fabæ, quorum ℥. i. manè &
vesperi exhibeatur cum ℥. iii. oxy-
melitis. Vtile est & hoc.*

*℞. Am. aceto dissol. ℥. i. essent. ze-
doar. ℥. ii. ag. cinamomi ℥. b. ver. ℥. ii.
fl. chamamel. ℥. iii. Millec pro 2. do-
sibus.*

Cum autem malum sit diuturnum
& contumax, vltus medicamentorum
continuandus, & medicamen-
ta sæpè repetenda, simulque per-
mutanda, ne materia vni assuescat.
Per intervalla quoque theriacæ ℥. b.
vel ℥. ii. exhibeantur. Vtiles quo-
que sunt millepedæ seu aselli, vt et-
iam suprà dictum, quorum & Ga-
lenus, 7. de comp. med. s. l. in fine
mentionem facit; ferantque & *Asperg.
& vulgatum Græcæ plebeculæ ho-
die esse medicamentum ad pulmo-
nes infarctos à crassis humoribus li-
berandos.*

Vel *℞. Hyssopi, veronicæ, scabio-
sæ, inarrub. origan. pulegiæ, cardus be-
nedicti, an. M. i. rad. iureos ℥. vi. xini-
x. i. b.*

Medica-
menta
sæpius re-
petenda
& mutan-
da.

3. j. β. *agrie, albiss.* 3. β. Infunde in aceti vini lb. j. β. *aqu. veronica, cardui bened.* an. lb. β.

Stent in vase vitreo obturato loco calido per triduum, deinde lento igne coquantur & exprimantur.

Colar. ℞. lb. j. β. *mell. opt.* lb. β.

Coqu. lento igne ad syrupi formam, qui aromatizetur cinamomo, *caryophyllis & calamo aromatico* in petia ligatis. Dantur manè 2. vel 3. cochlearia. Crato, *consil.* 29.

Syrupus Augeny de helenio.

℞. Rad. *belenij, polyod. q. in vino albo macer.* an. 3. ij. *passul. corint.* 3. β. *sebesten N. xv. sarfara, pulmonaria, fol. satureia, calaminib.* an. M. j. *fol. tabaci unum magnum. glycyrrh.* 3. ii. *sem. urtica, bombacis,* an. 3. j. β.

Goqu. in mulla ad remanentiam lb. j. β. & cum pari quantitate sacchari F. syrupus, cui oleum sulphuris addi potest.

Vel ℞. Rad. *gentian. helen.* 3. vi. *ireos, galanga,* an. 3. iii. *agrie, spica,* an. 3. j. β. *sacch. albi* 3. ij. F. Pulvis.

Vel ℞. *Hyssopi fices, semin. anisi,* an. 3. j. *glycyrrh.* 3. β. *sem. fenicul. cinamom.* an. 3. ii. *cardamomi* 3. ii. *ireos Florent.* 3. v. *sacch. ad pondus omnium.* F. Tragea vel cum melle electuarium.

Diabutyrum Ben. Victor. Faurentini.

Laudatur & diabutyrum Benedicti Victor. Faurentini.

℞. Butyri recent. bene loti 3. iii. *caricar. nucleor. pini, dactylor. amygd. amar.* an. 3. ii. *succi glycyrrh. tragacanth.* an. 3. i. *hyssop. ireos, thymi, satureia, prasi, pulegij, sem. urtic.* an. 3. β. *cinamom. zingib. pyrethri,* an. 3. iii. *caryophyll. galang. piperis nigri, sem. anisi, carui, cardamomi,* an. 3. ii. *igni aloës, uicis muscat.* an. 3. i. *aqu. mellis* lb. iii.

Caricas, passulas, dactylos bene confusos in aqua mellis triduo infunde, postea lento igne coque, & succum fortiter exprime, cui succo adde butyrum & præterea mellis despumati lb. vii. & iterum lento igne vnica ebullitione ebulliant, iterumque coentur. Colaturæ adde nucleos pini & amygdalas bene confusas, & in mortario omnia diligenter misce quibus reliqua omnia subtiliter pulverisata, vt & pulmonis vulpis subtiliter pulverisat. 3. ii. insperge, & super igne miscendo F. Electuariū, de quo 3. β. manè, meridiè & vesperti exhibeatur.

Vel ℞. *Conseru. betonic. botryas,* an. 3. ii. *violar. loc. de pino,* an. 3. i. *pulmon. vulpis præpar.* 3. i. β. *extract. glycyrrh. ireos,* an. 3. i.

Cum syrupo de hyssop. vel capill. Vener. F. Electuarium. Dos. Drach. β. Et commodum fuerit, si superbibatur haustus iuris galli decrepiti cum herbis peccoral. & ligno guaiaco facti. Vel ℞. *Pinear. mundar.* 3. ii. *radic. ireos. glycyrrh.* an. 3. ii. *trag.* 3. β. *sem. anisi, fenic. urtica,* an. 3. β. *rad. angel.* 3. β. *cin.* 3. iv. *styrac. calam.* 3. β. *sacch. penid. candi* an. q. s.

Cum aq. scabiosæ & feniculi, F. rotulæ vel morsuli.

Vtile est & sequens medicamentum.

℞. Rad. *irid. Florent. belenij,* an. 3. β. *pulpæ dactylor. & passular. mundatar.* an. 3. iii. *cortic. aurantior. siccor. citri siccor.* an. 3. ii. *benzoës,* 3. j. *croci,* 3. β.

Infunde bidui spatio in spiritu vini optimè rectificato. Postea liquor per inclinationem separatur, cui adde sacch. candi pul. q. s. spiritum vini accende, & liquorem continuò agita, donec flammâ spontè extin-

Et liquor olei ferè consistentiam acquirit, cui adde *ol. sulphuris* q. l. ad gratam aciditatem.

Externa.

Cum intertis medicamentis externa coniungenda. Illinendum nimirum pectus oleo amygdal. dulcino, chamæmel. anethino, cheirino, liliorum alborum, rutaceo additis mucilagibus & pinguedinibus emollientibus & discutientibus.

Vt *℞. Ol. amygd. dulc. lilior. alb. rutac. an. 3. vi. adipis gallinae, anseris, an. 3. b. mucilag. sem. fenugrec. cum aqua trisilagin. extracta 3. iii. Pulv. rad. iros, helenij, croci, an. 3. i. Cerv. parum. M.*

Vel *℞. Sem. carui, 3. iii. anisi, summit. absinth. an. 3. ii. pulverisatis adde mica panis similaginis 3. iii. mel. crud. 3. iv. terbinib. 3. ii. Coqu. in vino ad consumptionem vini. F. emplastrum, applicetur calidè pectori & dorso.*

In topicorum tamen horum vsti observandum, ne cutis pori occludantur: idèoque emollientibus commode medicamenta attenuantia ac poros aperientia, & nitri aliquid admiscetur.

Cauteria actualia.

Nonnulli etiam in malo inueterato & quod nullis aliis mediis cedit, cauteria actualia adhibent, secundùm collum, pectus & dorsum, circa medium vertebrae & costarum, de qua visione videatur Aëtius, *retrab. 2. ferm. 2. cap. 57.*

Si à catarrho malum sit vel fouetur, eius ratio habenda, & ut suprà lib. i. part. 2. cap. 34. de catarrhi curatione diximus, in brachijs fonticulis excitare vtile est.

Exsiccan-
tia.

Pectore expurgato, danda opera, vt per exsiccantia & absorbentia reliquæ in pulmone absumentur: in quem vsum pleraque medicamenta

humorem crassum è pectore expurgantia adhibentur, è quibus tamen hic fortiora & magis siccantia eligenda. Cum enim, vt antea dictum in principio & præparantia & expectorantia validius siccantia non sint satis commoda, quia tenui parte absumpta crassior relinquatur & induratur: vbi materia per incidentia & attenuantia præparata, vt & per expectorantia conuenientia euacuata fuerit, reliquum postea tutius per validius siccantia absumere licet. Qualia sunt, *belenium, arum, scilla, Nicotiana, ammoniacum, sulphur, benzoe, theriaca, mischridatum.*

Vt *℞. Rad. iros, 3. ii. helenij, ari, an. 3. i. scilla, angelica, an. 3. b. glycyrr. 3. i. hyssop. saturcia, pulg. marrubij, calamint. an. M. i. seminis feniculi, anisi, an. 3. ii. urtic. eruce, cartham. an. 3. b. Coquantur, & cum melle, vel saccharo. F. Syrupus. Sub finem adde croci, 3. b. Vtilis est & syrupus de Nicotiana.*

℞. Nicotianæ sicca, M. iii. hyssop. marrubij, calamint. an. M. b. capall. Ven. scabios. an. M. i. caricar. dañil. an. N. x. rad. angel. feniculi, an. 3. b. sem. fenic. anisi, an. 3. iii. urtic. 3. b. rad. iros, 3. x. Cog. in aqu. tb. iv. Et addito melle & saccharo fiat syrupus.

Syrupus
de Nico-
tiana.

Laudatur & ros Solis, si ei cum semine botryos, glycyrrhiza & marrubio S. V. affundatur. Vel fiat hoc eclegma:

℞. Ammoniaci, aceti scillit. dissoluti, 3. ii. sem. nasturtij, urtic. an. 3. i. flor. sulphur. 3. b. croci, 3. i. pulv. mou. vulpis præpar. 3. ii. cum oximel. scillite F. Electuarium. Vel hic pulvis.

℞. Rad. iros, glycyrr. helenij, an. 3. i. ari, 3. ii. cinamom. 3. ii. sem.

uric. nascitur. an. 3. j. pulmon. vulp. prepar. 3. ii. croci, 3. i. flor. sulphur. 3. i. benzoës, 3. 8. sacch. cand. 3. vi. F. Pulvis.

Vel 2℥. Flor. sulphur. vel lactis sulph. 3. 8. benzoës, 3. 8. fenicul. ari. 3. 8. rad. iris, 3. i. croci, 3. i. sacch. candi. 3. vi. F. Pulvis.

Vel 2℥. Ammoniaci, 3. i. 8. croci, 3. 8. flor. benzoës 3. v. extract. glycyrr. q. s. Fiant pilulæ xxx. dentur manè 5. 6. 7.

Vel 2℥. Flor. sulphur. 3. i. extract. helen. 3. i. sacch. albiss. in aqu. tussil. dissol. 3. iii. ol. anisi, 3. iv. F. rotulæ.

Vel 2℥. Spec. diareos simpl. 3. i. diatrag. calid. 3. 8. balsam. sulph. 3. 8. sacch. in acu. scabios. dissol. 3. v. ol. anisi, 3. v. Fiant rotulæ.

Vel 2℥. Lact. sulphur. flor. benzoës, 3. vi. ammoniaci, 3. iii. croci, 3. 8. margarit. prepar. 3. i. magist. oculor. 3. ii. mostbi, an. 3. 8. sacchar. candi 3. ii. Fiat pulvis, de quo quantum cuspidè cultelli bis capi potest, detur in ovo sorbili, vel aqua scabiosa.

Est & efficax decoctum ligni guaiaci, lassafias, lassæ parillæ, si pectoralia addantur, non quidem ad sudores ciendos, sed ad reliquias materiæ in pectore absumentas.

Vel 2℥. Ligniguiaci, 3. iy. lassæ parilla, vel ligni lassafias 3. i. 8. Infundantur horis 20. in 4℥. lb. iii. Deinde adde conferv. vislar. botrys, an. 3. ii. dactylor. N. x. Coq. in balneo vase clauso. Colatura exhibetur.

Ad easdem reliquias absumentas viles etiam sunt suffitus ex thure, myrrha mastice, styrace, benzoë, gummi iuniperi, nicotiana, cinamomo & similibus. Nonnulli etiam arsenicum suffumiguisistis ad-

miscendum censent, sed malè, vt postea *quest. 4.* dicetur.

Hæc tamen omnia ferè humorem crassum & viscidum spectant. Si verò ab humore tenui & seroso sit asthma, sæpius is euacuandus. postea etiam per sudorifera discutiendus.

Si à tuberculo, vel grandine, aut calculo iu pulmonibus genito, aut siccitate pulmonis hoc malum proveniat, qua ratione curatio instituenda sit, ex iis, quæ suprà, *part. 2.* de morbis pectoris dicta sunt, patet. Nam si tuberculum sit sanguineum, citò suppuratur & rumpitur etiam sine medicamentorum ope, idque ex puris excreatione, febris & anhelatione remissione cognoscitur, & tum hydromelite, aliisque medicamentis, quæ in pleuritide sunt propo- sita, ad extersionem utendum, ne vlcus relinquantur. Si verò tuberculum crudum sit, & coctum difficile, medicamenta calefacientia, attenuantia, & absumentia, quæ suprà sunt propo- sita, etiam hic locum habent. Quod si tandem in abscessum mutetur tuberculum, abstergentia requiruntur. Hinc Galenus, *4. de loc. aff. cap. vlt.* ad absumentalia tubercula vitur Athanasia, the- riaca & similib. valdè exsiccantibus medicamentis. Vix tamen aliquis talium ægorum sanitati restituitur.

Dieta.

Quia asthma plerumque à causa frigida & crassa ortum habet, vitæ ratio sit calefaciens & attenuas, de quo postea *quest. 7.* dicetur. Aer nimirum, quem inspirat æger, sit calidus, siccus, attenuans, liber & perflabilis. Ided etiam in cubiculo, in quo æger degit, suffumigia frequenter hanc ex styrace, thure,

Curatio
asthmatis
à tuber-
culo, grā-
dine vel
calculo.

Dieta.

myrrha, benzoë, moscho, ambra. Vitetur verò aer frigidus, & humidus, & crassus. Cibus eisdem qualitates habeat, ita tamen calefacientia & attenuantia moderanda, ut humectantia quædam admiscantur, ut materia facilius expectoretur. Nam si cibus & potus exhibeatur, qui solum calefaciat, attenuet, & simul siccat: facile fieri potest, ut humor maiorem crassitudinem acquirat, & tenacius asperis pulmonis arteriis adherescat. Ideoque cibi condiantur salina, saturata, thymo, hyssopo, formiculo, baccis iuniperi, & cinamomo, & in primis croco. Utiles quoque sunt passule, amygdalæ dulces, pineæ, pistacia, & imprimis commodum est ius galli decrepiti cum hyssopo & croco, atque aliis pectoralibus. Mellii quoque cibi adstringentes omnes & crassi succi, ut pisces, legumina, caro suilla, lac & caseus.

Potus sit vinum tenuis, subdulce, vel inebriatum, in quo thoracica medicamenta cocta sint. Possunt etiam ceruicis fieri cum salvia, hyssopo roremarino & similibus. Utiles etiam potus est decoctum ligni Guajaci. Ager situm non ferat, sed largius bibat; quia humectatione indiget ac cum quæ iam incisa & deterita sit in pectore, materiam rursi eiiciendam, ut docet Galenus, 7 de loc. affect. c. 6. vnicatamen vice, & cum cibo potus copiosus non assumatur: cum repletus potu nimio ventriculus difficultatem spirandi parere soleat, sed si opus: cibo in concoccto potus aliquid sumatur. Somnus sit nocturnus moderatus. In paroxysmo somno, quantum potest, æger abstineat, aut si vires imbecillæ somnum requirant, bre-

uis sit & interruptus. Dormiat æger capite & pectore nonnihil elevato. Utiles est & ambulatio ante cibum, & frictio partium extremarum. Vehementia autem exercitia, quod humores commoveant, omnino intermittenda. Vitentur animi perturbationes, ita, & omnis nimius animi, ac corporis motus: cum humores commouere & paroxysmum accendere soleant. A venere etiam abstinendum ægro.

QVÆSTIO I.

An humor asthmatis causa hæreat etiam quandoque extra bronchia pulmonum.

Alexander Massarius Auicennam reprehendit, quod statuat, humorem asthmatis causam contineri, quandoque etiam extra bronchia pulmonum in ramis leuium arteriarum, quarum propagines multæ per pulmonem distribuuntur, statuitque, si in pulmonibus obstruantur propagines leuium arteriarum, non asperæ arteriæ, cor laborare, pulsusque fieri inæquales, minimeque asthma excitari, nisi bronchia pulmonum simul obstruantur.

Verum enim vero materiam asthmatis causam quandoque etiam extra bronchia pulmonum in alijs pulmonis vasis, imo in ipsa pulmonis substantia consistere, multæ Medicorum obseruationes docent. Ita Helleus in quodam pulmonem tanquam spongiam imbutum multo humore pituitoso inuentum esse scribit. Reparet id ex eo, quod qui asthma laborant, non continuo cum stertore, & sonitu respirant, neque etiam semper tussibus aut hussibus, tussis tamen succit, quod minime fieri deberet, si materiam asperis

An humor asthmatis causa hæreat quandoque extra bronchia pulmonum.

pulmonum arteriis semper confisteret. Nam aer materiam transiens & dissolvens sonitum & stertorem excitat, & quicquid in aspera arteria, eiusque ramis existit, tussim excitare solet, ut postea, in cap. de tussi, dicitur. Et licet verum sit, laevibus arteriis affectis mutationem in pulsu fieri: tamen & respiratio tunc quoque aliter potest, si obstructio illa tam magna sit, humorisque tanta copia, ut & asperas arterias comprimant, angustior etque reddat, doceantque hoc satis paroxysmi asthmatici, qui per intervalla materiam agitant in vasis excitantur. Ideoque si materia in laevibus arteriis consistat, & asperas comprimant, siue in utroque arteriarum genere consistat, simul & Asthma, & pulsus inaequalitatem parit. Et ipsa origo asthmatis, de qua quaestione sequenti dicitur, satis docet, causam asthmatis potius in venis & pulmonis substantia, quam asperis arteriis contineri.

QUESTIO II.

An asthma frequentius a catarrho, an vero ab humore crudo & venis in pulmones effuso excitetur.

An asthma frequentius a catarrho, an vero ab humore crudo & venis in pulmones effuso excitetur.

Vulgata opinio est, frequentius a cerebro frigido & humido atque excrementis abundante materiam pituitosam ad pulmones descendere, atque ibi haerentem asthma parere. Verum cum non nego, quandoque post catarrhos aliquod pituitum in pulmonem restare, talique bronchia obstruere, & asthma excitare posse: tamen rarissimum hoc fieri existimo, sed frequentissimum asthma generari putabo ab humoris & crudis circa hepar,

imò in universo venoso genere collectis, & per venarum materiam in pulmones effusis. Item si materia e cerebro descendens causa asthmatis esse debet, necessarium catarrhus asthma praecedere debet, atque rarissimum adesse necesse est; quod tamen non semper observatum. Etenim, si vel leuiter solum asperae arteriae afficiuntur, tussis excitatur, ut postea, ex capite de tussi, patebit. Nonnulli quidem, ut Zecchius, consili. 12. aliam huius rei causam reddere conantur, statuuntque tussim in asthma quandoque non excitari ob partium spiritalium aequalem intemperiem, quae cum tristem sensum non inducat, etiam tussim non excitet. Cum enim spirandi organa ex longa patiendi consuetudine in morbosum quandam habitum commutata fere sint, aequalique intemperie cum humore per omnem partem aequaliter disperso afficiantur, novum dolorem seu molestiam non sentire, atque ita tussim non excitari, nisi quando nova accedit materia, vel prior certo loco collecta & commota vias exasperando, & aeris ingressum & egressum praepediendo novam affert molestiam.

Verum cum idem Zecchius, consili. 58. causam cur asthma non semper cum stertore & sonitu fiat, hanc reddat, quod materia non semper in asperis, sed quandoque in laevibus pulmonis arteriis existat; causam eandem hic etiam multo rectius asserere potuisset, quam istam aequalium intemperiem. Neque enim quae tussim excitant, solum obintemperiem, quam inducunt, id faciunt, sed etiam quia aeris ingressum prohibent, quod ipse constat id quod materia asthmatis, si in bronchiis

pulmonis hæretet, perpetuo faceret, & ita perpetuo tussim exciteret, eodem modo vt grandines tussiculam perpetuam excitant, neque longa patiendi assuetudine vltus talis habitus induci potest. Sunt & alia, quæ idem probant. Refert idem Zecchius *conf.* 18. Cardinalem Paliottum, asthmaticum simul vrinæ ardore, & difficultate laborasse, & ita quidem, vt cum vrinæ ardor, & difficultas vgeret, spirandi difficultas interim euidenter imminueretur, & rursus cum maiore impetu, stranguria cessante, repeteret. Quod certè indicio fuit à communi causa hæc duo mala prouenisse, vitiosos & crudos humores, quantea è venis ad pulmones ruentes asthma faciebant, postea ad renes, & vesicam transmissos difficultatem vrinæ excitasse. Et licet non omnibus asthmaticis vrinæ difficultas & ardor adsit: tamen durante accessione ægri vrinæ crassas, & turbidas mingunt; quæ scilicet humorum crassorum & crudorum in venis agitatorum pars etiam ad renes, & vesicam iuit. Arguit idem & hoc, quod asthmatici plerumque sunt cachectici, vt de eodem Cardinale Paliotto, refert Zecchius, pedesque tandem asthmaticis pene omnibus intumescunt; quod indicio est, causam asthmae circa hepar potius contineri, siue ibi ob hepatis imbecillitatem generetur, siue ab vtero in foemina, quibus mentes superstiti sunt, sanguis eò miratur. Neque id idèò fit, quod pulmones hepar refrigerent, cum si diligenter signa omnia perpendamus, crudorum humorum in venis cumulatorum signa adsint. Insuper idem

& hoc probat, quod asthma interdum circa tussim desinit, nec materia excreat, & è pectore elicitur, dum scilicet ea, vel per hâlicum digeritur, vel per vrinæ vias expurgatur, aut in venas recurrit. Sicut & hoc id persuadet, quod suppresis nientibus & hæmorrhoidibus ac aliis consuetis euacuationibus, asthma nullo præcedente catarho, succedit. Quod tandem & hoc confirmat, quod Aretæus inter signa imminents asthmae flatum in præcordiis, & eructationes præter rationem recenset; quæ proculdubio à materia cruda in hypochondriis agitata proueniunt. Neque enim, vt nonnulli volunt, flatum hi proueniunt, quod ventriculus ob pulmonis consensum afficiatur. Nam Aretæus eos non inter signa asthmae, quod diu durauit, & in quo pulmonis temperies valde labefacta sit, sed incipientis asthmae signa recenset, vbi pulmones non ita labefactos esse credibile est, vt ventriculum refrigerare possint. Materiam autem hæc quæ è venis in pulmones effunditur, non semper crudam & pituitosam, sed quandoque etiam serosam esse, nò sine ratione statuit Carolus Piso.

QVÆSTIO III.

An Asthma semper sit sine febre.

Vulgata est opinio asthma sine febre esse, & differre asthma à respiratione illa laxa, quæ fit in febribus, quod illa sit ob vsum auctum, hæc verò saltè ob vasorum angustiam. Suspectum tamen habet hanc doctrinam Carolus Piso, de morbis à collaue serosa, pag. 223. cum febris in nonnullis etiam lentius sese prodaret calor non sit siccus, & acer,

An asthma semper sit sine febre.

sed halituosus plerumque, humidusque & blandus. Etsi verò urina sæpè sint copiosa in asthma, ac tennes & instar aquæ perspicuæ, atque idèò dissimiles urinis familiaribus, & propriis febrili putridarum, suspitione absentia febris præbeat, tamen id familiare febribus, quæ ab humoris serosi fervore fiunt, esse putat, idèmq; in arthritide, aliisque à fluxione & fervore humoris serosi morbis accidere potest. Idque etiam historis aliquot adductis comprobatur.

Et omninò non est de nihilo hæc Caroli Pisonis sententia. Etsi sæpè febris absit, cum humor est crassior, aut tuberculum aliquot adest: tamen ubi à seroso humore asthma originem habet, quale plerumque circa insignes temporum mutationes in quibusdam & obnoxii excitatur, cum febrem aliquam simul adesse, experientia testatur: sed est ea blanda & halituosa, qualis etiam alios morbos à fervore & motu serosi humoris ortos, ut arthritidem, catarrhos, & huiusmodi fluxiones alias comitatur.

QVÆSTIO V.

An purgantia in paroxysmo asthmatico conveniant.

An purgantia in paroxysmo asthmatico conveniant.

Dissuadent id nonnulli ex primùm de causa, quod humor, qui asthma excitat, crassus sit, viscidus, neque evacuari facillè possit, nisi prius præparetur, & postea sensim ac per vires evacuetur, id quod etiam in aliis morbis pituitosis faciendum.

Deinde ob suffocationis periculum, quod maximè urget; cum

metuendum sit, ne si medicamenta purgantia exhibeantur, materia à medicamento agitata non ad ventrem inferiorem, sed potius ad locum affectum confluat, atque ita suffocationis periculum augeatur.

Contra verò Carolus Piso statim post sanguinis detractionem purgationem avertendi gratia instituendam censet: cum non nisi cum periculo suffocationis purgatio protrahi possit, & humor ipse per se satis sit fluidus, neque magno apparatu indigeat.

Verùm distinctione hic opus est, & humoris natura consideranda. Si enim humor sit crassus & viscidus, sine fructu initio statim instituitur purgatio, isque potius agitur, quam educitur atque hinc paroxysmus augetur. Si verò humor sit tenuis & serosus atque à venis in pulmones effundatur, quod præsupponit Piso, commodissimè mox initio instituitur purgatio.

QVÆSTIO V.

An ius galli decrepiti asthmaticis conveniat.

Ius galli decrepiti non solum cum pectoralibus coctum ad alterandam & expectorandam in asthma materiam, sed etiam cum purgantibus ad purgandum in omnibus fere medicorum, post Arabum tempora, libris præscribitur. Vnus, quod sciam, Ludovicus Septalius, *animadvers. medicar. lib. 6. num. 137.* id, tanquam noxium rejicit, utpote quod experientia non respondeat, & rationi adversetur.

An ius gallidecrepiti asthmaticis conveniat.

scribitque, se Mediolani, vbi frequenter exhibetur à Medicis, præsertim secundùm descriptionem Benedicti Victorij Fauentini in *Empirica*, id aliquoties inicitu successu exhibuisse. Obesse autè potius quàm prodesse, hisce de causis putat. In longa, inquit, ebullitione nitrosæ illæ partes, quibus maxime prodesse ipsi galli veteris creditur, tanquam terrestres subsident, atque in percolatione reiciuntur, viscidæ ac glutinosæ, crassæ, tum & præpingues ex cute, pedibus, alarum extremitis, musculosis denique & nervosis partibus, prouenientes, maxime remanent. Quæ de causa non solum non adiuuare materiæ ex pectore excretionem, sed crassiore & viscidior materia & antecedente & coniuncta causa addita humorem contumaciorem magisque rebellem ad excernendum reddere. Neque etiam quæ cum gallo coquantur, aliquis prodesse putat. Quæ enim pro soluenda alio adduntur, agaricus, sena, sem. carthami, cum paucissimam admittant ebullitionem, vinum omnium purgandi perdere ex longa coctione; alterantur etiam, vt capit. Vener. & alia, cum vires suas in superficie positas habeant, ex longa coctione eas admittere; alia, vt origanum, borſy. ex longa coctione putrilaginosa euadere.

Verum enim vero hæc, quæ ex Ludouico Septalio protuli, non tantavidentur; vt ideo à comuni opinione sit recedendum. Etenim à multis hætenus Medicis obseruatum, ius galli decrepiti in asthma profuisse. Neque refert, quod Septalius id aliquoties inuito conatu exhibuit. Incidit enim forsan in asthmaticos desperatos, quibus omnia,

etiam efficacissima remedia, frustra adhibentur. Rationes verò, quæ ab ipso afferuntur, etiam quod debent, non perſuadent. Quæ vt rectius intelligantur, ius galli decrepiti Benedict. Victor. Fauentini, quod allegat, prius proponendum. Ita autem habet eius descriptio.

℞. Gallum antiquum ad minimum trium annorum, quem flagellato & multum defatigato, decollato, & sine aqua deplumato, ac visceribus mundato, & vino forti eluito, parumque salito: Deinde.

℞. seminis carthami, anisi, anethi, an. ʒ. ii. rad. helenii, iridis, fol. hyssop. pras. an. ʒ. ʒ. b. glycyrr. pasifl. enucleat. an. ʒ. vi. variari alibi, ʒ. i. pulmon. vulpis puluerisari ʒ. ii.

Omnibus hisce crasso modo contusis venter galli repleatur, gallusque in aqua lb. xxx. coquatur, donec caro ab ossibus separetur. Deinde facta colatura cum forti expressione, colatura in frigido loco relinquatur, vt quod sæculentum est, subsideat, pars verò clara separetur & vsui reſeruetur.

Primo ergo verum quidem est, quod vis iuris galli decrepiti in partibus quibusdam nitrosis & abstergendi vi prædictis consistat. Hoc autem falsum, quod Septalius opinatur, illas partes nitrosas subſidere, & postea, tanquam sæculentas, abici. Etenim terrestres quidem, crassæ, viscosæ ac sæculentæ subsident; nitrosæ autem proprie terrestres non sunt, sed salis suo modo, ius quæ elaro liquori permisceantur salis more, non verò subsident. Deinde etsi verum sit, coctione nimia vinum tam purgantem quàm alterantem dissipari: tamen hoc facile præcaueri potest, si in vase clauſo & duplici in balneo

balneo feruenti fiat decoctio, & tum minus aquæ, cum nihil absumatur, affundendum. Aut si hac coctione vim omnem ex gallo extrahi non posse, sed coctione in vase aperto opus esse quis existimet, gallus primo solus coquatur, deinde in decocto in vase clauso infundantur vel ebulliantur medicamenta purgantia & alterantia. Pinguedo etiam facile separari potest.

QVÆSTIO VI.

An Arsenicum suffumigis in asthmaticis curandis rectè admisceatur.

An Arsenicum suffumigis in asthmaticis curandis sic admiscendum.

Plerique Medici post Arabes inter suffumigia, quæ ad exsiccandas & absumendas reliquias materię in asthmaticis adhibent, etiam Arsenicum admiscere iubent: sed quàm Arsenicum esse summè venenosum. Sunt quidem nonnulli, inter quos etiam Valsius, qui id excusare eo modo vult, quod in exigua quantitate admisceatur, aliisque medicamentis castigetur, & sustitu eius facultas elicitæ non adeò corrodens, malignaque existat; cum venosæ qualitates non in partibus tenuibus, igne resolutis, sed in crassioribus ac terrestribus insint.

Verumenimverò hoc modo se non expediunt. Primb enim Medici non in parua quantitate arsenici puluerem admiscunt, sed ad pondus omnium. Imò etiam in parua quantitate nocere potest. Deinde thus, myrrha & similia, quæ admiscuntur, venenosam arsenici vim corrigere non valent. Præterea notissimum est Chymicis,

etiam fumos arsenici, dum calcinatur, esse summè noxios; nec partes heterogenæ sunt in arsenico, vt alia sint terrestres & crassæ, alia volatiles. Nam dum arsenicum calcinatur, in fumos, vtpote totum volatile, resoluitur, qui summè venenosi & noxi sunt. Ergo arsenicum omnino in eiusmodi suffumigiis omittendum.

Error verò inde manauit, quod vocabula Sandarax Arabum, & Sandaracha Græcorum, malè confusa sunt. Sandarax enim Arabum, vulgò vernix, gummi iuniperi est, vi eximia sicandi præditum; vnde Arabes in sufficibus illis, qui ad reliquias humorum in pulmone in asthmaticis absumendas adhibentur, illud rectè præscripserunt. Sandaracha verò Græcorum, arsenicum rubrum est. Cum ergo, qui in Arabum scripta inciderunt, sandaracen Arabum, & sandaracham Græcorum idem esse putarent, malè pro gummi iuniperi, quod Arabum sandarax, est arsenicum, seu sandaracham Græcorum, quæ arsenici species est. Scio equidem nonnullos id probandum suscipere, ipsos etiam Græcos sua sandaracha, id est, arsenicò in suffumigiis hisce vfos fuisse: & sit, vt obteineant, tamen quibus maligna arsenici qualitas non ignota est, non facile eos imitabuntur.

QVÆSTIO VII.

An vitus attenuans simulque tenuis asthmaticis conueniat?

Mouent nonnulli questionem, an vitus attenuans asthmaticis conueniat, & mea soluenda multum la-

An vitus attenuans simulque tenuis asthmaticis conueniat.

borant. Nam et si Galenus, in principio libri de attenuante victu, scripserit, solâ victus ratione attenuante, sine vllis medicamentis, difficiles respiraciones, arthritides, epilepsias & alios morbos dururum se sanasse: tamen in contrarium adducunt Hippocratem, qui, 1. aphor. 4. scribit: in morbis longis victum tenuem & exquisitum semper parum tutum esse.

Verum res plana est. Aliud enim *νικτὸς διαίτα*, victus tenuis est, de qua Hippocrates, aphor. allegato: aliud *νικτὸς τροφή*, victus attenuans, vel attenuandi vim habens. Nam, *νικτὸς διαίτα*, victus tenuis, solam victus formam ac quantitatem respicit cum scilicet ægrius coctui facili, & quidem in exigua quantitate, & minus ferè, quam possit concoquere, offertur: cui opponitur *διαίτα ἀσθενέστερη*, plenior victus, qui scilicet maiore copia exhibetur: *διαίτα* verò *νικτὸς*, solam qualitatem respicit, & victus attenuans est, qui viscidos & crassos humores in corpore extenuat, cui incrassans victus opponitur, qui crassos humores in corpore nostro gignit, vt docet Galenus, loco allegato. Et agunt de tenui *διαίτα* cum alibi cum lib. de victus rat. in acut. Hippocrates & Galenus. De victu verò attenuante agit Galenus peculiari libello, de eo conscripto, describitque ibi Galenus cibos attenuantes, quod sensus mordeant & acres sint, cibosque illos, lib. allegat. Galenus enumerat & describit. Et tales cibos asthmaticis viles esse nullû dubiû est; an verò victus tenuis conveniat, valde dubium est; cum, vt apb. alleg. Hippocr. docet, in

morbis longis parum tutus sit.

Vasculum equidem hanc, quam ipsa linguae Græcæ proprietates suggerit, solutionem non probat, victumque attenuantem & tenuem re ipsa non differre statuit; idcò, quod victum attenuantem constituentia alimenta, cum tenuia & debilia sint, alimentum copiosum victumque plenum præbere non possint, aut si adeo magna quantitate exhibeantur, vt copiosum nutrimentum æquare valeant, à facultate concoqui non possint.

Verumenimverò diuersa planè victus ratio est, tenuis & attenuans: cum, vt dictum, tenuis victus saltem formam & quantitatem, attenuans qualitatem respiciat. Et diuerso planè fine *διαίτα* tenuis & attenuans instituitur. Finis *διαίτε* tenuis est, vt natura à coctione morbi ad coctionem cibi non augetur, idcòque paulò minùs cibi exhibetur, etiam si cum aliqua virtute iacturâ id fieri videatur. Attenuans verò victus finis est, vt cibi qualitate humores crassi attenuentur, atque ita, quod forsan medicamentis fieri non poterit, quotidiano cibi vû præstetur. Interim nullo modo in victu attenuante requiritur, vt de consuetâ quantitate aliquid subtrahatur. Et si hoc etiam attendendum sit, vt æger eiusmodi cibi copiam se non oneret, & plus assumat, quam concoquere possit. Et omnino victus attenuans non semper tenuis est, & cibi, qui victum attenuantem constituunt, etiam *διαίτα* plenam præbere possunt, sicut hoc ex allegato Galeni libro de victu attenuante patet, vbi c. 8. aues montanas, pisces saxatiles, carnem gallinarum, perdicum car-

nes, quæ victum plenum præbere possunt, in attenuante victu admittit. Ideoque si asthmaticis aucule montanæ, perdices, gallinæ ac similes cibi, qui victum intractantem non præbent, præcipuè cum hyssopo, sacuræia, thymo & similibus dentur, victus erit is attenuans, non tenuis.

CAPVT III.

De suffocatione seu strangulatione.

suffocatio
seu strangu-
lacio.

AD læsam seu potiùs abolitam & interceptam respirationem pertinet suffocatio, cuius species est strangulatio, de qua aliquid in specie dicendum.

Causa.

Suffocatur autem homo, cum aër ventilando calori cordis necessarius non attrahitur, fuliginèsq; calide expiratione non emittuntur.

Fit hoc 1. cum viæ aëris attrahendi dicatæ occluduntur; quod fit interdum ore occluso seu obstructo, sinuque naribus mucò obcuratis, unde interdum Apoplecticis & Epilepticis periculum suffocationis imminet.

2. Si fauces, præsertim circa laryngem, occluduntur, id quod fit in tumoribus musculorum faucium, laryngis, glandularum, columellæ, sicut & in luxatione vertebrarum, ceruicis.

3. Si asperæ arteriæ caput, seu rimula illa, per quam aër ingreditur, à re quacunque obstruitur. Est enim hoc facile non fieri, sed natura ob imminens summum pe-

riculum per tussim magno conatu omnia talia excutere conetur: tamen si res ita pertinaciter & fixè rimulæ illi inhæreant, suffocationem inducunt. Ita Hadrianum Pontificem à musca in fauces inuolante suffocatum esse, historici referunt: aliòsq; vix acinis, infantes quosdam nummis seu alijs rebus deglutitis suffocatos esse, ex historijs patet. Potest referri huc & suffocatio ab aqua. Quanquam Platerus ob defectum aënis eam fieri putet.

4. Ipse quidem asperæ arteriæ ductus non facile obstruitur, cum sit satis patens: à vi tamen externâ collo constricto, vt fit in strangulatione, via omnis spiritus intercepti potest. Et notabilis est hîc historia, quam in viro quodam docto obseruavi. Is enim cum cerasa comederet, accidit, vt cerasi nucleus in asperam arteriam incideret, & in pulmonem ipsum delaberetur, atque ibi etiam quandam grauitatem pectoris excitaret; post aliq; vtrò tempus accidit, vt nucleum illum picuita tenaci inuolutum cum vehementi tussi reiceret. Præterea fungorum quorundam efus, vt & alia venena strangulare solent; quod proculdubio fit cum ob membranam, quam œsophagus habet cum aspera arteria & larynge communem, laryngis rima & contrahitur & coarctatur. Ita ex medicamento sursum ac deorsum purgante ferè suffocatus Vinctor apud Harpalidem, libro septimo epidemion.

Accidit etiam in apoplexia suffocatio, cum motu thoracis omni & membrorum respirationi interuentum læso nulla sit respiratio.

Tandem etiam in catarrho subitò & confertim ad pulmones ruente suffocatio fieri potest, qui catarrhus idemco Suffocatus appellatur, de quo, *lib. 1. part. 2. in fine dictum.*

Pertinet huc & aer, qui attrahitur, ventilando calori ineptu & suffocans, qualis est ille, qui è captonibus accensis exhalat, vt & qui ex cloacis, sentinis & puteis exhalat, cuius rei exēpla duo habet Cristoph. à Vega. *Artis med. lib. 3. f. 5. cap. 8.* & aliquot etiā Marcellus Donatus, *de hist. med. mirab. lib. 2. cap. 6.* Disputatur quidem hac de re inter Medicos, vt etiam, *lib. 1. part. 1. cap. 7.* dictum est, an magis cerebrum, an verò magis pulmones & cor afficiantur. Et quidem Marcellus Donatus, *loco alleg.* cerebrum præcipuè affici statuit. Et negari non potest, cerebrum & spiritus animales affici, vt exempla ab eodem allegata testantur. Quidam enim postea resoluti sunt, quidam delirarunt. Verùm nec hoc negandum, organa respirationi dicata simul affici. Aer enim istis fumis infectus calori cordis ventilando ineptus est: cuius rei indicium est, quod nonnulli periculo suffocationis cessante febri correpti sunt.

Pertinet huc & illa suffocatio, cuius Aretæus, *lib. 1. c. 7. & l. 7. c. 7.* mentionem facit, cuius etiam suprà, *part. 1. c. 24. de angina* mentionem fecimus, quæ fiat spiritus praua conuersione ad calidissimum & siccissimum, nulla corporis parte inflammatione laborante. Et si verò alij aliter hac de re disputent, & in loco illo Aretæi explicando multum laborent: tamen commodissimè mihi explicari videretur, si dicamus, spiritum sepe ita esse inflammatum,

calidum & siccum, vt ei refrigerando aer externus, qui spiritu attrahitur, non sufficiat. Cui hoc addi potest, quod spiritus ille habere potest prauam qualitatem, & insignem extricandi, & constringendi vim, ob quam organa spirationis constringuntur & coarctantur, vt respiratio libera fieri non possit. Similem huic affectum describit Hippocrates, *4. de rat. viſſ. in acut. text. 31. ad 35.* cum qua tamen catarrhus fuit coniunctus.

Prognosticum.

Strangulati aut suffocati, non tamen mortui, ad se non redeunt, Prognosticum. quorum circa os collecta spuma apparet, *2. aph. 43.* Non tamen hoc vniuersaliter verum est, vt Galenus, *in comm.* addit: nonnulli, quibus strangulatis spuma circa os apparuit, sibi sunt restituti, vt etiam duo exempla obseruauit Christoph. à Vega, *loco alleg.* quamuis id raro accidat.

Curatio.

Cum verò morbi plerique, à Curatio quibus istæ suffocationes pendent, suprà cum curatione explicati sint, saltem hic quomodo strangulatis, & aquâ & fumo suffocatis succurrendum sit, dicemus.

Qui laqueo penè strangulati sunt, Laqueo strangu-
latis quo-
modo cu-
randi.
iis laqueo soluto acetum cum pipere, aut pulegium tritum, vel semen vrticæ cum vino aut mulso, vel acetum cum vino propinanda sunt, & collum lanâ oleo irino calente madidâ, inuoluendû. Possunt etiam commodè exhiberi aquæ epilepticæ, vitæ, cinamomi, & reliqua, quæ ad manum sepe sunt:

Ex vapo-
ribus seu
fumis
suffocati.

Eadem etiam iis, qui ex vapore cloacarum, puteorum, seu fumis carbonum suffocantur, exhibenda, vt & ea, quæ supra, lib. 1. part. 1. c. 17. sunt propofita.

Ex sub-
merfione
in aquâ,

Si verò ex fubmerfione in aquam quis fuffocationis periculum incurrat, is aquâ ereptus moueri debet, & capite deorfum inclinato ac pedibus eleuatis, ac pennâ oleo intinctâ, vel digito ori immiffio vomitus prouocandus; vel exhibeatur decoctum hordei, ficuum, glycyrrhizæ, adiecto butyro & faccharo; vel decoctum florum chamæmeli cum cereuifia. Poftea verò vinum meracius vel mulla exhibenda, & etiam aliquæ aquæ vitæ. Simul æger in calido conelauo feruandus, & fuffumigia instituenda, fobitiones quoque decocto farinæ ciccerum exhibeantur.

A fungis
venenatis.

Si fuffocatio à fungis venenatis imineat, vomitus ftatim concitandus decocto raphani cum oxymelite vel falis vitrioli 3. ſ. cum oxymelitis 3. iiii. propinanda. Poftea abſinthium & meliffa in vino iufundantur, & vinum exhibeatur.

Cùm Pausaniæ puellam, lib. 7. epid. fuffocatio ex fungi eſu apprehendiſſet, ei profuit mulla calida epota & vomitio, balneumque calidum. In balneo fungum vomitione reiecit, & cùm ceſſatura eſſent ſymptomata, ludore detenta eſt.

CAPVT IV.

De vitis vocis & ſermonis.

Vitia vo-
cis, & ſer-
monis.

C Vm in homine aër, quem ſpirando attrahimus, & eſſamus, non ſolùm ventilando cordis caloti,

ſed & voci & ſermoni formando inſeruiat, ordo poſtulare videtur, vt poſt reſpirationis vicia etiam de vitis vocis & ſermonis dicamus.

Non verò omnis ſermo vox eſt, ſed qui ſolùm ab animalibus prouenit; & quidem, vt Iulius Cæſar Scalliger, de cauſis ling. lat. cap. 4. defini- nit, eſt vox ſonus ex ore animalis: ſermo verò diſpoſitio vocum articulata- rum, ad interpretandum animum. Et omnis vox, vt ibidem, Scalliger docet, eſt ab animi affectu.

Eſt enim data animalibus ad expreſſionem voluntatis. Neque tamen omnis vox articulata eſt, ſed multæ voces ab affectu proficiſcuntur, quæ ſunt inarticulata, vt gemitus & ſibilus venatorum.

Eſt autem vox articulata, quæ ſcripto excipi atque exprimi valet: inarticulata, quæ non. Et articulas voces à brutis non excludit Scalliger; cùm ouium voces ad eò clarè ſcribi poſſint, vt ab ipſis vocabulum apud nos ſumptum, balare. Et ſit, vt ple- ræque brutorum voces non ſunt articulatæ: ad animi tamen affectum ſignificandum compoſitæ ſunt, de quo Lucretius, lib. 5.

----- quod ſecula ſerarum
Diſſimiles ſoleant voces variâſ-
que ciere,
Cùm metûs, aut dolor eſt, & cùm
iam gaudia gliſcunt,
Quippe etenim licet è rebus agnos-
cere apertiſ.
Irritata canum cùm primum magna
molofum
Mollia vieta fremunt, ſuuos nu-
danis dentes,
Longè alio ſonitu rabie diſſerta
nuntiant:
Et cùm iam latrant, & vocibus om-
nia complent.

Non om-
nis ſermo
vox eſt.

Vox ani-
malibus
cur data.

Vox arti-
culata.

An etiam
ſit bruto-
rum,

*At catulos blandè cum lingua
lambere tentant,
Aut ubi eos iactant pedibus mor-
susque petentes,
Suspensas teneras micuntur denti-
bus haustus,
Atque alio pacto ganniti vocis
adulant,
Et cum deserti baubantur in adi-
bus, aut cum
Plorantes fugiunt submissi corpore
plagas.*

Verùm de humana voce hìc agere nobis propositum est. Et si verò vox ex aëris è pectore efflato fiat: tamen non quilibet efflatio vocem parit. Si enim sit illa lenis, saltem sit exspiratio sine voce, vt verò vox fiat, vehementiore efflato opus est. Neque tamen omnis vehemens efflatio vox est: neque tussis propriè vox nominatur, sed quæ sit anima & voluncate dirigente ad sensus animi patefaciendos.

*Materia
voci.*

Materia autem vocis aut aër, seu spiritus, qui exspirando emittitur & ad organa vocis alliditur.

*Organa
voci.*

Organa verò vocis & sermonis formandi quod attinet, equidem ad aërem efflandum etiam requiritur pulmo, & musculi thoracis, vt & arteria aspera, quæ aëri transitum præbet: Verùm propria instrumenta vocis edendæ non sunt.

Quod primò ex eo patet, quod si infra caput arteria incidatur, exspiratio quidem fit, sed non vox editur quæ non fit, nisi aër per asperam arteriam caput seu laryngem, & quidem per eius rimulam, emitatur. Atque ita larynx proprium, & primum organum vocis formandæ organum est. Atque idem etiam rerum opifex laryngi varios musculos tribuit, vt

prohibitu eius rimula dilatari & contrahi possit. De cuius constitutione artificiosissima videantur Anat. & inter eos præcipuè Hieron. Fabr. ab Aquap. l. de laryng. & vocis organ. Et si verò vocis organum primum sit rimula illa laryngis, seu *pharynx* tamen ad vocem articulatam & in primis sermonem formandam non sufficit illa aëris è pulmone per rimulam laryngis efflatio, sed præterea requiritur gurgulio, qui inde plectrū vocis nominatur, lingua, palatum seu oris cælum, quod appellant, dentes. Vnde videmus, si harum partium aliqua deficiat, vel viciata sit, vt gurgulio præfectus, seu erosus, lingua præcisa, seu alio modo viciata, si palatum vlcere perforatum, si dentes elisi sint, seu inciderint, ex his omnibus vitium vocem vitari.

Differentia.

Sunt autem varæ voces differentia. Aliæ quidem naturales voces, vt sunt magna, seu grandis & parua, lenis, aspera, acuta, grauis, de quibus non nostris instituti, sed Physiici est agere: Aliæ voces præternaturales, cuius etiam differentia multæ ab antioribus recensentur, & ab aliis aliter. Verùm commodissime voces p. n. secundum differentias actionum læsarū distinguantur, quod scilicet vox vel aufertur, vel imminuitur, vel deprauatur. Vocis defectus *aporia* appellatur, cum scilicet homo planè vocē edere non potest: qui verò loqui non potest, mutus dicitur: qui diffculter verò loquuntur, *perplexi* nominantur. Deprauata verò vox est, rauca, obscura, tremula, abrupta, clangosa, de quibus postea in causis dicitur. Pertinet hæc & Balbuties, & omne illud vitium, cum homo sermonem non facit, & non ni-

*Differen-
tia.*

si cum magno conatu, ac crebra hæsitatione inchoare potest.

Causæ

Causæ.

Cum autem ad vocem & sermonem formandum concurrant larynx eius musculi, & qui iis inferuntur nervi recurrentes, aspera arteria; & ad aëris efflationem; pulmo, & thorax cum suis musculis, præterea lingua, luvella, palatum, dentes necessarii sint: vocis & sermonis læsi causæ in his querendæ sunt.

Primo ergo vocem abolitam & interceptam ac imminutam quod attinet, tollitur, seu imminuitur vox, vel principio nervorum affectio, vel vocalibus instrumentis, vel deficiente vocis materia. Vox & sermo aboletur ob cerebrum, nervorum principium; affectum in apoplexia, epilepsia, cerebri concussionem & commotionem; vt & in syncope, & vteri suffocatione ac similibus affectibus, ob quos spiritus aut animalis influxus prohibetur. In primis vero in affectu illo, qui *apoplexia* appellatur, & neque ad apoplexiam, neque ad epilepsiam commodè referri potest, sed inter eos quidam affectus medius videtur.

Quem etsi in praxi sæpè observaverim, vt ex historiis annotatis, quas suo loco proponam, patet, descriptum tamen invenire hæcenus apud Auctores non potui, nisi nuper apud Adrianum Spigelium, lib. 2. de semicr. cap. 16. his verbis: *Est morbus in Germania & Pannonia frequens, quem Austriaci, Morani, & Syri Timorem appellant, inter apoplexiam, & epilepsiam quodammodo ambigens. Cadunt enim velut apoplectici sine sensu, non autem motu privantur, neque tamen convelluntur, sicut epileptici: aliquando ster-*

tunt, nec tamen diffuso morbo paralysin alicuius membri incurruni. Si tamen causæ magna sit vehementia, in apoplexiam vel epilepsiam degenerare potest, tandemque aliquos hoc modo affectus subitò vt apoplecticos mortuos vidi. Talis *apoplexia* etiam proculdubio est, quæ fit ex ebrietate de qua Hippocrates, 5. aphor. 5. Oritur autem ferè à consensu partium infernarum, & vapore narcotico spiritus animales in cerebro sopiente, seu perturbante, & propterea commodissimè inter affectus cerebri refertur.

Instrumentorum vero vocalium causæ vox & sermo aboletur, seu imminuitur, cum laryngis membrana madescit, & humectatur ab humoribus à capite defluentibus.

Deinde si laryngis rimula angustior redditur seu occluditur à tumore, & compressione, vt in angina, & luxatione vertebrarum cervicis fieri solet.

Tertiò, cum musculi laryngem moventes, seu resolvuntur, seu vulnerantur, seu contunduntur.

Quartò, vbi nervi vocales, & quicunque voci edendæ inferiuntur incidentur, divelluntur, interceptiuntur, refrigerantur, aut quocunque modo læduntur. Ita refert Galenus, 1. de loc. affect. cap. 6. cecidisse quandam ab alto in terram, ita vt dorsi initium affligeretur, eumque tertio die exiguum admodum vocem edidisse; quarto die omnino obmutuisse, resolutæ simul fuisse crura manibus illatis, sed neq; spirationem amisisse, neq; difficulter spirasse. Cum enim tota sub ceruice spinalis medulla esset resoluta, accidit thoraci, vt per septum transversum & musculos supernos

numero quidē sex moueretur: quippe nervi ex spinali medulla, quæ in ceruice est, ipsis adueniunt. At intercostalium musculorum nervi per quos exsufflationem fieri diximus, omnes affecti erant. Cū itaque frustra Medici negotium subirent circa crura quidem utpote resoluta, circa guttur verò propter vocis affectum eequidem, id interdixit, atque affecto duntaxat loco curationem adhibuit, proinde finita tandem spinalis medullæ inflammatio, ne à septima die vox restituta est iuueni, & crura motionis facultatem recuperauerunt. *Ibidem* refert fuisse quendam, qui cū ex ceruice strumas in profundo excinderet, ac inter secandum, membranas non specillo diuideret, ne vas aliquod dissecaret, sed vnguibus euelleret, imprudens ob ignorantiam simul nervos recurrentes distraxit, atq; hoc pacto quidem puerum liberauit à strumis, sed mutum reddidit. Aliū pariter in puero strumas secantem læso altero nervo recurrente, ipsum semimutum fecisse. Simile historiam recitat Amat, Lusit. *rem. 2. cur. 70.* Mulier Illyrica, inquit, quæ ad caput montis habitat, cū strumam à Gallica scabie originem ducentem in collo haberet, mendicium quidem officio Medici fungentem pro sua valetudine accersuit, qui indiscretè cū pro ea propulsanda multis vlsus esset medicamentis, ita sublimatum, ut eius ressecaret radices loco indidit, à quo alter nervorum ex pectore recurrentium, qui vocem eilingunt, inibi corrosus est, unde ipsa paulatim raucesfacta vocem ferè in totum amisit.

Quintò, si aspera arteria incida-

tur, etiam vox & sermo perit; cū spiritus vocis & sermoni formando necessarius desit: quod etiam fit, si aspera arteria comprunatur, quod fit in strangulatione.

Tandem ob defectum materiæ vox perit, vel imminuitur, vel ut modò dictum, cū aspera arteria vulneratur, aut compressa spiritui transiitum non concedit, seu ob thoracis musculos resolutos. Eius rei exemplum habet Galenus, 3. *de loc. affect. cap. 1.* de quodam, qui nullo in vocalibus instrumentis vicio existente, sed musculis intercostalibus ob casum ex alto resolutis, vocem amisit.

Idem fieri potest: si iisdem musculi & membrane costas succingens vulneretur & perforetur. Cū enim tum thorax contrahi non possit, vocis etiam materia, spiritus qui efflatur, deest. Nontamen semper ob musculorum intercostalium læsionem vox tota perit, sed solum cū læsio illa magna est. Aliàs enim pro læsionis magnitudine vox saltem ex parte amittitur. Præterea pulmonis vicio idem evenit, qui si sanie vel humore repletus sit, aut aliàs debilis, ut fit in catarrhis suffocariis & tabe, vel valde imminuitur.

Accidit idem cū pauca fit efflatio, & spiritus deficit, ut in deliquio, syncope, veteri suffocatione. Quia verò ad sermonem formandum etiam lingua facit, sermo etiam ob lingue motum impeditum læditur, de quo supra *lib. 1. part. 3. l. 5. l. 7.* dictum. Vnde etiam citra vocis læsionem locutio interdum aboletur; id quod fit in mutis, in priuata resolutione lingue, qui tamen vocem quandā martellum edere possunt, & in hoc ob nervi, qui ad rectam coniuga-

tionem tendit, vitium. Quod si magnū sit, præcipuè si vitium sit à primâ conformatione, auditus tum ferè simul, ob illius cum dicto nervo communicationem, læditur, vnde, plerique qui sunt muti à nativitate, simul surdi sunt. Idem accidit si defluxio aliqua & humor in musculos linguam ac laryngem movētes decumbat. Reliqua videantur *loc. alleg. de motu linguæ impedito.*

Causas vocis depravatæ quod attinet, sunt nonnullæ congenitæ, & à natura quibusdā est vox aspera, quæ cūm propterea à nonnullis interna quibusdā est vox aspera, quæ cūm propterea à nonnullis inter naturales vocis differentias numeretur, saltem de his vocum differentis p. n. agemus, quæ à causis p. n. proveniunt.

Vox rauca.

Er quidem frequentissimè accidit vox rauca, quæ sit à membrana, quæ laryngem & asperam arteriam invelit, p. n. affecta, exasperata, & inæquali reddita. Cūm enim aspera arteria lævis facta sit, & si ea bene sese habeat, vox lenis & moderata edatur. Si illa naturalis lævitas & æqualitas tollatur, inæqualiter etiam aer allisus repercutitur, acque inde vox rauca efficitur.

Hinc causæ inter-
næ.

Accidit hoc primò à nimia humiditate vocis hoc organum irrigante, id quod frequentissimè à catarrho à cerebro delabente, & in organa vocalia irruente accidit, quæ in specie branchus appellatur, de quo Hippocrates, 3. aphor. 15. *Aestate sicca & aquilonia, autumno vero pluviosa & australi vehementes capitis dolores in hyemem incidunt, & tussis, & branchi seu raucedines, & graeco, nonnullis etiā sabbes expectanda.* Deinque idem accidit à tussi vehementi,

qua arteria ob crebram materię reiectionem exasperatur: id quod in phthisicis & thoracis suppuratione accidere solet. Idem præstant humores & vlcera vocalium instrumentorum. Vnde hæ venerea laborantes vocem raucam habent. Atque hæ causæ internæ sunt.

Extremæ

Externæ causæ sunt clamor nimius & vociferatio, quæ similem affectionem membranae laryngis & asperæ arteriæ inducunt lassitudini inflammationis in musculis. Aer quoque frigidus inspiratione attractus, ut & siccus, venenatus, & vaporibus, fumis, & pulvere inquinatus arteriam exasperandi vim habet. Idem præstat potus aquæ frigida, vini vel austeri, vel meracioris, nimius cibus & potus salis, & acres.

Vox ob-
tusa.

Vox obtusa seu tenebrosæ & turbida, ut nonnullis appellatur, sit à pituita crassa & viscida, quæ organis vocis adhærescit, vel abscissione columellæ.

Tremula

Vox tremula fit ex virtutis imbecillitate, cūm ob defectum spirituum natura organa respirationis æqualiter mouere non potest: id quod in quibusdā febribus accidit. Interdum idem euenit, ubi in musculos laryngis, seu linguæ & nervos his inserviētes humor aliquis decumbit, partēque illas relaxat quasi id quod ebriis accidere solet. Fit idem etiam ex timore, cum calore & spiritibus ad cor recurrentibus, tum aliæ partes, tum etiam respirationi & voci edendæ inserviētes his destitute officio suo rectè fungi non possunt: Vnde & qui valde timent, pedibus & manibus tremunt.

Abruptæ

Abruptæ vocis etiam Hippocrates, 4. de rat. vit. in acutis, text. 33. mentionem facit, quam in lib. de Coarct.

prænotionibus, effractam nominat. Habet autem ea ortum ex imbecillitate facultatis mouentis & organorum, qui spiritus efflationi inserviūt. Vt enim si is, qui folles, quibus organa musica inflant, mouet, si debilis, nec æqualiter moueat, sed aliquādiu quiescat, sonus interrumpitur: ita si muscoli: qui aëri, qui vocis materia est efflationi inserviunt, ob imbecillitatem à mouendo aliquādiu cessent, fit vox interrupta.

Tarda.

Vox tarda fit cū humor in spinali medullam & nervos musculis thoracis inserviētes effluuitur, vt liberè thoracem mouere non possit.

Clangosa.

Vox clangosa est subrauca, sed acuta ferè & sonora, qualem pleuraque animalia, quæ collum habent oblongum, vt greges, edunt. Habet ortum hæc vox, vt Galenus, 7. de vsu part. c. 7. 1. præbet. comm. 1. text. 3. & 17. docet à siccitate nimia laryngis & asperæ arteriæ, & defectu humiditatis, qua naturaliter arteria irrigatur, & quasi læuigatur, id quod fit in febribus ardentibus, & phrenitide.

Lupi con-
spedus
vitiatur vo-
cis causa.

Tandem referunt etiam inter causas raucedinis, & vocis vitiatur lupi conspectum, si is hominem obuium prior aspicias: quam vulgi opinionem etiam Virgilius secutus est, dum scribit:

Vox quoque Marini

Iam fugit ipsa: lupi Marini videre priores.

Vnde etiam habet ortum proverbum: *Lupus infabula*, quo utimur, cū is, de quo sermo, superuenit, & ita in præsentia suā sermonem interrumpt: de quo varij variè disputant, & alij aliam huius affectus causam reddere conantur. Verū prius

hic *in*, & an sese res ita se habeat, habet *in* *inquirendum* censeo.

Eandem ferè ob causas sermo & locutio vitiatur:

Causæ ser-
monis vi-
tiant.

1. Quidem ob instrumentorum vocalium & laryngis præcipuè vitium. Nam si vox sese non bene habet, nec sermo bene se habet, de cuius causis modò dictum.

2. Propter motum linguæ impeditum, de quo supra, p. 1. huius libri cap. 9. diximus.

3. Ob labiorum, dentium, palati vitium.

De balbutie & blasitate eiusque Balbutie causis agit Gal. & alij authores, ad aphor. 32. sect. 6. & docet Gelenus, quod *ῥαλλία* & *τραβία* non vocis, sed linguæ vitium sit, cū scilicet lingua eas voces, quæ per T & R scribuntur, articulatè proferre non potest. Idque accidere, quia lingua sit molliore ac humidior temperatū ac constitutione: quam ob causam pueri balbutiunt; cū musculi molliores & infirmiores linguā satis stabilire non possunt, eo modo, vt in ambulando titubant. Inde etiam ebrij balbutiunt.

Signa Diagnostica.

Vox & sermo ac locutio læsa, & quodnam vitium sit, faciliè ab audientibus cognoscitur. Causæ verò signis cognoscendæ. Et quidem externæ faciliè ex relatione ægri atque adstantium cognoscuntur. Internæ etiam suis signis patebunt. Si raucedo sit à catarrho, is adfuit, vel adhuc adest, qui faciliè patet. Si à phthisi seu pure & sanie in pectore contenta, & tūc crebrius recedat raucedo oriatur, etiam signa eius aderunt.

Signa vo-
cis & ser-
monis vi-
tiant.

Ita etiam aliarum causarum, à quibus vox seu aboletur, vel imminuitur, seu deprauatur, signa in morbis, à quibus illa pendente, explicantur.

Prognostica.

Prognostica.

1. Raucedo orta à causis externis seu evidentibus facilius curatur, quam quæ à causis internis fit.

2. Branchi & coryzæ in valde febribus coctionem non admittunt, 2. apb. 40.

3. Vocis vitium, quod fit à columellâ abscessâ vel erosâ, lingua mutilatâ, dentibus elisis vel elaplis, nisi factitij substituantur, non curatur.

4. Ita & motus linguæ inhibitus à ruptione vel contusione nervi non sanatur.

5. Raucedo per annum vel duos confirmata, vix sanatur.

6. Impeditus motus linguæ in pueris superueniente adolescentiâ & iuuentute interdum cessat, absumptis & exsiccatis superfluis humiditatibus.

7. Balbi alui profluvio maximè corripimur, 6. apb. 32.

8. Raucedines, quæ ob suppurationem vel tabem fiunt, ferè mortem futuram indicant.

9. Cum voce tremula alui præter rationem solutio in morbo acuto lethalis. Cum enim vox tremula fiat ex insigni debilitate virium, si alui profluvium accedat, vires magis decit.

10. Voces clangosæ malæ, & vacillatio mentis cum voce clangosa, linguæque convulsiones cum tremore, & voces ipsæ obtumescences mentis alienationem significant. In Coacis.

11. Vox effracta ex hypercatharsi ob musculorum thoracis convulsionem periculum portendit.

12. Aquis cum singulta pessima, 1. prorrh. comm. 1. text. 23.

Plura ex voce vitiata in febribus prognostica videantur apud Hippocratem, in Coacis prænot. & libris prorrheticis.

Curatio raucedinis.

Cum vocis & abolitæ & diminutæ ac depravatæ varix causæ sint, etiam curatio varia pro causarum varietate instituenda. Cum autem morbi illi, à quibus vocis & sermonis vitia pendente, iam ante explicati sint, pauca hic dicenda restant.

Etenim si cerebri vitio malum hoc accidat, curatio ex iis, quæ lib. 1. de apoplexia & paralyti explicata sunt, pariet.

Cæterum quoque supra, lib. 1. cap. 9. de linguæ motu impedito, cuiusque causæ & curatione actum. Dictum ibidem de faucium & dentium morbis: parte verò secunda, de asperæ arteriæ, pulmonis & thoracis morbis. Quos qui curaverit, simul & vocis & sermonis vitia, quæ ex iis morbis pendente, tollet. Ideoque saltem quædam de raucedinis curatione hic adiciemus, cum vox obtusa & similes eandem ferè curationem habeant. Vox verò clangosa, cum febribus acutis coniungatur, ab earum curatione & citius suavi curatio dependet.

Primo ergo si raucedo à catarrho dependeat, irrigante & inæquali reddente vocis organa, primo danda opera, ut catarrhus remoueat, quo præsentem vix raucedo tolli potest. Quæ ratione autem catarrhus curari debeat, dictum, lib. 1. par. 2. cap. 34.

Deinde danda opera, ut asperitas

& inæqualitas à catarrho inducta tollatur, & præcaueatur, ne, si catarrhus adhuc fluat, ab eo amplius vocis organa exasperentur: quod præstant medicamenta Arteriaca ab usu dicta.

Si ergo catarrhus sit frigidus & tenuis, medicamentis calefacientibus, siccantibus & lenientibus opus est, ut diatragacantho calido, melle rosato cum syrupo myrtino mixto, succo glycyrrhiz. amygdal. dulcibus.

Si verò materia sit crassa & viscida, incidentia, abstergentia, simulque lenientia & vocis instrumenta læugantia requiruntur: quæ parantur ex caricis, visis passis, melle, hyssopo, glycyrrhiza, succo brassicæ cum melle mixto, thure, myrrha, croco, terebinthina, saccharo penidio, cubebis cum passulis tritis mixtis. Et si pituita sit viscida, etiam oxymel scilliticum admisceri potest. Conuenit etiam hic lohoh sanum & expertum, de albara, de pino, de caulibus, syrup. de glycyrr. de hyssopo pilulæ seu trochisci de benzoë.

Vtile etiã est & sequens eclegma.

℞. Succ. prassij bene depurati ℥. ij. sacch. penid. ℥. j. oxyme. f. vel si maiori incisione opus sit, scilicet. q. f. F. lantile.

Vel *℞. pomum, & seminibus exemptis repletur myrrha, croco, thure, & assetur, ac manè & vespere comedatur.*

Vel *℞. Succ. glycyrrh. ℥. β. croci, ℥. j. myrrh. thuris, an. ℥. j. β. gummi tragacanth. Arab. an. ℥. iij. carnis trisum dactylorum, vini dulcis q. f.*

F. pilulæ sublingua tenendæ.

Syrup de Matthias Lobelius syrupam de erythimo, quod laudatissimum arce-

riacum nominat, commendat, scribitque se eius usu iuuenulam, decennali rauedine laborantem curasse, & alios diuturna & prope inuicta rauedine laborantes erysimi usu restitutos fuisse.

℞. Erysimi totius recentis M. vj. rad. heleny, tusisilag. succo adhuc pregnantium, glycyrrh. an. ℥. ii. borrag. cicbor. capill. Ven. an. M. i. β. flor. cordial. anib. stach. vel beion. an. M. β. sem. anisi, ℥. vi. passul. mundat. ℥. ii. Coqu. in f. q. aq. bordei, & hydrom. & succi erysimi, ℥. vi. ad tb. ii. vel iij. Colaturæ adde sacchari q. f. Fiat syrupus.

Vel *℞. Rad. glycyrr. albae, an. ℥. iij. iros, fol. erysimi, M. iij. tusisilag. prassij recentium, an. M. ij. sem. psyllij. cydonior. an. ℥. β. inub. N. xij. passul. annulat. ℥. ii. cubabar. ℥. i. β.*

Coquantur, & cum f. q. sacchari. Fiat syrupus.

Quod si catarrhus sit calidus & tenuis, frigida incrassantia & lenientia requiruntur, ut diatragacanth. frigid. conserua rosar. viola. diacodium, syrup. & lohoh de papauere, syrup. rosar. violar. de iuiubis myrtinus.

Si à pure in pulmone contento A partu rauedine ortum habeat, ad morbum quidem præcipuè cura dirigenda; simul tamen lenientia & læugantia asperam arteriam modò enumerata usurpanda.

A causis externis sit rauedine, iuss. A causis que siccantibus & calefacientibus, exictus, Leuiter itaque refrigerantia & lenientia usurpanda, ut diatragacanth. frigid. conserua rosar. viol. syrup. & lohoh de papauer. de iuiub. & & similia,

Si ab aëre, potu vel aliâ causâ frigida, calefacientia, modò in rauedine

à picuita proposita, vsurpanda.

Tandem si à nimia vociferatione, clamore & vocis intensione sit excitata rauco, conueniunt hîc medicamenta Arteriaca dicta, quod scilicet peculiariter asperæ arteriæ & laryngis affectibus conueniunt. Parantur autem ex amylo, tragacantha, gummi Arabico, glycyrr. sacch. cando & penidio, pallulis, dactylis, iuiubis, sebesten, amygdal. dulc. mucilag. althææ: vnde sunt syrapi. iuiubinus, capill. ♀. de althæa, de glycyrr. & similia.

Vel ℞. *Mucilag. sem. alib. 3. i. b. conserr. viol. 3. iii. amyli, 3. ii. sacchar. in aqua rosar. solut. q. s. F. Lohoh.*

Vel ℞. *Tragacanth. gummi Arab. an. 3. i. syrapi. iuiub. viol. an. q. s. mucilag. sem. alib. 3. ii. F. Lohoh.*

Atque hæc in primis in principio conueniunt. Vbi rauco iam imminuitur, vt humiditas in parte relicta absumat, exsiccantibus, discutientibus & extergentibus, sed sine acrimonia, opus est. Qualia parantur ex terebinth. melle, amygdalis amaris, inde, styrace, croco, myrrha.

Vel ℞. *Gummi iuiuper. tragacanth. an. 3. i. sacch. penid. 3. i. succi glycyrr. 3. ii. thuris, 3. i. b. styracis. calamin. 3. i. croci, 3. i. euuomelle. F. elegina.*

Vtile etiam est elegina de succo brassicæ antea propositum.

Vel ℞. *Hord. excors. pass. ennel. an. 3. i. glycyrr. b. 3. ii. cariear. pinge N. vi. capill. Venetis, byssop an. M. i. sem. brasie. 3. i. pimarum non rancidarum, 3. b.*

Coquantur in s. q. aquæ puræ.

Colaturæ pro qualibet libra adde *melle assumati, sacch. albi, ap. 3. vi.*

Misce, de quo sæpius aliquid bibendum.

Plura videantur apud Galenum, 7. de comp. medic. sec. loc. cap. 1. Aëritium, terrabl. 2. sermon. 4. caput. 51. & 52.

CAPVT V.

De Tussi.

Tussis.

AD deprauatos organum vocis respirationis motus tussis quoque pertinet, atque inter eos motus est tussis, qui quidem à naturâ sunt, irritatâ tamen & coactâ, atque à causa morbificâ stimulata ad expellendum id quod molestum est, cuiusmodi motus habetur oscitatio, pandiculatio, sternutatio, singultus, vt docet Galenus, lib. 2. de causis sympt.

Est nimirum tussis motus deprauatus seu vehemens efflatio, à veloci pulmonis & thoracis contractione edita, vt id, quod spirandi organis molestum est, excutiat. Seu vt Auicennas definit: *Tussis est motus Naturæ, quo conatur expellere, quicquid ladit, è partibus pulmonis, & partibus proximis pulmonum.* Sicut enim in sternutatione cerebrum, in singultu & vomitu ventriculus: ita in tussi thorax insurgit, & plurimo spiritu in pulmonem immisso, forasque iterum celerrimè explosio, atque impetu quodam id, quod molestum est, expellere conatur. Etenim aspera arteria, & eius ramuli per pulmonem sparsi tunicâ intus obducti sunt, cui exquisita vis inest sentiendi ea, quæ molestiam pulmonem creant, ita vt minimum quodque in asperam arteriâ illapsum statim sen-

Definitio.

tia. Atque ita tussim nihil excitat, nisi quod hanc membranam, quæ intus asperam arteriam, cuiusque ramus inuestit, afficit. Sic igitur irritatus pulmo non solum ipse mouetur, sed & in auxilium musculos thoracis & diaphragma sibi adsciscit, & quod sibi molestum est, expellere nititur.

Causa.

Causæ.

Atque ita causa proxima tussis est, quicquid pulmones, asperamque arteriam, & quidem membranam, qua intus inuestiuntur, afficere potest. Quæ autem id præstant, causæ sunt varæ, ut mox dicemus. Ad duo tamen genera referri possunt. Vel enim hoc præstant, quia angustiam in respirationis organis pariunt, vel quia mordicant, asperitatemque inducunt, atque adeò quocunque modo molesta sunt.

Causas verò omnes tussis, seu angustiam pariendo, seu irritando quocunque modo id præsent, in classes quasdam digereimus, & ordine enumerabimus.

Et i. inter causas tussis est intemperies, & quidem sola ac sine materia etiam tussim excitare potest, sed leuiorem, quam quæ est cum materia. Et frequentissimè quidem & maiorem tussim parit intemperies frigida, utpote quæ pectori maxime inimica est, quæ excitatur ab ære frigido, de quo Hippocrates, 3. aphor. 23. *Hyeme morbi laterales, pulmonis inflammationes, rauedines, tussis sunt, & ibidem, aphor. 5. Aquilo tussis mouet*: potu aquæ frigidæ, & præcipuè ex niue solutâ, medicamentis frigidis seu assumptis, seu thoraci applicatis. Excitat etiam tussim

intemperies calida, sed minorem, qualis est, quæ febribus ardentibus superuenit, quæque, ut est apud Hippocratem, 6. epidem. sect. 2. text. 24. est arida & parum irritans, & quæ non fit, nisi quando loquitur aut hiat.

Quando autem non loquuntur neque hiant, non tussunt. Siccitas autem præcipuè cum frigidityte coniuncta exasperando & irritando tracheam tussim excitat. Hinc, ut Hippocrates, 3. aphor. 5. scribit, Aquilo tussis mouet fauces exasperando, & ut Paulus Ægineta, lib. 3. cap. 28. docet, in Aquilonaribus constitutionibus non paucæ, neque cõtēnendæ tussis sunt. Humiditas autem, ut qualitas minimè omnium actiua, & quæ potius lenit, quàm exasperat, vix tussim inducit, nisi forsân inæqualiter primum inducatur, ubi breuiter leuissimam quandam tussicillam excitare potest, quod tamen rarum. Et dictum est supra de causis, quæ intemperiem pulmonis inducere possunt.

Deinde tussim excitat materia quæcunque in pulmone in & asperam arteriam incidit, aut in ea præter naturam continetur. Materia autem hæc varia est, catarrhus nimirum à capite defluens, atque ita omnes causæ, quas supra, lib. 1. catarrhum excitare posse diximus, etiam tussim excitare valent: ut & humoraliquis in cerebro collectus, qui per accessiones febrium mouetur, & à calore febrili funditur, de quo Hippocrates, in Coacis: *Quæ circa accessiones tussium, & lenius resudant, malignè habent*. Et, ibidem, *ex insania in rauedinem cum tussis abscessus*. Sicut & materia parotidea excitans: de quo idem Hippocrates,

eodem libro, & in prorrh. Abscessus ad aures solunt tussicula cum spurationibus. Idem efficit sanguis è vase in pulmone rupto fluens, vel è vicina aliqua parte vulneratâ vel erosâ in pulmone irrumpens. Item humor in pulmone collectus in phthisi, peripneumonia, & vomica pulmonis, vel alius vicinis partibus communicatus, vt in pleuritide & hydrope pectoris fieri solet. Pertinent huc & grandines, calculi, ac vermiculi in pulmone geniti. Idem præstant etiam res externæ in trachæam illapsæ.

Cum enim spiritu, quem trahimus, diu carere non possumus, organa, per quæ ille admittitur, vacua esse decet. Ideoque ne aliqua substantia præter aërem in asperam arteriam eiusque ramos per pulmones dispersos ingreditur, caput asperæ arteriæ epiglottide, seu operculo quodam Creator sapientissimus, munivit, vt sic quidam aëri ingressus pateat, à cibi verò potûsque pondere depræssum esculentis & potulentis aditum denegat, vt Galenus, 4. de usu part. cap. 3. docet. Quod tamen si fortuito fiat, vt interdum inter loquendum & ridendum, & infantibus inter lac sugendum accidere solet; periculum suffocationis inde imminet, à quo vt natura sese liberet, vehementissimam tussim excitare, nec prius desistere solet, quam emne id, quod molestum est, excusserit.

Tertio inter causas tussis est soluta vitas vasorum in pulmone, siue illa sit vulnus, siue vlcus & erosio.

Quarto excitatur tussis, dum in pleuritide materiæ aliquid ad pulmones mittitur, vel ob membra-

rum consensum pulmones irritantur. Pertinet huc diaphragmatis inflammatio & tubercula in spina enata, quod gibbis familiare est, teste Galeno, 6. aph. 46. Imò ipsa luxatio vertebrarum docti.

Ex quibus omnibus colligitur, tussim propemodum omnium thoracis, & pulmonis morborum symptoma inseparabile esse, vt pleuritis, peripneumoniæ, vomicæ pulmonis, sputi sanguinis, phthisis, & similibus.

Causæ verò extra pulmonem & thoracem consistentes, & quæ ita per ~~vuln~~ tussim efficiunt, etiam variæ sunt.

Quinto nimirum tussis excitatur hepate, liene, ventriculo intumescente aut inflammato, vt & in hydrope, siue id fiat, quod pulmo comprimatur, siue quod obstruitur, aut molestat à materia ad pulmonem redundante, siue quod partium vicinarum membrana afficte membranas organorum respirationis in consensum trahunt & vellicant, siue quod vapores aliqui ad organa respirationis transmittuntur, eaque siue obstruunt, siue mordicant, id quod etiam interdum in febris accidere solet.

Externæ tandem causæ variæ sunt.

Sexto enim præter aëtis intemperiem, vt & potus ac medicamentorum qualratem, quæ asperæ arteriæ intemperiem inducunt, tussim excitare valent causæ aliæ quoque externæ, irritando & exasperando nimirum asperam arteriam, vt si mus, pulvis, & vt Auenthois, 3. coll. capite proprio monet, præcipue pulvis ex lino, dum pectinatur, & ex veteri tritico, dum cinbro excutitur. Pulvis item & vapor calidis, & metallorû ac mineraliû. Quod pecti-

Externæ

nent austera, acida, astringentia, pingua & rancida præcipue, vt nuces & oleum rancidum. Vocis item intensio nimis. Referendi huc & lumbrici ac vermes in intestinis & ventriculo geniti, qui ipsi etiam tussim excitant, vapores, vt nonnullis placeat, putridos & malignos ad pulmones mittendo, vel, quod probabilius est, membranam œsophagi vellicando, quæ membranam asperam arteriam inuestientem in consensum trahit. Profundior etiam styli purgatorii in aures immisso tussim excitat, communicatâ scilicet hac irritatione tracheæ per nervulum quinti paris utriusque parti communem.

Differentia.

Differen-
tia.

Primo est tussis differentia secundum magnitudinem. Nam datur tussis quædam planè exigua, aut potius ad tussendum quidam impetus, & tussendi initium, quod Græcis *σπῆξις* dicitur. Vt enim vomitum nauseæ præcedit, ita tussim *σπῆξις*, vt docet Galenus, de differ. sympt. c. 4.

Deinde tussis alia est arida & sicca, quæ *καλὴ* facit, nec pituitam citat, vt Celsus, lib. 4. cap. 4. habet: alia verò humida. Sicca seu arida est, in qua nihil exspuitur, atque fit hoc, vel quia causa, quæ tussim excitat, non in organis respirationis hæret, vel licet ibi hæreat, inepta est ad excretionem. Prius accidit, cum aspera artetia vel intemperie afficitur, vel exasperatur, vel membrana asperam arteriam & eius ramos inuestiēs vellicatur à vaporibus ab inferioribus ascendentibus, siue comprimitur, aut à vicinis membris affectis in consensum trahitur, vel tenuis paucûsque

humor à capite destillat, aut aliunde transsudat, vt Galenus, 4. aph. 37. docet.

Posterior verò accidit, ubi in respirationis instrumentis humor hæret, qui eici non potest, vel quia ob lentorem & crassitiem bronchiis pulmonis nimis tenaciter adhæret, vel quia ob tenuitatem intereiciendum disploditur à spiritu, vt & in pulmonem relabatur, vt Galenus, 1. epid. comm. 1. text. 12. docet. Humida tussis est, quando humor aliquis tussiendo eicitur, atque oritur ab aliqua mediocri consistentiæ materia pulmones & tracheam irritante, quæ cum spiritu tandem expellitur.

Tertiò tussis aliqua vehemens est, quæ suppressi nequit; alia mitis. Vehemens Hippocrati, 1. aph. 17. & 24. *σφοδρὴ* nominatur, atque oritur ab humore magna vi destillante, vel vlcere organa respirationum obsidente, vel ab abscessu genito ibidem, vel ab empyemate.

Mitis fit ab intemperie organum respirationis; vel ab asperitate faucium & tracheæ, vel à pulvere, & aliis exasperantibus, vt & ab ambiente aëre, vt docet Galenus, 6. epid. comm. 2. aph. 24.

Quarto tussis quædam molestat: & ferè continuò ægrum affligit, quædam per certa intervalla corripit, prout causa tussim excitans nunc semper præiens est, nunc per intervalla colligitur & recurrit.

Verùm præcipue & ad curationem maximè cognitu necessarie sunt differentie, quæ à causis desumuntur. Ideoque secundum causarum differentiam postea etiam curationem in cætera quædam capita distinguemus.

Signa.

Signa Diagnostica.

signa.

Tussis ipsa adeo evidens symptoma est, ut signis ad eius cognitionem opus non sit. Verum cum causæ, à quibus excitatur, varix sint, omnino signis opus est, quibus illæ cognoscantur, ne Empiricorum more cum ægri damno cuilibet tussi quodvis remediū applicetur. Signa ergo causarum, ut supra eas recensuimus, explicabimus.

Ab intemperie nuda primò si sit tussis, abest catarrhus, alique morbi, qui materiam tussis causam suppeditant, vel etiam in consensum pulmonem trahere possunt: contra præcesserunt causæ, quæ intemperiem aliquam pulmonis inducere potuerunt, quæ ipsæ etiam, *hoc capite*, & supra, *part. 1. huius libri*, de intemperie pulmonis enumeratæ sunt. Adeest difficultas spirandi, tussis ipsa est sicca, nec ita vehemens & pertinax, faciliè quoque supprimitur.

Qualis autem intemperies sit, causæ imprimis, quæ præcesserunt, vel adsunt, indicabunt, iuvantia item & nocentia. Etenim si à frigidityte solà sit tussis, cohibito spiritu non solum reprimitur, sed & sanatur. Auctus enim tum in organis respirationis calor intemperiem illam corrigit, ægrotique aliis etiam calidis, ut potu & cibo, iuvantur, frigido offenduntur. Ideoque ægri calidum aërem amant, & linteolo manibus, & ori admoto, spiritum trahunt, ne mox frigido aëris impulsu tussis irritetur, ut hac de scribit Galenus 6. *epid. 2. com. t. 24*. Sitis etiam abest in hac intemperie.

Contrà si tussis sit ab intemperie calida, sitis molesta est, quæ potius

aëris frigidi inspiratione, quam potu frigido sedatur, ut docet Galenus *art. med. cap. 64*.

A catarrho tussis proveniens, è signis catarrhi supra, *lib. 1. propositis*, patet, tussisque est vehementior & perseverans. Si verò absque catarrho à materia in pectore contenta tussis concitetur, aderunt morbi tales, ut pleuritis, peripneumonia, empyema, phthisis, grandines, calculi, vermes, hydrops pulmonis, & similes morbi, in quibus materia tussim excitans colligitur, qui supra, *part. 1. huius libri* explicati sunt.

Quæ tussis quibusdam interuallis, ut bis terve anno affligit, ex irruente destillatione proficiscitur: quæ verò continenter, aut minimâ intermissione fatigat, aut vitiosam pulmonum affectionem, aut obstructionem veterem, aut aliam stabilem intus causam habet.

Si verò asperitas à causis externis inducta sit, ut à fumo, pulueribus, cibis vel medicamentis exasperantibus, illæ per se patent. Si tandem morbi extra thoracem, pulmones in consensum trahendo quocumque modo tussis causa sunt, ut hydrops, ventriculi, hepatis, lienis tumores & inflammationes, affectus illi ex suis signis patent.

Prognostica.

1. Tussis frequens & diuturna pleurumque ad sanguinis sputum perducit, teste Avicenna, propter vehementem thoracis motum, à quo ruptura vasorum pulmonis metuenda est; ac præsertim in adultis, quorum membra duriora concussionis violentiæ non ita cedunt. Quod si materia tussis non eiciatur, intus putrescens vel febrem putridam aut hecticam gignit, vel vlcus

Prognosticum.

excitat. In prægnantibus talis tussis abortum ciere solet.

2. Tussis vehemens interdum suffocat, non tam re aliqua obstruente, quàm iteratâ sine intermissione validâ efflatione, & quod aër inspiratus prius quàm ad cor perveniat, è pulmone mox iterum eliditur.

3. Tussis valida pectoris pulmonique partes calefacit, ideoque febrem accendit, & sitim auget. Quæ verò exiguæ tussis sunt, ac per longiora intervalla excitantur, tantisper membra illa concutiunt, donec ab ea humiditas aliqua irruens deferatur, quo fit, ut ægri intus sicculosi reddantur. Galenus, 6. *epid. text. 24.*

4. Tussis caput nihil juvat, Galenus, 2. *de sympt. causis cap.* 4. ac si violenta fuerit, ipsum replet, 6. *epid. s. 3. text. 18.* Neque enim ut sternutatio motum cerebri in expellendo juvat, sed ipsi potius nocet.

5. Tussis ex intemperie organorum respirationis periculosa equidem non est. Negligi tamen non debet, sicut exemplo docet Galenus adolescentis, qui ex tussi à causa frigida dimidiam heminam sanguinis reiecit, 5. *metb. med. cap. 13.*

6. Tussis ex catarrho periculosior est, quàm ab intemperie nuda, & si frequens ac diuturna sit, ad sanguinis sputum sæpè deducit, teste Auicenna: imò experientiâ, propter vehementiorem thoracis motum, à quo ruptura vatorum pulmonis metuenda est, præsertim in adultis, quorum membra duriora motui violento non cedunt, aut si materia tussi non reiciatur, intus putrescens vel febrem, vel vlcus, & hinc phthisin generat. Periculosa etiam est tussis, si ma-

teria è capite destillans tenuis & acris est. Nam siue retineatur in pulmone, intus putrescens pulmonem erodit & exulcerat, siue eniciatur, tussis violenta metum affert, ne vas aliquod rumpatur. Galenus, 6. *epid. com. 3. text. 18.* Ideoque diligenter est laborandum, ut destillationes tales acres à pectore auertantur, ne hominem in tabem deducant.

7. Tussis etiam à catarrhis in senibus periculosa sunt; quoniam in iis non maturantur. 2. *apb. 40.* & ut Galenus inde rectè colligit, eos usque ad mortem comitantur.

8. Hydropsi si tussis superueniat, malû 2. *apb. 35.* Serosa enim humiditas ita tum augetur, ut contineri tota in abdomine nequeat, sed pars quædam in thoracem, & asperas pulmonis arterias transponatur.

9. Tussis, quæ ex vicinarum partium consensu oritur, per se periculosa non est, sed sublatiis illis morbis earumque causis, tollitur.

10. Tussis à fumo, vel alia causa asperæ arteriæ inæqualitatem & asperitatem inducente absque periculo est, & sæpè causa ablata cessat.

11. Tussis infantium diuturnæ & vehementes deterrimæ; quoniam respirationem & somnum impediunt. Sæpè etiam ex multâ agitatione febres acutas & epilepsiam excitant. Non raro denique herniam.

12. Qui gibbi ex asthma & tussi ante pubertatem sunt, ij statim moriuntur, 6. *apb. 46.*

13. Tussis in febribus abscessus futuros sæpè prænunciant, non quod ipsa materia ex pectore ad articulos decumbat, sed potius quod febres, quæ tales tussis habent comites, in abscessus terminantur;

de quo vide Hippocratem, 2. epid. f. 2. & Galenum, in com. ubi verba enarrat: *Qui tussi parum & nihil notabile reiciebat, et manus dextra & cruris sinistri resoluti sunt.*

14. Tusses id febribus cum destillatione coniunctis quando exacerbantur, febriles accessiones instare indicant, & aliquando malum significant, ut Hippocrates docet, in Coacis, dum scribit: *Qui circa accessiones tussint, ac leniter desudant, maligne habent*; ij scilicet, qui vehementer tussunt, ita, ut tussi vehementi vires deiciantur, sonusque turbetur, ex fatigatione magna circa collum & frontem sudare incipiant.

15. Febres cum tussi si solvantur, tussis verò remaneat, recidivæ periculum minantur.

Indicationes.

Indica-
tiones.

Ad duo in omnis tussis curatione attendendum, primò ad causam, quæ tussim excitat, secundò ad ipsam tussim. Causæ tussim excitantes cum variz sint, ut ex iis, quæ de causis dicta sunt, patet, quælibet etiam peculiarem indicationem suppeditat. Intemperies nimirum per contraria alteranda; si à catarrho sit tussis, curatio catarrhi modo, lib. 1. descripto instituenda. Si à materia circa catarrhum in pectore hærente, ut pure, grandine, vel venenibus fiat tussis, materia illa elicienda. Si à causa externâ exasperante tussis proveniat, causa illa amovenda, & aspera arteria læuiganda. Si à partium vicinarum morbis, & pulmonis seu compressione, seu irritatione fiat tussis, morbi illi conueniente modo curandi.

Ipsam verò tussim quod attinet, etsi, ut alia symptomata, etiam commodissimè tollatur causa sublatâ, & propterea similis sit tussis, ipsa neglecta à causæ ablatione curationis initium faciendum sit: tamen sæpe tussis tam vehemens est, ut omnè curationem Medicique consilium ad se trahat, & postposita causa, ipsi statim succurrendum sit: id quod sæpe accidit, cum tussis tam vehemens est, ut ne vasa rumpeantur, metuendum sit, aut ne à continuis vigiliis febris accendatur, aut timendum sit, ne in grauidâ abortus, aut in infante rupturâ accidat. Tum igitur danda opera, ut tussis sedetur.

Tussis, quatenus salis, curatio.

Cum verò tussis illa vehemens sit ab asperitate aliqua in aspera arteria, eiusque ramis, & irritatione organorum respirationis, quæ naturam ad expulsionem stimulat, duobus omnino modis tussis mitigari potest; vel asperitatem leniendo & læuigando, vel sensus acrimoniam obviando, & quasi sopiendo. Prius præstant pægorica, aut lenientia dicta medicamenta, quæ lentore quodam viarum respirationis asperitatem æqualem reddunt, qualia sunt, lactis omne genus, amyllum, præisana, oleum amygdalarum dulcium, tragacantha, gummi Arabic. mucilag. sem. cydon. psyllij, syrupus de iuiubis.

Sensus verò acrimoniam retundunt & tollunt papauer, & medicamenta ex papauere parata ut syrup. de papau. & diacodion; ut & ex opio confecta, quæ somnū inducunt, & sensus acrimoniam abdundant

Curatio
tussis,
quatenus
salis.

qualia sunt, theriaca recens, Philonium Roman. pilula de cynoglossa, trochisci de carabe, laudanum opiatum.

Curatio tussis ab intemperie.

Curatio
tussis ab
intempe-
rie.

Qua ratione intem, eries tracheæ & pulmonis curanda sit supra part. 1. huius libri cap. 1. & 2. dictum, quæ omnia etiam in hac tussis specie curanda locum habent. In tussi nimirum ab intemperie frigida aër, in quo versatur æger, sit calidus, spiritus retineatur, ut ab eo pulmones incalescant, cibus & potus sint calidi, atque in primis utile est vinum generosum subdulce. Exhibeatur succus de glycyrrh. & de hyssopo. Topica pectori applicentur, pectusque inungatur oleo chamæmelior. albor. & similibus Eodem modo intemperies reliquæ curentur, vel loco allegato dictum.

Curatio tussis à Catarrho.

An catarrho.

Qua ratione catarrhus seu materia ad pectus ruens euacuanda, auertenda, deriuanda, interceptienda sit, supra, lib. 1. de curatione catarrhi, dictum. Frustrà enim in tussi curandâ laboramus, nisi catarrhus eius causa prius sistatur & tollatur. Hic ergo nihil aliud restat, nisi ut dicamus, quid materia, quæ in pectus illapsa est requirat.

Cùm autem materia illa sui euacuationem indicet, compertum quidem est, materiam è pectore etiam per urinam & aluum euacuari posse: verùm id rarissimè & in aliis potius pectoris affectibus, quàm tussi accidit. Ideoque nullus alius commodior modus est, quàm ut materia in pectus illapsa per tussim reiciatur.

Medicamenta autem quæ hoc præstant, inæqualitatem & asperi-

tatem leniunt & humectant, & humores ad expulsionem aptos reddunt, viasque disponunt, ut minore cum dolore reiciantur; sopitam item & inibecillam facultatem ad eiiciendum per tussim materiam stimulant, quæ medicamenta à propinad & à xina nominantur, quæ tamen pro diuersitate materiæ habent aliquam varietatem.

Syrupus catarrhalis vel pectoralis
D. Casp. Kegleri.

℞. Rad. polypod. ʒ. i. b. glycyrrh. rasæ, sarsapar. an. ʒ. vi. herb. saluia, hyssop. betonic. an. M. ii. prassij, M. i. b. sem. 4. frigid. mai. excoct. cōquass. ʒ. b. bombac. ʒ. iii. passular. enuel. ʒ. i. b. schæsten, ʒ. ii. inuiar. ʒ. i. caricar. N. vii.

Syrupus
catarrha-
lis D.
Casp. Ke-
gleri.

Bulliant i. a. in aq. bord. ad tertias, Circa finem, add. sol. sena Alex. f. ʒ. ii. zingib. ʒ. b. agar. rec. ʒ. iii. turbit. guim. ʒ. ii.

Huius colaturæ clara ℞. lb. iii. posita add. sacch. candi, lb. i. croci, ʒ. i. Denovo coq. parum ad tyrim. consistentiam.

Vltimò depuretur per residentem & clarificetur.

Aqua catarrhalis.

℞. Herb. veronic. scabios. an. M. i. Capill. Veneris, hyssopi, adianth. nig. fragar. meliss. an. M. iii. rad. vreas, angelic. eryng. glycyrrh. an. ʒ. i. myrrhæ, ʒ. li. croci integri. ʒ. ii. piperris alb. ʒ. i. caricar. N. viii. scilla præp. ʒ. ii. passular. min. ʒ. i. iii. sem. lini, sarnigraci, an. ʒ. iii.

Infund. cum spir. vini puriss. lb. vij. aq. fragor. scabios. an. lb. i. aceti vini, ʒ. i. Distillentur per M. M.

Curatio tussis à materia calida,
tenui & acri.

Si ergo materia sit calida, tenuis & acris, postè vniuersalia illa

A materia
calida, te-
nui &
acri.

præsidia euacuantia, reuellentia, inter-
trecipientia, & catarrhum sustinentia,
viendum est medicamentis refrigeran-
tibus, humorem incrassantibus, acrimo-
niam eius obtundentibus, atque omnino cum concoquentibus,
& ad mediocrem quandam crassiti-
em redigentibus, & ad exclusionem præ-
parantibus, arteriamque asperam lenientibus. Cum enim, ut
Galenus, 3. de rat. vi. in acut. 1. 2. ait
aër tanquam manus sit, quæ sursum
humores & pulmonibus effert, spu-
tum, ut non nimis crassum & viscidum
esse decet, quodque visci instar, organ-
is respirationis adhærescat, ita nec nimis
tenue esse oportet. Tenuis enim humor
inter tussendum ab aëre disploditur, &
non eicitur, sed in pulmones relabitur
Galenus, 2. de caus. sympt. c. 4. 6. epid.
f. 3. 1. 4. de loc. affect. cap. 4. 2. de cris.
cap. 10. Talia medicamenta sunt syr-
up. de iusub. de violis, de papau. diacodion
Mouani, mucilago sem. psyllis, cydon.
succus glycyrr. cum amylo, confert. rosar.
& violar. cum bolo Armeno, Emulsio seminis papau. albi.

Syrupi.

℞. Hord. M. ℞. sem. 4. frig. maior.
an. 3. i. papau. albi 3. ii. glycyrr. 3. i.
℞. iusub. N. x. Coq. in f. q. aqua f.
Colat. ℞. 3. x. Add. syr. viol. de
iusub. de pap. an. 3. ii. M. pro 4. do-
sibus

Vel ℞. Iusub. seb. an. N. xv. passul.
3. ℞. glyc. sem. alt. an. 3. ii. cyd. 3. i.
rad. alt. 3. ii. Coq. in aq. bord. f.
Colaturæ ℞. lb. i. syr. viol. de
iusub. an. 3. ii. M.

Alino syrupsus contra tussim.

℞. Rad. tussil. glyc. rafa. an. 3. v. belen. alt. iros. Florent. an. 3. iii. sol. malu. cum radic. capill. ℞. tussil. an. m. i. viol. ver. scab. an. m. ℞. bord. mund. m. i. Ebulliant aliquoties, add. byss. m. i. sem. malu. cydon. an. 3. i. fen. 3. i. ℞. ficum ping. dactyl. an. N. iii. iusub. seb. an. N. v. vinar. pass. b. arillis mund. 3. i. Dequoqu. omnia cum aq. f. ad lb. ii.

Facta colatura cum forti express. add. syr. de glyc. de iusub. an. 3. i. capill. Ven. 3. ℞. sac. cand. albi, 3. i. penid. q. f. Ebulliant ad consistentiam syrupi. Alius.

℞. Rad. glyc. 3. ℞. tussil. 3. iii. alibea, belen. an. 3. i. ℞. berb. capill. Ven. endiu. scabios. an. M. j. sol. insilag. betonic. byssopi, veronic. an. M. ℞. berdei mund. M. j. ficuum, dactylor. an. N. iii. iusub. sebest. an. N. v. passul. sine arill. flor. violar. borrag. eicharii, malua, an. P. i. sem. cydon. malua, cucumer. an. 3. i. Coq. in aq. scab. & tussilag. an. q. f.

Colaturæ ℞. lb. i. & 3. ii. Add. syr. de iusub. de glyc. an. 3. ℞. capill. Ven. 3. i. sacch. cand. penid. an. 3. i. Coq. ad formam syrupi.

Rosula & trochisci sublinguales.

Sublingua teneantur rotule diatragacanth. frigid. diapen. trochisci bechici albi.

Vel ℞. Boli Armeni præp. veri, amyli, 3. i. gummi Arab. tragac. an. 3. ℞. sacc. cand. penid. an. 3. ii. Cum mucil sem. psyll. aq. ros. ext. F. trochisci tub lingua tenendi.

Vel ℞. Conf. diac. Mesue cum sacc. parat. Spec. diatrag. frig. sacch. penid. an. 3. ii. boli Armen. 3. ℞. Cum syr. myrr. aut mucil. trag. F. trochisci sub lingua tenendi.

Vel ℞. Spec. diatrag. frig. 3. ii. bol.

Trochisci
sublinguales.

Arm. 3. B. sacch. in aq. of. solus. 3.
iii. F. rotulæ.

Pastilli, vel trochisci contra tussim.

℞. Pulv. glyc. cl. 3. ii. B. sem. 4.
frig. mai. an. 3. ii. anisi, scā. an. 3. B.
spec. diatr. diatr. an. 3. i. sacc. pen.
3. i. cum infus. trag. cum aqu. hyss.
F. trochisci.

Eclegmata.

℞. Conserv. viol. nymph. an. 3. B.
spec. diatr. frig. diatr. f. spec. an. 3.
B. succi glyc. 3. i. cragac. 3. B. cum
syr. inub. F. Lohoh.

Vel ℞. Cons. ros. viol. an. 3. i. B.
spec. diatr. frig. 3. i. B. bol. Arm.
prep. 3. i. Gum syrup. de papaner. F.
Lohoh.

Vel ℞. Macil. sem. alib. 3. vj.
sem. psylli. 3. iii. amygd. dulc. pincar.
mund. an. 3. B. sacc. pen. amyli. an.
3. ii. spec. diatr. frig. 3. i. gnmui
Arab. succ. glyc. an. 3. B. sem. 4. frig.
maior. an. 3. ii. papau. alb. la. Buc. an.
3. iv. cyd. n. 3. B. cum syr. viol. F.
Lohoh.

Narcoticis non utendum, nisi quando morus est, ne vel vas ruptur in pectore ex vehementi illo, & continuo astringente tussi, vel vigilis continuis febribus accedatur, virgulis deiciantur. Tum enim pilul. de cynog. theriac. rec. Phil. Rom. laudan. opiato vel licet.

Extra etiam inungatur thorax hoc vel simili linimento.

℞. Ol. viol. amygd. dulc. an. 3. ii.
mycel. sem. psyl. cum aqu. ros. ext. an.
3. B. cera alba. q. f. F. linimentum.

Vbi materia in pectore hærens satis inspissata est, ab huiusmodi remediis cessandum; ne nimio earum usu crassa reddatur, & ad expectorandum ineptior, sed tum ad detergen-

tia accedendum, ut syrup. de glycyrr. capill. Veneris & similia.

Curatio tussis ab humore pituitoso.

Si à materia frigida & lenta sit tussis, post uniuersalia illa supra lib. I. de catarr. proposita, utendum est calidis attenuantibus, incidentibus & abstergentibus, ut capillorum Ven. hyss. scā. scab. belon. & aliis pectoralibus calidis, & ex iis compositis syr. de capill. Ven. de hyss. de glyc. de præf. oximel. simpl. compof. scill. cum aqu. hyssipi, capillorum Veneris præsiii scab.

Ab humore pituitoso.

Vel ℞. Ficum, N. x. glyc. rasæ, pass. an. 3. B. sem. anisi, scā. an. 3. ii. capill. Ven. hys. an. m. i. Coq. in aq. pura.

Decoctum melle vel saccharo dulcoretur. Utile etiam est lohoh. sanum & expectum, & de pulmone vulpis.

Ad inueteratam tussim Aëtius commendat mell. butyri, an. 3. iv. cumini pulv. 3. i. Melle de pomato butyrum admisceatur, simulque calefactis cuminum inspergatur, & ægro deligendum cochlear præbeatur.

Vel. ℞. Cumini, piper. sem. urtic. an. 3. i. Trita subigantur cum mell. despumati sextario, & parumper seruesceto, reponantur ad usum & cochl. deligendum offeratur. Laudatur & hoc.

℞. Pulegii, piper. hys. calam. an. 3. ii. petr. 3. i. Mellis despumati sextarium. M.

Aqua pectoralis calida Dornacensis.

℞. Rad. Enule. 3. i. B. polypod. q. mund. pim. an. 3. i. alib. myrr. an. 3. B. aris. rot. 3. iii. pæonia mascul. decrefcente Luna in sign. piscium coll. ircos llyr. an. 3. ii. B. 3. ii. 3. i. asparagi, apii, an. 3. ii. herb. cap. Ven. hys. cardus benedict. vitronica pulmonaria

Aqua pectoralis calida Dornacensis.

maulos. an. M. iii. *sem. sanogr. se-*
fel. an. 3. ii. *anisi*, 3. iii. *quatuor fri-*
gid. maior. *excort.* an. 3. iv. *caithami*,
 3. iii. *6. lini*, 3. ii. *flor. cordial.* an. M.
 6. *ficuum pingue. recens.* N. vii. *pas-*
sul. maior. *enucleat.* 3. ii. *dactylor.*
pingue. enucleat. N. xii. *inubar. se-*
besten. an. *paria ix.* *succs glycyrrh. f.*
q. aqu. scordij dissoluti 3. i.

Pulueritanda puluerilientur sub-
 tilissimè, reliqua verò incidantur
 & contundantur minutim & infun-
 dantur in aq. scab. marrub. an. 6. iv.
feniculi. *betonic.* *tussilag. cardui*
Maria. *Nicotianæ* an. 6. i. Stent in
 infusione in loco calido per octidū,
 vase aliquoties singulis diebus agita-
 to, deinde adde mellis passul. *Corin-*
thiac. 6. 6. *croci Oriental.* 3. 6. M. &
 destillentur igne lentissimo in B. M.

Pro vltu quotidiano in tussi idem
 Aëtius fucus siccas, pingues in vino
 dulci meraco madefactas vnà cum
 vino exhibet. Alij fucus ad ignem
 parum tostas sub noctem deuorare
 iubent. Vitile est & hoc.

℞. *Succs tussilag. 6. 6. mucil. sem.*
vel rad. alib. extruct. cum aqu. bor-
dei 3. ii. *faceb. penid.* F. lohoh.

Vtilis est & radix tussilaginis mel-
 le condita.

Plura eius generis vide etiam, *part.*
 2. *huim lib. cap. 4. de arteriarum*
asperarum puln. & apud Galenum,
 7. *de compos. med. sec. loc. c. 3. & in*
lib. euparis.

Ut efficacissimum in materia cras-
 sissima sequens electuarium com-
 mendat Mercatus.

℞. *Succs tussilag. 3. iii. rad. pulegij,*
3. i. apy virid. M. i. Infundantur
 in 6. i. *mellis optimi.* *aceti 6. 6.* Coq.
 lento igne & facta expe hanc adde
prædictum succum & sanograci sa-
pissim. *ansea luis accoelum pond.* 3. x.

Mutridat. ant. theriaca. 3. i. 6.

Porrige summo nanè & ante
 cœnam cochl. ii. quibus admiscere
 potes syr. de pass. de hyssop. *Iobab de*
pino.

Rotula contra tussim pro pueris.
 ℞. *Spec. diatreos f. diatrag. frid.*
 an. 3. i. 6. *extr. glycyrrh.* 3. 6. *cun-*
ula, 3. 6. *faceb. candi.* alb. 3. iii. *in*
aqua scabios. dissolue 3. vi. F. conf.
 in rotulis.

Extra pectus inungatur hoc vel
 simili vnguento.

℞. *Mucilag. sem. alib. sanogræc.*
 an. 3. 6. *butyr. recens.* *axung. gall.*
 an. 3. i. *bdelly. styracis.* an. 3. 6. *croci.*
 3. 6. *ol. lilior albor. amygdal. dulc.* an.
 3. ii. *cera q. l.* F. Linimentum.

Tandem reliquæ exsiccantibus &
 detergentibus abumendæ, vt etiam
 suprà dictum.

Detergentia tamen & exsiccantia
 non sint nimis calida, nec acria, ne
 dissipata parte humoris tenuiore
 crassior remaneat. Ideoq; Auicēnas
 monet, vt vbi ob pituitæ crassitiem
 nihil exspuitur, hume ciliatæ addatur.

Cellus ouum torbile præbet cum
 paucio sulphure. Extat etiam des-
 criptio antidoti dialulphuris apud
 Serapionem, *de antidot. cap. 8.* quod
 ad tussim, tptu m sanguinis & ast-
 hma commendat; Et apud Mesuen
de antidot. cap. 3. Recentiores flores
 sulphutis, lac sulphuris & batani.
 sulphuris exhibent, cui & ben-
 zoën, & eius flores addunt. Exem-
 pli gratia.

℞. *Flor. sulphur.* 3. ii. *Spec. dia-*
trag. fr. 3. i. 6. *oretreos,* 3. i. *croci.* 3.
 i. *ol. anisi.* *putt. an. faceb. in aqu. sissil.*
& scab. diss. 3. vi. F. l. 2. rot.

Vel ℞. *rad. ireos Florent. belen. ins-*
fiag. an. 3. 6. *benzoës,* 3. 6. *flo. sul-*
phur. 3. i. *croci.* 3. vi. *uicoris. anar. sior.* 3.

β. sacch. albis, in aq. suffrag. solut.
 3. iii. & 3. ii. Fiat confect. in corulis,
 instillando spir. terebinth. Pulvis pe-
 ctoralis, seu pulmoniacus.

2. Glycyrrh. rasa, 3. iii. sem. anisi,
 scor. an. 3. i. β. spec. diatrag. fr. 3. i.
 diareas, 3. β. flor. sulph. 3. ii. pulm.
 vulp. prepar. 3. ii. β. sacch. cand.
 alb. 3. i. β. F. pulvis.

Ad tussim & pectus roborandum
 commendantur pulmones anima-
 lium, præcipue vulpis, vnde & lo-
 loh paratur, quod in officinis pro-
 fiat. Item ex pulmone vulpis, addi-
 ta salvia, hyssop. capill. Vener. &
 similib. thoracicus, aqua destillatur,
 atque sacchar. dulcorata propinatur.
 Laudatur & pulmo ceruinus, si
 cum gula sua exsiccat in furno &
 pulverisatus cum melle exhibeatur.

Curatio tussis à reliquis causis

A reliquis
 causis.

Si verò absque catarrho à mate-
 ria in pectore contenta tussis exci-
 tetur, id quod in pleuricide, peri-
 pneumonia, phthisi, calculis pul-
 monis fieri solet, curatio è suis locis,
 atque ex iis, quæ suprâ de his affe-
 ctibus dicta sunt, petenda. Ita & re-
 liquæ tussis differentiz, quæ ab as-
 peritate & inæqualitate arteriz, vel
 consensu diaphragmatis, aut irri-
 tatione pulmonis in morbis vicino-
 rum viscerum excitantur, quæ ratio-
 ne curandi sunt, ex iis, quæ suprâ de
 iis dicta sunt, & suo loco dicentur,
 patet.

Dietæ.

Dietæ.

Si tussis sit ab intemperie frigida,
 æger degat in aëre calido, seu na-
 turâ tali, seu aëre parato. Vten-
 dum cibis calidis & pectoralibus
 calidis, ac aromatis conditis. Po-
 tus sit vinum generosum, dulce, vel
 mulsum. Inter bellaria viles sunt
 pinguæ & pistacia. Si ab intemperie

sicca sit tussis, humectante dicta ven-
 tendum, butyro, oleo amygdal. dulce,
 cum sacch. malua, bortrag. Gale-
 nus; 7. de loc. affect. capir. 3. com-
 mendat aque dulcis tepide balneum
 scribitque se tragædis, guttur &
 asperam arteriam cantu & vocis in-
 tensione resiccatam habentes, hoc
 modo humectasse & curasse. In ca-
 tarrho cibi sint dulces, lenientes, &
 pectus dilatantes; vitentur omnia
 amara, acrida, salsa, acida, acerba.
 In causa calida convenit pitana hor-
 deacea, malua, emulsio amygdal.
 dulce. & sem. 4. frigid. maior. Lac
 caprinum, & vaccinum, si febris
 absit. Potus sit aqua saccharata. In
 frigida causa utatur æger calidis vel
 temperatis. Panis sit bene fermenta-
 tus, semine fœniculi ac anisi con-
 ditus. Potus sit hydromel. Æger
 temperanter vivat, vitet somnum
 mox à cibo, & diurnum.

QVÆSTIO I.

*Antussis sit solum ab angustia tracheæ
 arteriæ, & eius ramorum.*

Plures esse tussis causas ex supe-
 rioribus patet. Verumtamen in eo
 omnes conveniunt, quod aliquam
 pulmonibus molestiam creant.

Verùm quo modo, non omnes
 idem sentiunt. Nonnulli quidem
 omnes illas causas tussim excitare
 statuunt, quod angustiam aliquam
 in asperis arteriis pulmonum cre-
 ent. Verùm si causas, quas suprâ
 proposuimus, consideremus, ma-
 nifestum euadet, non solum an-
 gustiam pulmonum, sed etiam do-
 lorem aliquem & molestiæ sensum
 in organis respirationis tussim pa-
 rere, quo modo partes membrano-
 sæ vicinæ affectæ, ob consensum quæ
 habent cum membrana asperam
 arteriam

An tussis
 sit solum
 ab angus-
 tia tra-
 cheæ ar-
 teriæ &
 eius ra-
 morum.

enim respirationis viæ tum angustiores redduntur, vt Galenus 8. de plac. Hippocr. & Plat. in fine, & 2. de simpl. medic. fac. c. 17. Si quid verò in ipsam cavitatem, & quidem confertim irruit, tussim, & si magnum sit, etiam suffocationis periculum tum maximè suboritur, cum laryngis rimula ocluditur. Vbi verò res in asperæ arteriæ cavitatē illapsa est, non ita suffocationis periculum timendum; cum canalis ille satis amplus sit, tussis tamen inde excitatur. Et vt modò dictum, si calculi, si pituita crassa, si pus, si sanguis, & quidem sæpè magnā copiā ē pulmonē per asperam arteriam reici potest sine suffocatione: etiam sine eiusdem periculo aliquid in illam labi potest. Notabilis huius rei historia est, cuius etiam suprā, c. 3. *hæmaturæ* partis, facta mentio. Anno 1610. vir quidam doctus, cum cerasa arbore decerpta in horto comederet, atque subitò in strangulationis & suffocationis periculum cum maxima tussi comiceretur, nucleum cerasi in guttur illapsum, & tussis & strangulationis causam esse existimans, chirurgum qui illum eximeret, accessit: verum cum chirurgus nullum nucleum deprehenderet, & suffocationis periculum cessaret, tussis verò nihilominus perseveraret, in eam opinionem venit, nucleum nullum in guttur illapsum fuisse, sed hoc symptoma ex catarrho subito & vehementi provenisse. Deambulauerat verò in horto tempestate pluuiosa, & aliàs catarrhis valde obnoxius erat. Duravit ista tussis per tres septimanas, & per intervalla quædam ægrum valde afflixit, quo tempore etiam dolorem quandam grauiatū in dextra thoracis parte deprehē-

debat. Tandem cum noctu vehementer integram horam tussivisset, nucleum illum pituitæ crassæ adhaerescens tussis reiecit, atque ita tussis liberatus est.

Convulsio diaphragmatis.

Ad motus deprauatos organorum respirationis pertinet & convulsio diaphragmatis, quæ plorantibus infantibus accidere solet, cum scilicet ex nimio animi affectu spiritus in lacrymando eò effunduntur, & cum spiritibus aliquid materiæ, quæ nervos ad diaphragma tendentes irritat. Verum cum causā illa evidenti sublata sponte hoc symptoma cessare soleat, de eo nihil amplius hic addimus.

Convulsio
diaphragmatis.

CAPVT VI.

De dolore pectoris.

DE pleuritide equidem, quæ Dolor membranæ costas succingentis inflammatio est, dolorēque insignem coniunctum habet, diximus suprā. Verum cum alij adhuc dolores pectoris dentur, de iis in genere hoc loco agendum, qui tamen in genere sæpè pleuritidis nomine veniunt. Cum enim membrana costas succingens densissima sit, & exquisito sensu prædita, non solum ipsa primariò afficitur, verum etiam cum vicinorum musculorum membranæ vellicantur & afficiuntur, ipsa facili in consensum trahitur, & inde dolor excitatur; imò membranis etiam musculorum exteriorum affectis dolor oritur, vnde pleuritidis vocabulum hoc modo & in genere pro omni dolore lateris accipitur, & pleuritide

Pleuritis triplex.
 alia vera, alia notha est. Pleuritis vera ex inflammatione membranz costarum succingentis oritur, de qua suprà diximus. Notha verò varias causas habet.

Pleuritis notha.
 Primò excitatur cùm sanguis per ramos venarum axillaris in externa thoracis spatia, & in externos musculos thoracis illabitur; quæ tamen inflammatio ob continuitatem propaginum venarum externarum & internarum sæpè in veram pleuritidem permutatur.

Secundò, dum materia à capite per cervicem & omoplatas in musculos externos laterum decumbit.

Tertiò, cùm spiritus flatulentus membranas costarum & musculorum thoracis distendit. Atque accidit hoc faciliùs, si vociferatione & labore, tussì, vel aliis motibus musculi pectoris distendantur, ac flatus eò commoveantur, & si pectus refrigeretur. Vnde sæpe contingit, ut si pectus post validos motus denu-detur, & frigori exponatur, subito tales dolores excitentur, qui quiete & calore mitigantur.

Quartò, quando membranz pectoris in morbis hepatis & lienis mediante diaphragmate deorsum cum dolore trahuntur. Aëtius, *se-trab. 2. s. 4. c. ult.* affectione cuiusdam meminit, quæ pleuritidis non sit; specie tamen pleuritidis fallat, quæ ex victu crudo & crasso oriatur, cùm cumalatus in corpore humor crudus & lentus, subito in vacuum thoracis spatium, aut pulmonem suarum membranisque adherens, dolorem distendendo inferat cum magna spirandi difficultate. Verùm credibilis est, in musculorum membranas humores tales, & præcipuè serosos & acres effundi quàm

in ipsam cavitatem thoracis. Sæpè enim accidere solet, ut serosi, interdum etiam maligni humores ex venis in externos lateris musculos effundatur, & gravissimos sæpe dolores, non tamen diuturnos efficiant, & quidem sine inflammatione. Ita memini infantes aliquot gravissimos dolores in pectore perpessos esse antequam morbilli erumperent, qui morbillis erumpentibus postea cessarunt. Ita aliquoties observavi, ex scabie intempestivè curata pectoris dolores & nothas pleuritides ex falsis & serosis humoribus sine inflammatione excitatas fuisse, sed qui non fuerunt diuturni. Idem accidit sæpe in febribus malignis, ut & in scorbuto. Nec solum humores, sed & vapores hos dolores excitant, uti à vermibus putrescentibus elenati.

Signa Diagnostica.

Dolor ipse pectoris per se notus est, & ex ægrorum querelis patet. Cùm verò dolores pectoris à variis causis ortum habere possint, signis ex discernendæ sunt. Quæ pleuritidis veræ signa sint, suprà de pleuritide dictum. Reliqui verò dolores pectoris & nothæ pleuritidis à verà non difficulter discernuntur.

Nam in vera pleuritide signa omnia patognomonica, quæ suprà recensuimus, adesse necesse est, quorum si vnum absit, ea pleuritidis notha est, non vera. Deinde in notha pleuritide signa omnia, quæ ad-sunt, sunt ferè mitiora. In notha enim pleuritide febris vel nulla ad-est, vel mitior adest. Respiratio quoque, si dolor sit vehementior, parva est & frequens; cùm per validam respirationem dolor irritetur. Non tamen tam parva & frequens

est, ut in vera pleuritide. Tussis nulla adest; nisi forsitan aliquid à capite destillet: & nihil, eruenti, præsertim tussi, externitur. Pulsus neque tensionem habet, neque duritiem; dolor neque ad iugulum, neque ad hypochondria sese extendit. Locus manu pressus dolet, inflammatis intercostalibus musculis externis, vel muscularis costis incumbentibus. Nonnunquam & tumor apparet, qui suppuratus per cutem erumpit, teste Galeno, 5. de lor. affect. cap. 3. Si à statu dolor est, neque perpetuus, sed per intervalla recurrens.

Si à catarrho dolor est, in cervicæ & scapulis primum percipitur, postea in latus descendit, ubi tactu exacerbatur, & versus inferiora descendit, nec in vno loco subsistit. Dolores ab humore seroso plerumque paulò acutiores sunt, sed febris sæpe abest, suntque, vagi, & scabies, vel similes morbi præcesserunt, vel adsunt. Si à maligna materia est dolor, febris malignæ signa adsunt. Si à scorbutico, & eius signa aderunt.

Prognosticum.

Prognostica.

Quid in vera pleuritide præsignandum sit, supra de pleuritide dictum est. Reliqui dolores pectoris minus periculosi sunt, & facilius curantur.

Curatio.

Curatio.

Et quidem ut aliarum partium dolores commodissime curantur causa sublata; ita & pectoris dolores. Verùm quia nullum symptoma est, quod plus ægrum afficit, quàm dolor in omni etiam pectoris dolore, si is vehemens sit, danda opera, ut dolor mitigetur, quod præstant Anodyna. Hinc Hippo-

crates, 2. de rat. viis. in acut. vin pleuritide fomentis statim in initio vitur, aqua nimirum tepida aut sale & milio torrefactis & sacculo conclusis. Hodie plura alia adhuc in usu sunt, ut:

℞. Fol. malvæ, parietar. branc. vrs. an. M. j. sem. lini, fenugr. an. ʒ. ii. flor. ebamæ, sambuc. an. P. j.

Coquantur in aqua.

Colatura calida vel spongia, vel linteo triplicato lateri dolenti applicetur.

Vulgaritè est hodie decoctum florum chamæmeli cum lacte in vesica pectori applicatum.

Vel *℞. Parietarum*, coqu. in oleo chamæmelino, & loco dolenti applicetur, quod efficacissimum est remedium. Vtilis est & sacculus futurre plenus, si in decocto florum chamæmeli prius ebullierit.

Et omnino dolorem sedare vtile. Nam dolore sedato non tantus sit humorum affluxus; cùm dolor fluxioni occasionem præbeat, ut Galenus, 13. meth. med. cap. 3. docet. Ideoque ubi vel pleuritis est parva, aut etiam si sit paulò maior, si corpus sit purum, & externa potius causa morbo originem dederit, vel si signum aliquod deficiat, medicumque dubium reddat, an sit vera pleuritis, an verò febris aliqua, cui dolor pectoris ex humore seroso & acri, vel flatu coniungatur, fomentis statim uti licet.

Quibus de causis Hippocrates proculdubio, loco allegato, fomentis uti præcepit, & re ipsa tentavit, 3. epid. sect. 2. in historia Anaxionis, quod & Galenus, ibidem, confirmat. Nam ut solum exploraret

fomentis, an dolor fuerit à flatu, non est credibile. Nam dolorem pectoris à flatu prouenire, ex febris absentia, pulsu & excretionem nulla agnoscere non difficile est. Si verò certum sit, pleuritidem esse veram, ægrique corpus sanguine abundare, aut vitiosis humoribus refertum esse ante venæ sectionem & purgationem fomenta tuto non adhibentur. Nam, vt Galenus, 6. aphor. 1. docet, fomenta quidem dolorem leniunt nonnihil, aliam tamen fluxionem excitant.

Quod verò causas doloris pectoris attinet, dolor, quia vera pleuritide venit, qua ratione curandus sit, etiam supra dictum.

Si verò pleuritis sit notha ab inflammatione in musculis intercostalibus externis, auius etiam, qui costis incumbunt, vena primò etiam secatur, si cætera consentiunt. Postea fons fiat ex violaria, parietaria, malua, florum chamæmel. melilot. summit. anethi, rosis rubris. Vel vsurpetur tale vnguentum.

℞. Pingu. gallin. butyri recet. an. 3. i. pulu. cham. 3. i. ol. ros. amygdal. dulc. 3. β. cera q. f. M.

Vel ℞. Ol. amygd. dulc. violar. lilior. albor. an. 3. ij. butyri rec. 3. j. pingued. gelline 3. vi. cera noua q. f.

F. vnguentum.

Interdum inflammatio in eadem erumpit, teste Galeno, 5. de loc. af. cap. 7. in fine, vbi danda opera, vt tumor suppuretur, & suppuratio adiuuanda emplastro diachylof. & alijs conuenientibus medicamentis, & nisi tumor spontè rumpatur, aperendus est.

Qui ex destillatione à capite per ceruicem in pectus dolor ortum habet, is catarrho sublato tollitur.

A flatu frigido & crasso si sit dolor venæ sectio omittatur, ne materia crudior, dolorque maior reddatur, si signa simul plethoræ adsint. Fomentis verò ille discutatur & floribus chamæmeli, fol. rutæ, semini. cumini.

℞. Flor. chamæm. sambuc. an. p. i. sum. anethi rutæ cum semine, an. 3. β. sem. san. cumini. rutæ an. 3. i.

F. Sacculus interclusus, qui vino irroretur.

Efficaciora sunt calamintha, pulegium, thymus, rosmarinus, folia lauri, fanticulæ, alchymillæ, bacc. iuniperi, sem. nigellæ.

Extenuatis ita flatibus, tempestiuum erit, quatuor, aut sex digitis sub loco dolente cucurbitulam magnam sine scarificatione ac cum multa flamma bis aut ter affigere, vt extraxus spiritus flatulentus dissipetur.

Interim vniuersalia præsidia non omittenda. In dolore ab humore seroso & præcipuè maligno ea, quæ supra à proprietate pleuritidi prodelle diximus, hic locum habent, vt sem. card. Mariæ, card. bened. oculi cancri, aqua cardus Mariæ, card. ben. aqua & syrupus papaueris erratici.

CAPVT VII.

De sputo sanguinis.

Atque hæc sunt symptomata actionum læsarum, quæ organis respirationis accidunt. Symptomata in excretis quod attinet, inter ea primum est sputum sanguinis. Et si verò in genere sputum sanguinis Græcis *hæmoptoe* omnem sanguinis pereos reiectionem significat, atque ita eam etiam, quæ sanguis à capite,

Sputum
sanguinis
ait.

gingiuis, palato, & faucibus, œsophago, ventriculo, liene & locis vicinis per os reiiicitur: tamen propriè *aliquid* seu sanguinis sputum, de quo hic agimus, est sanguinis cum tussis, ex partibus respirationi dicatis, reiectio. Et quanquam etiam, quæ in pleuritide, & peripneumonia sit sanguinis reiectio hoc nomine appellati possit: tamen in specie ea solum sanguinis cum tussi reiectio, quæ citra harum partium inflammationem accidit, sanguinis sputum seu *aliquid* appellari solet. Est nimirum sputum cruentum symptoma de genere excretorum, quæ toto genere sunt præter naturam, è pulmone & vasis eius. Quanquam enim naturaliter in feminis per uterum, & in quibusdam cum feminis, tum viris sanguis per hæmorrhoidas euacuari soleat: tamen naturaliter è pulmone euacuari non solet,

Causa.

Cùm sanguis præter naturam reiecti non possit nisi vas aliquod præter naturam pateat, hic etiam nisi vas aliquod in pectore aperiatur, sanguinis sputum excitari non potest. Morbi autem, ob quos vasa aperiuntur, sunt *anæmia* & *anæmia* & quidem *pneumonia*, s. ruptio præcipuè, ad quam etiam referri potest contusio, vt & vulneratio seu incisio venarum *anæmia* enim, erosione, seu exesione ab humoribus acerbis quod ætinet, à Platero, *tomo 3. præf. lib. 2. c. 8.* hæc non recipitur. Nam cum ex his pulmonum vasis & pulmonum substantia simul erodatur, sensimque hoc fiat, moxque vlcus inde sordidum potius, quàm sanguine madens prodeat, phthisis potius

quàm hæmoptoica passio exoritur: qui tamen, vti in aliis vlceribus sanguinem interdum, cum impelluntur exsulantibus, cruenta exspuitio aliquando iungi potest. *Alia* vero vix sputum sanguinis inducit. Hi autem morbi à quibus causis oriuntur supra hoc libro, parte 2. caput. 6. de apertione vasorum pulmonis dictum, vt ea hic repetere opus non sit.

Hoc saltem hic addimus, non semper pulmonibus primariò affectis, sed sæpe secundariò quasi, sputum sanguinis excitari, sicut idem sanguis & per vomitum hoc modo reiiicitur, transmissus scilicet ab hepate, & vena cava, à liene, ab hæmorrhoidibus, vtero, per nares effluere consuetus, vt ex Galeno, de vna scilicet, aduers. Erasistratum c. 5. & 7. Aretæo, l. 2. de caus. & sign. ac. morb. c. 2. Celso, l. 4. Auicenna, l. 3. sen 10. 11. 3. c. 5. Aëtio, *sest. 2. serm. 4. c. 59.* vid. reest, & ipsa experientia testatur. Et quidem obseruatum est, interdum per interualla quædam sanguine n è pectore quasi criticè sine omni incommodo reici, & à retentorum menstruum malis atque aliis, quæ ex sanguinis copia proueniunt, incommodis liberare. Ita refert Plinius, l. 11. c. 38. Voluñum Saturninum omnibus annis statò tempore sanguinem exspulso, & nihilominus ad annum 90. vixisse. Et noui virum nobilissimum plethoricum in vicino Anhalidinato, qui per interualla sæpe è pulmone sanguinem copiosum sine omni incommodo reiciebat, in senectute verò per eandem viam quotidie magnam pituitæ copiam sine omni damno reiciebat, qui nihilominus ad summam senectutem peruenit,

Differen-
tiæ.

Differentia.

Differentiæ spūti sanguinis sumuntur.

1. Ab excreto. Potest is sanguis esse sincerus, vel eum aliis humoribus mixtus putridus vel non, alióque colore, sapore, consistentia præditus, copiosior vel paucior.

2. A parte, unde prodit, à vena scilicet vel arteria, eaque vel pulmonis vel pectoris, ut vulgò docetur. Quod tamen à venarum in conuexo pectoris reseruationibus aut læsionibus spūtum sanguinis oriri possit, Cl. Platerus, loco allegato, non concedit, sed sanguinem illic subsistentem corrupti, & vel phthisin, vel empyema tandem inducere scribit. Quare quid sentiendum sit, suprà, de inflammatione pleuræ, dictum.

3. A causa efficiente, quæ est vasorum vel anastomosin vel dirisus.

Signa diagnostica.

Signa spūti sanguinis etiam suprà, part. 2. cap. 6. sunt proposita. Hoc loco ergo saltem explicanda restant, quibus sanguinis ex aliis partibus effusi per os reiectio à thorace aut pulmone exeuntis spūto distinguitur, ne in prognostico vel curatione fallatur Medicus. Principio ergo modus reiectionis attendendus, an scilicet cum tussi, vel sine tussi reiciatur; præterea eius copia consideranda. Et si enim sanguis, qui à thorace prodit, omnis tussi reicitur: tamen non omnis, qui cum tussi reicitur, à pectore prodit. Nam si sanguis confertim à capite & naribus in fauces & gutturis partes dilabatur, etiam tussim excitat. Ideoque si sanguis patiens cum tussi reiciatur, signum quidem est, à thorace provenire. Si verò multus cum tussi reiciatur,

cum tum æquè à capite & thorace provenire possit, signis id discernendum est, quæ sanguinem à capite fluentem indicant; quæ sunt, si sanguis simul è naribus fluat, vel nuper fluxerit, si ægro hæmorrhagiarum consuetudo sit eaque iam suppressa, si ex ore & naribus simul sanguis reiciatur, (dum modò & alia signa adsint) Nam aliquando & sanguis è pulmonibus erumpens adscendit in fauces, & per os ac nares reicitur) si rubor, calor & dolor capitis adsit, si tussis in principio sit vehementior, dum scilicet sanguis per asperæ arteriæ caput transit, quam dum aliquod confluxit. Si sanguis sit nigrior, crassior & copiosior, ac qui primo excernitur, spumâ omni careat, reliquus verò parum spumofus sit, quod scilicet arteriam ingressus nigrescit, & egressus agitur, si adsit palati titillatio; si sanguinis spūtum percipitur ante tussim, si crebra adsit spūtio, & omnino thoracis affecti signa adsint.

Si verò hæc signa adsint, aut post casum, percussionem, clauorem magnum, tussim vehementem, similique causas spūtum sanguinis sequatur, è pectore provenire indicio est. Si verò sine tussi sanguis vomitu, vel sterata solo reiciatur, certum est, eum à thorace non provenire, à quocunque etiam loco prodeat, quod definire huius loci non est. Videatur Gal. 4. de loc. affect. c. 5.

Porro si è partibus respirationis dicatis reiciatur tussi sanguis, duo amplius inquirenda sunt, 1. à qua parte determinata sanguis proveniat; cum partes respirationis dicatas sint plures; 2. à qua causa,

Ergo si leuissima ruffi & seroatu potius, quàm tuffi, sanguis reiciatur, ilque paucus, & parum spumofus, & cum obfcuro aliquo doloris fenfu, ab afpera arteria prodire indicio eft. Si verò maiori cum tuffi, maiore quantitate, & cum maiore fputi copia fanguis reiciatur, à pulmone prouenire argumento eft; cùm aliter in afperam arteriam è fubftantia pulmonis prouenire non poffit. De quo Hippocrates, 1. apb. 23. *Quicquid fputofum fanguinem expuunt, iis è pulmone educto. Quan* quam verò ex aliis partibus fanguis profluens ex vifcidæ & aëreæ fubftantiæ permiffione fputofus fieri poffit: tamen ex toto fputofum effe folius fanguinis, qui ex pulmone prouenit, proprium eft. Et quidem cùm plurimum fputat è pulmone bronchus erumpit; cùm verò totus ferè fputa eft, fecundùm partes internas & externas, non tantùm in fuperficie fputas habens, è pulmone fubftantia prouenit. Qui verò è pectore fanguis reicitur, liuidus eft ac nigricans, ac multum alteratus, cùm à loco longinquo proueniat, & extra vafa diutius immoratus fit. Dolor etiam in aliqua parte thoracis percipitur. Contra fanguis, qui è pulmone exit, eft tenuis, florides, fputofus, vt dictum; & citò reicitur, ac fimo dolore. Qui è membranis exit, paucus eft, fputo permixtus, & cùm tuffi molefta, ac dolore pectoris.

Caufarum verò figna quod attinet, dictum eft de iis fuprà, p. 2. c. 7. Videatur etiam Galenus, 4. de loc. affect. 6. 2. Atet. lib. 5. de cauf. & fign. gen. morb. c. 2.

Hoc faltem addendum, diligen-

ter inquirendum effe num priuato pulmonis vitio, fanguis reiciatur, an verò aliunde, ab hepate fcilicet, liene, quod vel confueti aliqua fanguinis per vterum hæmorrhoides, hæmorrhagiam narium, euacuatio fuppreffa fit, & is ad pulmones tranfmittatur. Neque enim ea, quæ hæcenus propofita funt, & ab authoribus proponi folent, id fatis determinant. Nullum autem hic habetur fignum, pathognomicum, fed ~~maximè~~ artificiofo opus eft, exercitatumque id Medicum requirit, qui ex antea obferuatis id colligere poffit, & præcipue per negationem & remotionem aliorum. Si enim figna & indicia, quæ pectus primariò affici indicant, abfuerint, vel omnia, vel multa, atque alterius partis in corpore affectus, quas modo enumerauimus, figna adfint, probabile eft, fanguinem qui fputo reicitur, non ob priuatum pulmonis vitium, relici, fed aliunde ad pulmonem tranfmitti. Quod magis confirmatur, fi antequam fanguis erumpere incipiat dolor aliqua in parte in ventre inferiore, circa hepar fcilicet, lienem vterum, vel alibi percipiatur.

Addendum tamen & hoc, fi ab aliis partibus fanguis ad pulmones mittatur, non folum per pulmonem eum reici, fed obferuatum eft, fputum & vomitum fanguinis vno tempore accidiffe, uacuis fupperfuium fanguinem partem ad pulmones, partim ad ventriculum propelleate.

Prognoflica.

1. Vt fanguis ex quacunque parte profufus mortem afferre: ita etiam fi è pectore multus effundatur, hominem interire potest. Si ~~ramen~~ ledetur

Prognoftica.

sodetur sputum sanguinis sæpe in talem transit.

2. Et si verò omne sanguinis sputum periculo planè non vacat. tamen aliud alio periculosius est. Primum quidem ratione causæ, de quo *suprà loc. modò alleg. prognost. 1. 2. 3. 4. dictum.*

3. Deinde loci affecti ratione. Nā sputum sanguinis, quod ex pectore provenit, minus periculosum est, quàm quod ex pulmone. Et ex pectore sanguinis reiectio triplex beneficium habet præ ea, quæ sit in pulmone. 1. Quia vasa pectoris minora sunt. 2. Sanies in spatium & cavitatē pectoris effunditur. 3. Quia pectus magis carnosum est, quàm pulmo, ideoque vlcera pectoris facilius carne replentur.

4. Sanguinis sputum principale magis periculosum est, quàm non principale, quale est in pleuritide: quia non principale rupturam apostemat. significat, ac pus euacuari denotat.

5. Sanguinis è pulmone reiectio, quæ infra tres dies non curatur, superueniente phlegmone, incurabilis redditur. Galenus, *5. de loc. affect. cap. 8.*

6. A sanguinis sputo puris sputum malum, *7. apbor. 15.* quod scilicet ab inflamato & eroso pulmone provenit. Id enim rarè aut nunquam curatur; cùm phthisis inde & tandem mors sequatur, teste Hippoc. *ibid. apb. 16.*

Indicationes.

Indicationes.

In sputo sanguinis indicatio præcipua est, sanguinem sistere; quod fit, si sanguis ad partem non cõfluat, vel vas, è quo sanguis erumpit, claudatur, vel vitæ quæ præstetur. Ideoque si vitium sit à causa interna; ca-

tollenda; sanguis nimirum copiosus, & ad partem affluens reuellendus; calidus & acris refrigerandus & mitigandus; humores bilioli & acres euacuandi; ipsum verò vas, è quo fluit sanguis, occludendum. Et quidem si ab anastomosi sit sputum, vas obturandum & adstringendum. Si verò vas sit ruptum, vnire atque agglutinare oportet. Sin erosum, sarcoticis simul opus est, quod desperditum regeneretur. Si à *stasidi* provenit, densare & incrassare convenit. Concretus etiam sanguis in pulmone, si quis adit, dissolvendus, & detergendus.

Curatio.

Curatio.

Idcirco ad duo omnes curatio hic dirigenda, ut sanguis fluens sistatur, & vas, quod sanguinem effundit, occludatur. Quæ quomodo præstanda sunt, *suprà, loco alleg. de apert. vasor. pulm.* explicatum, quæ hic non repetimus, Pauca, saltē addemus.

Et primò quidam generales quoddam regulas in sputo sanguinis curanda observandas.

1. Reversio sanguinis fluentis fit per phlebotomiam, frictions, ligaturas, & cucurbitulas. Et quidem venæ sectio plerique fit in brachio: quandoque tamen in talo, in menibus suppressione, de quo *infra, in quest. dicturi.*

2. Mala sanguinis qualitas corrigatur & temperetur. Si tamen ab acri sanguine, & bilioso humore repleto sit vas erosum, vel apertum, purgandus est ab initio statim biliolosus humor, ne dum eum alere & temperare studemus, malum augeat & gravius reddat. Purgantia tamen non sint calida & fortia, ne acrimoniam humorum augeant, eoque

valdè commoueat. Qua de causa aloë & scammonium non vsurpanda.

3. Inflammatio in ea parte, vbi sanguis exit, omni ingenio prohibeatur.

4. Grumi sanguinis dissoluantur. ad quod etsi acetum vtile sit: solo tamen & sincero eo non vtendum, cùm partes exasperet, tussimque excitet, & fluxionem augeat. Ideoque vel melle, aut saccharo dulcorandum, vel aliis diluendum.

5. Vitentur, quæ sistant, aut nimium adstringunt, ante auertentium vsus. Nam sanguinem interò in pulmones impellunt, vnde eius putrefactio pulmonisq; vlcerata sequuntur. Ideoque remedia ex adstringentibus & agglutinantibus multa sunt; ita quidem, vt in aperto per anastomosis in vase adstringentia, in rupto glutinantia, & citra mordacitatem siccatia superent.

6. Topica frigida valde esse non debent. Frigida enim non solum pecton inimica sunt, sed & sanguinem intropellunt, atque fluxionem augent.

Opiata.

Deinde hoc monendum, si reliqua, *loc. allegato*, proposita sunt medicamenta ad sanguinem sistendum non sufficiant, ad opiata accedendum, & Philonium Romanum, requies Nicolai, pilul. de cytholos. aut laudanum opiatum exhibendum cum aqua portul. vel plantag. aut horum syrupis, quorum vsu sanguis ad motum torpidior redditur, somnûsque concitatur, ne perpetua tussi pulmones vehemèter concutiantur. Galenus prima mox die medicamentum dispermatum dictum ante somnum exhibuit, aetheriacam recentem quatuor mensium. Referri

huc potest aqua contra sputum sanguinis Dorncreilij, in *dispens.* quæ non tantum sanguinem, qui in pulmones, aut in capacitatem thoracis se effundit, sistere, sed etiam iam effusum, & concreuit tunc dissoluere, & blandè ac leniter expurgare perhibetur, si 3. iii. dosi cum *syrup. de symphyta*, Fernelij, vel *syrup. myrini compositis*, 3. si. sumatur. Est autem talis.

℞. Rad. *symphyt. maioris*, 3. ii. *plamaginis*, 3. ii. *tormentille*, 3. vi. *pimpinelle*, 3. i. *herb. bursæ pastoris*, *prunella*, *polygoni*, *consolida media*, *sanicula cum radic.* an. M. i. 6. *flor. ros. rubr.* M. i. *trachisc. deterra* sigillata 3. i.

Puluerisanda pulueriscentur subtilissimè: Herbar. verò & flores minutim incidantur & contundantur, ac infundantur in aqua *symphytis maior.* *plantag. bursæ pastor.* an. lb. ii. *pectoral. frigid.* lb. i. 6. *scabios. marub.* an. lb. 6. *oxymelitis composit.* 3. iii.

Misce, & stent in infusione in loco calido per octiduum vase quotidie aliquoties moto; deinde destillantur in alembico vitreo per M. B. igne lentissimo.

Possent fortasse & ea hic vsurpari, quæ occultâ proprietate sanguinem sistere dicantur, quæ suprà *lib. i. part. 3. sect. 4. c. 7.* de hæmorrhagia narium proposuimus: & inter ea radix nigellæ, de qua in *Practica Kentmanni* M. S. hoc habetur.

℞. Rad. nigellæ, & si quis habet fluxum sanguinis narium, da ei ad masticandum, & postquam masticauerit, impone natibus, restingue sanguinem; hoc similiter facere poteris in vulnere, sed magis appropriatum naso.

Historiam curare à se muliens

*Historia
mulieris
curatz à
Galenō.*

nobilis habet Galenus, *5. meth. med. cap. 13.* quæ ex catarrho, & hinc sequenti tussi vehemēti sanguinis spūto laborare cœperat, proculdubio ob catarrhum & tussim vehementem vase rupto: quæ exemplum nobis præbere potest curandi sputum sanguinis ex catarrho simplici sine pulmonū erosione. Mulieris huius, cū statim prima die Galenum consulisset, capiti, post vsum clystecis acris, frictionum & vinculorum, applicauit medicamentum calidum è itercore columbino. Post horas tres medicamento illo amoto ægram in balneum deduxit, quia cū illa iam prius per inediam euacuata esset, timendum non erat de fluxione noua concitanda, & caput balneo incallescens ipsum quoque à pectore reuellebat. Postea fructum autumnalem austerum dedit, post forbitionem, qua cibata fuit. Tandem dormitūre theriacam quatuor mensium exhibuit, vt fluxura per noctem ad pectus materia interciperetur & silteretur. Sequentibus diebus eadē penè adinutrat, nisi quod tertia die mel coctum exhibuit, quo materia in pulmone ad expectorationem sensim præpararetur, & pro forbitione cremorem ptisanæ concessit. Quarto die, cæteris non mutatis, theriacam vigentis ætatis dedit, cū fluxio iam cessasset. Quinto autem die, postquam ægrum præcedēti tempore in quiete continuisset, pectus per tussim expurgare cœpit, dehinc rursum capiti emplastrum calefaciens & siccans apposuit, vt materia catarrhi planè exhauriretur.

Meminit, *ibidem*, adolescentis, qui non è catarrho ex capite, sed ex refrigeratis spiritus instrumentis,

tussi cum sanguinis reiectione laborauit. Et primo mox die sanguinem misit, cum fricari & ligari iussit, medicamentum diaspersionem ad vesperam exhibuit, & pro cibo forbitionem. Secundo die iterum bis sanguinem detraxit, ceratum è thapsia pectori toti admouit, vesperi id auferens, diaspersionem quoque & forbitionem dedit. Tercio die, postquam ceratum è thapsia per tres horas apposuisset, hominem lauit, cremore ptisanæ ac pleniore aliquo cibo nutriuit, sed vesperi diaspersionem dedit. Quarto denique die instrumentis respirationis ad temperiem iterum redactis, & vacuato toto corpore pectus tussi expurgare aggressus est: theriacam exhibuit vigentis ætatis, & ægrum tandem ad Thabias, pro bibendo ibi lacte, misit. Vide Galenum, *5. meth. med. c. 22.*

Dieta.

Dixit ratio etiam supra exposita est; hoc saltem addimus. Cælius Aurelianus & Author libri *de subfiguratione empirica*, & alij, prohibent aspectum rerum rubrarum, ne, imaginatione commota, sanguinis fluxus concitetur. Neque enim de nihilo est, imaginationem & spiritus ab aspectu rerum externarum moueri. Nimirum & tenebræ & color niger timorem incutit, ac tristitiam excitat; contrà color albus & lucidus exhilarat; vnde etiam color ruber, cuius natura in fulgore quodam consistit, spiritus non parum commouet, notumque est, elephantos, tauros, gallos Indicos rerum rubrarum aspectu ad iram concitari, animi pathemata, præsertim iræ, quæ sanguinem & spiritus commouet, studiosè vitentur.

QVÆSTIO.

*An in sputo cruento sanguis semper à
brachio, an verò etiam à talo &
cruribus, præcipue in feminis
mittendus sit.*

Vade in
sputo
cruento
sanguis
præcipue
mittendus?

Galenus equidem, 5. meth. med. cap. 8. in sputo sanguinis internam cubiti venam secat, eamque sequenti die repetit. Alexander tamē Trallianus lib. 73. cap. 1. etiam vena in talo secata esse sanguinem misisse, & multo magis profuisse, quàm in cubito scribit: eùm sanguinem ad longinquas partes auocantia fortiorum multo reuulsione efficiant. Mesues & Auicennas distinctione vti videntur, & in præseruatione rectius ad inferiores partes sanguinem retrahi, in curatione verò à cubito mitti censent. Nonnulli tamen sunt, è quibus Valesc. de Tarant. & Hieron. Capiuacc. qui etiam in curatione saphenam secundam existimant. Videatque huiusmodi Hip. 5. ap. 32. dum scribit: *Muliers sanguinem eorum mensuris erumpentibus solutorem fieri.*

Verumenimverò rectissimè hic sentire videtur Mesues & Auicenna, dictumque est suprà, de pleuritide, non semper licere ad remotissimam reuellere, sed vbi in morbis pectoris præsentaneo auxilio opus est, venam in brachio esse aperiendam. Ideoque cum vel nondum ad pectus sanguis decubuit, sed fluxurus metuitur, aut parum omninò affluxit, prouidentur & præseruationis gratia,

ad remotissimam sanguinem reuellere, & venam in talo aperire licet. Vbi verò materia iam affluxit, & adhuc copiosè affluit, vt inflammationis metus sit, vena in talo secata nimis tardum auxilium affert: sed tum in cubito vena aperienda, vt de pleuritide dictum.

In mulieribus verò mensium habenda est ratio; vt pote quorum fluxus eas à morbis multis præsertat & liberat. Distinctione tamen opus est. Cum enim menses statò tempore fluentes mulieribus profint, alio verò tempore, faciliè concitari non possint: si mulieri sputo sanguinis, seu ex suppressione mensium, seu absque ea laboranti menses iam instent, vena in talo aperienda est. Ita enim Medicus socias naturæ operas præstat, atque in sanguinis ad vterum reuulsione natura Medico se coniungit. Atque hoc sensu accipiendus est allegatus aphorism. Hippocr. Si verò fluxus mensium nondum instet, distinctione iterum vtendum. Nam si sanguinem in feminis circa vterum cunulatum esse constet, nondum verò magnus eius sit ad pectus fluxus, tum æquè in feminis ac in viris à talo sanguis mittendus. Si verò ad pulmones magnus eius sit impetus, magna tamen ex suppressione mensium etiam in vteri venis sit eius copia, ex vtriusque venis quidem sanguis mittendus, veruntamen si mensium fluxus nondum instet, in cubito primùm vena aperienda, cum præsentaneum & subitum, quod vena in talo aperta præstare non potest, auxilium requiratur.



LIBRI SECVNDI
PARS QVARTA
DE MORBIS
AC SYMPTOMATIBVS
CORDIS.

CAPVT I.

De morbis Pericardij.

RESTANT tandem in hoc secundo libro morbi & symptomata Cordis. Cū autem cor sit vitæ principium, caloris nativi fons, primum viuens, & vltimum moriens, ac cæteræ corporis partes ex eo sanguinem, spiritus, ac calorem vitalem accipiant, atque actiones suas exercere non possint, n si calore & spiritu à corde sit perfusa; omnino cordis actiones ad vitam summopere sunt necessariae. Ideoque etiam natura cor maximè ab omnibus iniu-

riis tuetur, & cor vitali calore copioso præditum maximè omnibus iniuriis resistit, & noxia à se repellit, & hinc rarius, quàm alia corporis partes, morbis afficitur. Sūntque etiam morbi cordis difficiles cogniti atque plerumque non nisi in mortuis anatomicè deprehenduntur. Et si cor paulò grauius præter naturam afficiatur, mortem id homini accersere solet. Est nihilominus cor etiam multis morbis obnoxium. Et cū cor membrum tam nobile ac necessarium sit, peculiari capsula tegitur, quæ pericardium vocatur. Ideoque

morbi alij ipsius cordis, alij pericardij, de quibus seorsim dicendum. Symptomata verò præcipua sunt palpitatio cordis, vitium imbecillitas, ac lipothymia & syncope.

De aqua in pericardio aëta & deficiente.

Aqua in pericardio aucta.

Aqua quædam secundum naturam ut in aliis animalibus, ita in homine reperitur in pericardio; id quod non solum docuit Hippocrates, in libello de corde, sed & ex viuorum animalium sectione pater.

Hanc tamen aquam interdum præter naturam augeri, ut cor non libere moueri, & ita palpitatio cordis causa esse possit, docet Galenus, 5. de loc. affect. cap. 2.

Deficiens. Contra si ista aqua præter naturam deficiat, causa marasmus esse solet.

De vermibus in pericardio.

Vermes in pericardio aucti.

Vermes aliquando in capsula cordis seu pericardio genitos fuisse obseruatum est, annotantque aliquot eius rei historias Schenckius.

Difficiliter autem cognoscuntur, & raro exadè, nisi post mortem. Solet autem tales ægros infestare cordis tremor, anxietas, animi deliquium & syncope, ac plerumque tandem ægri subita morte extinguuntur. Si ergo ista symptomata adsint, & medicamenta cordialia exhibitia nihil proficiant, vermem talem adesse suspicari licet.

Lunaticæ passio.

Nonnulli Lunaticæ cuiusdam passionis mentionem faciunt: quæ ex vermibus in pericardio ortis pueris & infantibus accidit, unde ij sæpè semimortui apparent. Verùm mihi probabilius videtur, hoc quicquid est symptomatis, quod infantibus accidit, ex vermibus proueni-

re in intestinis genitis, & in ventriculo ascendentibus & orificium ventriculi molestantibus, quod etiam *capitula* appellatur.

Contra vermes autem in corde commendatur allium, obseruatumque est, vermes, qui in mortuis in capsula cordis reperiuntur, necatos fuisse succo alij, dum in circumlo ex alij succo in quens figuratum concluderentur: Vile est & hoc.

℞. Succum allij, raphani, & nasturtij, & exhibeatur.

Ad Lunaticam verò illam passionem, quæ ex vermibus in capsula cordis ex nonnullorum opinione, aut potius ex vermibus orificium ventriculi, seu cardiacum molestantibus oritur, commendatur tanacetum. Ramuli eius tenues in vinbra siccentur & addantur sequentis pulueris, 3. ii.

℞. Rad. gentiane, pæoniæ, an. 3. ii. myrris, 3. i.

Fiat puluis.

Pulvis hic aqua humectetur, & ori infantis inungatur.

Defectus Pericardij.

Defectus Pericardij.

Aliquando planè deest pericardium. Id quod obseruauit Columbus, qui lib. 15. anat. refert, se suspiculum in Romana Academia secuisse, cui pericardium deest: itaque subinde in syncope inciderebat, & mortuo similis conspiciebatur, quo genere morbi etiam exanimatus est.

Tumores Pericardij.

Tumores etiam in pericardio deprehensi sunt. Galenus, 5. de loc. affect. cap. 2. scribit, se simiam quandam quæ indies emaciabatur, post mortem secuisse, & cæteris omnibus partibus saluis, inuenisse in pericar-

Tumores Pericardij.

dio tumorem præter naturam, qui humorem in se, qualem hydatides emittere solent, continuerit. Atque in gallo quodam se vidisse aliquando cordis tunicam scitthoso tumore affectam, periunde ac si plures membranae crassæ inuolutæ altera alteri fuissent. Vnde coniecturam sumit, homines similibus affectibus obnoxios esse posse. Quem secutus Petrus Salius Diuersus, *de morb. rariorib. cap. 4.* colligit, idem in homine accidere posse. Nam si quis emacietur, nulla præstante destillatione, nec sputo vel cruento vel purulento, nullæque naturalium partium ita læsa videatur, vt hinc macies & atrophia subsequi possit, suspicari licet, posse hoc accidere ex pericardio male affecto. Etsi enim membrum per se non sit nobile: tamen quia cordi proximum est, id in consensum trahit & afficit. Affectus autem hic vt difficultèr cognoscitur, & non nisi coniecturâ, ita curatu est impossibilis, scribitque Petrus Salius Diuersus, *loc. alleg. se, etsi multa tentarit, nihil profecisse, omnesque tandem tabe consumptos & emaciatos, vltimò quadam accedente leui febricula, cui syncope coniungebatur, interisse.*

Vulnera, putredo, & corruptio pericardij.

Vulneratur etiam interdum pericardium, interdum exaceratur & putrescit Galenus, 7. *de administr. anator. cap. 13.* refert, se in puero quodam in palæstrâ cæco, & inflammationem in pectore passò, regione pectoris detecta & osse exciso, nudum cor inuenisse, vtpote cuius inuolucrum putruerat. Ita ex Francisco Rota *de torm. vulner. cap. 3.* refert Schenckius in suppurato quodâ

totum ferè pericardium corruptum deprehensum fuisse.

Beniuenius, *de abdit. morb. caus. cap. 5.* narrat, quendam in pericardio vulneratum sua cura conualuisse. Et Cardanus, *incomm. ad 8. aph. 1. 6. Hippocras.* refert, se partem pericardij vidisse ablatam, ægrumque tamen sanatum, sed suspiria alra duxisse, nec multis annis superuixisse.

Notabile est & hoc, quod ex obseruat. Iohan. Bauhini refert Schenckius, in cadauere quodam dissecto pulmonem repertum fuisse planè consumptum, thoracis cavitatem plenam putrido & concreto sanguine, in pericardio verò plusquam mensuram puris albi contentam fuisse, totâ cordis superficie absumptâ & extenuatâ. Symptomata, quæ passus est, erant tussis, febricula, dolor in thorace, & in anteriore ventris parte, difficilis respiratio, paucis diebus ante mortem deliquim animi, mens costabat. Verum quia Medici opera in his parùm præstare potest, plura de iis non addimus.

Historia
pulmonis
planè cō-
sumpti.

CAPVT II.

De cordis intemperiebus.

Intemperies Cordis calida.

Requentissimè cor intemperiem calidam patitur, & quideni à causis externis & internis: & omnes causæ, quæ febrem excitare solent, etiam intemperiem calidam cordis excitant; cum nulla febris excitari possit, nisi cor prius incalcescat. Causæ tamen, quæ intemperiem calidam cordis excitant, non verò in toto, matiores sunt; &

Intemperies
cordis calida.

quamuis cor per animi affectus & alias causas etiam per se incallescere possit: tamen per consensum aliarum partium sæpissimè intemperiem calidam contrahit; & præcipuè à partibus inferioribus incalescit, è quibus vapor calidus cordi communicatur. Ideoque de causis intemperiei calidæ cordis multa hie addere opus non est, cùm satis de usin doctrina de febribus dictum sit.

Cognoscitur intemperies calida cordis præcipuè ex actionibus eius mutatis; respiratio fit magna, celer, frequens, pulsus similiter est celer, frequens, magnus, si vires sufficiunt; adeit propensio ad iram, calor adeit præter naturam, & in totum corpus diffunditur, halius, qui ore egreditur, calidus est, ut ferè palatum, linguam & labia exsiccet. Præcellerunt causæ cor calefacientes; iuvant frigida, nocent calida.

Quo maior autem excessus est caloris, eò morbus periculosior est, patetque id maxime ex effectu, & virium robore vel deiectione, de quo de febribus dictum.

Curationem quod attinet, calida intemperies refrigerantia indicat. Vbi primò in genere monendum, extremè frigida vel nimis cor alterantia non usurpanda esse. Cùm enim cor caloris nativi fons sit, & maiorem calorem, quàm nulla pars alia corporis, obtineat, & ab eo vita hominis pendeat, calor is studiosè fovendus, nec quicquam adhibendum, quod ipsum extinguere possit, utpote quo extincto mors sequitur. Deinde quia cor spiritus vitales generat, sua violentia cordi maxime vitia sunt.

Medicamenta autem cor refrigerantia sunt, *acetosa, flor. rosar. visio-*

lar. nymphaea, flor. borrag. bugloss. succus citri, animum, granat. cerasar. poma odorata acidisculi, fructus ribes, berber. rubi Idæi, C. C. terra sigillata, bolus Armenus, coralliamargarita,

Ex his parantur alia Medicamenta.

Interna.

Aquæ, Rosar. violar. nymphaea. acetosa, borrag. bugloss. fragor.

Syrupi Acetosæ, citri, granator. acetosæ, acetosell. de succo ribes, berberis, belen. nymphaea. borrag. cerasorum, coralliorum.

Conseruæ, Rosar. borrag. nymphaea. viol. acetosæ, acetosell. flor. aurantior. citri.

Condita, caro citri, cerasa, ribes, berberis.

Species diamargaris frigidæ.
Rotulæ, & mersuli manus Christi perlat. diamarg. frigid. de succo citri, ribes, berberis.

Aqua Cordialis.

℞. Conseru. flor. bugloss. borrag. violar. rosar. nymphaea. corr. citri, an. 3. ii. spec. el. diamarg. frigid. de gemm. an. 3. ii. diamb. 3. i. cruci 3. i. b. sem. citri, oxalid. cydonior. an. 3. iii. 4. frigid. mai. scariola, an. 3. i. lactuca, 3. b. berb. lactuca, oxalid. portulac. endiu. an. M. 6.

Addendo.

Caponcin oxenterarum, purgatum & incisum, ut decet, succi acetosell. citri, granator. an. 3. i. b. aqu. rosar. borrag. bugloss. melis. an. lb. i.

Incidantur & contundantur, ac misceantur in mortario lapideo, & postea lento B. M. calore destillentur.

Externa.

Eadem pleraque extra applicari externa possunt.

signa.

Pignoflica.

Curatio.

possunt. Vnde fiunt.

Epithemata, ex aqua rosar. nymph. acciso rosar. santalo, margarit. corallis, quibus aliquid camphora additur.

Sacculi, ex herbis, floribus, & folijs antea enumeratis cū serico rubro vel albo, & floccis pāni coccinei.

Olea, rosar. violar. nymphae.

Vnguenta, rosar. santalinum.

Talia autem Topica commodissimè ad sinistram partem applicantur. Etsi enim cor in medio pectoris sit situm: quia tamen thorax in medio planè ossibus est, commodè ibi non possunt penetrare. Circa papillam verò sinistram, quò pars inferior cordis vergit, faciliùs penetrant.

Videtur ratio medicamentis respondere.

Si verò cum materia calor coniungatur, & quidem si sanguis abundet, is euacuandus: si bilis, expurganda syrupo rosar. solut. & viol. sol. pulp. tamarind. manna, triphera Pectica.

Intemperies cordis frigida.

Rarius verò cor intemperie frigida laborat. Cùm enim sit calidum membrum, causis frigidis fortiter resistit. Aliquando tamen etiam frigida intemperie corripitur, quam induci retentio excrementorum frigidorum & vapores frigidi ex aliis partibus ad cor ascendentes. Animi perturbationes, præcipue moror & timor, quibus calor cordis torpidior redditur, & penè suffocatur, immodica exercitia, otium nimium, ob quod spiritus torpent, & calor remittitur. Cibi & potus ut & medicamenta frigida, aër ambiens frigidus, siue inspiratione attractus, siue ob vestium defectum pectore nudo extra ad cor penetrans, ut & nimia pluviarum ad pectus appul-

sio. Et omnino omnes morbi, qui interitum homini afferunt, cor tandè refrigerant: cùm mors ab extinctio- ne calidi innati cordis proueniat.

Cognoscitur intemperies cordis *Signa.* frigida ex cordis pulsu paruo, tardo, raro, & respiratione simili, aërique, qui expiratur, frigidus percipitur. Et si sit excessus frigoris magnus, & calor cordis iam penè extinctus, corpus vniuersum frigidius sentitur. Præcesserunt causæ cor refrigerantes: iuuant calefacientia cor, nocent refrigerantia.

Curatur autem intemperies cor- *Curatio.* dis frigida calefacientibus. Sunt autem medicamenta cor calefacientia simplicia: *Melissa, corymb. rosmarinus, card. benedict. calamintaba, rad. belen. angelic. flor. rosmarinis, tunicis, laurandul. lilij conuall. sem. citri, grana alchem. lignum aloës. Aromata pleraque, cinamom. caryophyll. zedoar. macis, nux moschat. ambr. moschus.*

Atque ex his varia componun- tur.

Interna.

Aquæ & spiritus meliss. rosmarin. Internæ. flor. citri, anranior. cinamom.

Conseru. anrbos, meliss. tunicis, laurandul. lilior. conuall.

Syrapi, tunicis, meliss. laurandul. cinamomi, cortic. citri.

Condita, cortices citri, anranior. rad. belen. nuc. ingland.

Olea destillata, citri, meliss. cinam. caryophyll. macis.

Species & confectiones aromati- cæ, diamargar. calid. confect. de hyacinth. species cordiales, diamosch. diamb. diaxylo, aloës, arom. caryophyllas. & præcipue confect. Alchem. iberiaca iidem & Mithrida- cium.

Intempe-
ries cor-
dis frigida.

Externa.

Externa.

Eademque pleraque etiam extra applicantur, ut postea dicitur.

Ex his porro varia composita sunt:

Aquæ vitæ omnis generis, quæ passim extant, aqua virtutum, aqua carbunculi dicta, elixir vitæ Martialis. Videantur Inst. l. 5. p. 3. sect. 3. c. 5.

Vel paretur talis aqua:

℞. Meliss. M. ii. cymy M. j. flor. anthes, cordal. tunic. an. M. β. cortic. citri ʒ. β. sem. citri ʒ. ii. caryophyl. ʒ. iii. cinamom. ʒ. i. ligni alai, macis, zedoariz, an. ʒ. j. croci ʒ. β. moschi, ambr. an. ʒ. β.

Affundatur vini Maluatici q. l. Digerantur aliquandiu, postea destillentur. Detur ab ʒ. β. ad ʒ. i.

Rondeletij aqua & Iulebus.

Rondeletij aqua.

℞. Cord. porci N. ii. cerus vel bonis N. iii. caryophyllor. galanga mai. & min. sem. basilic. an. ʒ. iv. flor. bugles, borrag. an. P. ii. anthes P. iii.

Macerentur in vino maluat. & destillentur in vitro, Aqua seruetur vsui.

Iulebus
singuldem.

℞. Aqua pradiet. ʒ. iii. sacch. parum. F. Iulebus.

Aqua virtutis.

Aqua vir-
tutis.

℞. Rad. bugloss. real. ʒ. iv. flor. borrag. bugloss. an. ʒ. iii. rorismar. croci an. ʒ. i. succi cydonior. malor. Borstori. citri cum cortic. incis. an. ʒ. i. β. vini Rhenani albi lb. iii. aqu. meliss. borrag. bugloss. an. lb. β.

M. Stent in infusione per dies 10. in loco calido, postea fiat destillatio.

Aqua cardata D. Georgy
Lenschneri.

℞. Fol. basilic. c. floribus meliss. an. M. i. β. pulegy. mentha. flor. rosarum rubr. an. M. i. borrag. bugloss. ponia. violarum, betonica, an.

M. β. sem. meliss. basilic. cubeb. an. ʒ. i. caryophyllor. ʒ. ii. zedoar. galanga, enule, daronici, an. ʒ. i. β. macis ʒ. ii. sancti alii citrini, albi, an. ʒ. i. β. ligni aloes ʒ. i. cortic. citri exsiccat. auarior. an. ʒ. ii. β. cinamom. acutissimi ʒ. i. Hisee confus. & conquass. superinfund.

Vino Rhenani puri lb. v.

Stent infusa hor. xxxvi. ad cinctes calidos, postea destillentur f. a. in B. adicianturque tandem Fel. auri N. v. (estate sumantur recentia & viridia, & medietas tantum vini.)

Aqua virtutis alia.

℞. Galang. zinzib. caryoph. granor. Paradisi an. ʒ. iii. cubeb. piperis longi, an. ʒ. i. β. macis, nuc. moschi, an. ʒ. ii. β. ligni aloes, ʒ. iii. cinam. el. cortic. citri, an. ʒ. β. calam. arom. ʒ. i. β. rorismarini, salua, an. ʒ. i. flor. laueud. ʒ. vi. ruie, ʒ. ii. rosar. rubr. borragin. an. ʒ. β. fol. lauri ʒ. β. Contund. & infund. in vini boni mes. iii. Destillentur f. a.

Alia.

℞. Rorismarini, meliss. basilic. pulegy, serpilli, an. M. i. cortic. citri extern. ʒ. i. ligni aloes, sancti alii citrini, rhodiass. an. ʒ. i. β. caryoph. ʒ. ii. croci, ʒ. i. spica Celica, Lant. ark ʒ. i. nuc. mosch. ʒ. i. β. cortic. cydon. recent. ʒ. i.

Concisa infund. per dies 3. ad Solem: vel in loco calido in aqu. rosar. spir. vini opt. an. lb. i. β. acer. ros. lb. i.

Destillentur postea in M. B. In destillato liquore dissolue, mosch. q. s. ad gratiss. odorem.

Vel suspendatur moschus in alembici nostro.

Alia.

℞. Flor. lily conuall. M. ii. laueud.

cieher. an. M. i. cardamomi vir. galang. cyperosund. macis. nuc. mosch. lignis aloës. piperis longi. nigri. mastich. zingib. an. 3. i. B. cinamomi 3. ii. vini sublimatis lb. ix.

Infundantur per aliquot dies, postea destillentur.

Elisir vitae.

℞. Cinamom. elect. 3. vi. caryophyllor. cardamomi. ligni aloës optim. an. 3. i. B. santali citrini. 3. ii. nuc. mosch. macis. an. 3. i. Pulverisatis mediocriter omnibus, adde spirit. vini puriss. lb. vii.

Et permittit omnibus in vitro vase clauso orificio ita reſeruentur per mensem, singulis diebus ter quaterve agitando & commiscendo. Postremo die, vbi perfectè reſederint, percolentur, & colaturæ bene claræ add. syrup. & corticis. citri lb. i. B. mosch. ambræ. an. 3. lb. Reſeruetur in vitro benè obturato.

Aliud.

℞. Cinamom. elect. 3. ii. zingib. 3. vi. caryophyllor. nuc. mosch. an. 3. ii. gran. paradisi. 3. ii. cal. aromar. 3. B. galang. 3. i. flor. rosar. 3. i. rosarum. 3. iii. cortic. citri. 3. i. B. maioran. meliss. an. M. i. ligni Rhodij 3. iii. santali citrini. 3. ii. rubr. 3. i. vini sublimati lb. xii.

Infund. per mensem, deinde colentur & colaturæ claræ add. syr. de cort. citri. cydoniorum an. lb. j. B. M.

Electuaria.

℞. Conf. borrag. bugloss. anibos. rume. an. 3. i. ros. 3. B. cortic. citri condit. 3. vi. nucis mosch. condita. 3. i. pulv. caryophyll. 3. B. Cum syr. rume. F. Elect.

Regule & morsuli.

℞. Spec. diamb. diaxylaloes,

an. 3. i. ol. cinamom. citri. an. gutt. iii. confect. Aleberr. 3. i. sacch. in aqua rosar. solut. 3. iii. F. Rotuli. Illinant. ambr. in aqua rosar. dissol. 3. iii.

Vel ℞. Spec. diamb. aromati. caryophyll. diamosch. dale. an. 3. ii. lapid. bezoar. 3. B. cortic. citri condit. 3. ii. sacch. alb. in aqua rosar. dissol. 3. iii. F. Morsuli.

Vel ℞. Amygdal. dale. pistaciore. an. 3. i. pinear. 3. vi. carn. citri cond. 3. i. nuc. mosch. in India cond. 3. vi. cort. citri cond. 3. iii. zing. in Ind. cond. 3. B. macis. 3. i. cinam. 3. i. B. Fructus macerentur per noctem vnam in aqua rosar. & aromata cum eis incidantur & frangantur mediocriter. Add. sacch. albiss. 3. xx. in aqua rosar. dissol. In fine admisce. mosch. ops. 3. ix. ol. cinamomi 3. vi. F. l. a. morsuli deaurandi.

Ex medicamentis hæcenus enumeratis etiam externa varia componuntur.

Epithemata.

℞. Aq. fl. aurant. meliss. anibos. an. 3. ii. carboniculi. virtut. an. 3. i. spir. rosar. 3. i. conf. Alech. 3. B. cort. citri sic. 3. ii. croci. 3. B. M.

Balsama & linimenta.

℞. Ambr. liquidæ. olei nuc. mosch. exop. confect. Aleberr. an. 3. B. olei destill. citri. meliss. an. 3. B. F. Linimentum.

Sacculus.

℞. Flor. anibos. cordial. meliss. laurandul. an. M. B. corticum citri siccorum. caryophyllorum. macis. an. 3. i. Cum syndone rubro. F. sacculus.

Intemperies Cordis humida.

Intemperies cordis humidâ fit à intemperie causis, quæ aliàs totum corpus humectare possunt: verùm non faciliè eam recipit, cum sit valde

Extrema.

ries cor- dia.

calidum & sicum. Præcipue verò aër humectandi vim habet; vtpote qui per pulmones ad cor penetrat, nebulosus scilicet, crassus & humidus. Humectat etiam totius corporis intemperies humida, qualis est in anasarca.

Cognoscitur ex talibus causis, quæ præcesserunt: ex effectis item, vt pulsû molli, & toto corpore humidior.

Curatur siccantibus medicamentis hæc intemperies, qualia sunt omnia calida modò proposita. Omnia enim talia siccandi vim habent.

Exsiccat præterea cor humidum, quæ frigida siue temperata sunt, margaritæ, corallia, C. C. os de corde cerui, bolus Armenus, terra sigillata, lapides pretiosi.

Dieta medicamentis respondeat.

Intemperies cordis sicca.

Intemperies cordis sicca.

Cor siccant corporis atque animi motus nimij, curæ, mætor & sollicitudines, vigilæ nimix, vnde quibusdam ex hæc causis mortuis cor tanquam pyrum tostum inuentum fuisse historia testantur, aër calidus & siccus, qualis est in locis montanis, & sæpe etiam maritimis, cibi & potus siccandi vi præditi, in primis vini potentes rursus, medicamenta eiusdem generis, febres biliosæ, tumores pericardij, & aliæ causæ, quæ febrem hæcticam inducere valent.

Cognoscitur siccitas cordis à causis his, si præcesserint: sequitur verò totius corporis, & in primis pectoris extenuatio, pulsus est durus.

Curatur verò humectantibus, borrag. nigell. violis, semm. frigid. maior. passulis, amygdalis. Prodest etiam balneum aquæ dulcis tepidum, in quo malva, althæa scænugetæ, cocta

sunt. Fomenta etiam pectoris ex iisdem parantur, post quæ pectus inungatur ol. amygdal. dulc. viol. macil. semin. althææ, maluz.

Dizta etiam sit humectans, & omnino curatio & dizta talis instituenda, qualis hæcticis conuenit.

Morbi totius substantiæ.

In primis verò & frequenter cor à morbis totius substantiæ, seu formæ, vt appellant, vel qualitatum occultarè infestatur. Pleraque enim venena, quocunque modo in corpus sese insinuant, cor hoc modo afficiendi vim habent, de quibus loco dicitur, & etiam, libro 2. institut. part. 2. cap. 23. & de Pesse dictum.

Morbi totius substantiæ

Cognoscuntur autem hi morbi à causis, quæ præcesserunt, ad tales morbos producendos idoneis. Et si de causis eiusmodi non constet, ex effectis deprehenduntur, quæ supra vires caularum manifestarum sunt grauiora, vt anxietas & inquietudo, subita & summa virium deiectio, animi deliquium, & syncope, pulsus summa imbecillitas, & inæqualitas. Maculæ hinc inde in corpore erumpentes, & similia symptomata: quæ pestilentibus ac venenatis morbis sunt propria.

Morbi autem hi longè sunt periculosissimi, & hominem inopinatè sæpè iugulant.

Curantur autem hi morbi alexipharmacis. Et quidem cuilibet veneno suum alexipharmacum opponendum, de quibus Institut. lib. 3. pag. 1. s. j. cap. 21. & de Pesse dictum, ac suo loco, de venenis dicitur. In genere & præcipuè si de natura veneni non constet, antea enumerata usurpanda, & inter composita theiaca & Mithridatium.

Elect. &
Bertrucij.

Elect. Bertrucii confortans cor in
omni causa.

℞. Smarag. byacint. b. sapphir. an. 3. b. auri & argentipuri foliati, an. 3. i. margarit. perforat. & non perforat. 3. i. b. bugloss. meliss. borrag. ocym. zedoar. becn. alb. & rub. caryophyllor. ligni aloes, zingiberis, cinamomi, elect. an. 3. b. serici contrus, non combusti, cubeb. cardamom. calami arom. spica, galang. muscb. camphor. os de C. C. ambr. an. 3. i. corall. alt. rub. santal. rosar. spadii, myrobalan. belliric. terr. sigill. coriandr. an. 3. ii. b.

Terantur omnia subtiliter; & pro qualibet vicia specierum sumatur sac. albiss. lb. i. F. elect. Deauretur.

Cum etiam ad calidum nativum & naturalem corporis constitutionem conservandam spiritus vitales pertineant, atque hi etiam varia vitia pati possint, etiam de iis hoc loco dicendum esset. Verum de iis postea de lypothymia & syncope dicetur.

C A P V T I I I.

De reliquis Cordis morbis.

Reliqui
morb
cordis.

PRAETER morbos intemperiei & totius substantiae, qui cor frequentissime infestant, adhuc alij morbi cordis dantur, qui, quia rariores & rard curabiles, eos uno hoc capite coniungemus.

Sinistri cordis ventriculi defectus.

Sinistri
cordis
ventriculi
defectus.

Cordis ventriculorum sinistram in quibusdam defuisse, vel, plane exiguam fuisse, observavit Columbus, *anatom. lib. 15. ut & septum, quo ventriculi cordis distinguuntur, cartilagineum.*

Cor hirsutum.

Cor hirsutum.

Quosdam cor hirsutum habuisse annotavit Plinius *lib. 11. nat. hist. c. 25. Valer. Max. lib. 1. cap. 6. Benedict. Faurentinus, de abditior. morbor. & curation. caus. c. 85. Antonius Muretus, lib. 11. variar. lection. cap. 10. Amatus Lusitanus, cent. 5. curat. 65. Omnes autem hi, qui cor hirsutum habuerunt, fuerunt audacissimi & famosi latrones.*

Vermes, calculi & alia prater naturam in corde reperi.

Vermes aliquando in pestilentibus in ventriculis cordis fuisse genitos, auduisse se ab hominibus inde dignis, qui huiusmodi agrotantia corpora secuerint, refert Vidus Vidius, *cap. de morbis cordis. Idem etiam scribit, quod lapides in corde fuerint geniti, se neque auduisse, neque legisse. Referunt tamen id alij quamplurimi. Hollerius comm. 1. in lib. 6. aph. 4. Coac. pradiet. Hippocr. Scholiographus in Hollerium, ad cap. 29. & 30. lib. 1. Iacotius, comm. 1. lib. 6. sect. 2. aph. 4. Coac. Hippocr. Et comm. 1. ad aph. 52. lib. 3. sect. 2. Coac. Hipp. Et in Maximiliani II. Imperatoris corde inveni sunt tres lapides, ut refert Vvicius, de praestig. demon. lib. 4. cap. 6. Et Erastus, in consil. & ep. à Scholtzio, collectis. Atque horum alij palpitacionem cordis frequenter passi sunt, alij urina purulentam per multos dies, imò menses, salus renibus & vesicâ, minxerunt.*

Vermes
calculi
&c. in
corde
reperi.

Carnosas quoque excrecentias in cordis dextro ventriculo vel sinistro repertas fuisse in iis, qui dolorem cordis, & syncopen passi fuerunt, & pulsus intermittentem habuerunt, refert Vesalius, *lib. 2. cap. 5. de hum. corp. Fabrica Beniventius, de abdit.*

morb. & curat. caus. cap. 25.

Cordis tabes.

Cordis
tabes.

Cor quoque in quibusdam contabuisse & exsiccatum fuisse, observatum est. Idque etiam ex tumore pericardij accidisse, antea, *cap. 1. distellum*. Ad cordis verò tabem prodessse succum raphani ex Aegyptiorum traditione refert Plinius, *hyst. nat. lib. 19. cap. 5.*

Situs cordis mutatur.

Situs cor-
dis muta-
tur.

Cor etiam situm quandoque mutasse observatum est, ut in Liuno illo V vicebergæ, cuius supra, *libr. 2. part. 2. capite 15.* mentio facta est.

Vulnera cordis.

Vulnera
cordis.

Cor etiam interdum vulneratur, & quidem ut Galenus, *5. de loc. aff. cap. 1.* scribit, si ad ventrem cordis vulnus penetraret, protinus magno cum sanguinis fluore hominem mori necesse est. Idque præcipue si sinister ventriculus cordis fuerit vulneratus. Si verò non ad ventrem usque pertingit, sed in cordis subitania constitit, vivere ita affectus non solum ea die, sed etiam sequenti nocte potest.

Apostemata, & ulcera.

Aposte-
mata &
ulcera.

Imò cor apostemata & ulcera pati potest, quæ tandem hominem subito per syncopen tollunt. Quia tamen breui tempore contrahi non poterunt, hinc etiam ægri tales frequentissimè lipothymia fuere obnoxij; collegitque huius rei exempla Schenck. *in observ. Med.* Refert quoque, Heinricus Smetius, Miscell. *lib. 10.* se vidisse in mercatoris cuiusdam dissecto corpore dextrum cordis sinum interiore sui parte durum, exasperatum undique, & quodammodo squamosum, quo in loco continebatur frustum condensati

humoris pituitosi, lenti, albicantis, longitudine medij digiti, crassitie pollicis, sanguine mixtum. Verùm quia talia non nisi post mortem demum deprehenduntur, nec curationem recipiunt, plura de his non addimus.

CAPUT IV.

De Cordis palpitatione.

ATque hi sunt morbi, quos cor patitur. Restat ut de symptomatibus, qui in eius actione acciderent, dicamus, palpitatione scilicet, & animi deliquio, syncope. Palpitatio. Græcis *μαρμαίσι*. vocabulo generaliter accepto, est *διαστάσις* p. n. in quacunque corporis parte, quæ distendi & dilatari, utriusque concidere potest, cuiusmodi sunt partes molles, ut cutis, & subiecti huius musculi; quantum hi non obscuras cavitates habent; inter cutem autem & musculos etiam spatia quædam interiecta sunt, in quibus materia palpitationem efficiens colligi, & contineri potest. Causa enim palpitationis ita generaliter acceptæ est halitus crassus, qui in parte collectus cum exitum non reperiat, partem attollit, quæ suâ gravitate iterum concidit. Atque ita ad hunc motum, seu palpitationem generaliter dictâ nata præter expulsionem materie nihil confert, neque palpitatio hæc voluntariæ virtutis & organorum huius actio est, aut motus ex voluntario & naturali mixtus, qualis in tremore, sed simpliciter *κατὰ φύσιν*, & *κατὰ ἀναγκήν*, à sola causa morbifica partem dilatante & attollente, De quo videatur Galenus, *in libr.*

Cordis
palpita-
tio.

de tremore, palpit. & conuul. c. 4. & 5.

Deinde tribuitur etiam eadem appellatio motui cordis præter naturam, qui *παλσις*, & palpitatio cordis nominatur. Nonnulli etiam, teste Galeno, 4. *apb.* 65. per *καρδιασµὸν* cordis ipsius motionem crebram & celerem palpitationi similem intellexerunt, quam alteram *καρδιασµὸν*, speciem Erotianus, alij notham palpitationem faciunt. Verùm propriè *καρδιασµὸς* & *καρδιασυστα* oris ventriculi affectiones sunt, ortæ ab humore acris, & mordaci, quam partem antiqui, *καρδίας* dixerunt. *Παλσις*, & palpitatio cordis à nonnullis etiam tremor cordis & saltus cordis appellatur. Distinguunt nonnulli, inter quos Mercatus, inter tremorem cordis & palpitationem cordis, quod palpitatio à solo morbo fiat, tremor verò à morbo & facultate; Deinde quod palpitatio in ipsius partibus proveniat, quæ dilatari possunt, tremor verò in iis tantùm, quæ voluntariè moveri possunt. Verùm errandi causa pluribus ista fuit, quod palpitationis vt & tremoris vocabulum vniuocè cordi & aliis partibus competere existimant; quod tamen falsum. Nam sunt plurimi in ea sententia, cordi quoque tale quid accidere posse, quale in cute & muscularis sic, à spiritu & flatu frigido & crasso, à quo impletum iterumque euacuatum cor moveatur, instar vtrium, in quibus tale aliquid à liquore violenter infuso, vel spiritu inflato & sursum compresso contingit. Verùm magna palpitationis in partibus externis, & palpitationis cordis est diuersitas. Cutis enim & partes externæ nullo modo sponte se dilatant, sed solum à causis morbificis in altum eleuantur & attol-

luntur. Cor verò eùm facultatem insitam, qua dilatetur & contrahatur habeat, palpitatio cordis sine motu eius fieri non potest. Neque enim credibile est, cor, cuius motus proprius ad vitam summè necessarius est, & quo cessante, vires omnes collabuntur, instar vtrius, vel vesicæ, à flatibus distendi posse. Hoc enim si fieret, cordis naturalem motum cessare necessè esset. Et frustra à nonnullis hic multa loca à Galeno congeruntur, quibus probare conantur, palpitacionem cordis fieri non à natura, sed à morbo, aut potius causâ morbifica. Galenus enim in iis locis omnibus tantùm de palpitatione in cute & partibus externis, non verò de palpitatione cordis, quæ alterius naturæ est, loquitur. Et ipse Galen. 2. de *sympt. caus.* c. 2. palpitationem cordis & arteriarum ab aliarum partium palpitatione discernit. Atque hinc etiam accidit vt authores alij aliter de cordis palpitatione, vel tremore sentiant, nonnulli etiam planè falsa dōgmata habeant. Alij enim in specie eum saltem cordis motum, qui fit à causa cor molestante, seu ab expultrice cordis stimulata ad expellendum id, quod cordi molestum est, palpitationem cordis appellant. Imo nonnulli specialissimè cordis palpitationem ad eum saltem motum deprauatum restringunt, qui fit à materia crassa & sterculenta cor grauante, & quidem nonnulli, ve dictum, eodem planè modo, vt in cute, in corde à flatu palpitationem fieri docent.

Alij verò omnes motus cordis deprauatos nomine palpitationis cordis comprehendunt, siue sint parui & tremuli, siue magni

& cum saltu quodam. Hinc nonnulli palpitationem cordis aliam faciunt legitimam & veram, aliam notham; & legitimam eam saltem nominant, quæ sit à vapore crasso, ab aliis autem causis ortam notham appellant. Sed sufficiens causa nulla est, cur non & illa palpitatione, quam ex vulnere ortam describit Forestus, quæ tam vehemens ac violenta fuit, ut etiam extra domum, in qua æger decumberet, transiret, si fenestræ aures admoueret, exaudiretur, & illa, quam Fernelius thoracis vicinas costas effregisse, vel de sua sede depulisse scribit, aut quas Hollerius recenset, legitimæ & veræ cordis palpitaciones nominari non debeant.

Ideoq; definimus, *palpitationem cordis, metui deprauatum pulsantis cordis facultatis, simulata & currens à re molesta, & usu eius actiouis aucto*. Quam enim in febribus in æstu vehementiore & aliis causis nonnunquam etiam cor vehementius mouetur, tamen nisi motus ille insignis sit & deprauatus, palpitatione cordis non dicitur.

Causæ.

Irritatur autem facultas motrix tribus de causis, nimirum à re aliena & molesta, quam cor expellere nititur spirituum vitalium defectu, & caliditate præternaturam.

Prima ergo palpitationis causa est alienum & molestum quid cordi occurrens, quod à se amouere cupit. Et quia hæc causa frequentissimè facit, ut cor ita moueatur, ut eius motus deprauatus appellari possit, reliquæ verò dux sæpius vehementem aliquem motum potius quàm deprauatum efficiant, nonnulli, ut dictum, palpitationem cordis in specie appellant, quæ sit à causa cor grauante,

sive ab expultrice cordis stimulata ad expellendum id, quod cordi molestum occurrit. Dum enim cor grauatur & in motu impeditur, sit, ut pulsans vis, dum valida est ad expellendum id, quod molestum est, concitetur, & subito ad motum instigetur, vel resarciat motus impeditus, ut maiore pulsus, vel vtraque de causa motum vehementiorem efficiat, aut si vis imbecilla sit, pulsus paruos & crebros faciat. Neque mirum est, quod à corde tam vehementes motus proficiuntur. Cum enim cor principium vitæ sit, vim etiam expultricem, quam vlla alia pars, robustiorem habet, quæ nihil, quod cordi damnum inferre possit, tolerat. Ideoque quotiescunque ipsi aliquid molesti occurrit, contra illud vehementissimè insurgit, & hinc edicit motus vehementissimos.

Sunt autem causæ, quæ cor molestare, & expultricem eius stimulare possunt, variæ. Primum vapores & flatus non solum copia, sed & quantitate manifesta, vel occulta, vel utroque modo cor molestantes, cordis palpitationem excitant. Vnde à venenis, ut & in febribus malignis & pestilentibus, ab humorum putredine & corruptione palpitatione cordis excitatur. Hinc quoque euenit, ut fœminis mensium suppressione laborantibus, & qui melancholiâ hypochondriaca laborant, cordis palpitaciones familiares sint. Per arterias enim melsaraicas, & quæ multæ per lienem diffunduntur, itemque ex utero prauis vapores cor subeunt, cuius vis irritata vehementiore palpitatione nictitur, quod noxium est, expellere. Hinc etiam euenit, ut in corporis motu nimio, ita, metu, tristitia, æstu, balneis, venere,

Causæ
cor mole-
stantes.

nimio vini potentioris potu, inedia, palpitatio cordis præcipuè in dæpofitis excitetur. Ita enim, gaudium, timor, non solum sanguinem & spiritus, sed & humores ac vapores quietos commouent; quod idem & corporis exercitia præstant, & leue exercitium in iis, qui huic malo obnoxij sunt, palpitatio in cordis excitat.

Deinde humores putridi, acres, calidi, vel etiam copiosi cor moleſtare & grauare poſſunt. Qualem sanguinem in arteriis ex ſummo calore, veluti retortidum bilique atræ cognatum, ſe deprehendiſſe teſtatur Fernelius. De qua etiam re videatur Platerus, *lib. 1. Præſ. p. 569.* qui prolixè hac de re agit, & palpitatiõnem cordis, quæ virginibus menſtruatorum ſuppreſſione laborantibus familiaris eſt, ad hanc cauſam reſert. Malim tamen in prauos & fœtidos vapores cauſam reſerre palpitatiõis cordis in virginibus cauſa ſuppreſſorum menſtruatorum malum habitum acquirẽtibus, quàm cum Platero in copiam ſanguinis feruidi & bilioſi, qui cum cachexia, ac malo corporis habitu vix conſiſtere poeſt. Aliàs non negarem, retortidam ac inflammatam in hypochondriis, & in arterias effuſam bilem atram cordi communicari poſſe, cuius malignitate & acrimonia cor irritatum vehementiore hunc motum edat. Idem tamen à prauis vaporibus ex eodem humore eleuari fieri poeſt.

Fiunt & cordis palpitatiões, dùm humiditas illa in pericardio incrementum ſumit, vt cor premat & grauẽt. Huc pertinet ſanguis, qui interdum in vulneribus ad cor effunditur, quod accidit proculdu-

bio iuueni illi apud Foreſtum, *lib. 17. obſeru. 1.* de quo antea dictum. Moleſtant & cor tumores in pericardio excitati, ſiue illi ſint ſcirrhoſi, & humoris expertes, ſiue humorem in ſe contineant. Reſert Platerus in quodam, diuturniore cordis tremore è medio ſublato, oſſeum quiddam & cartilagineum in corde deprehenſum fuiſſe. Et Schenckius, *lib. 22. obſeru.* reſert, in ſacerdote quodam, qui à teneris vnguiculis uſque ad annum 42. quo mortuus eſt, palpitatiõne cordis laborauerat, in cordis baſi carnis excreſcentiam repertam fuiſſe, quæ ſex drachmas ponderaret & alterum corculum re præſentaret. Reſert quoque Dodonæus, in *annot. ad cap. 35. obſeru. Bemuenij*, ſe callum in arteria magna loco cordi proximo obſeruaviſſe. Vnde palpitatio orta eſt per multos annos durans. Huc etiam referendi vermes, quos in capſula cordis genitos cauſam palpitatiõis cordis fuiſſe reſerunt. Nonnunquam etiam externum quid cordi occurrere poeſt, quod illud pungat, rodāt & rumpat.

Secundò, ſi ob inediam, vel morbos vehementes ſpiritus ſubito aut nimium diſſipentur, vel per animi affectus, iram, gaudium, metum, pudorem, ſpiritus ſubito hinc inde propellantur ac diſſipentur, nec vt par eſt, in totum corpus diſtribuantur, vt huic defectui cor occurrat, & quod ſui officiij eſt, omnibus partibus ſpiritus neceſſarios ſuppeditet, eius motum intendi, vehementioremque reddi neceſſe eſt. Hinc quibus à ſpiritus deſunt, & qui debiles ac huic morbo obnoxij ſunt, iis vel leue exercitium cordis palpitatiõnem accerſere poeſt.

Tertio si calor præter naturam in corde augeatur, non solum spiritus intus absorbuntur & dissipantur, sed & accenduntur, ac propterea motus cordis & arteriarum augeatur, ut quod absorbitur, restitua- tur & calor refrigeretur. Fit autem hoc à causis tum internis, tum ex- ternis, irâ, motu. Ita observavit Platerus, iuvenem quendam admo- dum calentem, cum in exercitio pilæ ira corripereetur, atque ita duæ causæ coniungeretur, ita palpitatione cor- dis affectum fuisse, ut cum recolligere se non posset, nec hi motus remitterent, hincò extingueretur.

Hæc duo tamen causarum genera posteriora valde excedere oportet, si cordis palpitationem excitare debent. Alias enim saltem vehe- mentiore aliquem, non verò de- pravaurum, arteriarum & cordis mo- tum excitant. Ideoque nonnulli, ut dictum, primum solum causarum genus admittunt, utpote quod fre- quentissimè palpitationem cordis excitare solet.

Et omnino frequentior est palpi- tatio cordis, quæ fit per consensum aliarum partium, quàm quæ per primum cordis affectum oritur. Habet enim cor cum pluribus parti- bus corporis consensum, & ab his vapores ac flatus & humores reci- pere potest. Ab vero quidem per arterias cum spermaticas, tum hy- pogastricas, quæ à corde ad utrumque descendunt; à liene, per arterias, frequentiores per lienem disperfas, id quod scorbuticis non raro acci- dit; ab hepate, per arterias ad he- par tendentes, & venam insignem dextro ventriculo cordis iunctam; à pulmone etiam per commu- nia vasa.

Differentia.

Differentiæ ex hæcenus dictis se- rè patent, & à causarum varietate præcipuè petuntur. Patet ex iisdem affici cor vel per idiopathiam, cum causa morbi in ipso corde aut eius vasis consistit, vel per sympathiam, cum aliunde communicatur ex utero, liene & aliis partibus.

Signa Diagnostica.

Malum hoc etiam ab ipso ægroto proditur & cognoscitur, manû- que supra cordis regionem apposi- tæ deprehenditur. Estque hic mo- tus in corde aliàs debiliior, aliàs va- lidior, & nonnunquam tam validus & vehemens deprehensus fuit, ut ab adstantibus audiretur, ut refert Christ. à Vega, *art. Medic. lib. 3. cap. 8.* & quidem etiam ex interval- lo, ut ex Foresto dictum, aut ut co- stas vicinas cordi effringeret, vel sua sede dimoveret, aut in arteria à *superius* pomi magnitudine efficeret. Quæ hoc malum remittit; exas- peratur motu, æstu, balneo, ira, cra- pula, usu vini potentioris, venere. Causarum autem varietatem discer- nere non ita facile est. Si à vapore & flatu originem ducat cordis palpi- tatio, repentina fit accessio, & à levi corporis motu excitatur, ac facilius quoque discuitur; respiratio est difficilis, sæpè accedunt tremor in- genuis, oculorum tenebræ, soni- tus aurium, & non raro circa ali- quam partem dolor, qui sponte sta- tim cessat, percipitur. Qualis au- tem flatus sit vel vapor, ex humo- rum signis cognoscitur, cum vapor humoris, è quo elevarur, naturam re- ferat & retineat. Si verò humor sit causa palpitationis, non ita subito

humor inuadit & diutius durat, quàm cùm à vapore palpitatione ortum habet. Qualis autem humor sit, ex signis humorum abundantiam facile innotescit. Et omnino siue humor, siue vapor ab aliis partibus communicetur, ex partium illarum affectuum signis cognoscitur, & imprimis affectio hypochondriaca & mensium suppressio in feminis latere non possunt. Difficilius aqua in pericardio abundans cognoscitur. Malum tamen etiam est continuum & ægri conqueruntur, cor in aqua quasi detineri & suffocari, tandemque emaciantur, ut hectica correpti. Si humores sint prauis, corrupti, maligni, venenati, magna varietas in pulsu apparet, præcipue in magnitudine & paruitate. Magna enim est naturæ pugna. Accedit lipothymia, atque alia signa humorum venenatorum & malignorum adsunt. Si ab alia substantia cor grauante & premente est palpitatione, tum motus valde est præternaturalis, & inæqualiter ac præternaturam cor quasi exsilit, ut vel propulset, quod molestum est, vel ibidem motu diastolæ maiori resarciat. Atque tales causæ facile à suis signis parent. Si tumor sit causa palpitationis, notabilis in cordis pulsu apparet varietas, motus valde à naturali statu recedit; ferè inæqualis, ac inordinatus est. Et si tumor sit calidus, maxima in corpore erit inflammatio, sitis magna, difficilis respiratio, accedit lipothymia, & tandem mors sequitur. Si autem tumor durus sit in pericardio, motus est continuus, & æger sensim sine manifesta causa & euidenti contabescit. Si caro, vel simile quid cordi à primo ortu ad-

nascatur, palpitatione quoque à primo ortu ad mortem usque hominem comitatur.

Si verò ex spirituum defectu palpitatione cordis excitetur, patet hoc non solum ex causis, quæ præcesserunt, spiritusque dissipauerunt & absumpserunt, verum etiam ex eo, quod pulsus crebrior est, & interdum celer, simulque paruus, ob virium imbecillitatem.

Tandem si ob caliditatem nimiam præter naturam palpitatione cordis accidat, cognoscitur id ex signis febris aliisque causis calefacientibus: & præter frequentiam & celeritatem in pulsu magnitudo adest, dum vires constant. Præterea motus hic paulatim deprauatur, & maior ac vehementior in diastole, quàm systole.

Prognostica.

1. Palpitatione cordis omnis periculosum & non contemnendum malum est, ob læsum cordis motum, quo vita conservari debet, & quæ frequenter ad syncopen deducit, tandemque hominem e medio tollit. Docetque Galenus, 2. aph. 41. & 5. de loc. affect. cap. 2. omnes, qui inuenies, aut in declinante ætate sani subito sine ullo manifesto symptomate, palpitatione cordis correpti sunt, omnes ante senectutem mortuos esse, alios per febres acutas, alios cùm sani degerent subito syncope correptos, alios etiã citra syncopen apoplectico motu. Frequens enim palpitatione signum erat, cor & partes vicinas debiles fuisse.

2. Palpitatione per idiopathiam cordis periculosior est, quàm quæ sit per sympathiam: quæ item ab interna causa, quàm quæ ab externa; nisi

magna sit externæ causæ vehementia, vt veneni & ictus violentia.

3. Malum hoc sæpius recurrens tandem hominem ingulat, & quidem si à pericardio affectu proveniat, hominem lentè enecat, & ad tabem deducit.

4. Si proveniat à soluta venitate vel tumore cordis, malum desperatum & insanabile est.

5. Periculosum quoque est si à causa venenata & maligna origineducat, ægrique tales rarò evadunt, sed citò moriuntur.

Indicationes.

Indicationes.

Curatio autem, vbi morbi curam suscipit, ad duo in primis dirigenda. Primum est, vt causa quælibet, prout natura eius postulat & indicat, tollatur. Alterum, vt cor familiaribus & calorem eius innatum fouentibus roboretur. Nonnulli censent, & quidem ex Galeni, vt opiniatur, sententia, omnes palpitatione cordis laborantes adiuuari sanguinis missione. Verùm & ipsa hæc sententia à veritate aliena est, falsum Galenum hoc scripsisse. Non enim Galenus, *5. de loc. aff. c. 2.* omnes palpitatione cordis laborantes adiuutos phlebotomia scribit, sed omnes, qui iuvenes aut in declinante ætate constituti sani repente cordis palpitatione correpti sunt, eos scilicet, qui palpitatione cordis laborabant ex sanguine vitioso cor opprimente, aut ex flatu crasso vel frigido, vel cum plethora pura aut impura quæ adiuuat impetum humi flatu ad cor aut eius generationem per oppressionem diminuto calore, aut etiam impediēbat suā præsentia vsum remedium sanantium calidorum. Si verò palpi-

tio cordis sit ex frigidis, pituitosis, crassisque humoribus, sanguinis missio non convenit; cùm humores illi sanguine detracto crudiores reddantur: sic & in aliis causis, quas non tollit venæ sectio, sanguinem mittere inutile est.

Curatio palpitationis cordis à flatu & vapore.

Sed vt de hisce in specie secundum causarum varietatem dicamus, Primò si à flatu & vapore cor molestante sit palpitatione, sanguisque simul redundet, vena aperienda est. Alioquin enim calidis status discutientibus commodè vti non possumus, quin potius calidiorum vsu materiz affluxus ad cor augetur. Aperiatur autem vena vel in dextro vel sinistro brachio, prout pulsus in hoc vel illo brachio magis inquietus est, & pro redundantia eius ac viri robore sanguinis emittatur. Vtile quoque foret, crurum venas aperire, vt materia deorsum retrahatur, præsertim in formicinis, quibus à mensibus suppressis malum originem habet. Licet & cucurbitulas cruribus affigere.

Hæmorrhoides, si prouocari possint, magnum in hoc malo auxilium afferunt; cùm vix commodiore via sanguinem euacuare tum liceat.

Reliqua quod attinet, cùm status & vapores ab humore sui generis foueantur, humores vitiosi tollendi medicamentis non violentis, sed lenibus sæpè repetitis, vt materia per transpirationem tollatur. Et cùm malum hoc multorum morborum, imprimis melancholiz hypochondriacæ & mensium suppressorum, vtriq; morborum comes sit, curatio

Cura io palpitationis cordis à flatu & vapores. Venæ sectio.

Hæmorrhoides.

Humorū euacuatio.

ad illos morbos dirigenda, cordialibus semper additis.

Vapores
discutien-
tia & cor-
roboran-
tia.

Postea vapores discutientia & corroborantia exhibeantur, & ex his nunc calidiora, nunc frigidiora, ut causa morbi requirit. Monétque Avicenna in omnibus morbis cordis fugienda esse vehementer calefacientia, quæ vires cordis dissolunt; vehementer refrigerantia, quæ calorem labefactant, & spirationem difficilem reddunt; vehementer adstringentia, quæ fuligines & excrementa retinent. Quæ autem cor calefaciunt, quæ item refrigerant, supra de intemperie cordis sunt proposita. Temperata sunt, *aurum, margarita, corallia, os de C. C. lapides pretiosi, bezoar, bolus armenus, terra sigillata.*

Oleum
citri in
hoc malo
Efficax.

Oleum citri quoque cum conferva aliqua vel alio modo exhibitæ valde efficax est ad flatus crassos discutientes & corroborandum. Insignem quoque vim habet rhaponticum verum & ii. pondere exhibitum cum vino, aut vinum, in qua eadem radix macerata est.

Electuari-
us.

Vel ℞. Conseru. melis. ambros. bugloss. an. ℥. i. cortic. citri condit. rad. condit. scorzonera, an. ℥. b. spec. diamosc. dulc. diambra, an. ℥. i. confect. Alchem. ℥. i. Cum syruposunic. F. electuarius. Aliud.

℞. Conseru. borrag. tunic. an. ℥. i. confect. Alchem. iberiac. an. ℥. i. spec. elect. degemm. arom. ros. latitia Galeni an. ℥. i. Cum syrupo bugloss. & de cortic. citri. F. Electuarius.

Electuarius Langii.

℞. Conf. ros. ℥. vi. fl. tunic. ℥. i. melis. ℥. b. spec. diamarg. frig. ℥. iv. galanga, ℥. i. cinam. interior. ℥. vi. caryophyllor. ℥. ii. dorianic. ℥. i. succin. alb. ℥. b. nuc. moschata condit. ℥. ii.

xinzib. condit. ℥. b. cortic. citri. pinear. prap. an. ℥. ii. seminis melonũ. ℥. i. manus Christi cum perlas, ℥. b. marg. prap. ℥. v. sol. auri, N. x. cum syr. acetos. citri. F. Elect.

Vel ℞. Confect. Alchem. ℥. ii. lapid. bezoar. margarit. prapar. an. ℥. b. ol. citri, gutt. iii. M.

Detur ℥. b. vel vnus, cum aqua vel syr. borrag.

Vel ℞. Aq. flor. borrag. in balneo destillat. ℥. vi. flor. citri, ℥. ii. syrup. flor. borrag. tunic. an. ℥. i. spiritus ros. ℥. ii. aqu. cinamomi ℥. b. carbuncul. ℥. ii. magister. perlari. ℥. i. confect. Alchem. ℥. b. M.

Dentur cochlearia duo, vel tria. Extra quoque applicentur sacculi de melis. flor. lauend. rosis. borrag. bugloss. & aliis supra enumeratis cordialibus parati, ac vino albo & aq. ros. itrorati.

Vel ℞. flor. ros. rosis. an. ℥. ii. lauend. ℥. i. sem. angel. cortic. citri, caryoph. cinamom. macis, an. ℥. b. croci, ℥. j. mosci, ambr. an. ℥. vi. Cum syndone rubro, fiat sacculus.

Aur applicetur epithema, ex aq. rosar. melis. lauendul. borrag. card. benedict. cin. carbuncul. vel melissa viridis contrita & aq. ros. ac maluatice itrorata super latere ignito calefacta cordi applicetur. Inungi etiam potest cordis regio, oleo citri, meliss. caryophyll. macis, cinam. vel solis, vel cum vnguento rosaceo mistis.

℞. Vnguent. ros. ℥. b. ol. citri, ℥. b. cinamom. caryophyll. an. gutt. vi. mosch. ambr. an. ℥. iii. M. fiat lini-mentum.

Vel ℞. Ladani puri, ℥. b. sty. calaminta, therebinthina, mastiche an. ℥. ii. olei citri, caryophylla cinamomi. an. gutt. vi. mosch. ambr. an. ℥. iii.

Syrapi &
portionee.

Elect.
Langii.

Subigantur in mortario pistillo calido, addendo sub finem, *ol. nuc. moschata express.* §. ii. Fiat emplastrum.

Vid. Vidius lib. 7. de cur. membr. pag. 292. cucurbitulas sine scarificatione applicare iubet, iisque magnam in discutiendis ac digerendis flatuosis spiritibus, qui in partibus internis inclusi continentur, ineffe scribit.

Sunt & odora menta valde vtilia: cum via non longa ad cor tendant, viris que valde reficiant.

℞. *Fol. meliss. ocyni, caryophyllati*, an. ʒ. ij. *cortic. citri, sant. citrini, caryoph.* an. ʒ. j. *croci*, §. B. *ambr.* ʒ. vj. *mosch.* ʒ. iv.

Ligentur in nodulo, & irrorentur aq. cinam. & rosar. Vel balsama ex enumeratis modo oleis olfacienda naribus illinantur.

Tandem in hac palpitationis cordis specie, quæ à flatibus provenit, opera danda, ut materia flatuum distrahatur, & propterea clysteres purgantes & resoluentes flatu sapis iniiciantur.

Curatio
palpitationis
cordis ab humore.

Curatio palpitationis cordis ab humore.

Si palpitatio cordis ab aqua in pericardio contenta originem habeat, ea euacuanda & absumenda, ac cor roborandum est.

Nonnulli hic etiam venesectionem præcipiunt, sed malè. Tantum enim abest, ut venæ sectio eam euacuet, ut potius ad augendam faciat, calore debilitato.

Quidam purgantibus humores aquosos vtuntur, verum causam antecedentem & humores serofus in corpore, quæ aquam augere pos-

sunt, talia euacuant: ipsam verò aquam in capsula cordis contentam euacuare non valent. Itaque efficacissima hic sunt medicamenta aquam illam absumentia & discutientia tam interna, quam externa.

Aquam in peticardio discutientia interna. Externa.

Inter interna vtilia sunt *confect. Alehermes, sper. diambra, diamoschi, aromat. rosari, theriaca, Mitridda, & alia cordialia calidiora*, ut; *decoct. ligni guaiaci, sarsaparill. sassafras cum corticibus citri*.

Extra verò vtile est, panem calentem à furno regioni cordis applicare, item spongiam vel linteum triplicatum decocto vel aqua aliqua cordiali discutiendi & exsiccandi vim habente madidum.

℞. *Sper. arom. ros. diam.* an. ʒ. ii. *pulu. mic. caryoph. cortic. citri* an. ʒ. i. *fl. bugloss. citri*, an. ʒ. ʒ. B. Sacculus ex syndone rubro, qui vino albo irroretur, & cordis regioni applicetur. Simul odorata medicamenta cordialia, naribus admoveantur, & cibi admisceantur.

Nonnulli vesicatoria cordis regioni applicant, quæ quo modo è cordis capsula per spatium thoracis in cavitatem, in musculos & cutem aquam attrahere possint, non video.

Vesicatoria.

Quæ verò ex humoribus è ventre inferiore transmissis oritur cordis palpitationis, eandem ferè curationem habet, quam ea, quæ ex flatibus provenit. Et omnino si palpitationis cordis per consensum fiat, præcipua curationis ratio est, ut pars affecta, quæ eam communicat, diligenter curetur.

Curatio palpitationis cordis ex humoribus aliunde transmissis.

Venæsectio.
Purgentia humores serofos.

Quidam purgantibus humores aquosos vtuntur, verum causam antecedentem & humores serofus in corpore, quæ aquam augere pos-

Itaque primò vniuersales corporis purgationes instituendæ, & vel vena aperienda, vel humores vitiosi expurgandi, vel vtrumque agendū pro

Purgatio.

humoris peccantis & membri materiam suppeditantis naturâ & ratione. Humores etiam ad cor ruentes reuellendi. Hercules Saxonia hoc Elect. commendat, ad humorem tam pituitosum, quàm melancholicum in hypochondriaca affectione, & cordis palpitacione.

℞. Meliss. oxyi, bugloss. borrag. beonise. agrimon. puleg. an. M. i. cortic. curi. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. i. caryophyll. cinnamom. ligni aloes, macis. an. ʒ. i. fol. fen. elect. ʒ. vi. epibymii, polypod. q. an. ʒ. iv. mirobolan. chebul. curin. an. ʒ. i. passul. enucleat. tb. i.

Aromata ligentur in nodulo, & omnia bulliant, in f. q. aquæ ad dimidiam partis consumptionem, vel quod commodius est, dimidium saltem aquæ, quæ aliàs ad coquendum sumi solet, affundatur, & in vase clauso in Balneo per triduum macerentur, exprimantur & clarificentur.

Hinc adde *pulp. prun. tb. i. cinnam. el. ʒ. ʒ. ʒ. sacch. alb. q. f.*

Coquantur ad iustam consistentiam, vel potius saccharum sufficienter inspissatum addatur.

Ad materiam reuellendam in diuturnis & frequentibus cordis palpitacionibus cauteria & vesicatoria, vel brachis; si materia à capite defluat, vel cruribus, si palpitatio cordis sui per essentiam, aut à partibus inferioribus ad cor transmittatur, uti huius sunt.

De vesicatoriis tamen hoc mouet Mercurialis, ne cantharides usurpentur; cum vim malignam & cordi aduersâ habeant, sed potius ranunculus, stimula louis, sinapi, & similia.

Hinc cor roborandum medicamentis modò enumeratis, & inter ea in primis lapide Bezoar, margari-

tis, lapidib. pretiosis. Et quidem in materia frigida, theriacam præsertim extra adhibitam, valde commendat Mercurialis, narratque Maximilianum Imperatorem, cui palpitatio cordis familiariserat, sibi retulisse, se nullum remedium theriacam melius inuenisse.

Nonnulli quadrupedum & auium corda, ut cerui, bouis, porci, turris commendant, & præsertim assa peculiari proprietate prodesse docent. Hinc hæc aqua additis medicamentis cordialibus destillari potest.

℞. Cor cerui vel bouis, N. i. meliss. M. i. flor. cordial. M. ʒ. cortic. citri, ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. i. caryoph. cinam. sant. curin. an. ʒ. i. croci, ʒ. ʒ.

Affundatur vini q. f. ac destillentur. Aliæ duæ descriptæ existant in *Insitut. lib. 5. part. 3. sect. 3. c. 5. p. 1352.*

Efficaciores sunt aquæ, si moschi, ambreg. an. ʒ. ʒ. in alembico suspendantur.

Mercatus hanc commendat.

℞. Corda tururum N. ii. cernorum, vel bouis N. iii. caryophyll. galanga, an. ʒ. ii. ʒ. ʒ. macis. flor. bugloss. borrag. an. p. i. rorismar. p. ii.

Affundatur vini q. f. Stent per noctem, postea destillentur.

Efficax est & elixir cordiale in *Insitut. loc. alt. p. 1359.* propositum. Ut & hæc aqua:

℞. Flor. borrag. rorismar. rad. bugloss. an. ʒ. ʒ. iv. croci, ʒ. i. succ. cydonior. tb. ʒ.

Vini q. f. Stent in infusione per dies 14. postea destilleitur. Dosis ab ʒ. ʒ. ad ʒ. i. cum ʒ. ii. vini albi gener. vel maluatici in causa frigida; in causa calida, cum aqua borraginis. Vel propinetur hoc vinum.

Cauteriz
& vesica
cauteria.

Cautela.

Corro
borandū.

℞. Rad. belen. angelic. ꝛedear. galange, scorzon. an. ʒ. ii. cortic. citri, ʒ. i. caryoph. cinamom. an. ʒ. ii. sem. coriandr. præp. ʒ. ʒ. ʒ. fl. antbos ʒ. ii. meliss. M. i.

Affundantur vini alb. lb. xviii. Plura talia vide apud Rondelet. l. 2. c. 17. Iohan. Lang. lib. 3. epist.

Curatio palpitacionis cordis. à reliquis causis.

Curatio palpitacionis cordis à reliquis causis, à vermibus à spirituū defectu, à calore nimio febris.

Si à vermibus in capsula eius palpitatio cordis fiat, vermes interficiendi, vt suprà de vermibus in capsula cordis genitis dictum. Ad eisdem autem enecan dos, & lapis Bezoar adhibetur.

Si à spirituū defectu fit palpitatio, curatur spiritus reficientibus & corroborantibus, inter quæ in primis, si morbus id patitur, vile est vinum odoratum, & aquæ ac spiritus cordiales; quorum hæcenus facta est mentio.

Quæ ex calore nimio & in febribus accidit cordis palpitatio, tollitur medicamentis calorem febrilem temperantibus, & iis, quæ supra de interperie, cordis calida propolita sunt.

Dietæ.

Dietæ.

Victus ratio à medicamentis non discrepet. Aer sit purus & alteretur cordialibus compositis, prout causæ ratio id postulat. Eodem modo cibus & potus sese habeat, qui causæ aduersetur, cor verò roboretur. Si causa sit frigida, flatus crassi, materia melancholica, cibo attenuante & calefaciente opus est & propterea cibi condiantur aromatibus, & aliis cordialibus calidis. Vinum sit tenue, odoratum, & ad dulcedinem vergens, vel cereuisia clara & defecata, qui potus

herbis & aromatibus conuenientibus condiri possunt. In causa calida cibi condiantur acetosis cordialibus, vt succo citri, limonũ, aurantiorum, granatorum, acetosæ, ribes.

Potus si aqua hordei cum succis iisdem & eorum syrupis, aut cereuisia tenuis. In spirituū defectu nihil vtilius vino odorato, quod subitò spiritus reficit. Animi & corporis motus nimij, vigilæ, exercitia nimia, Venus præcipuè, ira, tristitia, aliæque animi perturbationes vitentur.

CAPVT V.

De virium imbecillitate.

VT in palpitatione cordis eius pulsatio deprauatur: ita quandoque accidit, vt eodem modo eius & arteriarum motus immineatur: quod malum vulgò virium imbecillitas; Germanis *Schwachheit*, appellatur. Etsi enim virium nomine etiam aliæ functiones intelligantur: tamen præcipuè vitales actiones per eas accipiuntur; & propterea hoc loco de ea agere placeat. Itaque virium defectus & imbecillitas dicitur, cum vires vitales atque cordis & arteriam præcipuè læduntur. Adest quidem & tum motus impotentia, sed differt ea ab ea motus impotentia, quæ, lib. 1. part. 2. cap. 26. fuit explicata, quod illa, viribus, & actionibus cordis saluis, nervoso genere in primis affecto, accidit; hæc verò potissimum corde læso & spiritibus deficientibus ortam habet, vnde labe illa etiam animali facultati communis, dum spiritus vitales, animalium

Virium imbecillitas.

malium materia, non sufficienter generatur, nec calidum nativum omnium partium influente calore, & spirituum vitalium influxu satis fouetur. Hinc in hac virium imbecillitate vniuersum corpus actiones suas difficulter perficit, & ægrè etiam mouetur, partibus non resolutis, vt in motus impotentia, sed languidis, & conuulsatis. Arteriarum quoque modus, seu pulsatio tunc etiam imminuitur, nec ex, vt solent, & debent dilatantur, fitque pulsus, vel paruus, vel languidus, vel tardus, vel rarus, vel intermittens, vel obscurus, aut miurus, aut formicans, aut vermiculans, prout imbecillitas hæc maior, vel minor est. Eodem modo, vt arteriarum motus, ita & cordis motus sese habet. Estque hæc virium imbecillitas maxima paulò ante mortem in agone sic dicto.

Cause.

Cause.

Imbecillitas autem hæc ortum habet, à spirituum & calidi innati, seu substantiæ spirituosæ, à quo vita & robur partium dependet, defectu. Spiritus autem hic insitus cum foueatur à spiritu vitali, in sinistro cordis ventriculo genito, & per arterias in vniuersum corpus diffuso, qui inde influens spiritus dicitur; si primò spiritus ille vitalis non satis copiose, & rectè à corde in partes omnes influat, insitum etiam, atque hinc omnes totius corporis vires debilitari necesse est. Quæ ratione autem & quibus de causis spiritus vitales deficere possint, *capite sequenti* dicitur: scilicet, quod vel non generantur, vel quod generati dissipantur, aut suffocantur. Quæ causæ omnes etiam hic locum habere possunt, nisi quod in lipothy-

mia & syncope spiritus vitales pendè toti & subito deficiunt: in virium verò imbecillitate pauciores, quàm debebant, partibus communicantur.

Deinde cum spiritus insitus non influente foueri debeat, sed etiam humido primigenio, quod appellatur, cui insideat, tanquam pabulo indigeat, si humidum istud deficiat & imminuat, etiam spiritum insitum debilitari, & vires labefactari necesse est.

Tertiò si etiam ipsa spirituiosa partium substantia, seu spiritus insitus, vel calor innatus dictus imminuitur in toto virium corpore imbecillitas sequitur. Accidit autem hoc ab iisdem causis, quæ spiritum influentem dissipare, vel suffocare possunt, quæ *capite sequenti* proponuntur. Fit nimirum cum humidum primigenii, tum caloris insiti, seu, vt utrumque vno nomine completamur, calidi insiti imminutio: à nimia Venere, sanguine, & aliis euacuatiouibus, quæ spiritus dissipant, dolore nimio; animi affectibus, & præcipuè timore, & mœstitia diuturna: morbis acutis & longis, in primis febribus, quæ & cordis & omnium corporis partium humidum primigenium exhauriunt, & calidum nativum dissipant: calore, & æstu externo: labore & exercitio nimio: frigore nimio, vt & otio, quo calor natus quasi suffocatur & torpidus redditur: humoribus vitiosis, qui per totum corpus diffunduntur, & calidum nativum opprimunt, vnde insolita virium debilitas imminetium morborum signum esse solet: venenis tandem & venenatis qualitatibus, quæ cordi & calido nativæ tota substantia aduersa sunt.

signa.

Signa Diagnostica.

Ipsum malum per se patet, ægritque de vitium omnium debilitate conqueruntur. Causæ verò ex iis quæ præcesserunt, vel adsunt, cognoscuntur, & cap. seq. etiam explicabuntur.

Prognosticum.

Prognosticum.

Quid autem periculi portendat, id omne ex causarum gravitate, vel leuitate æstimandum. Prout enim causa, quæ vitium debilitatem inducit, grauior, vel leuior est: ita etiam, vitium imbecillitas plus vel minus periculi portendit.

Indicationes.

Indicationes.

Curatio in duobus consistit, primo vt causæ, si adhuc adsint, tollantur, nimirum si euacuatio aliqua nimia sit, supprimatur: si à dolore spiritus dissipentur, vt is leniatur, & mitigetur: si ab animi affectu nimio, vt ei modus adhibeatur: si morbus vel febris adsit, curetur: si immineat, humores vitiosi expurgentur: si ex otio calor torpeat, corpus exerceatur: si à qualitate maligna calor destruat, ea expungatur: Secundò vt calidum insitum & spiritus vitales influentes conseruentur.

Curatio.

Curatio.

Qua ratione autem causæ istæ tollendæ sint, aliunde & ex sequenti quoque capite patet. Quapropter saltem hic, qua ratione calidum insitum & spiritus influentes conseruari, instaurari & augeri possint, dicemus: etsi etiam supra, de insensibilibus & morbis cordis, hac de re dictum sit, quod ibi videri, & huc transferri potest. In medicamentis tamen exhibendis ad causas simul respiciendum, ne dum spiritus reficere volumus, causam augeamus.

Ideoque in imbecillitate vitium & febre acuta, vel hæctica calefacientia, & exsiccantia non conueniunt, sed temperata exhibenda.

Utalia autem hic sunt in primis medicamenta cordialia supra proposita, & quibus pro causæ ratione conuenientia eligantur. Ideoque hic composita quædam saltem proponemus: è quibus cuilibet morbo comoda eligi poterunt. In primis verò gratum odorem spirantia spiritus reficiunt, ac roborant: atque hinc vinum odore plenum spiritus valdè recreat: præcipuè si aliorum odoratorum vi imprægnetur, qualia sunt moschus, ambræ, cinamomum, caryophylli, macis, crocus, zedoaria, cortices citri, lignum aloës, santalum, styrax, ladanum, rosf, viola, laudula, rosmarinus, spicanardi, melissa, ruta, salvia, &c. Vile etiam est acetum, præcipuè ex maluatico, & in primis rosis, fl. lilior. conualium, ruta, pulegio, succo rubi Idæi imprægnatum.

Odorata
spiritus
reficiunt.

Aqua odorifera cordialis, pro naturis calidioribus.

℞. Caponem, absconde caput & pedes, exenteretur, ac pinguedo dialis pre remoueatur. Incidatur minutum & calidus, affundatur. Aq. buglisse, cortic. citri, borrag. citrory, acerofa, rosf. an. canib. f. flor. stæchad. Arabic. chamamel. Rosmar. berreg. buglossæ, an. M. i. spec. aromat. rosfati, diatriosfani al. cinamom. acut. an. ʒ. i. b. santali citrini odorif. ʒ. i. pomar. citri recent. N. iv.

Incidentur incidenda minutim, fiatque destillatio secundum artem: Detur ad placitum sumentis ab vna semis ad vnam vnam.

Aquam instaurans diala.

℞. Ius cap. & cordis bonis vel Aqua incutur simul perfectè coctæ, mens. i. vni instaurans.

maluatici, pomum arantium vellimnium, vel aliud, ut dictum, diffitum in partes unum vel duo, rad. galanga, fol. melisse an. ʒ. i. cinamomi ʒ. ʒ. B. caryophyll. ʒ. ii. sem. coriandri, ocyimi, flor. rosar. rubr. scabiose, bugloss. viriusque an. ʒ. i. croci ʒ. i. rasura C. C. eboris an. ʒ. i. Misce; eliciatur aqua.

Quæ per se datur, vel cæteris commixta.

Aqua odorifera preciosa.

Aqua odorifera preciosa. ʒ. Flor. lilior. conuall. M. ii. ros. rubr. opt. M. vi. lauendula, M. j. borr. bugloss. an. M. ii. fol. saluæ, immorane, bissopi, rorismarini, an. M. iii. melissa, mentha crispæ, an. M. i. cinamom. acutiss. cubebæ, styrac. calaminta, an. ʒ. i. macis, piperis long. cardamomi minor, nuc. moscb. caryoph. an. ʒ. ʒ.

Tusis & incisis minutim, ac repositis in cantharū magnum, affunde vini maluatici & aq. rosar. opt. an. cantib. ii. digerantur ad triduum, quotidie ter agitando: dehinc fiat destillatio igne lentiss. & in capitello vel rostro ponatur ambr. moschi ana ʒ. ʒ. cum syndone rubr. detur imbecillo vel natura vel vi morbi cochleare vnum sæpe, & humectentur in hoc destillato lineæ pura, quæ admoueantur cordi, temporibus, pulsibus ac naribus.

Aqua vitæ odorifera pro naturis frigidioribus & adultis.

Aqua odorifera preciosa alia. ʒ. Spiritus vini rectificati lb. ii. croci, caryophyll. granor. paradisi, nuc. moscb. macis, cinam. mastiches, cardamom. zedoaria, cubeb. rosar. rubr. an. ʒ. i.

Pulueriscentur crasso modo, fiatque infusio ad octiduum, dehinc fiat colatura citra expressionem, & adde *mo-va cydonior.* ʒ. vi. Misce, datur

pro vice cochleare vnum: roborat stomachum, hepar, splenem, & cor, renibus etiam in expellenda serositate vires addit: potest mane, ac sero sumi ante somnum.

Alia aqua odorifera.

ʒ. Flor. rosar. opt. recent. ʒ. vi. spica nardi vulgar. rec. herb. rorismar. maioran. an. ʒ. i. basilici, thymi, santurina, an. ʒ. ʒ. B. cortic. citri recent. ʒ. ii. ligni aloes odoriferi, cinam. elect. an. ʒ. i. caryophyll. ʒ. ʒ. rad. ireos Florent. ʒ. vi. styrac. calam. asa dulcis, an. ʒ. ʒ. B. vini maluatici, aqua rosar. ana lb. iv. lauendul. meliss. an. lb. i.

Viridia incidantur, arida verò in puluerem redigantur. Solique exponantur per 7. vel 9. dies: Deinde destillantur lento igne in vase duplici. Præparanda est hæc aqua tempore æstiuo: datur intra corpus ʒ. ʒ. extra eâ pulsus & nares humectentur: potest etiam manibus irrorandis ac lauandis adhiberi.

Julebi & potiones.

ʒ. Confect. alkermes, ʒ. i. pulu. diamarg. frig. ʒ. ʒ. B. syr. de acet. citri, ʒ. ʒ. B. de papauere, ʒ. iii. Cum aq. ros. bugloss. & cinamomi, Fiat potio.

Hæc & in doloribus hominem prosternentibus vtilis, auctâ præsertim syr. papaverini quantitate.

Alia, quæ & in veneno sumpto conueniet.

ʒ. Confect. de byacinib. ʒ. ʒ. B. syr. acetos. citri, ʒ. i. aq. scabios. meliss. an. q. f. Fiat potio.

Rotulæ, manus Christi, & diamargariti frigidi sint in frequenti vsu, vel rotulæ & morsuli suprâ partis huius c. 2. propositi. Vel paritur talis mistura.

ʒ. Pulu. sacch. opim. q. v.

Humectetur probè cum aqua cinamomi optima, quo nonnihil fluidû

reddatur faccharum, cui adde aliquot guttas spiritus vitrioli pro acetositate manifesta; vltcrius admisce ol. cinamomi, gut. iv. caryophyllorum, gutt. ii. macis, nucis mosch. destillat. anisi, an gut. iii.

Probè inuicem miscendo detur cum cochleari argenteo ad placitum.

Electuarium confortans.

℞. Conf. rosar. rubr. borrag. hurgloss. tunicis, melisse, an. ʒ. i. spec. elect. resumptini, ʒ. ʒ. cortic. citri condit. ʒ. vi. rad. condit. eryngij, saryrij, an. ʒ. ʒ. confect. Alkermes, ʒ. ii. spir. rosar. essentia citri, an. ʒ. ʒ. ol. cinamom. gutt. vi. Cum syr. fl. borra. Fiat elect.

Externa quoque antea proposita pulvis, cordi & uatibus applicentur.

Diat.

Ager nutriatur alimentis, quæ bonum & multum siccum præbent, ac facildè concoquuntur eaque in quantitate parua, sed sæpe exhibeantur, potissimum senibus, & qui è morbo conualescunt, aut ex magnis euacuacionibus vires perdidderunt. Et si vis coquendi sit debilior, vt crassiores cibos concoquere non possit, dentur iura instaurantia in Institut. lib. 5. part. 4. sect. 3. et 2. proposita. Præcipuè vinum odoratum, quale est Rhenanum & Nectaricum, & panis albi mica eo madida vires valde instaurat, cui pro morbo exigente succus citri, vel granatorum, vel simile quid addi potest.

CAP. VI.

De lipothymia & syncope.

QVandoque verò accidit, vt arteriarum motus ferè tollatur: Lipothymia & syncope. Quod malum, prout varios gradus minoris & maioris ratione differentes habet, ita etiam varijs nominibus exprimitur.

Leue est animi deliquitum, *ἀσυνεμία*, & *ἀνοψυχία* & *ἀσφυχία* *ἑλάνθη* grauius; *οὐρνοσὶ* grauiissimū. Quæ si à *ἑλάνθη* ed vsque deueniat, vt in toto corpore pulsatio aboleatur, *ἀσφυχία* nominatur, quæ proximus ad mortem gradus est. Differre autem *ἑλάνθη* à *ἀσυνεμία* vel *ἀνοψυχία*, patet ex eo, quod Hippocrates, 7. apbor. 8. scribit: *Αἰνερκεῖς ἰντορσὺν ἐρρηπνὴ ἑλάνθη* *ἀνοψυχία* oritur. Et *Ἐγινετα*, lib. 3. cap. 34. inter syncopes signa *ἑλάνθη* & *ἀνοψυχίας* nominat.

Apud Hippocratem quidem & antiquos Græcos vox *οὐρνοσὶ* vilitata non fuit, quæ affectum hunc *οὐρνοσὶ* *δύμνη* & *ἀνοψυχίας* & *ἀσφυχίας* appellarunt: Paulò tamen ante Galeni tempora hæc vox inuenta, & in specie tribuitur grauiori malo, quàm est *ἀσυνεμία* & *ἀνοψυχία*. Hæc enim inter has voces genuina est differentia. Nam, vt docet Galenus, ad Glanconem libr. capite decimo quarto, *ἀσυνεμία* est syncope imperfecta, & præterea syncopen semper præcedit, atque in *ἀσυνεμία* sensus nondum planè aboletur; & ipso paroxysmo ægri vident, audiunt & intelligunt, quæ audiunt, licet non possint nutu aut signo demonstrare cogitationes. Præterea vt

Syncopes
vox Hip-
pocrati
non in usu
fuit.

Aëtius, *tetrab. 2. serm. 2. cap. 3.* docet, in *lipothymia* xgri non sudant, in syncope verò sudationes accidunt, quæ idèò etiam synoptica dicuntur. Cùm enim in syncope vires magnopere prosterantur, & calor ad interiora refugiat; humidum partium solidarum rectore destitutum ad exteriora defluit. Ac frigiditatem ijs sudores, quia calor naturalis regēs partes solidas in syncope vel extinguitur, vel extinctioni proximus est; quod à partibus illis profluit. In lipothymia verò sudores non exeunt; quia vires in hac non ita collabuntur. Quidam tamen hanc Aëtij sententiam & differentiam non simpliciter admittunt, putantque, etiam in lipothymia aliquando aliquem sudorem accidere posse, & in syncope corpus ita dispositum esse posse, ut vix aliquis sudor erumpat.

Lipothymia & syncope aut totum gradibus differant.

Sunt quidem nonnulli, qui lipothymia & syncopen non solum maioris & minoris ratione discrepare putant, & longè maiorem esse differentiam existimat Mercatus, atque lipothymiam esse affectum cerebri, & in ea solum & primario cerebrum offendi, seu esse casum subitum animalis potentiae, qui fiat retrocedentibus spiritibus animalibus ad cerebrum ipsum, quo accidat, ut instrumenta sensuum & motus spiritibus destituantur, atque ita actiones suas exequi non possint. Syncopen verò esse proprium cordis affectum, & in eo cor primum pati, & hinc ob dependentiam, quam cum corde habent, alias actiones omnes laedi. Verùm falsa & tanto viro indigna est hæc opinio, & in lipothymia non tam spiritus animales, quam vitales laeduntur, id quod symptomata, quæ in lipothymia adiunt, & causæ, quæ

eam excitant, ac cor, non cerebrum afficiunt, solùmque à causis syncopes magnitudine differunt, satis docent. Ideoque in omni lipothymia pulsus (quamquam Mercatus sine ratione contra experientiam id negat) aliquo modo læditur, nec plane saluus est. Quod verò simul facultas animalis afficitur, idèò fit, quia spiritus animales salvi esse non possunt, si vitales rectè sese non habent, cùm illi ex his generentur. Quapropter lipothymia non cerebri, sed cordis affectus est, in quo sensus & motus idèò laeduntur, quod spiritus vitales cerebro non communicantur.

Cælius Aurelianus & Aretæus, in *inscriptione cap. 3. lib. 2. de morbis acutis*, cardiacam in genere appellant. Quia tamen *in eis* non solum cor, sed & orificium ventriculi significat, in specie nonnulli eam syncopen, quæ oris ventriculi consensu fit, cardiacam appellant. Alij verò & magis propriè eam syncopen simpliciter cardiacam vocari delere censeant, quæ primario cordis affectu fit, eam verò, quæ ex oris ventriculi fit consensu, stomachicam, ut docet esse nominandam Galen. *5. de loc. affect. c. 2. 12. meth. med. c. 5. 3. de crassi. ratione in acutis text. 59.*

Definitio.

Est ergo animi deliquium, ut Galenus, *12. meth. med. cap. 5.* definit, præceptum virium lapsus, id est, subita actionum vitalium & consequenter animalium imminutio, sicut syncope penè earum abolitio, ob spirituum vitalium vitium, & denegatum in alias partes influxum.

Causæ.

Itaque pars primario affecta est Cor. Causa proxima est spirituum

Definitio.

Causæ.

vitaliam, sine quibus cor, nec vlla alia pars in corpore suas actiones edere potest, subito defectus; id quod subita huius mali inualio fatiscitur. Spiritus autem vitales ad alias partes non influunt, vel quia non generantur, vel quia generati dissipantur & dissolvuntur, aut suffocantur. Non generantur, vel defectu materię, vel generatrice eorum facultate sese non recte habente. Deficit materia in nimia sanguinis euacuatione. Quanquam & tum spiritus simul dissipantur. Quod etiam facere potest calor intensus & perseverans, qui non solum spiritus dissipat, sed & eorum materiam absorbere potest. Spiritus enim vitales ex tenuissima sanguinis parte generantur, quę a calore magno & diuturno absorbuntur, idque in iis facilius accidit, qui humores tenues, & corpus ad *diuturnum* aptum habent, de quo Galenus, 12. *meth. med. cap. 6.* Facultatis autem generatricis causa spiritus non generantur, cum ipsa cordis substantia, quę spiritus generat, sese recte non habet; quod fit in morbis, qui temperiem cordis valde immutant, calidumque eius natium absorbunt, quales sunt febres synoptice, malignę, pestilentes, colliquantes, hecicę, *pneumonicę*, item morbi compositionis, & solutę vnitatis, qui si sunt paulo grauiores, a syncope ad vitam nullus datur regressus, sed hominem iugulat.

Spiritus verò generati absorbuntur & dissipantur ac corrumpuntur variis de causis. Primo spiritus corrumpuntur, aut certe insigniter mutantur & afficiuntur a maligna ac venenata cordis ac spiritibus vitalibus peculiariter aduersa materia, siue il-

la in corpore generetur, id quod accidit in febribus malignis, aut cum vermes in aliquo loco stabulantur, vel sanguis menstruus, aut alius humor corruptus alicubi in corpore delitescens putres ac malignos vapores ad cor mittit; siue extra adueniat, id quod fit, cum aer malignus & venenatus, vel venenum admotum, vel morsu aut ictu animalium venenatorum corpori communicatur. Quod pertinent & peculiare antipathię, cum quidam rerum, alius non ingratarum odorem, conspectum, vel præsentiam ferre non possunt, sed ea de causa animo deficiunt. Deinde a corde auertuntur, resolvuntur & dissipantur spiritus vitales variis de causis. Nimirum calor insignis spiritus ad exteriora euocat & dissipat. Quod pertinent febres ardentes, ætus æris, balnei, corporis motus nimius, perturbationes animi nimie, ira, *anxiété* seu effusum gaudium, quos alios syncope correptos, alios mortuos esse legimus, *vigilię*, fames & inedia diuturna: Venus nimia, dolores colici, oculorum, dentium, oris, ventriculi & aliarum partium, in primis earum, quę magnam cum corde consensum habent, euacuationes nimie, vel sanguinis per nares, vterum, hæmorrhoides, vulnus, phlebotomia, vel humorum excrementiciorum, per vomitum, aluum, urinam, sudores; quę excretiones, in primis si cum dolore coniungantur, id quod fit in dysenteria, vires valde prosterunt; aut si abscessus subito rumpatur, de quo Hippocrat. 3. *aphor. 8.* a *tuberculi inius ruptione exsolutio*, vomitus & animi deliquitum accidit, aut si hydropicorum aquę, aut empyicorum pus subito euacuatur. Et ut spiritus facilius dissipantur,

facit corporum & humorum natura in iis, qui tenues succos habent, ut facilius exhalent, & *insipien*, patiantur, de quibus Galenus, 12. *meth. med. cap. 16.*

Tertiò suffocantur & obruuntur spiritus vitales, vel cum spiritus & sanguis subito ad cor confluit, quod fit in febre syncopali, ex humore crudo cum oris ventriculi offensione, de quo Gal. 12. *meth. med. c. 3.* & consternatione nimia & repentina, quam Græci *ἰσχυρία*, nominant, Galen. 12. *meth. med. c. 5.* vel cum vapores crassi à ventre inferiore attolluntur, & humores crassi ac frigidi arterias replent, ut spiritus liberè moveri non possint, vel cum circa cor & mēbra vicina copiosè fuligines cumulantur, & læsa respiratione non expelluntur.

Hisce causis hætenus enumeratis addit adhuc aliam Carolus Piso, de morbis ab illius serosa, cap. de morbis thoracis, statuitque, etsi causæ hætenus enumeratæ omnes absint, tamen accidere posse syncopen, quæ hominem in momento ferè jugulet, ab interceptione seu obstructione nervi sexti paris cordi implantati, ab humore seroso & cerebro repontè in eum defluente. Docet enim cor accepto à cerebro motus principio moveri, ideoque si ætate florente vel consistente & in corporibus calidis & humidis & *ἰσχυρία* serosa in capite colluvies abundet, & in principium nervorum irruat, ac vel guttula saltem eius in nervum cordi insertum aberrer, spiritu animali non denegato, cordis motum subitè intercipi, hominèmq; inopinatè mori. Quod ante ipsum etiam docuit Piccolomineus, qui statuit, nervullos illos exiles, qui à sexta coniugatione

cordi inferuntur, ei vim motoriam præter sensum tribuere.

Verùm in hac opinione illud magnū paradoxum est, motum cordis pendere à facultate animali, & non sui generis ac peculiarem esse, qui vitalis dicitur. Et si ab hoc nervulo obstructo fieret nō solūm syncope, sed & mors accidere item deberet, vbi in apoplexia totum nervorum principium affectum. At videmus in Apoplecticis nihilominus cor moveri & pulsū durare. Et experientia etiā se didicisse scribit Spiegelius, falsam esse Piccolominei sententiam, cum plurimum animalium corda exēpta è corpore abscisso penitus nervo aliquandiu mota fuisse observari. Ideoque cuilibet perpendendum relinquo, annon illi, quorum, ut syncope subitè extinctorum, allegat historias Carolus Piso, apoplexia forti extincti fuerint; & meinini aliquos iis similes, quos Piso describit, habitu scilicet corporis carnosio, ætate consistente, subitè concidisse, & nullum verbum protulisse, ac post horas non multas mortuos fuisse, qui tamen reuera fuerunt apoplectici, cum motus cordis & pulsus in iis permanisset aliquandiu, facultatis verò animalis affectæ signa evidentiā adfuerint.

Differentia.

Differentia illa, quæ secundum maius & minus est, non ita magni momenti est, cum curationem non ita variet. Magis illa attendenda, quæ à causarum diversitate sumitur, & quod alia sit per primarium cordis affectum, alia per consensum vteri & lienis. Nimirum quinque, quæ curationem variant, differentiz sunt attendendæ, quarum

Differentia
tia.

tamen singulæ rursus aliquas particulares differentias habet.

Prima est, cum materia spiritibus generandis subtrahitur quocunque modo; quod præcipue accidit in corpore raro, & quod humores tenues habet, qui faciliè dissoluntur.

Secunda, cum ob morbum aliquem cordis æconomia eius & spirituum generatio læditur.

Tertia, cum maligna & venenata materia spiritus corrumpit, vel insigniùter mutat, seu in corpore genita, in febribus malignis, seu extra communicata, quo pertinet & optatorum vlus.

Quarta, cum spiritus dissipantur & absorbuntur à calore nimio, motu corporis & animi, vigiliis, inedia & euacuationibus inmodicis, abscissum eruptione, & aquarum sub cure euacuatione confertim facta, doloribus.

Quinta cum suffocantur, vel ab humore crudo in febris syncopali, aut animi consternatione, aut à vaporibus, seu intra genitis, seu extra communicatis.

Signa Diagnostica.

Signa.

In lipothymia, quæ syncopen antecedit, pulsus est languidus, paucus, inæqualis; facies pallore suffunditur, ex recurso spirituum & sanguinis ad interiora: quæ de causâ & extrema frigent, oculis tenebræ suffunduntur, aut viride, vel flauum quid iis obseruari videtur. Sudor sæpè diaphoreticus apparet, præcipue circa frontem; quoniam partes calore destitutæ humiditatem continere nequeunt, & cerebrum aliqua ea parte compatitur: frigidusque erumpit; quia per cutim ob reuocationem caloris ad internam refrigeratam transit. Quæ signa omnia diligenter at-

tendenda sunt; cum vtilissimum sit, imò summe necessarium, imminentem syncopen præuidere, ut quantum fieri potest, præcaueri possit. Nam sicut Menon, filius Zoar, ait, ut refert Rabbi Moses, 6. apb, qui syncopè non præuidit, aut præuisam annunciauerit, hominis mortui homicida est.

In syncope verò symptomata hæc omnia vehementiora sunt, pulsus quo ad sensum cessat, mentis actiones, & motus sensusque corporis, ac vox quoque perit.

Quod ad signa causarum, humorum tenuitas, & corporis constitutio ad *diag. spiritus*, apta suis signis cognoscitur; & tales, præcipue syncope corripuntur, si febris accedat, vel ambientis æstus, atque in his celestiter facies Hippoc. apparet, ut docet Galenus, 12. *meth. med.* cap. 6. Humores maligni in corpore geniti, aut venena extra quocunque modo communicata è suis signis patent. Causæ resolucentes à suffocantibus non ita difficile discerni possunt. Si enim corpus extenuatum sit, & causæ etiam spiritus dissipantes præcesserint, ex spirituum resolu in me & dissipatione malum ortum esse indicatur. Si verò cohibita sit aliqua euacuatō, homo plus iusto edat aut bibat, frigidorum, ac crudorum humorum signa adsint, aut phlegmone vel obstructio, vel dolor circa cor addit, aut *mutatio*, materiz subita ad partes illas facta sit, aut repentino timore aut terrore homo consternatus sit, suffocari spiritus argumento est.

Ex cuius autem partis vitio cor afficiatur, ex cuiusque propriis accidentibus, quæ syncopen necessarò antecedunt, cognoscitur. Ex vtero

v. g. si syncope prodeat, vteri affecti signa sunt. Ex affecto ventriculo si proueniat, præcellerunt oris ventriculi dolor & morsus, & nausea, vomitus, & eius generis signa alia. Et quidem si ob fluxum bilem os ventriculi molestantem accidat, cognoscitur ex maiore oris ventriculi dolore, ex vellicatione, anxietate, oris amarore, siccitate & siti. Idem de alijs partibus esto iudicium.

Si verò nullum alicuius partis affectus est indicium, nullumque alius affectus, nec sebris, nec inflammatio, nec alicuius partis affectus signa adlunt; ex primario cordis affectu lipothymiam prouenire indicio est.

Quid autem mali cor patiatur, cognoscitur ex ægri facie, modo, quo in syncope incidit, & ex his, quæ præcellerunt. Ex spirituum corruptione, aut venenatâ aut maligna alteratione, si sit syncope, luida & valde frigida apparent extrema, facies pallida & plumbea est, nec tamen collapsa, respiratio non ita est immutata, licet sit frigida, cessit subitus ægri lapsus, & si venenû sumplerit, vel ab animali venenato morsus vel ictus sit æger, nec id latere potest.

Ex spirituum dissipatione synco-
pem prouenire, vix dictum, cognoscitur ex his, quæ præcellerunt, labore & exercitio nimio dolore, vehemente, vigilijs, & similibus causis.

Ex spirituum suffocatione fieri cognoscitur si causæ istæ non præcellerunt, æger plurimis & crassis humoribus abundet, adlit ventriculi anxietas, & nausea, cum præcordiorum tensione ac dolore.

Ex quibus omnibus synco-
pen à cognatis affectibus discernere facile est. Distinguitur syncope ab epilepsia, quod licet interdum animi deliquium, aut potius quædam animi seu sensuum perturbatio epilepsiam præcedere soleat, nulla tamen adest in syncope convulsio, sicut in epilepsia. Ab apoplexia verò differt, quod in apoplexia pulsus insigniter non mutatur, nisi morte instante. Ab vteri strangulatu, quod in ea aufertur respiratio, sed non pulsus, cum contra in syncope pulsus ad sensum penitus auferatur, respirationis autem difficultas tanta non adfit. Interdum tamen cum suffocatione vteri syncope coniungitur, atque tum pulsus interdum non percipitur.

Prognostica.

1. Qui sæpè & sine manifesta causa animo linquantur, ij repente moriuntur. Hip. 2. aph. 41. Prognostica.

2. Omnis syncope mala; sed pessima, quæ fit in corpore debili, quæ vetusta, quæ confirmata. Cognoscitur autem syncope esse confirmatam & consummatam, quod color faciei viridis apparet, & collum, vt in strangularis inuenitur. Auicenn. 3. canon. fenit. tract. 2. c. 6.

3. Syncope, à qua homo non restituitur, post irrorationem faciei cum aqua rosarum. Post vini exhibitionem, post ptarmica etiam, lethalis est.

4. Cor primariâ affectione laborans auxilium non admittit, purâ phlegmone, erysip. dyscrasia vehementi, per febres acutissimas, vulnera præsertim sinistri ventriculi. Per consensum verò affectum à cerebro, hepate, ore ventriculi, à subita &

vehementianimi perturbatione, curationem recipit, nisi vires planè deiecta sint. Paul. *Ægin. lib. 3. c. 34.*

5. Syncope ex cordis intemperie simplici mitior est, quàm quæ ex instrumentariis eius morbis, aut soluta vinitate oritur. Simplex etiam spirituum animalium alteratio minus offendit, quàm eorundem suffocatio, aut resolutio & euacuatio.

6. Syncope, quæ fit ab intemperie cordis frigida vehemèti, ægerminè curatur. Nam à nulla alia corporis parte calor naturalis cordi communicatur, sicut cor, quod est caloris principium, calorem aliis communicat.

7. Qui ob magnam humorum crudorum copiam febricitantes in syncopen incidunt, si ventriculus & hepar in his inflammatum fuerit, desperata salus est. Similiter qui ob humores tenues omnino concidunt per febres, & ventriculum aut hepar inflammatum habent, viribusque languent, in his celeritèr lethalis constitutio in facie apparet. Galenus, 12. *meth. medic. cap. 3. & 6.*

8. Non statim salus promittenda, cùm quis à syncope sibi redditur. Nam si pulsus non redit, nec calor viuus, & æger frigidus semper manet, mox in syncopen relabitur.

9. Syncope, quæ ex immodicis euacuationibus, timore, tristitia, aut alia euidenti causâ provenit, minus periculosa est, quàm quæ ab interna orta est.

Indicationes & Cursus.

Indicatio-
nes & cu-
ratio.

Curatio autem syncopes in duobus temporibus diuiditur, vnum paroxysmi, alterum intermissionis. In paroxysmo ut æger excitetur, & reuiuifcat quasi,

primò spiritus conferuandi, fouendi & instaurandi sunt, secundo facultas animalis atque vitalis excitanda; tertio causæ, quæ spiritus lædunt, tollendæ sunt, pro quarum diuersitate diuersa præsidia requiruntur. Si spiritus non generentur ob nutrimenti defectum, corpus quamprimum nutrimento reficiendum: si non generentur ob cordis aliquem morbum, ei quantum possibile, occurrendum: si spiritus corrumpantur, vel causâ maligna alterentur, illæ causæ per contraria tollendæ: si dissipentur & resoluantur, non solum per odoremata & alimenta spiritus instaurandi & fouendi, sed & causæ illæ, quæ spiritus resoluunt, tollendæ, pori corporis, ne nimia fiat resolutio, claudendi, euacuationes immodicæ sistendæ, dolores leniendi, & reliquis etiam causis, occurrendum: si à spirituum suffocatione fiat syncope materia ad cor affluens reuellenda; si copiosa sit, euacuanda; si cruda & crassa, alteranda.

Primum ergo quod attinet, spiritus conferuentur, roborentur, foueantur, & ad naturalem statum reducuntur cum internis, tum externis auxiliis. Nimirum aqua rosacea, vinum, acetum, aqua cinamomi, carfunkuli, moschus, ambra & similia alia cordialia admouenda, iisque facies irroranda & tempora illinenda. In paroxysmo tamen obseruandum, 1. ut in morbis calidis frigida vsurpentur, rosæ, & earum aqua, violæ, flores citri, sangalium, acetum. In frigidis autem morbis calida. Licet tamen in frigidis aliquid de calidis admiscere ob spiritus subito reficiendos. 2. In feminis odoremata suauia naribus non ad-

moueantur, sed potius graucolentia, vt castoreo, ruta, ne vteri suffocatio concitetur, atque ita periculosus malum reddatur. Cordis quoque regioni epithemata, fomenta, sacculi, inunctiones ex cordialibus, theriaca, Michridario, oleo citri, spiritu aliquo, vel aqua cordiali admouenda. Atque hic etiam valde utilis est melissa vino odorato, vel maluatico conspersa, & in latere calente calefacta, atque cordis regioni imposita. Exhibendum simul vinum generosum vetus, aut panis co madidus. Vix enim aliquid magis & citius vires, quam vinum reficit. Quamquam verè aliàs & extra paroxysmum iis, qui inflammatione viscerum aliqua laborant, aut capite dolent, vel simili malo instantur, vinum non conueniat: tamen in ipsa syncope; in qua vniuersum corpus refrigeratur, plus vrgent spiritus reficiendi, quam illæ causæ prohibere possint. De delectu autem vini in syncope videatur Galenus, 12. meth. med. cap. 4. Si verò sit cauta frigida, non solum vinum conuenit, sed & moschus, ambra & aromata, confectio Alkermes, syrupus de corticibus citri, confectio diambrae, diamoschi vsurpari potest, & in primis ad spiritus subito reficiendos plurimum possunt aquæ & spiritus cordiales passim descripti, quales etiam supra, & cap. præced. fuerunt propositi. Inter eas autem facile primum locum obtinet aqua vitæ alba Dresdensis, quæ quā nimis operosa visa fuit, ad istum modum à D. Andrea Donrero correctæ, & contracta est.

℞. Spirituum bonorum seqq. lento igne seorsim paratorum ex vino. Spirit. vini moschatiellini, Maluatici, rub.

maturs & veteris, an. Canthar. vi. beton. meliss. rorismar. veron. card. bened. menth. crisp. absinth. vulg. hyssop. salvia minor. artemisia rub. & ligno samarisci, & cerasti, sanct. prunor. syluest. vnuarum passiarum, flo. sambuci, & bacci. sunipori, caric. aurant. citri, an. Canth. iii. embraße, scolop. rut. an. Canth. i.

Hiscæ spiritibus commistis adde radic. enula, pimpinell. polypodij, an. ℞. iv. min. valeriana, an. ℞. i. B. sol. salvia, min ℞. i. scolopend. menth. crisp. pulegi, matricaria, an. ℞. vi. nuc. persic. f. a. præp. ℞. ii.

Relinque in infusione per triduum. Colat. adde panes triticeos, perfectè rector, & è farina optimâ paratos, N. x. ita, vt singuli pugnum æquent humanum, frangantur è clibano extracti feruentes adhuc minutim, relinquantur iterum in infusione per triduum. Fiat postea destillatio in arena, moderato igne, ita vt tantum, quod spirituosum est separetur & colligatur. Referuetur diligentissimè hoc destillatum ne exhalet.

℞. Præterea caponem annosum, Aqua vitæ corpulentum, ac suspendo enecatam N. i. cum perdisibus duabus bonis, aut phasiano bono, N. i. deplumetur sine aqua, exenterentur, in frusta diuidantur, remota pinguedine omni ac vino Rhenano bono abluantur. Præparatis hoc modo adde.

Cinamom. elect. caryophyll. galang. zingiber. macis, an. ℞. vi. nuc. moschi N. v. gran. parad. piper. long. cardam. cubebæ. an. ℞. iii. croci ℞. ii. sem. & rad. pæon. an. ℞. vi. sol. maior. ℞. ii. amygdal. dulc. exort. ℞. ii. passul. Cosm. h. ℞. iii. zingiber. ℞. i. B. sacch. cand. ℞. ii. zeduar. ℞. B. manna, ℞. x.

Affunde postea *vini maluat.* & *Alacanth. opr. q.s.* ad perfectā coctionem in duplici vase instituendam. Vbi sponte post coctionem sufficientem refluxerit decoctum, incendantur minutissimè carnes caponis & phasiani, & contundantur probè. Fiat deinde destillatio lenta in arena.

Cui destillationi porrò commisce *destillatione de pambus tritici.*, adde insuper *spiritu. Vin. mosch. batellin. opr. Canth. iii.* Adde præterea sequentes species in duplo: *caryophyll. 3. i. nuc. mosch. macis. piper. long. nigr. an. 3. vi. rad. aristol. long. calami. aromat. diapam. alb. caryoph. torment. angelic. bistorra. lenifici. rhubarbar. per no-ctem prius scorsim infus. in vini Rhen. q.s. xingib. an. 3. b. styrac. calam. in gr. an. 3. vi. sam. alb. rub. citrin. an. 3. vi. croci. 3. ii. sem. anisifenic. coriand. præp. aquileg. carui. an. 3. b. ligni aloë. carpobalsam. 3. i. b. cinam. 3. ii. ligni rosac. 3. x. off. de cord. ceru. N. vi. pomum citrium recens. N. i. mat. perlar. præp. 3. i. b. fl. stœc. Arab. 3. x. primul. vers. 3. ii. borr. bulg. an. 3. vi. lil. conu. rec. nt. 3. i. b. pœonia. anisoth. tunic. plen. violar. rosar. rubr. incarn. spir. flor. laueud. nymph. alb. cent. minor. an. 3. i.*

Adde porrò spec. *arom. caryoph. Mesut. diarrhodon. abb. cum mosch. & camph. diamarg. frig. calid. larii. Gal. diantho. dia. cinam. an. 3. ii.*

Stent in infusione per 9. dies. Fiat deinde per organa vitrea destillatio accurata, & postrema in M. B. ita ut tantum, quod spirituosum est, colligatur.

Tertia pars sine moscho & ambra conservanda & referuanda.

Reliquis duabus partibus adde *mosch. opr. aq. ros. bona prius solut. 3. b. amb. pars modo prius solut. 3. vi.*

Et sic perfectum est opus, referuetur & custodiatur diligentissimè in organis vitreis bene minutis.

Secundò, spiritus excitantur & ad exteriora reuocantur extremorum frictionibus, corporis concussione, acclamatione, nomine a gri in primis expresso, frictionibus linguæ, & palati ore diducto cum theriaca & aqua cinamomi & similibus. Si tamen à spirituum dissipatione, sit syncope, frictiones & ligaturæ non conueniunt, sed xger, quiescat.

Tertio, quod causarum diuersitatem attinet, de qua Gal. 1. ad Glauco. c. 14. Si spiritus non generentur ob nutrimenti defectum, corpus quamprimum reficiendum; quod commodissimè fit vino & pane vino madido exhibito, quo simul spiritus reficiantur, vt diximus.

Si syncope accidat, quod humores tenues adsint, qui facile exhalant, corporisque habitus rarus sit, odoramentis & cibis boni succi restituatur corpus. Corporis præterea summa cutis densanda est oleo rosacco, myrtino, mastichino, cydoniorum; ærque corpus ambiens refrigerandus. Cibi sint qui non facile dissilantur, vt sorbitiones ex allica & similibus, de quo videatur. Gal. 4. meth. med. c. 16.

Si ob morbum aliquem cordis accidat syncope, morbo contraria, vt suprâ dictum, & cordi amica medicamenta exhibenda.

Si ex spirituum alteratione & corruptione fiat syncope, & quidem qualitas vel aura venenata ab vtero communicetur, inferiora fricentur, cucurbitæ ad coxas, & pubem ponantur, pelsi subdantur, & alia, quæ in suffocatione vteri fieri solent, pergantur. Si fiat à materia maligna, &

venenata, ut in vomitu & ruginoso ea exhibeantur, quæ materiam illam eluant, & humores temperent, postea cordialia medicamēta hæcenus propolita exhibeantur. Si ventrū haultum sit, alexipharmaca conveniētia exhibeantur. Si à mōsu animalis venenati accidat, itidem alexiteria vsurpentur, & parti læsæ cucurbitulæ scarificatæ, atque alia venenum emocantia apponantur. Eodem modo & aliis causis malignis resistentum.

Si à spirituum resolutione syncope fiat, cum id rursus variis de causis, ut dictum, accidere possit, singularem habenda ratio & modus, quo causa agit, considerandus, atque aduersus illum pugnandum. Est enim omnes euacuationes nimis spiritus dissipant: alio tamen modo compescenda euacuatio, si per sudorem nimium fiat; alio, si ab alui fluxu alio, si à vomitu; alio, si è sanguinis profusione. Calor ergo si sit nimius, per contraria temperandus & ulcerandus. Si ab immodica euacuatione accidat syncope, euacuatio sistenda, ægerque odoribus, cibo, potu, somnoque ac quiete reficiendus: Cohibetur euacuatio frictionibus, ligaturis, cucurbitulis in aduersum administratis; ut in hæmorrhagia narium fricentur, & ligentur inferiora, cucurbitulæ sine scarificatione apponantur, suris & hypochondrio dextro, si à nare dextra, in sinistro, si in sinistra fluat sanguis, & administrentur alia, quæ hæmorrhagiam narium sistere solent. Ita mensium profluvium debito modo sistatur. In hypercatharsi dentur cibi & medicamenta astringentia, theriacæ non admodum vetustæ, 3. β. vel 3. i.

cum aqua plantaginis. Concilietur somnus, qui omnes euacuationes sistit, excepto sudore. In syncope autem quæ sit euacuationibus nimis, quæ pueritidis non conspergendum, neque alia frigida & cutim astringentia adhibenda, cum talia humores intro pellendo fluxiones augeant.

In sudore largo neque frictiones, neque ligaturæ locum habent, sed ea, quæ cutim astringunt. Facies igitur irroretur aqua rosarum; collum, thorax & axillæ, inguina inungantur oleo rosaceo, myrtino, cydoniorum: æger quiescat, olfaciat frigida, assumatur syrupus granatorum, citri, limonum, ribes, acetosellæ. In ruptione subita apostematis instauratio fiat cibis, odoribus, quiete. Si à vehementi dolore syncope accidat, qui & per se spiritus resolvit, & per accidens vigilis immixtis, remoneatur ille anodynus, & causa doloris tollatur; quod nausea indicat, atque æger faciliè natura sua vomat, vomitus proderit. De quibus Galen. 12. meth. med. capite 4. §. 7. & 8.

Si tandem ex suffocatione spiritus fiat syncope ad ambitum corporis spiritus reuocandi, frictionibus, ligaturis, cucurbitulis & aliis externis partibus adhibitis. Et quidem si ex plenitudine fiat syncope venæ sectio primùm instituenda, ut suffocationis periculum aueratur, cum sanguinem euacuando, tum reuellendo, præsertim si sanguis cum impetu ad vitales partes feratur. Quando enim in hoc casu mittitur sanguis, perinde fit, ac si quis ex quo igni, qui sub strue lignorum suffocatur, aliquid de lignis subtrahat, ut ignis reuiuiscat; qua similitudine Galen.

vitur, 4. *derat. in acut. apbor.* Apetitur autem basilica, vt à fonte sanguis educatur; nisi à mensibus suppressis morbus sit, vbi vena tali apertienda, modò malum det inducias. Sanguis autem iteratis vicibus mittetur, ne vires vna vice nimium labefactentur.

Ex crustorum succorum copia genita syncope, vti os ventriculi simul affectum est, & habitus ac color, qualis ferè hydropicorum est, apparet, nec phlebotomiam, nec purgationem sustinet æger, sed vacuatio conuenit per frictions deorsum factas: primò crurum, deinde brachiorum & spinæ dorsæ, quotidie aliquoties iteratas, quæ & calcifiunt & discutunt. Post frictione inunctio fiat cum oleo aliquo laxante, quale est chamæmelinum & anethinum. Multa primis diebus detur aut oxy-mel cum decocto hyssopi, origani, & simulum. A cibo alio abtineat æger, si vires serant, vt per inediam humores erudi coquantur. Quia tamen pulsus subitò ad imbecillitatem mutatur, panis ex vino exubeatur ad vitandum præsens periculum: postea ad abstinentiam sedeat æger. Aër neque calidus nimium sit, ne liquati humores ad cor confluant, neque nimis frigidus, ne concoctio, & discussio materiz impediatur, episthematis cordis non vtendum, nili materia prius concocta & discussa fuerit. Videatur etiam Galen. 13. *meth. med. cap. 3.*

Si à repentino terrore & metu syncope oriatur, ne ex affixu sanguinis obstructio aliqua in valis, aut inflammatio exciteretur, euacuatio debita instituatur ad periculum illud prohibendum.

Extra paroxysmum curam quod

attinet, danda opera, vt auferantur illæ causæ, quæ iterum possent syncope excitare, vitæque debilitata resiciantur, & cor roboretur. Ideoque in syncope, quæ ex veneno, nimis euacuationibus, aëre calido, sudore prouenit: illa ipsa, quæ in paroxysmo requiruntur, etiam extra illum locum habent, neque aliquid noui ferè agendum. Si autem ex dolore sit syncope, dolores leniendi & causæ doloris excitantes tollendæ. Stupefacientibus tamen cautius & parcius vtendum; eodem modo etiam purgantibus, si ea ob causæ rationem necessaria sunt, vitium semper habenda ratio, & in omnibus medicamentis quancunque etiam causam respiciant, admiscenda sunt cordialia. Si ex inflammatione oriatur, extra paroxysmum seu syncope ipsam, vinum non est dandum. Si acris, tenuisque materia ventriculū lacescat, aloë & pilulis alephanguis euacuari poreit, vel decocto tamarindorum cum manna & syrupo rosarum laxatiuo. Sic enim & causa morbi tollitur, & ventriculus roboratur. Ita & aliis causis omnibus debito modo occurrendum per conuenientia medicamenta.

D x i a.

Aër ab omnibus inquinamentis purus sit, atque alteratus cordialibus pro causarum diuersitate. In paroxysmo vel imminente hoc, aërfrigidus sit, vbi malum est à causa resoluente: moderatè sit etiam frigidus, vbi à causa suffocante, ob refrigerandi corpus necessitatem, ne calor extingatur. Cibus quoque secundum causarum diuersitatem conueniens ordinandus. Vinum extra paroxysmum non conuenit, Vbi plethora adeit; aut calor vehementior, & fe-

bris ardens, aut inflammatio interna
 alieuius visceris, aut delirium, aut
 dolor grauis. Galenus in syncope &
 crudorum humorum copia, vel ex
 flaua bile vel ex succis tenuibus & fa-
 cilè exhalantibus vinum concedit
 tenue, boni odoris, & quod cele-
 riter mutatum in corpus distribua-
 tur, sed nec tum insigniter eum fe-
 bricitare ægrū oportet, nec phleg-
 mone interna affligi.

In syncope verò à resolutione pro-
 batur vinum odoratum, vt & iuscula
 carniū, consumptana, gelatinæ, &
 contusa, qualia in Institut. libro 5.
 part. 3. sect. 3. cap. 2. sunt propo-
 sita.

In syncope à spiricuum corruptio-

ne & alteratione in febris pestilenti,
 aut causa aliqua venenata vinum vel
 iuscula condiantur succo citri, ace-
 tosa, melissa, terrâ sigillatâ, mar-
 garitis & similibus.

Somnus in syncope ex resolutione
 & euacuatione periculosus est; quia
 debilis calor intus reuocatus synco-
 pen augeat. Et proinde per somnum
 æger ab assidentibus diligenter ob-
 seruandus est, nec statim post synco-
 pes solutionem ad somnum est ad-
 mittendus. Nocet quoque vbi syn-
 cope est ex materia venenata rapien-
 do venenum ad cor. Vtilis est in syn-
 cope ex materia cruda, eam coquen-
 do, quam vigilatè temperatè postea
 discutiant.

FINIS.





INDEX RERVM ET VERBORVM.

A.

- ANGINA.** 85. **Aspera arteriæ intemperies.** 125.
Angina exquisita, 86. **Aspera arteriæ vulneca & vulneca,**
eius *causa,* *ibid.* *diff.* 128. *causa,* *signa,* *prognostica,* *cu-*
88. *signa,* 90. *prognos-* *ratio.* 129.
tica, 92. *Indicatio-* **Asperarum arteriarum angustia** 146.
nes, 95. *curatio,* *ibid.* *Diet.* 109. *causa,* *signa,* *ibid.* & 147. *prognos-*
Angina notha 109. *eius signa & cu-* *stica* *ibid.* *indicationes* 148. *curatio*
ratio. 110. *secundum causarum diversitatem va-*
Anginæ epidemix. 87. *ria,* 148. & *sequ.* *Diet.* 152.
Anginæ ex vertebrae collis luxatio- **Althia** 275. *eius causa* 276. *diff.*
ne curatio. 109. *rentia* *ibid.* *signa* *ibid.* *causarum* *fi-*
Angina à melancholia. 111. *gna* 279. *prognost.* 289. *indicationes*
Aphthæ, *vide oris vulneca.* 60. & *281.* *curatio* *tempore paroxysmi* 281.
seq. *extra paroxysmum* 284. *diet.* 289.
Aqua catarrhalis. 312. **Arthmatis à tuberculo, calculo vel**
Aquæ cordiales, cõposita varia. 351. *grandine curatio.* *ibid.*
Aqua D. Doringij ad hydropem pe-
ctoris. 254.
Aquæ pectorales 151. 296. *in illarum*
compositione quid observandum. 151.
Aqua pectoralis calida Dornier. 314.
Aqua vitæ alba Dresdensis. *ibid.*
Arteriaca medicamenta. 126.
Aspera arteriæ angustia, 127. *eius*
causa, *signa,* *prognostica,* *ibid.* *cu-*
ratio. 128.
Aspera arteriæ asperitas, 126. *eius*
signa, *curatio,* *ibid.*
- B** **Alburies.** 302. 303.
Bronchocele 121. 122. *eius cu-*
ratio. *ibid.*
- C** **Alculi in pulmone geniti** 165.
eorum cause 166. *signa,* *pro-*
gnostica & curatio. *ibid.*
Calculi

Calculi in corde reperti.	166.	Cornua in dorso.	260.
Carunculae in pulmonibus genita.	166.	Costarum luxatio. ibid. eius sympto-	
e arundem curatio.	167.	mata, & curatio.	ibid.
Catarthorum septem differentia,		Costarum fractura, eius signa.	260.
256.		prognostica, curatio.	261. dicta 262.
Catarrhi cum spurto sanguinis curatio,		Costarum numerus visus. ibid.	
325.		tumor.	ibid.
Cordis intemperies calida. 331. eius		D.	
causa, signa, prognostica, & curatio.			
332. dicta.	333.		
Cordis intemperies frigida. 333. eius		Dens aureus pueri Siluefij. 51.	
causa, ibid. signa & curatio.		Dens quomodo ad extractionem	
ibid.		parandus.	46.
Cordis intemperies humida: 335.		Dentes canini elapsi non renascuntur.	
eius causa, signa & curatio. ibid.		27. molares nunquam excidunt.	
Cordis motus an pendeat à facultate animalis.	353.	ibid.	
Cordis palpitatio. 338. eius descriptio.		Dentes in palato enati. 28.	
340. causa, differentia, signa. ibid.		Dentes non extrahendi nisi vacillent.	
& 341. prognostica, indicationes.		23.	
343. dicta. 348.		Dentes sine violentia euellendi ratio. ibid. in extractione dentium quadam obseruanda. ibid.	
Cordis palpitationis à flatu & vapore curatio.	344.	Dentes fordidi, 49. causa, ibid.	
Cordis palpitationis ab humore curatio.	346.	curatio. ibid.	
Cordis palpitationis ab humoribus aliunde transmissis curatio.	ibid.	Dentes soli ex osibus extra alucolos prominent. ibid.	
Cordis palpitatio à vermibus. 348.		Dentium casus 28. eius causa, signa, prognostica, curatio. 27. 38.	
à spirituum defectu, ibid. calore nimio febrili. ibid.		Dentium connexio inter se. 29. cum maxilla. ibid.	
Cordis tubitantiæ morbi.	336.	Dentium corrosio & caries. 20. eius causa. ibid. curatio. ibid.	
Cordis tabes.	338.	Dentium dolor. 29. eius causa, signa, prognostica. 30. 31. indicationes & curatio. 42. 43. dicta. 46.	
fieri multis.	ibid.	Dentium dolorem à proprietate sententia. ibid.	
vulnera.	ibid.	Dentium elongatio. 24.	
apostematæ & vlcera.	ibid.	Dentium fistula. 21.	
Cordis ventriculi sinistri defectus.		Dentium immunitio. 24.	
337.		Dentium mobilitas & vacillatio, ibid. eius causa interna, ibid. externa & violentia. 25. curatio. ibid.	
Cor bisutum.	ibid.	Dentium numerus auctus. 28.	
Cor molestans causa. 340.		Dentium sensus vitians. ibid.	
Cor calefacientia medicamentis. 333.			
334. interna, simpliciter. 333. composita. ibid. & seqq. externa simpliciter. 334. composita. ibid.			
Cor refrigerantis medicamentis. 332.			
interna. ibid. externa. 335.			

INDEX RERVM

Dentium *fordes ac sophi.* [129.](#)
 Dentium *stridor* 48. eius *causa*, *pro-*
gnostica, *curatio.* [49.](#)
 Dentium *structura* *fucata.* [37.](#)
 Dentium *stipor* [47.](#) eius *causa* *ibid.*
curatio. [48.](#)
 Dentium *usus.* [30.](#)
 Dentium *ultra* [63.](#) *annum* *atatis* *re-*
natorum *historia.* *ibid.*
 Diabutyrum *Bened. Viſtor. Fanen-*
tini. [287.](#)
 Diaphragmatis *conuulſio.* [318.](#)
 Diaphragmatis *inflammatio* [193.](#) eius
ſigna, *prognostica*, & *curatio*, *ibid.*
 & [224.](#)
 Diaphragmatis *tumores* *frigidi*, *ibid.*
ſigna, *prognostica* & *curatio* *ibid.*
 & [195.](#) *dieta.* *ibid.*
 Diaphragmatis *vulnera* [196.](#) *an ſint*
ſanabilia. [196.](#)
 Diaphragmatis *vulnerati* *in ſtudioſo*
Liuono Vuſtebergæ *hiſtoria* [298.](#)
[296.](#)
 Diuretica *in hydropē* *peſtoris* *uſilia*
ſunt. [264.](#)
 Dolor *infantium* *denſientium.* [46.](#)
 Dracunculi [258.](#) eorum *cauſa* [259.](#)
ſigna, *curatio.* *ibid.*

E.

E^v *Kauu diff. à anadupia & an-*
anadupia. [352.](#)
 Eſectuarium *Bertricy conſortis* *cor*
an omni cauſa. [337.](#)
 Empyema [243.](#) eius *cauſa* *ibid.* *differe-*
ſigna [244.](#) *prognost.* [245.](#) *curatio*,
[246.](#) *dieta.* [242.](#)
 Excreſcentiæ *cauſa* *in corde* *reper-*
ſa. [337.](#)

F.

F^v *Vcus ex hydrate pro corruptis den-*
ſes. [21.](#)

G.

Gⁱ *Ibbositas* [254.](#) eius *ſpecies* [255.](#)
 Gingiuæ *carne denudata.* [34.](#)
 Gingiuæ *excreſcentes & laxæ.* [52.](#)
 Gingiuarum *epulis.* [57.](#)
 Gingiuarum *imminutio* *mobilicatio*
dentium cauſa. [36.](#)
 Gingiuarum *inflammatio* [55.](#) eius
ſigna *prognostica.* *ibid.* *curatio.*
ibid.
 Grandines *in pulmone* *geniti* [165.](#)
illorum cauſa [166.](#) *ſigna*, *progn-*
ostica, *curatio.* *ibid.*
 Grumos *ſanguinis* *in peſtore* *reſolu-*
uentia *medicamentis* [160.](#) *quo tem-*
pore ſine exhibenda. [167.](#)
 Gurgulionis *inflammatio* & *exulce-*
ratio [73.](#) eius *cauſa*, *ſigna* *progn-*
ostica [73.](#) *curatio* [74.](#) *dieta.* [77.](#)
 Gurgulionis *laxatio* [70.](#) eius *curatio.*
[71.](#)
 Guttur *illaſſa* *ut examenda.* [82.](#)

H.

Hⁱ *Aſenſebare.* [80.](#)
 Hirundinum *pulsis* *contra an-*
ginam. [110.](#)
 Humorū *pleuritidem* *parientium*
ſigna. [197.](#) [198.](#)
 Hydrops *peſtoris* [331.](#) eius *cauſa*,
[152.](#) *differentia*, *ſigna*, [253.](#) *pro-*
gnost. *curatio* *ibid.* *dieta.* [254.](#)
 Hydrops *pulmonis.* [17.](#)

I.

I^v *Us galli decrepiti purgans.* [149.](#)
[181.](#) [285.](#) [291.](#)
 Iuuenibus *cur phthiſis familiaris.*
[166.](#)

K.

K^v *Ar. Iſu quid?*

112.

L.

- L**abia curta 8. curandi ratio duplex. *ibid.*
 Labia leporina, *ibid.* illorum curatio. *ibid.*
 Labia liuida. 10.
 Labiorum fissura 4. eorum causa 5. differentia *ibid.* signa, prognostica, indicationes, *ibid.* curatio. 6.
 Labiorum inflammatio 4. cancer, *ibid.* & eius curandi ratio peculiaris. 8.
 Labiorum peruersio 9. eius causa. 10.
 Labiorum tremor. 9.
 Labiorum tumor 4. natus 3. à venenis 4. durus. *ibid.*
 Labiorum tumores aridi. *ibid.*
 Labiorum ulcera 6. cause, signa, prognostica & curatio, *ibid.* data. 7.
 Labiorum usus. 3.
 Labiorum vulnera. 8.
 Leuium pulmonis arteriarum angustia 153. eius causa, signa, 154. prognostica, indicationes & curatio. 155.
 Leprosia. 108.
 Lingue vitia. 19.
 Lipothymia vide Syncope. 351.
 Lipothymia & syncope quomodo differant. *ibid.*
 Lipothymia an sit affectus cerebri, 357. an in ea spiritus animales potissimum afficiantur? *ibid.*
 Lumbago 156. eius curatio. 258.
 Lunatica passio ex vermibus impericatio orta. 330.
 Lupi conspectus vitiosa visus causa. 302.

M.

- M**axilla inferior capiti adnata. 58.
 Maxilla cum capite connexio. 58.
 Maxilla fractura. 59.

- Maxilla fractura oris tortura causa. 14.
 Maxilla inferioris immobilitas 60. signa & curatio eius. 35.
 Maxilla inferioris iunctura soluta, 58. eius prognostica, & curatio. *ibid.*
 Maxillarum fungus. 57.
 Maxillarum luxatio 58. eius signa, prognostica, & curatio. *ibid.* & 59.
 Maxillarum syderatio. 57.
 Mediastini inflammatio 192. eius causa, signa, *ibid.* prognost. & curatio *ibid.* data. 192.
 Mitescer 159.
 Mucronata cartilaginis prolapsus, 262. eius causa manifesta 264. obscura *ibid.* symptomata ac signa 265. prognostica & curatio. 266.
 Mucronata cartilaginis prolapsus an sit morbus ficticius? 262. qualis sit morbus? 264. huius morbi nomen & natura 262. quae partes in morbo afficiantur? 264.

N.

- N**igellæ radix fluxum sanguinis sistit. 326.
 Nutricum incuria in infantibus fasciis constringendis. 250.

O.

- O**mnizonis seu forceps dentarius plumbens in templo Apollinis suspensus. 23.
 Odorata spiritus rescindunt. 350.
 Oleum citri in palpitatione cordis valde utile. 345.
 Oleum lini in pleuritis epidemia alium monet. 214.
 Oris apertio lesa 14. eius causa, signa & curatio. *ibid.*
 Oris distortio 12. causa *ib.* remota 13.

INDEX RERVM.

- signa.* 14. *prognostica & curatio.* 15. *Pleuritis* 196. *eius causa proxima* 197. *remota* 198. *differentia* 200. *signa* *ibid.* *tempora* 202. *signa* *differentiarum* 202. *prognost.* 203. *indicationes* 207. *curatio* *ibid.* *Dietæ.* 11. 221.
- Oris factor* 68. *eius causa* *ibid.* *signa.* *prognostica.* *curatio.* 69.
- Oris hiatus* 10. *eius causa.* *prognostica & curatio.* 11.
- Oris inflammatio* 68. *eius signa & curatio.* *ibid.*
- Oris peruersio ex resolutione nervorum.* 141.
- Oris ulcera & æstus.* 61. 68. 56. *Pleuritidis vere & falsa differentia.* 200. 201.
- eorum causa* 61. *differentia* 62. *signa* *prognostica* 67. *indicationes* 64. *curatio in infantibus* 64. *in adultis* 65. *Dietæ.* 67.
- Orthopnea.* 257.
- Oscitatio* 11. *eius signa.* *prognostica.* *ibid.* *curatio.* *ibid.*
- Ossa in pulmonibus genita.* 165.
- Ossis palati corruptio.* 67.
- Oua in dorso.* 260.
- Oxymel belleboratum Gesneri.* 286.
- P.*
- P* *Astinax maxillæ radius dentes excidere facit.* 46. 45.
- Paralysis & convulsio in torsura oris interdum iunguntur.* 13.
- Paralysis in inflammatione pulmonis.* 139.
- Pectoris dolor* 318. *eius signa* 319. *prognost.* *& curatio.* 320.
- Pediculi in dorso.* 259.
- Pericardij aqua aucta vel deficiens.* 330.
- Pericardij corruptio.* 331.
- Pericardij defectus.* 330.
- Pericardij putredo.* 331. *tumores* 330. *ulnura* 331.
- Phthisis definita* 176. *eius subiectum.* *causa.* *ibid.* *differentia* 179. *signa* *incipientis* *ibid.* *perfectæ* *ibid.* *prognostica* 181. *indicationes* 182. *curatio* 185. *Dietæ.* 187.
- Pleuritidis à diaphragmatis inflammatione discrimin.* *ibid.*
- Pleuritidis ab hepatis inflammatione differentia.* *ibid.*
- Pleuritidis salutaris terminatio.* 205.
- signa salutis in pleuritide* 200. *signa* *mortis.* *ibid.*
- in Pleuritide ante annum* 24. *vena non secunda.* 209.
- Pleuriticorum victus à veteribus accurâtè prescriptus.* 221.
- Ptyalisinus* 16. *eius cause* 18. *signa.* *prognost.* *ibid.* *curatio.* 19.
- Pulmonis vasorum apertio quot modis fiat* 150. *eius signa.* *prognostica* 157. *indicationes* 159. *curatio* *ibid.* *dietæ.* 164.
- Pulmo quomodo euacuatur?* 131.
- Pulmo repletus.* 146.
- Pulmonis cancer.* 190.
- Pulmonis hydatides.* 190. 191.
- Pulmonis inflammatio* 134. *eius causa.* *ibid.* *differentia* 136. *signa* 137.
- prognost.* 140. *indic.* *& curatio* 143. *dietæ.* 144.
- Pulmonis intemperies* 130. *eius causa.* *signa* 131. *prognostica* 132. *indicationes & curatio* 132. 133. *dietæ.* *ibid.*
- Pulmonis morbi in numero deficientes.* 167.
- Pulmonis sphacelus.* 190.
- Pulmonis tubercula* 167. *cruda & suppurata* *ibid.* *causa* *ibid.* *signa* 168. *prognostica & curatio* 169.

ET VFRBORVM.

Pulmonis vulneris causa proxima	Saluæ & sputi differentia.	16.
176. mediata 177. signa 179. prognostica 181. curatio 182. Diata.	Saluæ generatio 19. vsus.	17.
187.	Sanguinis fluxus & dentibus.	51.
Pulmonum ulcera peculiaria.	Labii. 14. Gurginis.	54.
189.	Sibuvacens qualis sit morbus.	
Pulmonum cum latere coalitus 170.	348.	
eius causæ, signa 171. prognostica, curatio.	Sermonis vitia, vide vocis vitia, an omnis sermo vox sit?	297.
Pulmones refrigerantia 177. catasacientia ibid. siccantia 134. immetantia. ibid.	Sermonis vitii causa.	299.
Pulmonum vulnera 172. signa vasorum pulmonis vulnera ibid. signa carnis pulmon. vulnerata, ibid. prognost. 173. indicatio & curatio. ibid. diata.	Spasmus Cynicus.	12.
175.	Spasmus Cynicus ex abscisso furunculo ortus.	13.
Pulmonis vulnerati historia.	Spinæ dorsi contuse.	255.
Pulmonis planè consumpti historia.	fractura.	ibid.
331.	vulnera.	ibid.
Pulsus & respirationis differentia.	Sputum sanguinis 321. causæ, 322. differentia, 323. signa ibid. prognostica, indicationes & curatio 325. diata.	327.
271.	Sputi sanguinis in muliere à Galen. curati historia.	327.
Purgantia si diutius continuantur, mandanda sunt.	Strangulatio 295. eius causæ, ibid. prognostica, curatio.	296.
Pus in empyemas e sensim euacuandum.	Strangulati laqueo quomodo curandi.	ibid.
248.		

R.

P <i>Αἰμάρι.</i>	5.
Raucedo, vide vocis vitia.	
197.	
Raucedinis è catarrho curatio 303. à pure 304. à causis externis. ibid.	
Rectitudo quid.	211.
Regum Galliarum in curandis strumis vis.	121.
Respiratio quomodo ledatur.	272.
Respiratio læta in genere 275. causa. ibid. & 376.	

S.

S Aliuæ defectus 19. signa, prognostica & curatio.	ibid.
---	-------

Sibu vacens qualis sit morbus.	348.
Sermonis vitia, vide vocis vitia, an omnis sermo vox sit?	297.
Sermonis vitii causa.	299.
Spasmus Cynicus.	12.
Spasmus Cynicus ex abscisso furunculo ortus.	13.
Spinæ dorsi contuse.	255.
fractura.	ibid.
vulnera.	ibid.
Sputum sanguinis 321. causæ, 322. differentia, 323. signa ibid. prognostica, indicationes & curatio 325. diata.	327.
Sputi sanguinis in muliere à Galen. curati historia.	327.
Strangulatio 295. eius causæ, ibid. prognostica, curatio.	296.
Strangulati laqueo quomodo curandi.	ibid.
Strumæ in gutture 115. causa 116. signa, prognostica, curatio.	117.
Suffocatio vide strangulatio.	295.
Suffocatio spontanea serui Barbari.	271.
Suffocati ex vaporibus seu fumis vis curandi 296. 297. ex submersione in aquam, ibid. à fungis venenatis.	ibid.
Syncope vocis an Hippocrati in visio fuerit.	352.
Synopes definitio 353. causa, ibid. differentia, 355. signa 350. prognostica 357. indicationes & curatio.	358.
Synopes à cognatis affectibus differentia.	357.
Syrupus de belenio Angeni.	287.
Syrupus de erysimo Lobelli.	304.
Syrupus catarrhalis Kegli.	305.

INDEX RERVM

T.

T Abes dorsalis. 255.
eius differentia. *ibid.*
 Thoracis fistula 242. *illarum differentia*, *ibid.* *signa*, *prognostica* & *curatio.* *ibid.*
 Thoracis vulnera 238. *duplicita*, *ibid.*
 Thoracis vulnerum penetrantium *signa*, 239. *prognostica*, *ibid.* *curatio* 240. *dieta.* 242.
 Tonfillarum inflammatio & *ulcera* 77. *causa*, *signa*, *prognostica*, 78. *curatio* 79. *dieta.* 82.
 Tussis definitio 305. *causa* 306. *differentia* 308. *signa* 309. *prognostica* *ibid.* *indicationes* 311. *dieta.* 316.
 Tussis quatenus talis *curatio.* 311.
 Tussis ab intemperie *curatio.* 312.
 Tussis à catarrho *curatio* *ibid.* à materia calida *acuta* & *acuta*, 313. *ab humore pituitoso* 314. *à reliquis causis.* 316.

V.

V Enz cauz ramulus à Nicolao Sanmichelo observatus. 237.
 Venz sectio tuisissimum pleuritidis *auxilium.* 208. 209.
 an purgationi in pleuritide sit praefenda. 208.

Vermes in pulmonibus *geniti* 165. *causa* 166. *curatio.* *ibid.*
 Vermes dors. 258.
 Vermes in pericardio 224. *signa* & *curatio.* *ibid.*
 Vermes in ipso corde reperti. 337.
 Verruez in gutture & lingua 68.
 Vertebrae primae luxatio, 254.
 Vertebrae cervicis luxatio *ibid.* earundem subluxatio. 255.
 Vertebrae dors. luxatio 254. *eius differentia* 256. *causa externa* *ibid.* *internae* *ibid.* *signa* 257. *prognostica* *ibid.* *curatio.* 258.
 Vertebrae quassatio. 255. *eius curatio.* *ibid.*
 Veliculae in pulmonibus *genita* 176. earum *curatio.* *ibid.*
 Virium imbecillitas 216. *eius causa* 345. *signa*, *prognostica*, *indicationes* & *curatio* 208. *dieta.* 352.
 Vocis organa 298.
 Vocis vitia 297. *differentia* illorum, 298. *causa* 299. *signa* 302. *prognostica* 303. *curatio.* *ibid.*
 Vox animalibus *cur data.* 297.
 Vox articulata *ibid.* an etiam sit brutorum. *ibid.*
 Vox obtusa. 301.
 Vox rauca 303. *eius causa* 302. *curatio* vide raucedo.
 Vox tremula 302. *abrupta* *ibid.* clausa 302. *curatio.* *ibid.*



FINIS.

187.00 15.0

187.00

6.7. 60. 73.



